


ANATOMIA EM RADIOLOGIA

Prof. Fernando Henrique Alves Benedito



Crânio


Vista Anterior







Crânio

Vista Lateral











Crânio

Secção Sagital Mediana




Crânio de um Recém-nascido

Vista Lateral









Vértebras Cervicais [C2-T1], Agrupadas


Vista Lateral Direita



Alinhamento da coluna cervical. Radiografia da coluna cervical demonstrando as linhas convexas da coluna cervical. 1- Linha formada pela junção das margens anteriores de todos os corpos vertebrais. 2- Linha formada pela junção dos muros posteriores de todas as vértebras. 3- Linha formada pela junção das margens anteriores dos processos espinhosos / lâminas. 4- Junção das porções posteriores dos processos espinhosos



Articulação Atlanto-occipital






Case courtesy of Dr Tom Molyneux, Radiopaedia.org, rID: 55665

Úmero e Escápula


Vista Posterior








Ossos do Cotovelo em Extensão

Vistas Anterior e Posterior









Incisura radial da ulna

Processo coronóide


Incisura troclear


Olécrano



Rádio e Ulna Direitos em Supinação


Vista Anterior






Ossos do Carpo

Vista Anterior [Palmar]



Ossos do Carpo

Vista Posterior [Dorsal]




1. escafóide
2. semilunar
3. Piramidal sobre pisiforme
4. trapézio
5. trapezóide
6. capitato
7. hamato



Case courtesy of Dr Benoudina Samir, Radiopaedia.org, rID: 43806


Ossos do Punho e da Mão


Vista Anterior [Palmar]



Ossos do Punho e da Mão

Vista Posterior [Dorsal]





L

R



L


R






Topografia dos Pulmões

Vista Anterior








Case courtesy of Dr Usman Bashir, Radiopaedia.org, rID: 18394




Case courtesy of Dr Garth Kruger, Radiopaedia.org, rID: 21938



Case courtesy of Dr Jeremy Jones, Radiopaedia.org, rID: 26866




Quadrantes do abdome








Case courtesy of Dr Jeremy Jones, Radiopaedia.org, rID: 34071




Case courtesy of Dr Jeremy Jones, Radiopaedia.org, rID: 34071



Case courtesy of Dr Ahmed Abdrabou, Radiopaedia.org, rID: 35721

Pelve Feminina

Medidas - Vista Anterior




Vista AP da pelve feminina





Pelve Masculina

Medidas - Vista Anterior



Vista AP da Pelve masculina






Linha iliofemoral

- A linha iliofemoral é traçada em uma projeção de pelve AP. É uma linha curvilínea, ao longo da superfície externa do ílio, através da borda acetabular superior e do colo femoral.
- Deve ser bilateralmente simétrico. A assimetria pode ser o resultado de displasia congênita, escorregamento da epifisiólise do fêmur, luxação ou fratura.




Nervo Obturatório



Nota: são mostrados somente os músculos inervados pelo nervo obturatório


Articulação do Quadril

Vista Anterior




Fêmur

Vista Anterior



Fêmur


Vista Posterior



AP do quadril

- O AP do quadril examina a anatomia da articulação do quadril e do fêmur proximal.





Handwritten signature

Vista “perna de rã” lateral

- A vista “perna de rã” lateral é um exame radiográfico especial da pelve para avaliar o quadril. O exame bilateral permite uma melhor visualização das articulações do quadril e do colo femoral e, portanto, é uma visão importante na avaliação de: epífise femoral superior escorregada (SUFE), doença de Perthes




R

HORI-BEAM


Vista AP do joelho com carga

- A visão do peso do AP do Joelho é uma projeção especializada para avaliar a articulação do joelho, o fêmur distal, a tíbia proximal e a fíbula e a patela. Frequentemente usado no contexto de consultas ortopédicas para obter imagens dos joelhos em sua posição anatômica natural.
- Essa visão é frequentemente usada para avaliar a osteoartrite, não é incomum que a visão do AP seja bilateral.




Tíbia e Fíbula da Perna Direita

Vista Anterior



Tíbia e Fíbula da Perna Direita

Vista Posterior




Vista AP

- 8 anos, Masculino
- Queda de skate. Deixar de suportar o peso é adequado.




Ossos do Pé

Vista Dorsal



Ossos do Pé

Vista Plantar



Fratura de cubóide



A



ALB


L



L

Ossos do Pé

Vista Lateral



Ossos do Pé

Vista Medial

