

# MANUAL FARMACÊUTICO

2021 / 2022



**OSWALDO CRUZ**  
HOSPITAL ALEMÃO

SUMÁRIO ←

# **Manual Farmacêutico**

## **2021 - 2022**

Elaboração  
Comissão de Farmácia e Terapêutica

7ª edição



Site: [www.hospitalalemao.org.br](http://www.hospitalalemao.org.br), na seção Médicos > Área Exclusiva  
para Profissionais de Saúde > Manual Farmacêutico  
E-mail: [cim@haoc.com.br](mailto:cim@haoc.com.br)

**PRESIDENTE DO CONSELHO DELIBERATIVO**

Weber Porto

**VICE-PRESIDENTE DO CONSELHO DELIBERATIVO**

Mark Albrecht Essle

**DIRETOR-PRESIDENTE**

Paulo Vasconcellos Bastian

**DIRETORA-EXECUTIVA ASSISTENCIAL**

Fatima Silvana Furtado Gerolin

**DIRETOR-EXECUTIVO MÉDICO**

Dr. Antonio da Silva Bastos Neto

**DIRETOR-EXECUTIVO DE OPERAÇÕES**

Allan James Paiotti

**DIRETOR-EXECUTIVO DE INOVAÇÃO, PESQUISA E EDUCAÇÃO**

Kenneth Nunes Tavares de Almeida

**DIRETORA-EXECUTIVA DE RESPONSABILIDADE SOCIAL E DE GENTE & GESTÃO**

Ana Paula Pinho

**DIRETOR CLÍNICO**

Dr. Marcelo Oliveira dos Santos

**VICE-DIRETOR CLÍNICO**

Dr. Gilberto Turcato Junior

**COORDENADOR DA COMISSÃO DE FARMÁCIA E TERAPÊUTICA**

Dr. Luis Edmundo Pinto da Fonseca

**MEMBROS DA COMISSÃO DE FARMÁCIA E TERAPÊUTICA**

Dr. Americo Lourenco Cuvello Neto

Dr. Antonio Francisco Marques

Dr. Cheng Tzu Yen

Dr. Julio Henrique Onita

Dr. Leonardo Teixeira D. Duarte

Dr. Luis Edmundo Pinto da Fonseca

Dr. Philip Bachour

Dr. Vladimir Bernik

Dr. Wagner Galvão

Gerente de Assistência Farmacêutica Alessandra Pineda Amaral Gurgel

Farmacêutica Marcella Arruda Cotta

Farmacêutica Lara Cristina Viana de Almeida Bueno

Enfermeira Juliana dos Santos Amaral

Nutricionista Mylene Montes Rodrigues Faim

Diretora de Suprimentos Leonisa Obrusnik

Apoio

## **GERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA**

Farm<sup>a</sup> Alessandra Pineda do Amaral Gurgel

## **DIRETORA DE SUPRIMENTOS**

Leonisa Obrusnik

## **ELABORAÇÃO E REVISÃO**

Farm<sup>a</sup> Marcella Arruda Cotta

## **COLABORADORES**

Farm<sup>o</sup> Alfredo Jose A. Rodrigues Neto

Farm<sup>a</sup> Andreia Ramos Lira

Farm<sup>o</sup> Anderson Da Silva Galvão

Farm<sup>a</sup> Barbara A. R. Nascimento

Farm<sup>a</sup> Bianca Oliveira Lima

Farm<sup>a</sup> Carolina Cardoso Venâncio

Farm<sup>a</sup> Cristiane Aparecida Alves

Farm<sup>o</sup> Denis Dequian de Souza Silva

Farm<sup>o</sup> Eduardo Henrique de Araújo Castro

Farm<sup>a</sup> Elaine Darini Bastos

Farm<sup>a</sup> Elaine Miguel Neves

Farm<sup>a</sup> Eliane Sateles Ferreira

Farm<sup>a</sup> Fabiane de Oliveira Moreira

Farm<sup>a</sup> Fernanda Begnami Guimaraes

Farm<sup>a</sup> Ingrid Correa de Castro

Farm<sup>a</sup> Juliana Januzzi da Costa

Farm<sup>a</sup> Juliana Mucedola Longo

Farm<sup>a</sup> Lia do Céu Cardoso

Farm<sup>a</sup> Luciana Marques de Souza

Farm<sup>a</sup> Marcelle Cristine de Freitas Soares Vieira

Farm<sup>a</sup> Marina Alves de Andrade Ferreira

Farm<sup>a</sup> Nathalia Castrello Novo Pais

Farm<sup>a</sup> Paula Cazzonatto Zerwes

Farm<sup>o</sup> Pierre Galdino

Farm<sup>o</sup> Willian de Almeida Bispo

## **REVISÃO ORTOGRÁFICA**

Bianca Oliveira

## **REVISÃO TÉCNICA**

Farm<sup>a</sup> Teresa Cristina Bortoletto

## **DESIGNERS**

Amanda Dassié

## **PROJETO EDITORIAL**

TERRA A VISTA

Comunicação, Marketing e Cultura.

[www.vista.com.br](http://www.vista.com.br) - [terra@vista.com.br](mailto:terra@vista.com.br)



# PREFÁCIO À SÉTIMA EDIÇÃO DO MANUAL FARMACÊUTICO

## EVOLUIR, SEMPRE

O Hospital Alemão Oswaldo Cruz é uma Instituição com 122 anos de história e serviços prestados à população brasileira. Um de nossos valores aplica atenção e precisão para entregar o essencial para todos os nossos pacientes: segurança. Por isso, como bem diz a expressão alemã “immer besser”, que significa fazer sempre melhor, aplicamos este conceito para entregar o melhor diagnóstico, oferecer os mais eficientes tratamentos e perseguir os melhores desfechos clínicos.

Em 2019 finalizamos o processo de automação logística, iniciativa que permite a total rastreabilidade dos medicamentos utilizados nos processos assistenciais, por meio de dispensários eletrônicos, robotização do almoxarifado e da implementação de ferramentas que permitem o gerenciamento eletrônico da origem e destino de cada medicamento. Isso proporcionou mais agilidade aos pacientes internados, já que pudemos evitar os deslocamentos.

A administração de medicamentos à beira leito, presente nas unidades de internação e Unidade de Terapia Intensiva (UTI) desde 2018, também foi implementada em 2019 no Pronto Atendimento, o que possibilitou agilizar o atendimento dessa área, tornando ainda mais eficaz a atuação de nossas equipes assistenciais.

Em 2021 atualizamos a 7ª edição do Manual Farmacêutico, guia de apoio para todo o corpo clínico e assistencial, que facilita as rotinas adotadas em nosso dia a dia. Esperamos que este documento funcione como uma importante referência para assegurar um atendimento de excelência, servindo para aumentar a qualidade e a segurança com que já somos reconhecidos, na prática.

**Paulo Vasconcellos Bastian**

Diretor Presidente

# **PREFÁCIO À SÉTIMA EDIÇÃO DO MANUAL FARMACÊUTICO**

## **INOVAÇÃO E ATUALIZAÇÃO**

A 7ª edição do Manual Farmacêutico do Hospital Alemão Oswaldo Cruz demonstra a constância de propósitos da organização, no sentido de buscar sempre a inovação e atualização de conteúdos fundamentais para os princípios da qualidade e segurança na assistência aos pacientes atendidos nesta instituição.

Com o contínuo e rápido desenvolvimento da indústria farmacêutica no que se refere a novos medicamentos, existe a necessidade de nos mantermos atualizados e melhor preparados para esta realidade, sempre fundamentados por evidências científicas.

Este manual, bem como as edições anteriores, foi desenvolvido de forma multidisciplinar, pois entendemos que a participação de todos os profissionais que compõem a assistência hospitalar tem contribuições fundamentais para esta construção. Como resultado, tem-se um recurso para que todos os profissionais que cuidam dos pacientes, direta ou indiretamente, possam consultar e aprimorar seu conhecimento na área farmacêutica, buscando a racionalização e a padronização de fármacos. É um instrumento destinado não somente a esta Instituição mas, também, representa um modelo para diversos hospitais e profissionais.

**Fátima Silvana Furtado Gerolin**  
Diretora Executiva Assistencial

# **PREFÁCIO À SÉTIMA EDIÇÃO DO MANUAL FARMACÊUTICO**

## **SEGURANÇA NA ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS**

O compromisso inegociável do Hospital Alemão Oswaldo Cruz com a adoção de práticas de qualidade e segurança do paciente representa o pilar de sustentação para a complexa cadeia de processos envolvidos na administração de medicamentos aos nossos pacientes.

Os investimentos frequentes nas diferentes etapas do processo e os projetos de melhoria contínua têm promovido o fortalecimento da cultura de inovação, permitido garantir nossos protocolos clínicos e sistemas de controle cada vez mais seguros e eficientes.

A 7ª edição do Manual Farmacêutico reflete o trabalho conjunto de várias equipes de profissionais de toda a Instituição, fundamentado nas melhores evidências científicas.

Espero que este manual seja de extrema utilidade aos profissionais de saúde e possa ser uma fonte precisa para dirimir e esclarecer eventuais dúvidas, promovendo o tratamento efetivo e seguro aos nossos pacientes.

**Antonio da Silva Bastos Neto**  
Diretor Executivo Médico

# **PREFÁCIO À SÉTIMA EDIÇÃO DO MANUAL FARMACÊUTICO**

## **SEGURANÇA NA PRESCRIÇÃO E PROCEDIMENTOS ASSISTENCIAIS**

Apresento aos colegas do Corpo Clínico a 7ª Edição do Manual Farmacêutico do Hospital Alemão Oswaldo Cruz. Desde a edição inicial, o Manual Farmacêutico tem sido utilizado não apenas como uma relação ordenada de compostos, doses e apresentações, mas como prática ferramenta de consulta de informações, auxiliando os profissionais na prescrição, manipulação ou administração de medicamentos.

Esta edição atualizada faz parte do trabalho dos membros da Comissão de Farmácia e Terapêutica, na busca pela segurança nas prescrições médicas, e demais procedimentos assistenciais do nosso hospital.

**Marcelo Oliveira dos Santos**

Diretor Clínico

# **PREFÁCIO À SÉTIMA EDIÇÃO DO MANUAL FARMACÊUTICO**

## **PRESCRIÇÕES OTIMIZADAS**

Um dos objetivos da 7ª edição do Manual Farmacêutico do Hospital Alemão Oswaldo Cruz é demonstrar que, ao otimizar o uso de tecnologias em saúde, podemos contribuir favoravelmente para um uso cada vez mais racional e sustentável do sistema. Num panorama em que os custos da saúde crescem vertiginosamente, pressionando os orçamentos das instituições hospitalares e de toda a cadeia de valor da saúde, refletir sobre a escolha eficiente dos medicamentos é uma maneira de promover a saúde baseada em valor para nossos clientes, oferecendo uma melhor experiência ao paciente e otimizando recursos.

O manual é resultado de inúmeras pesquisas e estudos da Comissão de Farmácia e Terapêutica na busca de um arsenal terapêutico que assegure qualidade para um tratamento custo-efetivo, sempre primando por fornecedores qualificados e tecnologias efetivas, seguras e inovadoras para nosso Corpo Clínico e profissionais de saúde.

Ser sustentável é a base para continuarmos evoluindo e proporcionando a melhor experiência para nossos pacientes, nos comprometendo com o nível assistencial de excelência pelo qual o Hospital Alemão Oswaldo Cruz é amplamente reconhecido no Brasil e no mundo.

**Allan James Paiotti**

Diretor Executivo Operacional

# **PREFÁCIO À SÉTIMA EDIÇÃO DO MANUAL FARMACÊUTICO**

## **PRESCRIÇÃO ADEQUADA E SEGURA**

Apresentamos a nova edição do Manual Farmacêutico do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, necessária devido à constante atualização do rol de medicamentos padronizados nesta Instituição. Ele é um importante fruto do esforço de uma equipe multidisciplinar, composta de farmacêuticos, enfermeiras, nutricionistas, administradores e médicos de diversas e abrangentes especialidades e segue os mesmos critérios das edições anteriores.

Em paralelo à evolução da terapêutica médica, exige-se uma contínua revisão e análise, com a inclusão de novos princípios ativos e apresentações, assim como a exclusão de tecnologias superadas e/ou de baixo consumo a nível hospitalar.

Este Manual, além de listar todos os medicamentos padronizados na Instituição, com orientações detalhadas sobre seu uso, da mesma forma que nas suas edições anteriores, oferece outras importantes informações práticas, tanto técnicas como administrativas, visando uma prescrição adequada e segura.

Agradeço à participação de todos os membros da Comissão de Farmácia e Terapêutica e de seus consultores pela sua dedicação e contribuição, qualificada e idônea. Assim como em todas as Comissões e Comitês do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, todos os Colaboradores desta Comissão de Farmácia e Terapêutica preenchem e assinam a Declaração Anual de Potencial Conflito de Interesses, aumentando a transparência e a credibilidade de suas opiniões.

Nosso reconhecimento especial a equipe de Farmacêuticos deste Hospital, a quem coube o maior esforço, incluindo e organizando todas as informações selecionadas, neste texto final. Esta atual edição deixa de ser fisicamente impressa e passa a ser publicada exclusivamente por via digital, estando disponibilizada em todos os terminais de computadores da Instituição, pela sua Intranet e pela Internet, possibilitando a sua consulta por profissionais desta e de outras instituições. Esta facilidade de consulta e o seu valioso conteúdo visam o principal objetivo deste Manual, que é de servir como uma importante ferramenta para a correta prescrição e administração dos fármacos.

**Luís Edmundo Pinto da Fonseca**

Coordenador da Comissão de Farmácia e Terapêutica

## **AGRADECIMENTOS**

“À Presidência do Conselho, Diretor Presidente e aos Diretores Executivos por terem viabilizado o desenvolvimento desta 7ª edição”.

“À Diretoria Clínica, à Diretoria de Suprimentos, à Gerência de Assistência Farmacêutica e aos membros da Comissão de Farmácia e Terapêutica, por colaborarem no processo contínuo de avaliação e padronização dos medicamentos no Hospital Alemão Oswaldo Cruz”.

“A todos os profissionais de saúde, colaboradores do Serviço de Assistência Farmacêutica e, em especial aos estagiários: Ricardo Santos Nawoe, Diane Dutra Souza, Giulia Brambillo dos Santos, Julia Rosaneli Nestlehner Moreno, Suellen Cristina Cardoso e Leticia Santos Arcanjo que contribuíram com seu esforço e dedicação de forma direta e indireta para a publicação do Manual Farmacêutico 2021-2022”.

## SUMÁRIO

|                                                                              |     |
|------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Prefácio à sétima Edição do Manual Farmacêutico .....                        | 05  |
| Agradecimentos .....                                                         | 09  |
| Orientações sobre a Utilização do Manual .....                               | 13  |
| Abreviações.....                                                             | 14  |
| Medicamentos elegíveis para prescrição .....                                 | 16  |
| Serviço de Assistência Farmacêutica.....                                     | 21  |
| Comissão de Farmácia e Terapêutica.....                                      | 28  |
| Orientação de Prescrição de Medicamentos não Padronizados .....              | 30  |
| Orientação de Inclusão na Padronização .....                                 | 30  |
| Orientação de Prescrição de Medicamentos da Secretaria da Saúde .....        | 33  |
| Orientação de Prescrição de Medicamentos Importados.....                     | 33  |
| Classificação Terapêutica de Medicamentos por Princípio Ativo / Subgrupo ... | 38  |
| Classificação Terapêutica dos Medicamentos por Indicação .....               | 50  |
| Medicamentos Padronizados por Ordem Alfabética de princípio ativo .....      | 112 |
| Orientações Gerais sobre Medicamentos .....                                  | 560 |
| Doses Usuais e Diluição dos Injetáveis .....                                 | 560 |
| Ajuste de Dose para Insuficiência Renal .....                                | 560 |
| Administração Via Sonda .....                                                | 560 |
| Administração com Alimentos .....                                            | 562 |
| Administração em Idosos .....                                                | 562 |
| Alto Custo .....                                                             | 562 |
| Alta Vigilância .....                                                        | 562 |
| Armazenamento .....                                                          | 563 |
| Risco de Queda .....                                                         | 565 |



|                                                                               |            |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Medicamentos Sujeitos a Controle Especial .....</b>                        | <b>569</b> |
| <b>Serviço de Terapia da Dor.....</b>                                         | <b>572</b> |
| <b>Nutrição Parenteral .....</b>                                              | <b>575</b> |
| <b>Tabela de Contrastes .....</b>                                             | <b>580</b> |
| <b>Tabela de Insulinas .....</b>                                              | <b>582</b> |
| <b>Tabela de Radiofármacos.....</b>                                           | <b>583</b> |
| <b>Tabela de Medicamentos relacionados à flebite .....</b>                    | <b>584</b> |
| <b>Tabela de Vasoativos - Diluições Padronizadas na UTI .....</b>             | <b>591</b> |
| <b>Glicocorticoides: Equivalência de Doses.....</b>                           | <b>593</b> |
| <b>Correlação de Medidas Domésticas .....</b>                                 | <b>594</b> |
| <b>Correspondência em mEq.....</b>                                            | <b>595</b> |
| <b>Correspondência Iônica .....</b>                                           | <b>597</b> |
| <b>Correlação entre Dose, Gotas e Mililitros.....</b>                         | <b>598</b> |
| <b>Medicamentos de Alta Vigilância Clássica .....</b>                         | <b>600</b> |
| <b>Medicamentos de Alta Vigilância por Fonética / Escrita Semelhante.....</b> | <b>604</b> |
| <b>Medicamentos de Alta Vigilância por Aparência Semelhante .....</b>         | <b>606</b> |
| <b>Medicamentos Semelhantes por Fonética e/ou Escrita .....</b>               | <b>609</b> |
| <b>Referências Bibliográficas .....</b>                                       | <b>684</b> |
| <b>Índice Remissivo .....</b>                                                 | <b>686</b> |



## **ORIENTAÇÕES SOBRE A UTILIZAÇÃO DO MANUAL**

Nesta sétima edição, divulgamos o elenco de medicamentos padronizados no Hospital Alemão Oswaldo Cruz.

Encontra-se descrita a estrutura funcional do Serviço de Farmácia institucional, acompanhada de uma breve abordagem de cada setor.

Inicialmente está descrita a classificação terapêutica do arsenal disponível, em ordem alfabética, com a finalidade de facilitar a consulta de medicamentos similares ou equivalentes terapêuticos.

A seguir encontram-se listados os medicamentos padronizados, organizados por ordem alfabética, nomes comerciais, posologias, dose em insuficiência renal, preparo e diluição dos injetáveis, cuidados de administração em idosos, administrações enterais e com alimentos, condições de armazenamento, e alertas sobre: tipo de receita, alta vigilância, alto custo, sinalização de padrão de acordo com a unidade disponível (Unidade Paulista, Unidade Vergueiro).

O manual aborda também orientações sobre aspectos técnicos que estão relacionados com a prática diária, como informações sobre Medicamentos sujeitos a Controle Especial, Diabetes, Diagnósticos, Cálculos Técnicos, Tabela de ajuste Posológico conforme função renal, orientação em Nutrição Parenteral e Terapia da Dor, entre outros.

Este é um meio de divulgar o arsenal terapêutico institucional para facilitar as práticas diárias da equipe multiprofissional visando assegurar a qualidade no atendimento aos nossos pacientes.

## ABREVIACÕES

<: Menor que  
>: Maior que  
≥: Maior ou igual a  
≤: Menor ou igual a  
ACD: Anticoagulante Citrato Dextrose  
Ade: Adesivo  
AIT: Ataques Isquêmicos Transitórios  
Amp: Ampola  
ANVISA: Agência Nacional de Vigilância Sanitária  
AVC: Acidente Vascular Cerebral  
Bis: Bisnaga  
BST: Bastão  
c/: com  
CAM: Concentração Alveolar Mínima  
Cap: Cápsula  
CIM: Centro de Informação sobre Medicamento  
Clcr: Depuração da Creatinina  
CMV: Citomegalovírus  
Colh: Colher/Colheres  
Cp: Comprimido  
Dis: Disco  
Drg: Drágea  
Eferv: Efervescente  
Env: Envelope  
EUA: Estados Unidos da América  
FA: Frasco Ampola  
FF: Formas Farmacêuticas  
Fla: Flaconete  
Fr: Frasco  
g: Grama  
Gts: Gotas  
h: Hora  
HAOC: Hospital Alemão Oswaldo Cruz  
IM: Intramuscular  
Inj: Injetável  
INR: International Normalized Ratio  
IV: Intravenoso  
kcal: Quilocalorias  
kg: Quilograma  
L: Litro  
Liof: Liofílico  
Manip: Manipulado  
Mastig: Mastigável  
mcg: Micrograma  
mEq: Miliequivalente  
mg: Miligrama  
mg/dia: Miligrama por Dia  
mg/mL: Miligrama por Mililitro  
Mg: Magnésio  
min: Minutos  
mL: Mililitro  
N/D: Não Disponível  
NE: Nutrição Enteral  
Nebuliz: Nebulização

NR: Notificação de Receita  
NRE: Notificação de Receita Especial  
Oft: Oftálmica  
pH: Potencial Hidrogeniônico  
PVC: Cloreto de Polivinila  
p/: para  
qsp: Quantidade Suficiente Para  
QT: Quimioterapia  
Rev: Revestido  
Ret: Retal  
RM: Receita Médica  
SC: Subcutânea  
Scr: Creatinina Plasmática  
Seg: Segundos  
Ser: Seringa  
SF: Soro Fisiológico  
SG: Soro Glicosado  
SIDA: Síndrome da Imunodeficiência Adquirida  
SL: Sublingual  
SNC: Sistema Nervoso Central  
Sol: Solução  
Sup: Supositório  
TC: Termo de Consentimento  
TE: Termo de Esclarecimento  
TFG: Taxa de Filtração Glomerular  
Top: Tópico  
TR: Termo de Responsabilidade  
Transd: Transdérnico  
UF: Unidade Federativa  
Un: Unidade  
UI: Unidades Internacionais  
USP: United States Pharmacopoeia  
VO: Oral  
Vol: Volume  
Xrp: Xarope

## MEDICAMENTOS ELEGÍVEIS PARA PRESCRIÇÃO

Os medicamentos elegíveis para prescrição são os devidamente registrados na ANVISA e aprovados para indicação em questão, assim como manipulados, homeopáticos e antroposóficos cujas farmácias estejam de acordo com regulamentação ANVISA e VISA local. Os medicamentos alopáticos importados, que eventualmente se façam necessários, devem estar devidamente registrados no FDA ou EMA para a indicação em questão.

Prescrever preferencialmente medicamentos padronizados, pois estão prontamente disponíveis em estoque para atendimento. Caso seja prescrito medicamento não padrão o prazo para compra é de até 12h úteis, 48h para medicamentos manipulados, ou caso não haja disponibilidade para pronta entrega pelo fornecedor. Medicamentos manipulados e/ou controlados incluindo antibióticos não padronizados requerem receituário a parte para compra externa, solicita-se que este seja feito em receituário interno e encaminhada à Farmácia para aquisição junto ao fornecedor.

As informações contidas no sistema para permitir a prescrição, tais como diluição e via de administração são cadastradas mediante referências bibliográficas e/ou registro de produtos na ANVISA. Caso exista dúvida em relação a estas informações, fazer contato com o farmacêutico (ramal 0270). Não estarão disponibilizadas no sistema vias de administração off label, salvo em casos de deliberação pelo Comitê de Medicamentos que normatiza o uso de medicamentos em situações excepcionais e off label.

Em situações que se fizerem necessárias prescrições de medicamentos em caráter excepcional: off label, uso compassivo e acesso expandido segue abaixo o encaminhamento interno no HAOC, salientando a necessidade de aplicação de Termo de Consentimento Livre e Esclarecido ao paciente pelo prescritor.

| Medicamentos experimentais - Sem registro |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Medicamento nacional sem registro para indicação / dose / via                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Variáveis                                 | Uso Compassivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Acesso Expandido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Off Label                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Definição*</b>                         | Disponibilização de medicamento novo promissor em processo de desenvolvimento clínico, para uso pessoal em pacientes que não são participantes de programa de acesso expandido ou de pesquisa clínica, pacientes portadores de doenças debilitantes graves e/ou que ameacem a vida e sem alternativa terapêutica satisfatória com produtos registrados no país (por compaixão); | Programa da indústria de disponibilização de medicamento novo, promissor, ainda sem registro na Anvisa ou não disponível comercialmente no país, que esteja em estudo de fase III em desenvolvimento ou concluído, destinado a um grupo de pacientes portadores de doenças debilitantes graves e/ou que ameacem a vida e sem alternativa terapêutica e/ou que ameacem a vida e sem alternativa terapêutica satisfatória com produtos registrados; (pacientes devem estar inscritos no programa e o medicamento direcionado em seu nome); | O uso off label é, por definição, um uso não autorizado por uma agência reguladora, mas isto não implica que esteja incorreto.” <a href="http://www.anvisa.gov.br/medicamentos/registro/offlabel.htm">http://www.anvisa.gov.br/medicamentos/registro/offlabel.htm</a> acessado em 03/11/2014 |
| <b>Números pacientes beneficiados (n)</b> | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | >1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Fornecedor do produto</b>              | Indústria Farmacêutica Fabricante                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Indústria Farmacêutica Fabricante                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Instituição                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Números pacientes beneficiados (n)</b> | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | >1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| Medicamentos experimentais - Sem registro |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                               | Medicamento nacional sem registro para indicação / dose / via |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Variáveis                                 | Uso Compassivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Acesso Expandido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Off Label                                                                                                                                                                                     |                                                               |
| Patrocinador conforme RDC*                | Médico ou Indústria ou Instituição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Médico ou Indústria ou Instituição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | N/A                                                                                                                                                                                           |                                                               |
| Players                                   | Médico/ Instituição / Indústria/Anvisa/ Siscomex                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Médico/ Instituição / Indústria/Anvisa/ Siscomex                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Médico/Paciente / Instituição / Convênio                                                                                                                                                      |                                                               |
| Custos incorrem por                       | Medicamento sem custo para paciente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Medicamento sem custo para paciente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Não sendo autorizado pelo convênio, despesas incorrerem particular.                                                                                                                           |                                                               |
| Encaminhamento interno                    | <p><b>1.</b> Médico assistente encaminha ao Comitê de Medicamentos (CM) solicitação em impresso padrão de medicamento em caráter de uso compassivo, justificando a indicação e referenciando o fabricante.</p> <p><b>2.</b> CM encaminha documentação para ser analisada pela Unidade de Pesquisa em Saúde (UPS) - (UPS) - IECs ou por médico da instituição indicado pela Superintendência Médica para avaliação se a indicação caracteriza-se como uso compassivo.</p> <p><b>3.</b> UPS-IECs ou médico indicado encaminham parecer para Comitê de Medicamentos/ Superintendência Médica;</p> | <p><b>1.</b> Médico assistente encaminha ao Comitê de Medicamentos (CM) solicitação em impresso padrão de medicamento em caráter de acesso expandido, justificando a indicação e referenciando o fabricante.</p> <p><b>2.</b>CM encaminha documentação para ser analisada pela Unidade de Pesquisa em Saúde (UPS) - IECs ou por médico da instituição indicado pela Superintendência Médica para avaliação se a indicação caracteriza-se como acesso expandido.</p> <p><b>3.</b> UPS-IECs ou médico indicado encaminham parecer para Comitê de Medicamentos/ Superintendência Médica;</p> | <p><b>Busca de evidências:</b></p> <p>revisões sistemáticas, ensaios clínicos randomizados ou monografia em base de dados Micromedex, Lexi Comp. Up to Date caracterizando uso off label.</p> |                                                               |



Encaminhamento interno

- 4. Comitê de Medicamentos e Superintendência Médica avaliam parecer de aprovação ou não do uso do medicamento em caráter de uso compassivo;
- 5. Médico solicitante é comunicado da decisão e deverá fazer contato com patrocinador para aceite ou não deste patrocínio. Havendo aceite do patrocínio deverá comunicar indústria farmacêutica patrocinadora para assinatura de contrato com HAOC e dar sequência ao processo de encaminhamento dos formulários para ANVISA/SISCOMEX.

O contrato entre patrocinador indústria farmacêutica e HAOC deve ser firmado em função de eventos adversos que possam surgir decorrentes do uso do medicamento. No HAOC será considerado como patrocinador a indústria farmacêutica.

- 4. Comitê de Medicamentos e Superintendência Médica avaliam parecer de aprovação ou não de uso do medicamento em caráter de acesso expandido;
- 5. Médico solicitante é comunicado da decisão e deverá fazer contato com patrocinador para aceite ou não deste patrocínio. Havendo aceite do patrocínio deverá comunicar indústria farmacêutica patrocinadora para assinatura de contrato com HAOC e dar sequência ao processo de encaminhamento dos formulários para ANVISA/SISCOMEX, assim como elaboração do dossiê regulatório.

O contrato entre patrocinador indústria farmacêutica e HAOC deve ser firmado em função de eventos adversos que possam surgir decorrentes do uso do medicamento. No HAOC será considerado como patrocinador a indústria farmacêutica.

**Se sim:** médico receberá retorno por profissional da assistência e deverá esclarecer paciente/familiar aplicando TCLE off label.

**Se não:** a solicitação será encaminhada para apreciação da Superintendência Médica e/ou Comitê de Medicamentos que conduzirão a análise e encaminhamento junto a equipe médica solicitante.

\* RDC nº 38, DE 12 DE AGOSTO DE 2013



**Termo de Esclarecimento, Ciência e Consentimento para terapia com medicamento sem aprovação/regulamentação pela ANVISA. \***

\* "O uso off label é, por definição, um uso não autorizado por uma agência reguladora, mas isto não implica que esteja incorreto."  
[http://www.anvisa.gov.br/medicamentos/registro/registro\\_offlabel.htm](http://www.anvisa.gov.br/medicamentos/registro/registro_offlabel.htm)  
 acessado em 03/11/2014

Etiqueta do paciente

Uso exclusivo do  
Hospital Alemão Oswaldo Cruz

Autorizo o (a) Dr(a). \_\_\_\_\_ a instituir o tratamento medicamentoso infra mencionado, independentemente de constar seu registro ou regulamentação junto a ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) no que tange à utilização específica pretendida e recomendada pelo médico acima referido.

Declaro que o médico ora assistente explicou claramente a necessidade do tratamento, os potenciais benefícios, os efeitos adversos, os principais riscos e complicações deste tratamento e as alternativas disponíveis. Declaro que tenho ciência de que esse medicamento não possui registro na ANVISA para a utilização pretendida pelo médico acima referido. E, por fim, declaro que pude fazer os esclarecimentos sobre o tratamento livremente e recebi as respostas que desejava.

Reservo-me o direito de revogar esta autorização a qualquer momento, e declaro que assumirei a inteira responsabilidade, pelas consequências de fazê-la contrariamente à recomendação médica.

Entendo que esta autorização pode implicar em custos não autorizados pelo convênio e assumo a inteira responsabilidade pela quitação dos mesmos.

☐ Paciente ☐ Responsável

Nome: \_\_\_\_\_

São Paulo, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_

Hora: \_\_\_\_:\_\_\_\_

Doc. Identidade n° (se aplicável): \_\_\_\_\_

Grau de Parentesco (se aplicável): \_\_\_\_\_

**Preenchimento médico:**

Por tratar-se de ato médico, proposto por profissional que o executa, cumpre esclarecer que o mesmo se inscreve na responsabilidade de sua indicação.

**Descrição do princípio ativo, dose, frequência, via, tempo de tratamento proposto, resultados almejados:**

---



---



---



---



---



---



---

Expliquei de forma clara e objetiva todo o procedimento e tratamento a que o (a) paciente acima referido (a) está sujeito (a), ao próprio

(a) paciente e/ou seu responsável e também sobre os benefícios, riscos mais frequentes e alternativas, tendo respondido às perguntas formuladas por esses. De acordo com o meu entendimento, o (a) paciente e/ou seu responsável, está (ao) em condições de compreender o que lhes foi informado e de se determinarem de acordo com o entendimento que possuem.

Nome: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_

CRM: \_\_\_\_\_

## SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

### ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO HOSPITAL ALEMÃO OSWALDO CRUZ

O Serviço de Assistência Farmacêutica do Hospital Alemão Oswaldo Cruz tem sob sua responsabilidade atividades clínico-assistenciais e administrativas, visando o uso seguro e racional de medicamentos para a otimização da terapêutica e minimização de efeitos adversos. Conta com profissionais qualificados alinhados ao planejamento estratégico corporativo, que buscam novas tecnologias baseadas em evidências científicas para atualização do arsenal terapêutico, obtenção dos melhores resultados clínicos assistenciais e de sustentabilidade.

A Assistência Farmacêutica abrange qualificação de fornecedores, seleção e padronização de medicamentos, armazenamento de acordo com boas práticas, processos de distribuição automatizados, preparo em conformidade com legislações e recomendações SCIH, processo de administração à beira leito com rastreabilidade, monitoramento de reações e eventos adversos, disseminação de informações por meio do cadastro técnico em sistema Tasy, boletins periódicos e educação continuada dos profissionais de saúde e do paciente para assegurar o uso seguro e racional de medicamentos.

A Assistência Farmacêutica também pode ser evidenciada com a participação dos farmacêuticos em diversos times de melhores práticas, comissões e comitês multiprofissionais: Time de Urgência e Emergência, Time de Diabetes, Time de Oncologia, Time de Transplantes, Terapia da Dor, Comissão de Farmácia e Terapêutica, Time de Neurologia, Time de Gerontologia, Time de Queda, Time de Acessos Vasculares, Time de Sepses, Time de Racionalização de Antimicrobianos, Time de TEV, Comissão de Prontuários e Comitê de Medicamentos, assim como a liderança do capítulo de gerenciamento e uso de medicamentos da Joint Commission International (JCI).

### AQUISIÇÃO DE PRODUTOS

O planejamento de insumos quer seja eles medicamentos ou materiais hospitalares, assim como a aquisição dos mesmos é realizado pelo setor de suprimentos institucional de forma centralizada. O planejamento é realizado a partir de ferramentas informatizadas ou por meio de Vendor Managed Inventory (VMI) realizado por fornecedores previamente qualificados e sob contratos corporativos, garantindo assim a qualidade e procedência dos produtos.

### QUALIFICAÇÃO DE FORNECEDORES

A qualificação de fornecedores é um programa que tem por finalidade avaliar e qualificar fornecedores para credenciamento, assegurando, desta forma a qualidade dos produtos farmacêuticos adquiridos pelo Hospital.

O GAFO - Grupo de Avaliação de Fornecedores trabalha sem fins lucrativos, sendo constituído por farmacêuticos hospitalares com interesses comuns no que se refere à avaliação de fornecedores como parte do Programa de Qualidade dos hospitais, desde que exista interesse comercial por partes das instituições, as quais os membros do grupo representem.

O Hospital Alemão Oswaldo Cruz participa das atividades deste grupo desde seu início em 1994. Desde então tem acompanhado a realização de auditorias em 551 fornecedores, nos diferentes segmentos do mercado farmacêutico, desde a indústria farmacêutica de medicamentos, indústria de materiais, indústria de saneante, distribuidoras

de medicamentos e materiais, farmácias de manipulação, drogarias, transportadoras e operadores logísticos.

Este Grupo de Avaliação de Fornecedores de medicamentos e produtos para saúde estimula e contribui para a melhora da qualidade e cumprimento da legislação vigente.

## UNIDADES DE DISPENSAÇÃO: CENTRAL, UTI, CENTRO CIRÚRGICO E QUIMIOTERAPIA

A dispensação de medicamentos e materiais hospitalares é realizada pela Farmácia Central e por 3 unidades satélites: UTI, Centro Cirúrgico e Quimioterapia sob supervisão e responsabilidade do farmacêutico.

É realizado um controle efetivo de armazenamento e validade dos produtos, havendo constante monitoramento dos processos no sentido de orientar a correta separação e dispensação dos produtos farmacêuticos, de forma a validar todo o processo antes da administração ao paciente.

O modelo de dispensação é híbrido sendo 85% realizado de forma descentralizada e 15% centralizada com atendimento 24h. São 25 dispensários eletrônicos alocados individualmente em cada unidade de internação, UTI's e Pronto Atendimento (PA), permitindo que 85% da demanda de pacientes seja atendida diretamente nos andares por meio da integração com prontuário eletrônico, sendo a dispensação realizada com restrição de acesso aos colaboradores do setor e de forma unitária por paciente e por horário, por meio da leitura de código de barras bidimensional datamatrix. Os 15% restantes são atendidos de forma centralizada pela Farmácia Central por meio de coletores de dados integrados a prescrição eletrônica. Ambos atendimentos, asseguram a dupla checagem eletrônica entre a prescrição e o item dispensado, conferindo rastreabilidade de processo e produto.

## FARMÁCIA CLÍNICA

O serviço de Farmácia Clínica teve início em 2004 e é realizado por uma equipe de farmacêuticos que atuam de acordo com o Modelo Assistencial do Hospital Alemão Oswaldo Cruz® que sintetiza a eficiência e o acolhimento que marcam a vocação do hospital em cuidar da saúde das pessoas, tendo o paciente e a família no centro do cuidado, prestando assistência individualizada e integral.



Os farmacêuticos clínicos analisam todas as prescrições médicas de pacientes internados na instituição promovendo o uso seguro e racional de medicamentos, baseado em evidências.

A prescrição médica é informatizada realizada pelo médico diretamente no sistema Sigha-Tasy® contendo dados dos pacientes, nomes e dosagens dos medicamentos, doses, vias de administração, intervalos de administração, diluições e tempo de tratamento quando pertinente e identificação do prescritor.

A equipe de farmacêuticos clínicos tem por objetivo monitorar a terapia medicamentosa e detectar possíveis não conformidades nas prescrições no que se refere à indicação, a dose, via de administração, frequência, diluição, tempo de infusão e horários de administração, omissão de itens, necessidades de ajustes posológicos, tempos de tratamento, compatibilidades, interações medicamentosas, presença de alergias e reações adversas, resultados de exames laboratoriais, reconciliação medicamentosa e necessidade de coleta exames e/ou inclusão procedimentos (por exemplo controle de glicemia capilar, nível sérico de medicamentos), oferecendo suporte às equipes médicas e assistenciais com objetivo de garantir a otimização da terapia, a segurança do paciente e a farmacoeconomia.

As prescrições de nutrição parenteral são monitoradas e liberadas para manipulação pelo farmacêutico clínico que analisa diariamente os resultados de exames e a necessidade de ajustes nas formulações além do controle glicêmico dos pacientes apoiando a equipe médica para melhor desfecho destes pacientes.

Os farmacêuticos clínicos também realizam orientações para alta de pacientes com patologias específicas como por exemplo pacientes em uso de anticoagulante (varfarina), pacientes submetidos a transplantes de órgãos sólidos e transplantes de medula alogênicos.

O farmacêutico clínico atua em conjunto com as equipes médicas e assistenciais estando inserido no cuidado do paciente, participando ativamente da terapia medicamentosa, da promoção da saúde, da prevenção de eventos adversos e otimização de recursos.

## **CIM – CENTRO DE INFORMAÇÕES DE MEDICAMENTOS**

O Centro de Informação de Medicamento (CIM), tem como objetivo disponibilizar e facilitar as informações técnicas, promovendo uso racional dos medicamentos. Fornece informações relacionadas à indicação, prescrição, dispensação e administração de medicamentos, utilizando informações de fontes bibliográficas especializadas, idôneas e atualizadas. Promove apoio técnico e científico através das atividades:

- ▶ Elaboração e atualização do Manual Farmacêutico institucional;
- ▶ Análise de consumo de medicamentos quanto aos estudos de farmacoeconomia e uso racional;
- ▶ Disponibilização de informações técnicas sobre medicamentos na base de dados do Sistema Sigha-Tasy® para a prescrição eletrônica, com doses terapêuticas, doses limites, diluições de injetáveis, vias de administrações, minimizando eventos relacionados a prescrição médica;
- ▶ Divulgação de orientações técnicas e alertas farmacêuticos;
- ▶ Monitoramento de produtos com indisponibilidade no mercado farmacêutico;
- ▶ Suporte à Comissão de Farmácia e Terapêutica (CFT);
- ▶ Monitoramento de reação adversa dos fármacos novos incluídos na padronização;
- ▶ Monitoramento de medicamentos sob investigação;
- ▶ Avaliação e qualificação de fornecedores;
- ▶ Newsletters ao corpo clínico;

## SEGURANÇA NO PROCESSO DE MEDICAÇÃO

A área de Segurança no Processo de Medicação teve início em 2012. O objetivo é detectar oportunidades de melhorias, analisar e promover ações no processo de medicação, ou seja, toda a cadeia da Assistência Farmacêutica prezando pela segurança do paciente. A atuação da área de Segurança no Processo de Medicação compreende:

- ▶ Farmacovigilância;
- ▶ Atualizar e analisar mensalmente os indicadores do serviço de Farmácia;
- ▶ Divulgar Alertas relacionados a segurança do paciente;
- ▶ Analisar as Notificações de Evento Adverso e Quase Falha, relacionadas a medicamentos e promover medidas de melhorias, juntamente com a equipe de Gerenciamento de Riscos;
- ▶ Analisar problemas relacionados ao sistema SIGHA-Tasy no âmbito da prescrição, aprazamento e dispensação e realizar ordens de serviço para tratativa.


## FARMACOVIGILÂNCIA

O hospital conta com o Serviço de Farmacovigilância desde 2004, que, no início, estava vinculado ao CIM e atualmente à Segurança do Processo de Medicação.

Farmacovigilância é a ciência que se destina a detecção, avaliação, compreensão e prevenção dos efeitos adversos ou outros problemas relacionados a medicamentos.

A Farmacovigilância permite avaliar as questões de segurança dos medicamentos após sua comercialização:

- ▶ Relação causa-efeito entre a administração do medicamento e o surgimento de efeitos indesejados ou ausência de ação farmacológica;
- ▶ Monitorar o processo de fabricação do mesmo, por meio de alterações em sua embalagem, conteúdo e/ou produto final (Queixa Técnica).
- ▶ Farmacovigilância influi diretamente nas situações:
  - ▶ Reconhecimento de novas reações adversas;
  - ▶ Identificação de fatores predisponentes para as reações adversas;
  - ▶ Detecção e avaliação de ineficácia ou novas indicações de fármacos não observados anteriormente;
  - ▶ Desenvolvimento de ações preventivas e de educação continuada;
  - ▶ Inclusão e/ou alteração de informações na bula dos medicamentos, quanto a: efeitos colaterais, interações medicamentosas, contraindicações e outros;
  - ▶ Retirada de produtos farmacêuticos do mercado mundial pelos órgãos responsáveis.





Nº Protocolo Interno : \_\_\_\_\_  
(Campo exclusivo da Farmácia)



## NOTIFICAÇÃO DE SUSPEITA DE REAÇÃO ADVERSA E QUEIXA TÉCNICA A MEDICAMENTO

DATA \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Após o preenchimento, encaminhar esta notificação para a Farmácia Central.

### DADOS DO NOTIFICANTE

*Agradecemos a notificação e reafirmamos que todos os dados serão tratados como confidenciais.*

Nome:

☐ Dentista ☐ Enfermeiro ☐ Farmacêutico ☐ Médico ☐ Outros:

Nº Conselho/UF:

Sector: Ramal: e-mail:

### DADOS DO PACIENTE

Nome do Paciente:

Atendimento: Data de Nascimento: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Sexo: ☐ M ☐ F Gravidez? ☐ N ☐ S (Idade gestacional: \_\_\_\_\_) Peso (kg):

### QUEIXA TÉCNICA

*Definição: afastamento dos parâmetros de qualidade estabelecidos para um produto ou processo.*

Medicamento (nome comercial/concentração):

Apresentação: ☐ Amp ☐ FAP ☐ Bolsa ☐ Fr ☐ Cp ☐ Drg ☐ Cáps ☐ Envelope ☐ Outros: \_\_\_\_\_

Lote: Validade: Fabricante:

Descrição do desvio:

Entregar a amostra junto com a notificação para análise pelo fabricante. Em caso de bolsas de soro apresentando vazamento, certificar-se de que a amostra está bem fechada antes de encaminhar para a Farmácia.

### REAÇÃO ADVERSA

*Definição: qualquer resposta prejudicial ou indesejável, não intencional, a um medicamento, que ocorre nas doses usualmente empregadas no homem para profilaxia, diagnóstico, terapia da doença ou para a modificação de funções fisiológicas.*

**Medicamento suspeito:**

Lote: Validade: Dose diária: Via:

Início do uso: Fim do uso: Motivo do uso:

**Medicamento suspeito:**

Lote: Validade: Dose diária: Via:

Início do uso: Fim do uso: Motivo do uso:

Farmacovigilância  
Serviço de Farmácia  
3549-1724

Versão 04/2019



Descrição da reação:

Data de início da reação:     /     /     Data de término da reação:     /     /

A reação ocorreu quanto tempo após a administração do medicamento?

☐ Durante     ☐ \_\_\_\_\_ segundos     ☐ \_\_\_\_\_ minutos     ☐ \_\_\_\_\_ horas     ☐ \_\_\_\_\_ dias

#### Informações Adicionais (RAM)

##### Doenças concomitantes:

|                                                |                                   |                                                        |                                            |                                      |                                     |
|------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Cardiopatia           | <input type="checkbox"/> Diabetes | <input type="checkbox"/> Dislipidemia                  | <input type="checkbox"/> Hepatopatia       | <input type="checkbox"/> Hipertensão | <input type="checkbox"/> Nefropatia |
| <input type="checkbox"/> Tabagismo             | <input type="checkbox"/> Etilismo | <input type="checkbox"/> História clínica desconhecida | <input type="checkbox"/> Nega comorbidades |                                      |                                     |
| <input type="checkbox"/> Outros (especificar): |                                   |                                                        |                                            |                                      |                                     |

**História de alergia a medicamentos?** Especificar abaixo o medicamento e, se possível, a reação apresentada.

##### Medicamentos concomitantes:

###### Medicamento:

|       |           |              |      |
|-------|-----------|--------------|------|
| Lote: | Validade: | Dose diária: | Via: |
|-------|-----------|--------------|------|

|                |             |                |
|----------------|-------------|----------------|
| Início do uso: | Fim do uso: | Motivo do uso: |
|----------------|-------------|----------------|

###### Medicamento:

|       |           |              |      |
|-------|-----------|--------------|------|
| Lote: | Validade: | Dose diária: | Via: |
|-------|-----------|--------------|------|

|                |             |                |
|----------------|-------------|----------------|
| Início do uso: | Fim do uso: | Motivo do uso: |
|----------------|-------------|----------------|

###### Medicamento:

|       |           |              |      |
|-------|-----------|--------------|------|
| Lote: | Validade: | Dose diária: | Via: |
|-------|-----------|--------------|------|

|                |             |                |
|----------------|-------------|----------------|
| Início do uso: | Fim do uso: | Motivo do uso: |
|----------------|-------------|----------------|

#### Conduta e Evolução do Caso (RAM)

☐ Conduta mantida     ☐ Posologia alterada     ☐ Medicamento suspenso

Especificar o(s) medicamento(s) usado(s) para tratar a RAM:

|                                                                  |                                                                           |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Houve recuperação total do paciente     | <input type="checkbox"/> Melhora do paciente após mudança de conduta      |
| <input type="checkbox"/> Reação reapareceu com readministração   | <input type="checkbox"/> Reação gerou prolongamento de internação         |
| <input type="checkbox"/> Reação causou necessidade de internação | <input type="checkbox"/> Reação representou risco de vida para o paciente |
| <input type="checkbox"/> Paciente apresentou sequelas            | <input type="checkbox"/> Paciente evoluiu a óbito                         |

Especificar, caso aplicável, causa mortis e/ou sequelas:

## COMISSÃO DE FARMÁCIA E TERAPÊUTICA

### OBJETIVOS:

A Comissão de Farmácia e Terapêutica foi criada com o intuito de assessorar a Diretoria Clínica na implementação das políticas relacionadas à seleção, padronização, aquisição, prescrição e dispensação de medicamentos. Seu objetivo é aperfeiçoar continuamente a assistência terapêutica aos pacientes internados e otimizar custos do tratamento hospitalar. É constituída por uma equipe multiprofissional: médicos de diversas especialidades (Clínica Médica, Cirúrgica, UTI, Oncologia, Cardiologia, Infectologia, entre outros), farmacêuticos, enfermagem, nutrição e suprimentos.

### COMPETÊNCIAS:

- ▶ Implementar estratégias visando melhorar o uso de medicamentos (incluindo avaliação do uso de medicamentos e a integração com a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar);
- ▶ Acompanhar estudos e pesquisas de fármacos ou congêneres avaliando aspectos químicos, farmacodinâmicos e farmacocinéticos. Emitir parecer técnico sobre sua eficiência terapêutica, para embasar critérios de escolha de produtos padronizados ou novas aquisições;
- ▶ Disciplinar a inclusão e/ou exclusão de medicamentos para uso institucional;
- ▶ Disciplinar a prescrição médica hospitalar e uniformizar a terapêutica, tendo em vista a melhoria contínua da qualidade dos medicamentos a serem utilizados em nossos pacientes;
- ▶ Controlar o acesso da indústria farmacêutica, com suas atividades promocionais, aos profissionais da instituição;
- ▶ Orientar o corpo clínico do hospital no que se refere ao gerenciamento de medicamentos e congêneres, tais como qualidade e uso;
- ▶ Manter sistema informatizado, com controle de acesso, mantendo registro atualizado sobre os medicamentos e congêneres contendo listagem padrão e dados farmacológicos;
- ▶ Promover a divulgação da padronização de medicamentos através da Diretoria Clínica do hospital.

### PADRONIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS

#### CRITÉRIOS PARA PADRONIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS:

- ▶ Medicamentos autorizados pela ANVISA;
- ▶ Princípios ativos com valor terapêutico comprovado, catalogados pelo princípio ativo, conforme a Denominação Comum Brasileira – DCB;
- ▶ Formas Farmacêuticas que permitam a individualização na distribuição;
- ▶ Forma Farmacêutica, apresentação e dose considerando: comodidade para administração ao paciente; faixa etária; facilidade de cálculo da dose a ser administrada; facilidade no fracionamento ou multiplicação de doses;
- ▶ Medicamentos que atendam as necessidades básicas da Instituição em análise conjunta com o corpo clínico;
- ▶ Medicamentos que minimizem custos da terapêutica, com qualidade, segurança e efetividade;
- ▶ Medicamentos que minimizem custos operacionais quanto à aquisição, armazenamento, dispensação e controle de estoque.

#### CRITÉRIOS DE ANÁLISE PARA INCLUSÃO DE MEDICAMENTOS:

- ▶ Preenchimento do formulário de solicitação de padronização institucional;
- ▶ Considerações sobre a ação terapêutica e uso clínico;
- ▶ Vantagens terapêuticas aos medicamentos similares ou equivalentes aos padronizados;
- ▶ Encaminhamento para Comissão de Farmácia e Terapêutica.


**CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO DE MEDICAMENTOS:**

- ▶ Medicamentos que se mostrarem tóxicos e/ou ineficazes;
- ▶ Estudo de consumo que não justifique a padronização;
- ▶ Princípios ativos que possam ser substituídos com vantagens, quando outro for incluído;
- ▶ Medicamentos que poderão ser substituídos, com vantagens, quando outro for incluído;
- ▶ Comercialização do medicamento foi proibida ou descontinuada por órgão competente

**ORIENTAÇÕES SOBRE COMO PREENCHER O FORMULÁRIO DE INCLUSÃO DE MEDICAMENTOS NA PADRONIZAÇÃO:**


- ▶ Preencher os campos com Nome Genérico; Nome Comercial; Laboratório Fabricante; Concentração; Forma Farmacêutica e Via de Administração do medicamento.
- ▶ Assinalar se existe o medicamento similar ou equivalente padronizado e informações de eficácia e segurança do medicamento proposto.
- ▶ Justificar as vantagens clínicas do medicamento em relação ao produto equivalente se for o caso.
- ▶ Citar referências e/ou anexar trabalhos científicos.
- ▶ Justificar as vantagens clínicas do medicamento em relação ao produto equivalente se for o caso.
- ▶ Citar referências e/ou anexar trabalhos científicos.

**ESQUEMA DE INCLUSÃO DE MEDICAMENTOS NA PADRONIZAÇÃO:**



## ORIENTAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS

Prescrições de medicamentos Não Padronizados só poderão ser realizadas por meio do preenchimento da justificativa de Utilização, a qual se encontra no sistema Tasy. O medicamento estará disponível em até 12 horas após o encaminhamento da justificativa. Em caso de dúvidas, entrem em contato com farmacêutico.  
Farmácia Central: 3549-0270 / 3549-0265



## ORIENTAÇÃO DE INCLUSÃO NA PADRONIZAÇÃO

Os medicamentos somente serão inclusos na padronização mediante preenchimento de Formulário Inclusão de Medicamentos na Padronização conforme formulário a seguir.



|                                                                                          |                                                                                  |                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Preenchido pelo Médico                                                                   | <b><u>Nº do Protocolo:</u></b> _____                                             |                               |
|                                                                                          | <b><u>Identificação do Medicamento:</u></b>                                      |                               |
|                                                                                          | Nome Genérico: _____                                                             |                               |
|                                                                                          | Nome Comercial: _____                                                            | Laboratório Fabricante: _____ |
|                                                                                          | Concentração: _____                                                              | Via de Adm: _____             |
|                                                                                          | Indicação Terapêutica: _____                                                     |                               |
|                                                                                          | Apresentação: ( ) Cp ( ) Cp Rev ( ) Fr ( ) Fap ( ) Cap ( ) Amp ( ) Outros: _____ |                               |
|                                                                                          | <b><u>Previsão de Consumo:</u></b>                                               |                               |
|                                                                                          | Número de pacientes com a doença tratados atualmente: _____ pac/mês              |                               |
|                                                                                          | Número de pacientes que usarão o novo produto (previsão): _____ pac/mês          |                               |
| <b><u>Justificar a Necessidade de Comprar o Medicamento:</u></b>                         |                                                                                  |                               |
|                                                                                          |                                                                                  |                               |
| <b><u>Referências Bibliográficas:</u></b>                                                |                                                                                  |                               |
|                                                                                          |                                                                                  |                               |
| <b><u>Declaração de Conflito de Interesse Médico e Identificação do Solicitante:</u></b> |                                                                                  |                               |
| Existe algum "conflito de interesse" nesta solicitação médica? Não ( ) Sim ( )           |                                                                                  |                               |
| Médico: _____ CRM: _____ Data: _____ Telefone: _____                                     |                                                                                  |                               |
| Assinatura: _____                                                                        |                                                                                  |                               |


**Anexo – Formulário de Inclusão de Medicamentos na Padronização**

|                                 |                                                                                                                                                                   |                |                             |                                      |                          |     |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------|-----|
| <b>Preenchido pela Farmácia</b> | <b><u>Registro e Classificação Terapêutica:</u></b>                                                                                                               |                |                             |                                      |                          |     |
|                                 | Nome Comercial: _____                                                                                                                                             |                |                             |                                      |                          |     |
|                                 | Registro MS: _____ Classificação Terapêutica: _____                                                                                                               |                |                             |                                      |                          |     |
|                                 | A indicação terapêutica solicitada está aprovada em bula? ( ) Sim ( ) Não                                                                                         |                |                             |                                      |                          |     |
|                                 | <b><u>Medicamentos Padronizados ou Similares e Equivalentes (pertencentes a mesma classe terapêutica):</u></b>                                                    |                |                             |                                      |                          |     |
|                                 | Similar? Não ( ) Sim ( ) Qual? _____                                                                                                                              |                |                             |                                      |                          |     |
|                                 | Equivalente? Não ( ) Sim ( ) Qual? _____                                                                                                                          |                |                             |                                      |                          |     |
|                                 | <b><u>Esquema Terapêutico Recomendado e Dose Limite:</u></b>                                                                                                      |                |                             |                                      |                          |     |
|                                 | Idade ou Peso                                                                                                                                                     | Dose Ataque    | Dose Usual                  | Dose Mínima                          | Dose Máxima              | Via |
|                                 | Adultos                                                                                                                                                           |                |                             |                                      |                          |     |
|                                 | Idosos                                                                                                                                                            |                |                             |                                      |                          |     |
|                                 |                                                                                                                                                                   |                |                             |                                      |                          |     |
|                                 |                                                                                                                                                                   |                |                             |                                      |                          |     |
|                                 | Observação: _____                                                                                                                                                 |                |                             |                                      |                          |     |
|                                 | Intervalo de frequência para prescrição de dose terapêutica:<br>( ) diário ( ) alternado ( ) 3 vezes/semana ( ) cada 30 dias ( ) cada 12 semanas ( ) outro: _____ |                |                             |                                      |                          |     |
|                                 | Intervalo para prescrição de dose terapêutica:<br>( ) agora ( ) 1 vez/dia ( ) 4h/4h ( ) 6h/6h ( ) 8h/8h ( ) 12h/12h ( ) 24h/24h ( ) outro: _____                  |                |                             |                                      |                          |     |
|                                 | Duração do Tratamento: _____                                                                                                                                      |                |                             |                                      |                          |     |
|                                 | <b><u>Previsão de Gasto do Tratamento:</u></b>                                                                                                                    |                |                             |                                      |                          |     |
|                                 | Posologia                                                                                                                                                         | Valor unitário | Gasto/paciente/mês<br>(R\$) | Nº pacientes a<br>serem tratados/mês | Impacto<br>econômico/mês |     |
|                                 |                                                                                                                                                                   |                |                             |                                      |                          |     |
|                                 |                                                                                                                                                                   |                |                             |                                      |                          |     |
|                                 | <b><u>Estudos Farmacoeconômicos:</u></b> Anexar (se houver)                                                                                                       |                |                             |                                      |                          |     |
| <b>Preenchido pela CFT</b>      | <b><u>Parecer da Comissão de Farmácia e Terapêutica:</u></b>                                                                                                      |                |                             |                                      |                          |     |
|                                 | ( ) Inclusão na padronização ( ) Não padronizar e avaliar o consumo ( ) Não padronizar o medicamento                                                              |                |                             |                                      |                          |     |
|                                 | Justificativa: _____                                                                                                                                              |                |                             |                                      |                          |     |
|                                 | _____                                                                                                                                                             |                |                             |                                      |                          |     |
|                                 | _____                                                                                                                                                             |                |                             |                                      |                          |     |
|                                 | Médico: _____ CRM: _____ Data: _____ Assinatura: _____                                                                                                            |                |                             |                                      |                          |     |

Versão out/2020

## **ORIENTAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA SECRETARIA DA SAÚDE**

Medicamentos fornecidos pela Secretaria de Saúde serão providenciados mediante a prescrição médica de acordo com a documentação adequada para cada tipo de produto. Ver Formulário.

## **ORIENTAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DE MEDICAMENTOS IMPORTADOS**

Medicamentos sem registro no Ministério da Saúde não serão padronizados. Para utilização de medicamentos importados, o medicamento deverá ser providenciado pelo hospital e/ou paciente que deverá preencher o Termo de Responsabilidade. Ver Formulário.



ANEXO II – MEDICAMENTOS

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**TERMO DE RESPONSABILIDADE**

ETIQUETA DO PACIENTE

Medicamento(s): .....  
.....  
.....  
.....  
.....

Ciente das determinações do HAOC responsabilizo-me pela qualidade, condições de armazenamento e transporte dos medicamentos por mim trazidos para viabilização do meu tratamento, isentando o hospital de quaisquer problemas relacionados ao medicamento.

\_\_\_\_\_  
Assinatura paciente

\_\_\_\_\_  
Nome responsável legal / Acompanhante

\_\_\_\_\_  
Grau de parentesco

\_\_\_\_\_  
Assinatura

\_\_\_\_\_  
Assinatura do Médico

\_\_\_\_\_  
Assinatura Farmacêutico



☐ **O medicamento foi liberado pela Secretaria da Saúde.**

Descrição do medicamento: \_\_\_\_\_

Protocolo da entrega: \_\_\_\_\_

Receita Médica \_\_\_\_\_

Nº de lote: \_\_\_\_\_ Validade: \_\_\_\_\_

Conservação: ☐ Temperatura ambiente (Max. 25°C) ☐ Sob refrigeração 2 a 8°C

Anuência do médico responsável no HAOC \_\_\_\_\_

☐ **O medicamento foi por mim importado.**

Descrição do medicamento: \_\_\_\_\_

Importadora: \_\_\_\_\_

Ordem de Serviço: \_\_\_\_\_

Invoice (Documentação de Importação): \_\_\_\_\_

Receita Médica: \_\_\_\_\_

Nº de lote: \_\_\_\_\_ Validade: \_\_\_\_\_

Conservação: ☐ Temperatura ambiente (Max. 25°C) ☐ Sob refrigeração 2 a 8°C

Anuência do Médico responsável no HAOC: \_\_\_\_\_

☐ **O medicamento foi doado a mim pelo fabricante.**

Descrição do medicamento: \_\_\_\_\_

Carta de doação: \_\_\_\_\_

Nota fiscal de doação: \_\_\_\_\_

Nº de lote: \_\_\_\_\_ Validade: \_\_\_\_\_

Conservação: ☐ Temperatura ambiente (Max. 25°C) ☐ Sob refrigeração 2 a 8°C

☐ **Medicamento de uso próprio**

**1) Descrição, dose e apresentação:** \_\_\_\_\_

Quantidade: \_\_\_\_\_ Lote: \_\_\_\_\_ Validade: \_\_\_\_\_

Conservação: ☐ Temperatura ambiente (Max. 25°C) ☐ Sob refrigeração 2 a 8°C

RMS: \_\_\_\_\_

**2) Descrição, dose e apresentação:** \_\_\_\_\_

Quantidade: \_\_\_\_\_ Lote: \_\_\_\_\_ Validade: \_\_\_\_\_

Conservação: ☐ Temperatura ambiente (Max. 25°C) ☐ Sob refrigeração 2 a 8°C

RMS: \_\_\_\_\_

**3) Descrição, dose e apresentação:** \_\_\_\_\_

Quantidade: \_\_\_\_\_ Lote: \_\_\_\_\_ Validade: \_\_\_\_\_

Conservação: ☐ Temperatura ambiente (Max. 25°C) ☐ Sob refrigeração 2 a 8°C

RMS: \_\_\_\_\_

**4) Descrição, dose e apresentação:** \_\_\_\_\_

Quantidade: \_\_\_\_\_ Lote: \_\_\_\_\_ Validade: \_\_\_\_\_

Conservação: ☐ Temperatura ambiente (Max. 25°C) ☐ Sob refrigeração 2 a 8°C

RMS: \_\_\_\_\_

**5) Descrição, dose e apresentação:** \_\_\_\_\_

Quantidade: \_\_\_\_\_ Lote: \_\_\_\_\_ Validade: \_\_\_\_\_

Conservação: ☐ Temperatura ambiente (Max. 25°C) ☐ Sob refrigeração 2 a 8°C

RMS: \_\_\_\_\_



## CLASSIFICAÇÃO TERAPÊUTICA DE MEDICAMENTOS POR PRINCÍPIO ATIVO / SUBGRUPO

A classificação agrupa os medicamentos de acordo com seu uso por anatomia, sistemas e ação farmacológica, sendo uma adaptação da classificação ATC – Anatomical Therapeutic Chemical.

### SUBGRUPO - AGENTES QUIMIOTERÁPICOS

#### Antifúngico Sistêmico

- ▶ Anfotericina B Lipossomal
- ▶ Anidulafungina
- ▶ Caspofungina
- ▶ Fluconazol
- ▶ Itraconazol
- ▶ Micafungina Sódica
- ▶ Nistatina
- ▶ Posaconazol
- ▶ Voriconazol

#### Antimicrobiano Aminoglicosídeo

- ▶ Amicacina
- ▶ Gentamicina
- ▶ Neomicina
- ▶ Tobramicina

#### Antimicrobiano Anaeróbico

- ▶ Metronidazol

#### Antimicrobiano Carbapenêmicos

- ▶ Ertapeném
- ▶ Imipenem + Cilastatina
- ▶ Meropeném

#### Antimicrobiano Cefalosporina 1ª geração

- ▶ Cefadroxil
- ▶ Cefalexina
- ▶ Cefalotina
- ▶ Cefazolina

#### Antimicrobiano Cefalosporina 2ª geração

- ▶ Cefaclor
- ▶ Cefoxitina
- ▶ Cefuroxima

#### Antimicrobiano Cefalosporina 3ª geração

- ▶ Cefotaxima
- ▶ Ceftazidima
- ▶ Ceftazidima + Avibactam
- ▶ Ceftriaxona

#### Antimicrobiano Cefalosporina 4ª geração

- ▶ Cefepima
- ▶ Ceftarolina Fosamila
- ▶ Ceftozolona + Tazobctam

#### Antimicrobiano Glicilciclina

- ▶ Tigeciclina

#### Antimicrobiano Glicopeptídeo

- ▶ Teicoplanina
- ▶ Vancomicina

#### Antimicrobiano Lincosamida

- ▶ Clindamicina
- ▶ Clindamicina Fosfato
- ▶ Fosfomicina Trometamol

#### Antimicrobiano Lipopeptídeo

- ▶ Daptomicina

#### Antimicrobiano Macrolídeo

- ▶ Azitromicina
- ▶ Claritromicina
- ▶ Eritromicina
- ▶ Eritromicina Lactobinato

#### Antimicrobiano Nitrofurano

- ▶ Nitrofurantoína

#### Antimicrobiano Oxazolidinona

- ▶ Linezolida

#### Antimicrobiano Penicilina

- ▶ Amoxicilina
- ▶ Amoxicilina + Clavulanato de Potássio
- ▶ Ampicilina
- ▶ Ampicilina + Sulbactam
- ▶ Benzilpenicilina Benzatina
- ▶ Benzilpenicilina Potássica
- ▶ Oxacilina
- ▶ Penicilina G Benzatina
- ▶ Piperacilina + Tazobactam

#### Antimicrobiano Polimixina

- ▶ Polimixina B

#### Antimicrobiano Quinolona

- ▶ Ciprofloxacino
- ▶ Levofloxacino
- ▶ Moxifloxacino
- ▶ Norfloxacino

#### Antimicrobiano Sulfa

- ▶ Sulfadiazina
- ▶ Sulfametoxazol + Trimetoprima
- ▶ Sulfassalazina

### **Antimicrobiano Tetraciclina**

- ▶ Doxiciclina

### **Antimicrobiano Tuberculostáticos**

- ▶ Isoniazida
- ▶ Rifampicina

### **Antineoplásicos Anticorpo Monoclonal**

- ▶ Bevacizumabe
- ▶ Brentuximabe Vedotin
- ▶ CETuximabe
- ▶ Daratumumab
- ▶ Durvalumabe
- ▶ NIVolumab
- ▶ Panitumumab
- ▶ Pembrolizumab
- ▶ PERTUzumabe
- ▶ Ramucirumab
- ▶ Rituximabe
- ▶ Trastuzumabe

### **Antineoplásicos Citotóxicos**

- ▶ Azacitidina
- ▶ Bleomicina
- ▶ Bortezomibe
- ▶ Bussulfano
- ▶ Carboplatina
- ▶ Carmustina
- ▶ Ciclofosfamida
- ▶ Cisplatina
- ▶ Citarabina
- ▶ Dacarbazina
- ▶ Daunorrubicina
- ▶ Decitabina
- ▶ Docetaxel
- ▶ Doxorrubicina
- ▶ Doxorrubicina lipossomal
- ▶ Epirubicina
- ▶ Etoposideo
- ▶ Fludarabina
- ▶ Fluoruracila
- ▶ Gencitabina
- ▶ Idarrubicina
- ▶ Ifosfamida
- ▶ Irinotecano
- ▶ Melfalano
- ▶ Metotrexato
- ▶ Mitoxantrona
- ▶ Nabpaclitaxel
- ▶ Oxaliplatina
- ▶ Paclitaxel
- ▶ Pemetrexede
- ▶ Vimblastina
- ▶ Vincristina
- ▶ Vinorelbina

### **Antineoplásicos Orais**

- ▶ Anastrozol
- ▶ Bicalutamida
- ▶ Bussulfano
- ▶ Capecitabina
- ▶ Hidroxiureia
- ▶ Melfalano
- ▶ Mercaptopurina
- ▶ Tamoxifeno
- ▶ Tretinoína

### **Antiparasitário, Anti-helmíntico**

- ▶ Albendazol
- ▶ Hidroxicloroquina
- ▶ Ivermectina
- ▶ Nitazoxanida
- ▶ Pirimetamina

### **Antiparasitários Citotóxicos**

- ▶ Pentamidina

### **Antivirais**

- ▶ Aciclovir
- ▶ Alfapeginterferona 2b
- ▶ Dolutegravir
- ▶ Lamivudina
- ▶ Oseltamivir
- ▶ Ribavirina
- ▶ Tenofovir
- ▶ Valaciclovir

### **Antivirais Citotóxicos**

- ▶ Foscarnet Sódico
- ▶ Ganciclovir

## **SUBGRUPO - APARELHO CARDIOVASCULAR**

### **Agentes Anti-Hipertensivos**

- ▶ Atenolol
- ▶ Bisoprolol
- ▶ Candesartana
- ▶ Captopril
- ▶ Carvedilol
- ▶ Clonidina
- ▶ Enalapril
- ▶ Hidralazina
- ▶ Indapamida
- ▶ Levanlodipino Benzilato
- ▶ Lisinopril
- ▶ Losartana
- ▶ Metildopa
- ▶ Metoprolol Succinato
- ▶ Metoprolol Tartarato

- ▶ Nebivolol
- ▶ Nitroprussiato de sódio
- ▶ Olmesartana Medoxomila
- ▶ Propranolol
- ▶ Ramipril
- ▶ Telmisartana
- ▶ Valsartana
- ▶ Verapamil

#### **Antianginoso**

- ▶ Isossorbida Mononitrato
- ▶ Nifedipino
- ▶ Nitroglicerina
- ▶ Propatilnitrato
- ▶ Trimetazidina

#### **Antianginosos e Vasodilatadores**

- ▶ Alprostadil
- ▶ Isossorbida Dinitrato

#### **Antiarrítmicos**

- ▶ Adenosina
- ▶ Amiodarona
- ▶ Diltiazem
- ▶ Esmolol
- ▶ Propafenona
- ▶ Sotalol

#### **Bloqueador de canal de cálcio**

- ▶ Anlodipino
- ▶ Nimodipino

#### **Cardiotônicos**

- ▶ Deslanósideo
- ▶ Digoxina
- ▶ Levosimendana
- ▶ Milrinona

#### **Diuréticos**

- ▶ Acetazolamida
- ▶ Amilorida
- ▶ Clortalidona
- ▶ Espironolactona
- ▶ Furosemida
- ▶ Furosemida + Cloreto de Potássio
- ▶ Hidroclorotiazida
- ▶ Manitol 20%

#### **Estimulante Adrenérgico**

- ▶ Adrenalina
- ▶ Dobutamina
- ▶ Dopamina Cloridrato
- ▶ Efedrina
- ▶ Fenilefrina
- ▶ Isoprenalina
- ▶ Metaraminol
- ▶ Norepinefrina

#### **Outros - Aparelho Cardiovascular**

- ▶ Cumarina + Troxerrutina
- ▶ Diosmina+ Hesperidina
- ▶ Ivabradina
- ▶ Monoetanolamina Oleato
- ▶ Polidocanol
- ▶ Solução Cardioplégica

#### **Trombolíticos**

- ▶ Alteplase

#### **Vasoconstritores e Hipertensores**

- ▶ Vasopressina

#### **Vasodilatador Periférico, Cerebral**

- ▶ Pentoxifilina
- ▶ Papaverina

### **SUBGRUPO - APARELHO DIGESTIVO, METABOLISMO E NUTRIÇÃO**

#### **Alimentação e Reposição**

##### **Hidroeletrólítica Parenteral**

- ▶ Aminoácidos + Glicose + Lipídeos + Na + K + Mg + Ca + Po4 + Zn + SO-4 + Cl + Acetato
- ▶ Lipídeos

#### **Antiácidos**

- ▶ Bicarbonato de Sódio
- ▶ Hidróxido de Alumínio + Hidróxido de Magnésio + Simeticona

#### **Antidiarreico, repositores da flora intestinal**

- ▶ Saccharomyces Boulardii

#### **Antidiarreicos e Adsorventes**

- ▶ Loperamida
- ▶ Racecadotril

#### **Antiemético, Antivertiginoso**

- ▶ Dimenidrinato + vitamina B6
- ▶ Dimenidrinato + Vitamina B6 + Frutose + Glicose
- ▶ Meclizina

#### **Antiemético, Procinético**

- ▶ Alizaprida
- ▶ Aprepitanto
- ▶ Bromoprida
- ▶ Domperidona
- ▶ Fosaprepitanto Dimeglumina
- ▶ Granisetrona
- ▶ Metoclopramida
- ▶ Ondansetrona
- ▶ Palonosetrona

### **Antiespasmódico**

- Escopolamina
- Mebeverina
- Propantelina

### **Antiespasmódicos e Analgésicos**

- Escopolamina Brometo + Dipirona

### **Antifisético**

- Simeticona

### **Antissépticos Bucal**

- Cetilpiridínio
- Clorexidina
- Clorexidina + Fluoreto de Sódio
- Enxaguante Bucal Enzimático sem Alcool e sem Clorexidina

### **Antiulceroso**

- Dexlansoprazol
- Esomeprazol Magnésio
- Esomeprazol Sódico
- Omeprazol Magnésio
- Omeprazol Sódico
- Pantoprazol
- Ranitidina
- Sucralfato

### **Digestivos**

- Ácido Ursodesoxicólico
- Amilase + Lipase + Protease

### **Eletrolito Oral**

- Cálcio Carbonato
- Cálcio Carbonato + Colecalciferol
- Cloreto de Potássio
- Cloreto de Sódio
- Magnésio Sulfato

### **Hepatoprotetor**

- Ornitina

### **Hipoglicemiantes**

- Dapagliflozina
- Empagliflozina
- Gliclazida
- Glimepirida
- Insulina Degludeca
- Insulina Glargina
- Insulina Glulisina
- Insulina Humana NPH
- Insulina Humana Regular
- Insulina Lispro DNA Recombinante
- Linagliptina
- Liraglutida

- Metformina
- Pioglitazona
- Sitagliptina
- Vildagliptina

### **Hipolipêmico**

- Atorvastatina
- Bezafibrato
- Ciprofibrato
- Colestiramina
- Ezetimiba
- Pravastatina
- Rosuvastatina
- Sinvastatina

### **Laxantes**

- Bisacodil
- Bisacodil+ Docusato Sódico
- Fosfato de Sódio Dibásico + Fosfato de Sódio
- Glicerina
- Lactitol
- Lactulose
- Macrogol + Bicarbonato de Sódio + Cloreto de Sódio + Cloreto de Potássio
- Óleo Mineral
- Prucaloprida
- Picossulfato Sódico
- Plantago Ovata
- Sene + Associações
- Sorbitol + Lauril Sulfato de Sódio

### **Orexígeno**

- Cobamamida + Cloridrato de Ciproetadina
- Vitamina A + Vitamina B12 + L Carnitina + L Lisina

### **Outros medicamentos - Aparelho digestivo, metabolismo e nutrição**

- Mesalazina
- Saliva Artificial

### **Reposição Hidroeletrolítica Oral**

- Cloreto de Sódio
- Cloreto de Potássio

### **Vitaminas e Suplementos Minerais**

- Arginina + Fosfoserina + Fosfotreonina + Glutamina + Triptofana + Hidroxocobalamina
- Benfotiamina
- Calcitriol
- Vitamina + Poliminerais
- Vitamina A + Vitamina D
- Vitamina B1

- ▶ Vitamina B1 + Vitamina B6 + Vitamina B12
- ▶ Vitamina B12
- ▶ Vitamina B6
- ▶ Vitamina C
- ▶ Vitamina D3
- ▶ Vitamina E
- ▶ Vitaminas
- ▶ Vitaminas + Ácido Fólico
- ▶ Vitaminas Complexo B s/ vit B1
- ▶ Vitaminas do Complexo B
- ▶ Zinco + Cobre + Manganês + Cromo

#### **SUBGRUPO - APARELHO GENITURINÁRIO**

##### **Antiespasmódicos urinários**

- ▶ Oxibutinina Cloridrato

##### **Antiinfeciosos Ginecológicos Tópicos**

- ▶ Clostebol Neomicina
- ▶ Nistatina

##### **Antissépticos e Analgésicos Urinários**

- ▶ Fenazopiridina
- ▶ Metenamina + Metiltionínio

##### **Estimulante Uterino**

- ▶ Ergometrina

##### **Solução para Diálise**

- ▶ Bicarbonato de Sódio
- ▶ Citrato Trissódico
- ▶ Solução Ácida Para Hemodiálise
- ▶ Solução Básica de Diálise: Bicarbonato de Sódio + Cloreto de Sódio + Glicose Anidra
- ▶ Solução de Diálise : Bicarbonato de Sódio
- ▶ Solução de Diálise Peritoneal
- ▶ Solução de Diálise: Cloreto de Cálcio Diidratado + Cloreto de Sódio + Glicose + Cloreto de Magnésio Hexaidratado + Sódio Lactato
- ▶ Solução de Diálise: Cloreto de sódio + cloreto de potássio + associações
- ▶ Solução de Diálise: Cloreto de sódio + sulfato de magnésio heptaidratado s/ glicose
- ▶ Solução de Diálise: Cloreto de Sódio + Sulfato de Magnésio + Heptaidratado sem Glicose + Bicarbonato de Sódio
- ▶ Solução de Reposição de Cálcio

##### **Terapêutica Prostática**

- ▶ Citidina + Uridina + Hidroxocobolamina
- ▶ Doxazosina
- ▶ Dutasterida
- ▶ Finasterida
- ▶ Tansulosina

##### **Outros- Aparelho Genitourinário**

- ▶ Citrato de Potássio

#### **SUBGRUPO - APARELHO RESPIRATÓRIO**

##### **Antiasmáticos**

- ▶ Beclometasona Dipropionato

##### **Antitussígenos**

- ▶ Cloperastina

##### **Broncodilatadores**

- ▶ Aminofilina
- ▶ Bamifilina
- ▶ Budesonida
- ▶ Budesonida + Formoterol
- ▶ Fluticasona + Salmeterol
- ▶ Ipratrópio Brometo
- ▶ Salbutamol
- ▶ Teofilina
- ▶ Terbutalina
- ▶ Tiotrópio Brometo

##### **Descongestionante Nasal**

- ▶ Cloreto de Sódio + Bensalcônico
- ▶ Desloratadina
- ▶ Oximetazolina

##### **Mucolítico**

- ▶ Acetilcisteína

##### **Outros - Aparelho Respiratório**

- ▶ Montelucaste Sódico

#### **SUBGRUPO - DERMATOLÓGICOS, OTOLÓGICOS E OFTALMOLÓGICOS**

##### **Anestésico Ocular**

- ▶ Proximetacaína

##### **Anestésicos tópicos**

- ▶ DMSO
- ▶ Lidocaína

##### **Antifúngico Tópico**

- ▶ Cetoconazol
- ▶ Clotrimazol
- ▶ Isoconazol



- ▶ Miconazol
- ▶ Nistatina + Óxido de Zinco

### **Antiglaucomatoso, Indutor da Miose**

- ▶ Dorzolamida + Timolol
- ▶ Latanoprost + Cloreto de Benzalcônio

### **Anti-hemorroidário**

- ▶ Policresuleno + Cinchocaína

### **Anti-inflamatório Esteroidal (Corticoide) Tópico**

- ▶ Betametasona Valerato
- ▶ Cetoconazol + Betametasona
- ▶ Hidrocortisona + alumínio subacetato + lidocaína + zinco óxido
- ▶ Triancinolona Acetonida

### **Anti-inflamatório não esteroidal tópico**

- ▶ Cordia Verbenacea
- ▶ Diclofenaco Dietilamônio
- ▶ Polissulfato de Mucopolissacarídeo
- ▶ Propionato de Clobetasol + Alantoína

### **Anti-inflamatório Oftálmico**

- ▶ Dexametasona

### **Antimicrobiano Oftálmico**

- ▶ Ciprofloxacino
- ▶ Tobramicina

### **Antimicrobiano Oftálmico e Corticoide**

- ▶ Dexametasona + Moxifloxacino
- ▶ Dexametasona + Neomicina Sulfato + Polimixina B Sulfato + Hipromelose
- ▶ Dexametasona + Neomicina Sulfato
- ▶ Tobramicina + Dexametasona

### **Antimicrobiano Tópico**

- ▶ Ácido Fusídico
- ▶ Bacitracina + Neomicina
- ▶ Cloranfenicol + Aminoácidos + Metionina + Vitamina A
- ▶ Cloranfenicol + Colagenase
- ▶ Cloranfenicol + Desoxirribonuclease + Fibrinolisa
- ▶ Gentamicina Sulfato
- ▶ Hexamidina + Tetracaína
- ▶ Mupirocina
- ▶ Nitrofurazona
- ▶ Sulfadiazina prata + nitrato de cério

### **Antimicrobiano Tópico e Corticoide**

- ▶ Betametasona + Clioquinol + Gentamicina + Tolnaftato
- ▶ Betametasona + Gentamicina

- ▶ Gramicidina + Neomicina + Nistatina + Triancinolona
- ▶ Mometasona

### **Antisséptico Tópico**

- ▶ Álcool Etilico Hidratado
- ▶ Clorexidina
- ▶ Hidrogênio Peróxido
- ▶ Iodopovidona

### **Debridante**

- ▶ Octil Cianoacrilato
- ▶ Papaina

### **Hidratante, Protetor Epidérmico**

- ▶ Ácidos graxos Essenciais (A.G.E)
- ▶ Alantoína + Fomblin + Óleo de Silicone
- ▶ Alantoína + Triclosan + Fenoxietanol + Óleo Vegetal de Milho
- ▶ Camomila Extrato
- ▶ Dexpanthenol
- ▶ Gelatina + Pectina + Carboximetilcelulose Sódica + Associações
- ▶ Glicerina
- ▶ Óleo de Amêndoas
- ▶ Propilenoglicol + Polietilenoglicol + Hidroxipropilcelulose + Ácido Láctico
- ▶ Silicato de Magnésio
- ▶ Vaselina
- ▶ Vitaminas + Lectina + Óleo Vegetal

### **Lubrificante Oftálmico**

- ▶ Ácido Poliacrílico
- ▶ Álcool Polivinílico + Povidona
- ▶ Carboximetilcelulose Sódica (Carmelose)
- ▶ Carmelose Sódica + Associações
- ▶ Dextrano + Hipromelose + Poliquad
- ▶ Hidroxipropilmetilcelulose
- ▶ Hialuronato de Sódio

### **Midriático**

- ▶ Atropina
- ▶ Fenilefrina
- ▶ Tropicamida

### **Otológico Tópico**

- ▶ Hidroxiquinolina + Trietanolamina

### **Outros - Dermatológicos, Otológicos e Oftálmicos**

- ▶ Ácido Acético
- ▶ Condroitina + Hialuronato
- ▶ Iodo + Iodeto
- ▶ Pilocarpina
- ▶ Solução Salina: Cálcio Cloreto + Magnésio Cloreto + Potássio Cloreto + Sódio Acetato + Sódio Citrato + Sódio Cloreto

## **Terapêutica das Afecções Dermatológicas**

- ▶ Clostebol + Neomicina
- ▶ Desonida

## **SUBGRUPO - HORMÔNIOS E METABOLISMO**

### **Anti-inflamatório Esteroidal Sistemico**

- ▶ Beclometasona Dipropionato + Fumato de Formoterol
- ▶ Betametasona Acetato + Betametasona Fosfato Dissódico
- ▶ Budesonida
- ▶ Deflazacort
- ▶ Dexametasona
- ▶ Fludrocortisona
- ▶ Fluticasona
- ▶ Hidrocortisona Succinato
- ▶ Metilprednisolona Acetato
- ▶ Metilprednisolona Succinato
- ▶ Prednisolona
- ▶ Prednisona
- ▶ Triancinolona

### **Hormônio Tireoideo**

- ▶ Levotiroxina

### **Hormônio Androgênico**

- ▶ Nandrolona Decanoato
- ▶ Undecilato de Testosterona

### **Hormônio Anti Estrogênico**

- ▶ Fulvestranto

### **Hormônio Antiandrogênico**

- ▶ Ciproterona

### **Hormônio Antidiurético**

- ▶ Desmopressina

### **Hormônio Antitireoideo**

- ▶ Propiltiouracil
- ▶ Tiamazol

### **Hormônio Estrogênico**

- ▶ Levonorgestrel

### **Inibidores da Reabsorção Óssea**

- ▶ Pamidronato Dissódico
- ▶ Zoledrônico Ácido

### **Outros - Hormônios e Metabolismo**

- ▶ Acetato de Degarelix
- ▶ Glucagon
- ▶ Gosserelelina

## **SUBGRUPO - IMUNOTERAPIA E ALERGIA**

### **Anti-Histamínicos H1**

- ▶ Bilastina
- ▶ Cetirizina Dicloridrato
- ▶ Dexclorfeniramina
- ▶ Difenidramina
- ▶ Difenidramina + sódico citrato + amônio cloreto
- ▶ Fexofenadina
- ▶ Fexofenadina + Pseudoefedrina
- ▶ Hidroxizina
- ▶ Loratadina
- ▶ Prometazina

### **Imunoglobulina**

- ▶ Imunoglobulina Antitetânica
- ▶ Imunoglobulina Humana

### **Imunomodulador**

- ▶ Belimumabe
- ▶ Infliximabe
- ▶ Natalizumab

### **Imunossupressor**

- ▶ Azatioprina
- ▶ Basiliximabe
- ▶ Ciclosporina
- ▶ Everolimo
- ▶ Imunoglobulina Antitímocito Humanos (COELHO)
- ▶ Micofenolato de Mofetila
- ▶ Micofenolato de Sódio
- ▶ Sirolimus
- ▶ Tacrolimo

### **Vacina Antitetânica**

- ▶ Vacina Antitetânica

### **Vacinas**

- ▶ Bacillus Calmette Guérin - (BCG)
- ▶ Vacina Contra Hepatite B
- ▶ Vacina Pneumocócica

## **SUBGRUPO - OUTROS MEDICAMENTOS**

### **Agente diagnóstico**

- ▶ Azul Patente
- ▶ Fluoresceína
- ▶ Índigo Carmim
- ▶ Tirotrófina Alfa

### **Antídotos**

- ▶ Alcool Absoluto 99,6 °GL
- ▶ Azul de Metileno

- Carvão Ativado
- Desferroxamina Mesilato
- Dexrazoxano Cloridrato
- Flumazenil
- Folinato de Cálcio
- Mesna
- Naloxona Cloridrato
- Naltrexona
- Protamina
- Rasburicase
- Sugamadex Sódico

### **Antitabagismo**

- Nicotina
- Vareniclina Tartarato

### **Contrastes**

- Ácido Gadotérico
- Bário Sulfato
- Gadobutrol
- Gadopentetato de Dimeglumina
- Gadoxetato
- Iodixanol
- Iopamidol
- Iopromida
- Ioversol
- Meglumina (Meglumina Ioxitalamato) + Ioxitalamato de sódio
- Meglumina (Meglumina Ioxitalamato) + Polividona
- Meglumina Ioxitalamato
- Óleo Iodado de Papoula + Iodo

### **Eletrólitos, diluentes**

- Água Bidestilada
- Acetato de Sódio
- Bicarbonato de Sódio
- Cálcio Cloreto + Sódio Cloreto + Potássio + Sódio
- Cálcio Cloreto + Sódio Cloreto + Potássio + Sódio Lactato
- Cálcio Cloreto
- Cloreto de Potássio
- Cloreto de Sódio
- Fosfato Potássio
- Glicerofosfato de Sódio
- Gliconato de Cálcio
- Glicose
- Glicose + Cloreto de Sódio
- Magnésio Sulfato
- Sódio Cloreto + Potássio Cloreto + Soro Glicosado 5%

### **Irrigação vesical**

- Glicina

### **Outros medicamentos**

- Extrato de Componentes da Saliva
- Fenol
- Nanquim
- N-butil-2-cianoacrilato
- Permanganato de Potássio
- Sildenafil
- Verde Brilhante

### **Quelante**

- Deferasirox
- Sevelâmer

### **Resina de troca iônica**

- Cálcio Poliestirenosulfonato

### **Solução para conservação de órgãos**

- Minerais + Histidina + Triptofano + Manitol + Alfa-cetoglutarato
- Solução de Conservação de Órgãos

### **Solventes**

- Éter + Álcool Etilico

## **SUBGRUPO - SANGUE E ÓRGÃO HEMATOPOIÉTICOS**

### **Antiagregante Plaquetário**

- Abciximabe
- Cilostazol
- Clopidogrel
- Dipyridamol
- Ticagrelor
- Ticlopidina
- Tirofiban

### **Antianêmicos**

- Ácido Fólico
- Ácido Fólico + Ferrocianida + Cálcio Pantotênico + Vitaminas + Políminerais
- Alfafoetina Humana Recombinante
- Carboximaltose Férrica
- Eritropoetina Humana Recombinante
- Ferro III Polimaltosado Hidróxido
- Ferro Quelato Glicinado

### **Anticoagulantes**

- Apixabana
- Dabigatran
- Enoxaparina Sódica
- Fondaparinux Sódico
- Heparina
- Rivaroxabana
- Varfarina

### **Anti-Hemorrágicos**

- ▶ Eltrombopag Olamina

### **Estimulante da formação de células sanguíneas**

- ▶ Filgrastim
- ▶ Lipegfilgrastim
- ▶ Pegfilgrastim
- ▶ Plerixafor

### **Expansor de volume sanguíneo**

- ▶ Albumina Humana
- ▶ Gelatina + Cloreto de Sódio + Hidróxido de Sódio
- ▶ Hidroxiethylamido
- ▶ Solução de eletrólitos

### **Fator de coagulação**

- ▶ Complexo Protrombinico
- ▶ Fator de de Von Willebrand + Fator VIII
- ▶ Fator Recombinante de Coagulação VII A
- ▶ Gelatina + Trombina
- ▶ Matriz Gelatinosa Derivada Bovina + Derivado de Trombina Humana

### **Hemostático**

- ▶ Ácido Épsilon Aminocapróico
- ▶ Ácido Tranexâmico
- ▶ Fibrinogênio + Trombina Humana
- ▶ Fibrinogênio Humano
- ▶ Fibrinogênio Humano + Aprotinina Sintética + Trombina Humana
- ▶ Fibrinogênio Humano + Aprotinina Bovina + Trombina Humana
- ▶ Octreotida
- ▶ Percloroeto Férrico
- ▶ Somatostatina
- ▶ Subgalato de Bismuto
- ▶ Terlipressina
- ▶ Vitamina K

### **Outros - Sangue e Órgãos**

#### **Hematopoiéticos**

- ▶ Ciclo-taurolidina + Citrato + Uroquinase
- ▶ Cloridrato de Prasugrel
- ▶ Hialuronidase
- ▶ Hilano G-f 20
- ▶ Icatibanto

## **SUBGRUPO - SISTEMA NERVOSO**

### **Analgésico, Anti-inflamatório**

- ▶ Paracetamol + Diclofenaco de Sódio + Carisoprodol + Cafeína

### **Analgésico, Antipirético, Antiagregante Plaquetário**

- ▶ Ácido Acetilsalicílico
- ▶ Ácido Acetilsalicílico Tamponado

### **Analgésicos e Antipiréticos**

- ▶ Adifenina + Dipirona + Prometazina
- ▶ Dipirona Sódica
- ▶ Paracetamol
- ▶ Paracetamol + Cafeína
- ▶ Viminol

### **Analgésicos Narcóticos**

- ▶ Alfentanila
- ▶ Buprenorfina
- ▶ Codeína
- ▶ Codeína + Paracetamol
- ▶ Fentanila
- ▶ Meperidina Cloridrato (Petidina)
- ▶ Metadona
- ▶ Morfina
- ▶ Nalbufina Cloridrato
- ▶ Oxycodona
- ▶ Remifentanila
- ▶ Sufentanila
- ▶ Tramadol
- ▶ Tramadol + Paracetamol

### **Anestésicos Gerais**

- ▶ Cetamina
- ▶ Desflurano
- ▶ Etomidato
- ▶ Isoflurano
- ▶ Propofol
- ▶ Sevoflurano
- ▶ Tiopental

### **Anestésicos Locais**

- ▶ Bupivacaína + Glicose
- ▶ Bupivacaína
- ▶ Bupivacaína + Epinefrina
- ▶ Levobupivacaína
- ▶ Levobupivacaína + Epinefrina
- ▶ Lidocaína
- ▶ Lidocaína + Epinefrina
- ▶ Lidocaína + Norepinefrina
- ▶ Ropivacaína

### **Ansiolíticos**

- ▶ Alprazolam
- ▶ Bromazepam
- ▶ Buspirona
- ▶ Clobazam
- ▶ Clonazepam
- ▶ Cloxazolam
- ▶ Diazepam
- ▶ Lorazepam

### **Anticolinérgico**

- ▶ Atropina
- ▶ Succinato de Solifenacina
- ▶ Donepezila
- ▶ Galantamina
- ▶ Neostigmina
- ▶ Piridostigmina
- ▶ Rivastigmina

### **Anticonvulsivantes**

- ▶ Carbamazepina
- ▶ Divalproato de Sódio
- ▶ Fenitoína
- ▶ Fenobarbital
- ▶ Gabapentina
- ▶ Lacosamida
- ▶ Lamotrigina
- ▶ Levetiracetam
- ▶ Oxcarbazepina
- ▶ Pregabalina
- ▶ Primidona
- ▶ Topiramato
- ▶ Valproato de Sódio

### **Antidepressivos**

- ▶ Agomelatina
- ▶ Amitriptilina
- ▶ Bupropiona
- ▶ Citalopram
- ▶ Clomipramina
- ▶ Duloxetina
- ▶ Escitalopram
- ▶ Fluoxetina
- ▶ Imipramina
- ▶ Lítio Carbonato
- ▶ Mirtazapina
- ▶ Nortriptilina
- ▶ Paroxetina
- ▶ Sertralina
- ▶ Succinato de Desvenlafaxina Mono-
- dratado
- ▶ Trazodona
- ▶ Venlafaxina
- ▶ Vortioxetina

### **Antienxaquecoso**

- ▶ Isometepteno + cafeína + dipirona
- ▶ Naratriptana
- ▶ Sumatriptana

### **Antiparkinsonianos**

- ▶ Amantadina
- ▶ Biperideno
- ▶ Entacapona
- ▶ Levodopa + Benserazida
- ▶ Memantina
- ▶ Pramipexol

- ▶ Rivastigmina
- ▶ Rotigotina

### **Antipsicótico, Neurolépticos**

- ▶ Clorpromazina
- ▶ Droperidol
- ▶ Droperidol + Fentanila
- ▶ Haloperidol
- ▶ Levomepromazina
- ▶ Olanzapina
- ▶ Periciazina
- ▶ Quetiapina
- ▶ Risperidona
- ▶ Sulpirida

### **Antivertiginoso**

- ▶ Betaistina
- ▶ Flunarizina

### **Hipnóticos**

- ▶ Dexmedetomidina
- ▶ Flunitrazepam
- ▶ Flurazepam
- ▶ Midazolam
- ▶ Zopiclona
- ▶ Zolpidem

### **Outros - Sistema Nervoso**

- ▶ Monossialogangliosídeo
- ▶ Riluzol

### **Psicoestimulante**

- ▶ Metilfenidato
- ▶ Modafilina

## **SUBGRUPO - SISTEMA MÚSCULO-ESQUELÉTICO**

### **Antigotoso**

- ▶ Alopurinol
- ▶ Colchicina

### **Anti-inflamatório Não Esteroidal Seletivo da COX2**

- ▶ Celecoxibe
- ▶ Etoricoxibe
- ▶ Parecoxibe

### **Anti-inflamatório Não Esteroidal Sistêmico**

- ▶ Cetoprofeno
- ▶ Diclofenaco Sódico
- ▶ Flurbiprofeno
- ▶ Ibuprofeno
- ▶ Indometacina
- ▶ Naproxeno
- ▶ Nimesulida

- ▶ Tenoxicam
- ▶ Trometamol Cetorolaco

#### **Antirreumático**

- ▶ Abatacepte
- ▶ Adalimumabe
- ▶ Condroitina Sulfato + Glicosamina
- ▶ Golimumab
- ▶ Hialuronato de Sódio
- ▶ Hialuronato de Sódio + Sorbitol
- ▶ Leflunomida
- ▶ Tocilizumabe

#### **Bloqueador Neuromuscular**

- ▶ Pancurônio
- ▶ Rocurônio
- ▶ Suxametônio

#### **Colinérgico, disfunção vesicoesfincteriana**

- ▶ Betanecol

#### **Outros - Sistema Músculo - Esquelético**

- ▶ Denosumabe

#### **Relaxantes Musculares**

- ▶ Alpinia zerumbet
- ▶ Baclofeno
- ▶ Ciclobenzaprina
- ▶ Dantroleno Sódico
- ▶ Dipirona + Orfenadrina + Cafeína
- ▶ Tiocolchicosido
- ▶ Tizanidina
- ▶ Toxina Botulínica Tipo A



## CLASSIFICAÇÃO TERAPÊUTICA DOS MEDICAMENTOS POR INDICAÇÃO

### Agente Diagnóstico

|                  |                                                              |
|------------------|--------------------------------------------------------------|
| Azul Patente     | Azul Patente 2,5% Amp 2ml Manip                              |
|                  | Bleu Patente V 2,5% Amp 2mL                                  |
| Fluoresceína     | Fluoresceína 1% (10mg/ml) Solução Oftálmica Frasco 5ml Manip |
| Índigo Carmim    | Índigo Carmim 2% (20mg/ml) Corante Fr 30ml Manip             |
|                  | Índigo Carmin 0,8% Corante Fr 30mL                           |
|                  | Índigo Carmin 0,8% Corante Amp 5mL                           |
| Tirotrófina Alfa | Thyrogen 1,08mg (0,9mg/ml) FA 1,2ml                          |

### Agentes Anti-hipertensivos

|              |                                     |
|--------------|-------------------------------------|
| Atenolol     | Ablok 25mg Cp                       |
|              | Angipress 25mg Cp                   |
|              | Atenol 25mg Cp                      |
|              | Atenolol 25mg Cp (Prati Donaduzzi)  |
|              | Atenolol 25mg Cp (Biosintética)     |
|              | Atenolol 25mg Cp (EMS)              |
|              | Atenolol 25mg Cp (Medley)           |
|              | Atenolol 25mg Cp (Sandoz)           |
|              | Atenolol 25mg Cp (Germed)           |
|              | Atenolol 50mg Cp (Biosintética)     |
|              | Atenolol 50mg Cp (EMS)              |
|              | Atenolol 50mg Cp (Medley)           |
|              | Ablok 50mg Cp                       |
|              | Atenol 50mg Cp                      |
| Bisoprolol   | Concor 2,5mg Cp Rev                 |
| Candesartana | Atacand 8mg Cp                      |
|              | Blopress 8mg Cp                     |
| Captopril    | Captopril 12,5mg Cp (Medley)        |
|              | Captopril 12,5mg Cp (EMS)           |
|              | Captopril 25mg Cp (Prati Donaduzzi) |
|              | Captopril 25mg Cp (EMS)             |
|              | Captopril 25mg Cp (Medley)          |



|                         |                                                   |
|-------------------------|---------------------------------------------------|
| Carvedilol              | Cardilol 3,125mg Cp                               |
|                         | Cardilol 12,5mg Cp                                |
|                         | CarVEDilol 12,5mg Cp (Biosintética)               |
|                         | CarVEDilol 12,5mg Cp (Libbs)                      |
|                         | CarVEDilol 3,125mg Cp (Biosintética)              |
|                         | CarVEDilol 3,125mg Cp (EMS)                       |
|                         | CarVEDilol 6,25mg (EMS)                           |
|                         | Carvedilol 6,25mg Cp (Biosintética)               |
|                         | Carvedilol 6,25mg Cp (Germed)                     |
|                         | Carvedilol 6,25mg Cp (Medley)                     |
|                         | Coreg 12,5 Cp                                     |
|                         | Divelol 6,25mg Cp                                 |
|                         |                                                   |
| Clonidina               | Atensina 100mcg Cp                                |
|                         | Atensina 150mcg Cp                                |
|                         | Clonidin 150mcg Amp 1ml                           |
| Enalapril               | Renitec 5mg Cp                                    |
|                         | Renitec 10mg Cp                                   |
| Hidralazina             | Apresolina 25mg Drg                               |
|                         | Hidralazina 25mg Cap Manip                        |
|                         | Nepresol 20mg Amp 1mL                             |
| Indapamida              | Indapen Sr Cp Lib Prolongada                      |
|                         | Natrilix Sr Cp Lib Prolongada                     |
| Levanlodipino Benzilato | Novanlo 2,5mg Cp                                  |
| Lisinopril              | Lisinopril 10mg Cp (EMS)                          |
|                         | Lisinopril 10mg Cp (Medley)                       |
|                         | Zestril 10mg Cp                                   |
| Losartana               | Aradois 25mg Cp Rev                               |
|                         | Aradois 50mg Cp Rev                               |
|                         | Corus 50mg Cp Rev                                 |
|                         | Cozaar 50mg Cp Rev                                |
|                         | Losartana Potássica 50mg Cp Rev (Prati Donaduzzi) |

|                         |                                                  |
|-------------------------|--------------------------------------------------|
| Metildopa               | Aldomet 250mg Cp Rev                             |
|                         | Metildopa 250mg Cp Rev (Biosintética)            |
| Metoprolol Succinato    | Selozok 25mg Cp Lib Controlada                   |
| Metoprolol Tartarato    | Seloken 5mg Amp 5ml                              |
|                         | Betacris Amp 5mL                                 |
|                         | Seloken 100mg Cp                                 |
| Nebivolol               | Nebilet 5mg Cp                                   |
| Nitroprussiato de sódio | Nitroprus 50mg FA                                |
| Olmesartana Medoxomila  | Benicar 20mg Cp Rev                              |
|                         | Olmetec 20mc Cp Rev                              |
|                         | Fluxocor 20mg Cp Rev                             |
| Propranolol             | Inderal 10mg Cp                                  |
|                         | Inderal 40mg Cp                                  |
|                         | Propranolol 10mg Cp (EMS)                        |
|                         | Propranolol 10mg Cp (Germed)                     |
|                         | Propranolol 10mg Cp (Medley)                     |
|                         | Propranolol 40g Cp (Medley)                      |
|                         | Propranolol 40mg Cp (EMS)                        |
|                         | Propranolol 40mg Cp (Germed)                     |
| Ramipril                | Naprix 5mg Cp                                    |
|                         | Ramipril 5mg Cp                                  |
|                         | Triatec 5mg Cp                                   |
| Telmisartana            | Micardis 40mg Cp                                 |
| Valsartana              | Diovan 80mg Cp Rev                               |
|                         | Valsartana 80mg Cp Rev (Germed)                  |
|                         | Brasart 80mg Cp Rev                              |
| Verapamil               | Dilacorón 80mg Cp Rev                            |
|                         | Dilacorón Retard 120mg Cp Rev                    |
|                         | Verapamil Cloridrato 120mg Cp Lib Prolongada     |
|                         | Verapamil Cloridrato Cp Ação Prolongada (Sandoz) |
|                         | Verapamil 80mg Cp Rev (EMS)                      |

### Alimentação e Reposição Hidroeletrolítica Parenteral

|                                                                                               |                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Aminoácidos + Glicose +<br>Lipídeos + Na + K + Mq +<br>Ca + Po4 + Zn + SO4- +<br>Cl + Acetato | Smofkabiven Fr 1477mL         |
| Lipídeos                                                                                      | Emulsão Lipídeos 10% Fr 500ml |
|                                                                                               | Smoflipid 20% Fr 100ml        |
|                                                                                               | Smoflipid 20% Fr 500ml        |

### Analgésico, Antipirético, Antiagregante Plaquetário

|                                     |                           |
|-------------------------------------|---------------------------|
| Ácido Acetilsalicílico              | Aas Infantil 100mg Cp     |
| Ácido Acetilsalicílico<br>Tamponado | Aspirina Prevent 100mg Cp |
|                                     | Somalgin Cardio 100mg Cp  |

### Analgésico, Anti-inflamatório

|                                                                   |              |
|-------------------------------------------------------------------|--------------|
| Paracetamol +<br>Diclofenaco de Sódio +<br>Carisoprodol + Cafeína | Beserol Cp   |
|                                                                   | Tandrilax Cp |

### Analgésicos e Antipiréticos

|                                       |                                                    |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Adifenina + Dipirona +<br>Prometazina | Lisador Gts Fr 15ml                                |
|                                       | Dorilen Gts Fr 15mL                                |
| Dipirona Sódica                       | Dipirona Sódica 1g Amp 2ml (Teuto)                 |
|                                       | Dipirona Sódica 1g Amp 2mL (Hipolabor)             |
|                                       | Dipirona Sódica 500mg Cp (Medley)                  |
|                                       | Dipirona Sódica Comprimido 500mg (Prati Donaduzzi) |
|                                       | Dipirona Sódica Cp 500mg (EMS)                     |
|                                       | Novalgina 1g Amp 2ml                               |
|                                       | Novalgina 500mg Cp                                 |
|                                       | Novalgina Gts 500mg/ml Fr 10ml                     |
| Paracetamol                           | Dorico 750mg Cp                                    |
|                                       | Paracetamol 750mg Cp (Biosintética)                |
|                                       | Paracetamol 750mg Cp (Prati Donaduzzi)             |
|                                       | Paracetamol 750mg Cp (Germed)                      |
|                                       | Paracetamol 750mg Cp (Neo Química)                 |
|                                       | Paracetamol Gts 200mg/ml Fr 15ml (EMS)             |
|                                       | Paracetamol Gts 200mg/ml Fr 15ml (Medley)          |

|                                  |                                                   |
|----------------------------------|---------------------------------------------------|
| Paracetamol                      | Tylenol 750mg Cp Rev                              |
|                                  | Paracetamol Gts 200mg/20gts/mL Fr 15mL (EMS)      |
|                                  | Paracetamol Gts 200mg/20gts/mL Fr 15mL (Medley)   |
|                                  | Paracetamol Gts 200mg/20gts/mL Fr 15mL (Germed)   |
|                                  | Tylenol Gts 200mg/ml Fr 15ml                      |
|                                  | Halexminophen 1000mg (10mg/ml) Bolsa 100ml        |
| Paracetamol + Cafeína            | Tylenol Dc 500mg + 65mg Cp Rev                    |
| Viminol                          | Dividol 70mg Cap                                  |
| <b>Analgésicos Narcóticos</b>    |                                                   |
| Alfentanila                      | Rapifen 2,5mg Amp 5ml                             |
|                                  | Alfast 2,5mg Amp 5 mL                             |
| Buprenorfina                     | Restiva 10mg Adv Transdérmico                     |
|                                  | Restiva 5mg Adv Transdérmico                      |
|                                  | Transtec 20mg Adv Transdérmico                    |
|                                  | Transtec 30mg Adv Transdérmico                    |
|                                  | Transtec 40mg Adv Transdérmico                    |
| Codeína                          | Codein 3mg/ml Sol Oral Fr 120ml                   |
| Codeína + Paracetamol            | Tylex 7.5mg/500mg Cp                              |
|                                  | Tylex 500mg/30mg Cp                               |
| Fentanila                        | Durogesic D-trans 2,1mg Adv Transdérmico 12 mcg/h |
|                                  | Durogesic D-trans 4,2mg Adv Transdérmico 25 mcg/h |
|                                  | Durogesic D-trans 8,4mg Adv Transdérmico 50 mcg/h |
|                                  | Fentanest 100mcg Amp 2ml                          |
|                                  | Fentanest 250mcg Amp 5ml                          |
|                                  | Fentanest 500mcg Amp 10ml                         |
|                                  | Fentanil 100mcg Amp 2ml                           |
|                                  | Fentanil 250mcg Ampola 5ml                        |
|                                  | Fentanil 500mcg Amp 10ml                          |
| Fentanila                        | Unifental 250mcg Amp 5 ml                         |
|                                  | Unifental 100mcg Amp 2 ml                         |
| Meperidina Cloridrato (Petidina) | Dolantina 100mg Amp 2ml                           |

|                           |                                                   |
|---------------------------|---------------------------------------------------|
| Metadona                  | Mytedom 10mg Amp 1ml                              |
|                           | Mytedom 5mg Cp                                    |
| Morfina                   | Dimorf 10mg Amp 1ml                               |
|                           | Dimorf 2mg Amp 2ml                                |
|                           | Dimorf 0,1mg Amp 1mL                              |
|                           | Dimorf 10mg Cp                                    |
| Nalbufina Cloridrato      | Nubain 10mg Amp 1ml                               |
| Oxicodona                 | Oxycontin 10 mg Cp Lib Prolongada                 |
|                           | Oxycontin 20mg Cp Lib Prolongada                  |
| Remifentanila             | Remifas 2mg FA                                    |
|                           | Remifentanila Cloridrato 2mg FA                   |
|                           | Ultiva 2mg Fap                                    |
| Sufentanila               | Sufenta 50mcg/ml Amp 1ml                          |
|                           | Fastfen 50mcg (75mcg Citrato de Sufentanila/ml)   |
| Tramadol                  | Tramadol 50mg Cap (Germed)                        |
|                           | Tramadol Cloridrato 100mg Amp 2ml (União Química) |
|                           | Tramadol Cloridrato 50mg Cap (Medley)             |
|                           | Tramadon 100mg Amp 2ml                            |
|                           | Tramadon 50mg Cap                                 |
|                           | Tramal 100mg Amp 2ml                              |
|                           | Tramal 50mg Cap                                   |
| Tramadol + Paracetamol    | Ultracet 37,5/325mg Cp                            |
| <b>Anestésicos Gerais</b> |                                                   |
| Cetamina                  | Ketamin S 50mg/ml Amp 2ml                         |
|                           | Ketamin S 50mg/ml FA 10ml                         |
| Desflurano                | Desforane 1ml/ml Fr 240ml                         |
| Etomidato                 | Hypnomidate 20mg Amp 10ml                         |
|                           | Etomidato 20mg Amp 10ml (Cristália)               |
| Isoflurano                | Isoforine 1ml/ml Fr 100ml                         |
|                           | Isoflurano 5mL - Dose                             |

|                              |                                                           |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Propofol                     | Diprivan 1% Amp 20ml                                      |
|                              | Diprivan 1% FA 100ml                                      |
|                              | Diprivan P F S 1% Ser 50ml                                |
|                              | Diprivan P F S 2% Ser 50ml                                |
|                              | Lipuro 1% Amp 20ml                                        |
|                              | Lipuro 1% FA 100ml                                        |
|                              | Propovan 1% Amp 20ml                                      |
|                              | Proville 1% FA 100ml                                      |
|                              | Proville 1% FA 20ml                                       |
|                              | Propofol 1% (10mg/mL) Amp 20mL (Fresenius)                |
|                              | Propofol 1% (10mg/mL) Amp 100mL (Fresenius)               |
| Sevoflurano                  | Sevorane 1ml/ml Fr 100ml                                  |
|                              | Sevorane 1ml/ml Fr 250ml                                  |
|                              | Sevoflurano 1mL - Dose                                    |
|                              | Sevoflurano 5mL - Dose                                    |
|                              | Sevones Fr 250mL                                          |
|                              | Sevoflurano 10mL - Dose                                   |
|                              | Sevocris 1ml/ml Fr 250ml                                  |
| Tiopental                    | Thiopentax 1g FA                                          |
| Anestésicos Locais           |                                                           |
| Bupivacaína                  | Neocaína 0,50% Sem Adrenalina FA 20mL                     |
|                              | Neocaína Isobárica 0,5% Amp 4ml                           |
|                              | Bupstestic 0,5% S/ Adrenalina FA 20mL                     |
| Bupivacaína + Glicose        | Neocaína Pesada 0,5% Amp 4ml                              |
| Bupivacaína + Epinefrina     | Bupstestic 0,5% C/ Epinefrina FA 20mL                     |
|                              | Neocaína 0,50% Com epinefrina FA 20mL                     |
| Levobupivacaína              | Novabupi 0,5% Sem Vasoconstritor FA 20 mL                 |
| Levobupivacaína + Epinefrina | Novabupi 0,5% Com Vasoconstritor FA 20mL                  |
| Lidocaína                    | Cloridrato de Lidocaína 2% Sem Vasoconstritor (Novafarma) |
|                              | Xylestesin 1% Sem Vasoconstritor FA 20mL                  |
|                              | Xylestesin 2% Isobárica Amp 5mL                           |

|                           |                                                |
|---------------------------|------------------------------------------------|
| Lidocaína                 | Xylestesin 2% Sem Vasoconstritor Carpule 1,8ml |
|                           | Xylestesin 2% Sem Vasoconstritor FA 20mL       |
| Lidocaína + Epinefrina    | Xylestesin 2% Com epinefrina FA 20ml           |
| Lidocaína + Norepinefrina | Xylestesin 2% Com Norepinefrina Carpule 1,8mL  |
| Ropivacaína               | Naropin 0,75% Amp 20ml                         |
|                           | Naropin 1% Amp 20ml                            |
|                           | Ropi 0,75% (7,5mg/mL) Amp 20mL                 |
|                           | Ropi 1% (10mg/mL) amp 20mL                     |
| <b>Anestésico Ocular</b>  |                                                |
| Proximetacaína            | Anestalcon Sol Oft 25mg Fr 5ml                 |
| <b>Anestésico Tópico</b>  |                                                |
| DMSO                      | DMSO 99% Gel Bis 10g Manip                     |
| Lidocaína                 | Dermomax Creme 200mg Bis 5g                    |
|                           | Toperma 5% (50mg/g) Patch Dose 5 adesivos      |
|                           | Xylestesin 10% Spray Fr 50ml                   |
|                           | Xylestesin 2% Geléia Ser 10g                   |
|                           | Xylestesin 2% Geléia Bis 30g                   |
|                           | Xylocaina 2% Geléia Bis 30g                    |
|                           | Lidocaína 40mg/g Creme Bis 5g Manip            |
|                           | Xyloproct Pomada Bis 25g                       |
| <b>Ansiolíticos</b>       |                                                |
| Alprazolam                | Apraz 0,5 Cp                                   |
|                           | Frontal 0,5mg Cp                               |
|                           | Alprazolam 0,5mg Cp (Germed)                   |
|                           | Alprazolam 0,5mg Cp (Medley)                   |
| Bromazepam                | Lexotan 3mg Cp                                 |
|                           | Somaliun 3mg Cp                                |
| Buspirona                 | Ansitec 10mg Cp                                |
| Clobazam                  | Frisium 10mg Cp                                |
|                           | Urbanil 10mg Cp                                |
| Clonazepam                | Clonazepam Gts 2,5mg/ml Fr 20ml (EMS)          |
|                           | Rivotril 0,25mg Cp Sublingual                  |

|            |                                          |
|------------|------------------------------------------|
| Clonazepam | Rivotril 0,5mg Cp                        |
|            | Rivotril 2mg Cp                          |
|            | Rivotril Gts 2,5mg/ml Fr 20ml            |
| Cloxazolam | Olcadil 1mg Cp                           |
|            | Olcadil 2mg Cp                           |
| Diazepam   | Compaz 10mg Amp 2ml                      |
|            | Uni-diazepax 10mg Amp 2ml                |
|            | Valium 5mg Cp                            |
| Lorazepam  | Lorazepam 1mg Cap Manip (Fórmula & Ação) |
|            | Lorazepam 1mg Cap Manip (Formularium)    |
|            | Lorax 1mg Cp                             |

**Antiácido**

|                                                                  |                                      |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Bicarbonato de Sódio                                             | Bicarbonato de Sódio 500mg Cap       |
| Hidróxido de Alumínio +<br>Hidróxido de Magnésio +<br>Simeticona | Maalox Plus Suspensão Oral Fr 240ml  |
|                                                                  | Mylanta Plus Suspensão Oral Fr 240ml |

**Antiagregante Plaquetário**

|             |                                              |
|-------------|----------------------------------------------|
| Abciximabe  | Reopro 10mg Fr 5ml                           |
| Cilostazol  | Cebralat 50mg Cp                             |
|             | Vasogard 50mg Cp                             |
| Clopidogrel | Plavix 75mg Cp Rev                           |
| Dipiridamol | Persantin 10mg Amp 2ml                       |
| Ticagrelor  | Brilinta 90mg Cp                             |
| Ticlopidina | Plaketar 250mg Cp Rev                        |
|             | Ticlopidina Cloridrato 250mg Cp Rev (Medley) |
| Tirofibana  | Agrastat 12,5mg FA 50ml                      |

**Antianêmicos**

|                                                                                         |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Ácido Fólico                                                                            | Endofolin 5mg Cp Rev    |
| Ácido Fólico +<br>Ferrocarbonila + Cálcio<br>Pantotênico + Vitaminas<br>+ Polilminerais | Combiron Fólico Cp Rev  |
| Carboximaltose Férrica                                                                  | Ferinject 500mg FA 10mL |



|                                        |                                                   |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Eritropoetina Humana Recombiante       | Eprex 10000ui Ser 1mL                             |
|                                        | Eprex 4.000ui Ser 0,4 mL                          |
|                                        | Eprex 40.000ui Ser 1mL                            |
| Ferro III Polimaltosado Hidróxido      | Noripurum 100mg Amp 5ml                           |
|                                        | Noripurum 100mg Amp 2ml                           |
|                                        | Noripurum 100mg Cp Mastigável                     |
| Ferro Quelato Glicinado                | Neutrofer 300mg Cp                                |
| <b>Antianginoso</b>                    |                                                   |
| Isossorbida Mononitrato                | Monocordil 5mg Cp Subl                            |
|                                        | Coronar 10mg Amp 1mL                              |
|                                        | Monocordil 40mg Cp                                |
|                                        | Monocordil 20mg Cp                                |
|                                        | Mononitrato de Isossorbida 20mg Cp (Biosintética) |
| Nifedipino                             | Adalat Oros 30mg Cp                               |
| Nitroglicerina                         | Tridil 50mg Amp 10ml                              |
| Propatilnitrato                        | Sustrate 10mg Cp Subl                             |
| Trimetazidina                          | Vastarel Mr 35mg Cp Rev lib Prolongada            |
| <b>Antianginosos e Vasodilatadores</b> |                                                   |
| Alprostadiil                           | Prostavasin 20mcg Amp                             |
| Isossorbida Dinitrato                  | Isordil 5mg Cp Sublingual                         |
| <b>Antiarrítmicos</b>                  |                                                   |
| Adenosina                              | Adenocard 6mg Amp                                 |
| Amiodarona                             | Amiodarona 150mg Amp 3mL (Hipolabor)              |
|                                        | Amiodarona 150mg Amp 3mL Manip                    |
|                                        | Amiodarona Gts 200mg/mL Fr 30mL Manip             |
|                                        | Ancoron Gts 200mg Fr 30mL                         |
|                                        | Amiodarona Cloridrato 200mg Cp (Biosintética)     |
|                                        | Ancoron 200mg Cp                                  |
|                                        | Atlansil 200mg Cp                                 |
|                                        | Miodaron 200mg Cp                                 |
|                                        | Amiodarona Cloridrato 100mg Cp                    |
|                                        | Ancoron 100mg Cp Rev                              |
|                                        | Atlansil 100mg Cp                                 |

|                            |                                                    |
|----------------------------|----------------------------------------------------|
| Diltiazem                  | Cardizem 30mg Cp                                   |
|                            | Cardizem 60mg Cp                                   |
|                            | Diltiazem 30mg Cp (EMS)                            |
|                            | Diltiazem 60mg Cp (EMS)                            |
|                            | Diltiazem Cloridrato 30mg Cp (Germed)              |
| Esmolol                    | Brevibloc 100mg Fap                                |
|                            | Brevibloc 2,5g Amp                                 |
| Propafenona                | Cloridrato de Propafenona 300mg Cp Rev (Eurofarma) |
|                            | Ritmonorm 300mg Cp Rev                             |
| Sotalol                    | Sotalol Cloridrato 120mg Cp (Brainfarma)           |
|                            | Sotalol Cloridrato 160mg Cp (Brainfarma)           |
|                            | Sotalol Cloridrato 120mg Cp (Biosintética)         |
|                            | Sotalol Cloridrato 160mg Cp (Merck)                |
|                            | Sotalol Cloridrato 160mg Cp (Biosintética)         |
| <b>Antiasmáticos</b>       |                                                    |
| Beclometasona Dipropionato | Clenil A 400mcg Flac 2ml                           |
| <b>Anticoagulantes</b>     |                                                    |
| Apixabana                  | Eliquis 2,5mg Cp Rev                               |
| Dabigatрана                | Pradaxa 110mg Cap                                  |
|                            | Pradaxa 150mg Cap                                  |
| Enoxaparina Sódica         | Clexane 100mg Ser 1mL                              |
|                            | Clexane 20mg Ser 0,2mL                             |
|                            | Clexane 40mg Ser 0,4ml                             |
|                            | Clexane 60mg Ser 0,6ml                             |
|                            | Clexane 80mg Ser 0,8ml                             |
|                            | Versa 40mg Ser 0,4mL                               |
|                            | Versa 20mg Ser 0,2mL                               |
| Fondaparinux Sódico        | Arixtra 2,5mg Ser 0,5ml                            |
|                            | Arixtra 7,5mg Ser 0,6ml                            |
| Heparina                   | Hemofol 25.000ui FA 5ml                            |
|                            | Hemofol Sc 5000ui Amp 0,25ml                       |
|                            | Hemofol 5000UI/mL FA 5mL                           |

|                             |                                                            |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------|
| Heparina                    | Heparina 300UI Ser 3mL                                     |
|                             | Heparina 300UI Ser 10mL                                    |
|                             | Hepamax S 5000UI/mL FA 5mL                                 |
|                             | Heptar 5000UI/mL FA                                        |
|                             | Heptar 25.000ui FA 5ml                                     |
| Rivaroxabana                | Xarelto 10mg Cp Rev                                        |
|                             | Xarelto 15mg Cp Rev                                        |
| Varfarina                   | Marevan 2,5mg Cp                                           |
|                             | Marevan 5mg Cp                                             |
| <b>Anticolinérgico</b>      |                                                            |
| Atropina                    | Atropion 0,5mg Amp 1ml                                     |
|                             | Hytropin 0,5mg Amp 1ml                                     |
| Succinato de Solifenacina   | Vesicare 5mg Cp Rev                                        |
| <b>Anticolinesterásicos</b> |                                                            |
| Donepezila                  | Eranz 5mg Cp Rev                                           |
| Galantamina                 | Reminyl ER 8mg Cap Liberação Prolongada                    |
|                             | Coglive 8mg Cap Liberação Prolongada                       |
|                             | Galantamina 8mg Cap Liberação Prolongada (Nova Química)    |
|                             | Galantamina 8mg Cap Liberação Prolongada (Prati Donaduzzi) |
| Neostigmina Metilsulfato    | Normastig 0,5mg Amp 1ml                                    |
|                             | Prostigmine 0,5mg Amp 1ml                                  |
| Piridostigmina              | Mestinon 60mg Cp                                           |
| Rivastigmina                | Exelon 1,5mg Cap                                           |
| <b>Anticonvulsivantes</b>   |                                                            |
| Carbamazepina               | Tegretol 200mg Cp                                          |
|                             | Tegretol CR 200mg Cp Lib Controlada                        |
|                             | Tegretol 400mg Cp                                          |
| Divalproato de Sódio        | Depakote Er 500mg Cp Rev Lib Prolongada                    |
|                             | Depakote 250mg Cp Rev                                      |
|                             | Depakote 500mg Cp Rev                                      |
|                             | Depakote Er 250mg Cp Rev Liberação Prolongada              |

|               |                                        |
|---------------|----------------------------------------|
| Fenitoína     | Hidantal 250mg Amp 5mL                 |
|               | Fenital 250mg Amp 5ml                  |
|               | Hidantal 100mg Cp                      |
| Fenobarbital  | Fenocris Iv 200mg Amp 2ml              |
|               | Gardenal 100mg Cp                      |
| Gabapentina   | Gabapentina 300mg Cap (Biosintética)   |
|               | Gabapentina 300mg Cap (EMS)            |
|               | Gabapentina 300mg Cap (Germed)         |
|               | Gabapentina 300mg Cap (Biolab)         |
|               | Gabapentina 400mg Cap (EMS)            |
|               | Gabapentina 400mg Cap (Germed)         |
|               | Gabapentina 400mg Cap (Biolab)         |
|               | Neurontin 300mg Cap                    |
|               | Neurontin 400mg Cap                    |
| Lacosamina    | Vimpat 200mg FA 20mL                   |
|               | Vimpat Sol Oral 10mg/ml Fr 200ml       |
|               | Vimpat 50mg Cp Rev                     |
| Lamotrigina   | Lamictal 100mg Cp                      |
|               | LamiCTAL 25mg Cp                       |
|               | Lamitor 25mg Cp                        |
|               | Lamitrigina Cp 25mg (Eurofarma)        |
|               | Lamotrigina Cp 100mg (Eurofarma)       |
|               | Lamotrigina Cp 25mg (Medley)           |
| Levetiracetam | Keppra 250mg Cp Rev                    |
| OXcarbazepina | Trileptal 300mg Cp Rev Divisível       |
| Pregabalina   | Lyrica 75mg Cap                        |
|               | Prebictal 50mg Cap                     |
| Primidona     | Primid 100mg Cp                        |
| Topiramato    | Amato 25mg Cp Rev                      |
|               | Topamax 100mg Cp Rev                   |
|               | Topamax 25mg Cp                        |
|               | Topiramato 100mg Cp Rev (Biosintética) |

|                        |                                                 |
|------------------------|-------------------------------------------------|
| Topiramato             | Égide 100mg Cp Rev                              |
|                        | Vidmax 25mg Cp Rev                              |
|                        | Topiramato 25mg Cp (Biosintética)               |
| Valproato de Sódio     | Depacon 500mg Amp 5ml                           |
|                        | Depakene 250mg Cap                              |
|                        | Depakene 50mg/ml Xarope Fr 100ml                |
|                        | Depakote Er 250mg Cp Rev Liberação Lenta        |
|                        | Depakote Er 500mg Cp Rev Liberação Lenta        |
|                        | Depakote 250mg Cp Rev                           |
|                        | Depakote 500mg Cp Ver                           |
|                        | Valproato de Sódio Xarope Fr 10mL (Hipolabor)   |
|                        | Epinelil 250mg Cap                              |
| <b>Antidepressivos</b> |                                                 |
| Agomelatina            | Valdoxan 25mg Cp Rev                            |
| Amitriptilina          | Amytril 25mg Cp                                 |
| Bupropiona             | Bup 150mg Cp Ação Prolongada                    |
|                        | Bupropiona 150mg Cp ação prolongada (Germed)    |
|                        | Bupropiona 150mg Cp Liberação Lenta (Eurofarma) |
|                        | Bupropiona 150mg Cp Rev liberação lenta (EMS)   |
|                        | Wellbutrin Sr 150mg Cp Rev Ação Prolongada      |
|                        | Zyban 150mg Cp Ação Prolongada                  |
|                        | Zetron 150mg Cp Rev Ação Prolongada             |
| Citalopram             | Citalopram 20mg cp (Biosintética)               |
|                        | Citalopram 20mg cp (Sandoz)                     |
|                        | Cipramil 20mg Cp                                |
|                        | Procimax 20mg Cp                                |
| Clomipramina           | Anafranil 25mg Drg                              |
|                        | Clo 10mg Drg                                    |
|                        | Cloridrato de Clomipramina 25mg Drg (EMS)       |
| Duloxetina             | Cymbalta 30mg Cap de Lib Retardada              |
|                        | Cymbalta 60mg Cap de Lib Retardada              |
|                        | Velija 30mg Cap de Lib Retardada                |

|                 |                                               |
|-----------------|-----------------------------------------------|
| Escitalopram    | Exodus 10mg Cp                                |
|                 | Lexapro 10mg Comprimido                       |
| Fluoxetina      | Daforin Gts 20mg/ml Fr 20ml                   |
|                 | Fluoxetina 20mg Cap (Biosintética)            |
|                 | Fluoxetina 20mg Cap (EMS)                     |
|                 | Fluoxetina 20mg Cap (Medley)                  |
|                 | Fluoxetina 20mg Cap (Eurofarma)               |
|                 | Fluoxetina 20mg Cap (Teuto)                   |
|                 | Fluoxetina Gotas 20mg/ml Fr 20ml (Medley)     |
|                 | Fluxene 20mg Cap                              |
|                 | Prozac 20mg Cap                               |
| Imipramina      | Imipra 25mg Drg                               |
|                 | Tofranil 25mg Cp                              |
| Litio Carbonato | Carbolitium 300mg Cp Rev                      |
| Mirtazapina     | Mirtazapina 15mg Cp Orodispersível            |
|                 | Mirtazapina 30mg Cp Orodispersível (Sandoz)   |
|                 | Remeron Soltab 15mg Cp Orodispersível         |
|                 | Remeron Soltab 30mg Cp Orodispersível         |
|                 | Razapina Odt 15mg Cp                          |
| Nortriptilina   | Nortriptilina Cloridrato 25mg Cap (Eurofarma) |
|                 | Nortriptilina Cloridrato 25mg Cap Manip       |
|                 | Pamelor 10mg Cap                              |
|                 | Pamelor 25mg Cap                              |
| Paroxetina      | Aropax 20mg Cp Rev                            |
|                 | Paroxetina 20mg Cp Rev (EMS)                  |
|                 | Paroxetina 20mg Cp Rev (Eurofarma)            |
|                 | Paroxetina 20mg Cp Rev (União Química)        |
|                 | Pondera 20mg Cp Rev                           |
| Sertralina      | Assert 50mg Cp                                |
|                 | Cloridrato de Sertralina 50mg Cp (Germed)     |
|                 | Sertralina 50mg Cp (EMS)                      |
|                 | Zoloft 50mg Cp                                |

|                                                     |                                                               |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Succinato de Desvenlafaxina Monoidratado            | Pristiq 50mg Cp Rev de Lib Prolongada                         |
|                                                     | Deller 50mg Cp Ver de Liberação Controlada                    |
| Trazodona                                           | Donaren 50mg Cp Rev                                           |
| Venlafaxina                                         | Efexor Xr 150mg Cap                                           |
|                                                     | Efexor Xr 37,5mg Cap Lib. Controlada                          |
|                                                     | Efexor Xr 75mg Cap Lib. Controlada                            |
|                                                     | Venlafaxina 75mg Cp Lib. Prolong (Eurofarma)                  |
|                                                     | Venlafaxina 75mg Cp Lib. Prolongada (EMS)                     |
|                                                     | Venlafaxina Cloridrato 37,5mg Cp Lib. Controlada (Medley)     |
|                                                     | Venlafaxina Cloridrato 75mg Cp Lib. Controlada (Biosintética) |
|                                                     | Venlafaxina Cloridrato 75mg Cp Lib. Controlada (Medley)       |
|                                                     | Venlift Od 150mg Cap Lib. Controlada                          |
|                                                     | Venlift Od 75mg Cap Lib. Controlada                           |
|                                                     | Venlaxin 75mg Cap Lib. Prolong                                |
| Vortioxetina                                        | Brintellix 5mg Cp Ver                                         |
| <b>Antidiarreico, Repositor da Flora Intestinal</b> |                                                               |
| Saccharomyces Boulardii                             | Floratil 100mg Cap                                            |
| <b>Antidiarreicos e Adsorventes</b>                 |                                                               |
| Loperamida                                          | Imosec 2mg Cp                                                 |
| Racecadotril                                        | Tiorfan 100mg Cap                                             |
|                                                     | Avide 100mg Cap                                               |
| <b>Antídotos</b>                                    |                                                               |
| Alcool Absoluto 99,6 °GL                            | Alcool Absoluto 99,6°GL Amp 10mL                              |
| Azul de Metileno                                    | Azul de Metileno 2% Amp 5ml Manip                             |
| Carvão Ativado                                      | Carvão Ativado 10g Env Manip                                  |
| Desferroxamina Mesilato                             | Desferal 500mg FA                                             |
| Dexrazoxano Cloridrato                              | Cardioxane 500mg FA                                           |
| Flumazenil                                          | Flumazil 0,5mg Amp 5ml                                        |
|                                                     | Flumazenil 0,5mg Amp 5mL (União Química)                      |
|                                                     | Lanexat 0,5mg Amp 5ml                                         |

|                                                 |                                              |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Folinato de Cálcio                              | FauldLEUCO 300mg FA 30mL                     |
|                                                 | FauldLEUCO 50mg FA 5 mL                      |
|                                                 | Folinato de Cálcio 15mg Cp Manip             |
|                                                 | Folinato de Cálcio 300mg FA 30mL (Eurofarma) |
|                                                 | Legifol Cs 10mg/mL FA 5mL                    |
|                                                 | Tevafofin 300mg FA 30 mL                     |
|                                                 | Tevafofin 50mg FA 5ml                        |
| Mesna                                           | Mesna 400mg Amp 4ml (Blausiegel)             |
|                                                 | Mitexan 400mg Amp 4ml                        |
| Naloxona Cloridrato                             | Narcan 0,4mg Amp 1ml                         |
| Naltrexona                                      | Revia 50mg Cp                                |
| Protamina                                       | Protamina 5000ui Amp 5ml                     |
| Rasburicase                                     | Fasturtec 1,5mg FA                           |
| Sugamadex Sódico                                | Bridion 200mg FA 2ml                         |
| <b>Antiemético, Antivertiginoso</b>             |                                              |
| Dimenidrinato + Vitamina B6                     | Dramin B6 10mg Cp Rev                        |
| Dimenidrinato + Vitamina B6 + Frutose + Glicose | Dramin B6 DL Amp 10ml                        |
| Meclizina                                       | Meclin 25mg Cp                               |
| <b>Antiemético, Procinético</b>                 |                                              |
| Alizaprida                                      | Superan 50mg Amp 2ml                         |
| Bromoprida                                      | Bromogex 10mg (5mg/ml) Amp 2ml               |
|                                                 | Bromoprida 10mg (5mg/ml) Amp 2ml (Novafarma) |
|                                                 | Bromoprida 10mg Amp 2ml (União Química)      |
|                                                 | Bromoprida Gts 4mg/mL Fr 20mL (Biosintética) |
|                                                 | BromoPRIDA Gts 4mg/ml Fr 20ml (EMS)          |
|                                                 | BromoPRIDA Gts 4mg/ml Fr 20ml (Medley)       |
|                                                 | Digesan 10mg Amp 2ml                         |
|                                                 | Digesan 10mg Cap                             |
|                                                 | Plamet 10mg Amp 2ml                          |
|                                                 | Plamet Gts 4mg/ml Fr 20ml                    |
|                                                 | Digesan Gts 4mg/mL Fr 20mL                   |



|                                      |                                       |
|--------------------------------------|---------------------------------------|
| Domperidona                          | Motilium 10mg Cp                      |
|                                      | Peridal 10mg Cp                       |
| Fosaprepitanto<br>Dimeglumina        | Emend 150mg FA                        |
| Granisetrona                         | Granisetrona 1mg Amp 1mL              |
|                                      | Granisetrona 3mg Amp 3mL              |
|                                      | Kytril 1mg Amp 1ml                    |
|                                      | Kytril 3mg Amp 3ml                    |
|                                      | Neosetron 3mg Amp 3ml                 |
| Metoclopramida                       | Aristopramida 10mg Amp 2mL            |
|                                      | Noprosil 10mg Amp 2mL                 |
|                                      | Plasil 10m Amp 2ml                    |
|                                      | Plasil 10mg Cp                        |
| Ondansetrona                         | Ansentron 8mg Amp 4ml                 |
|                                      | Nausebron 4mg (2mg/ml) Amp 2ml        |
|                                      | Nausebron 8mg (2mg/ml) Amp 4ml        |
|                                      | Nausebron 8mg Cp Rev                  |
|                                      | Ondantril 4mg Cp Rev                  |
|                                      | Vonau-flash 4mg Cp Desintegração Oral |
|                                      | Listo 4mg Cp Desintegração Oral       |
|                                      | Zofran 4mg Amp 2ml                    |
|                                      | Zofran 4mg Cp Rev                     |
|                                      | Zofran 8mg Amp 4ml                    |
|                                      | Zofran 8mg Cp Rev                     |
| Palonosetrona                        | Onicit Ponv 0,075mg FA 1,5ml          |
|                                      | Onicit 0,25mg FA 5ml                  |
| <b>Antienxaquecoso</b>               |                                       |
| Dipirona + Isometepteno<br>+ Cafeína | Neosaldina Drg                        |
| Naratriptana                         | Naramig 2,5mg Cp Rev                  |
|                                      | Naratriptana 2,5mg Cp Rev (SEM)       |
| Sumatriptana                         | Sumax 25mg Cp                         |

**Antiespasmódico**

|              |                                                           |
|--------------|-----------------------------------------------------------|
| Escopolamina | Buscopan Simples 20mg Amp 1ml                             |
|              | Buscopan Simples 10mg Drg                                 |
|              | Buscopan Simples Gts 10mg/ml Fr 20ml                      |
|              | Butilbrometo de Escopolamina 20mg Amp 1mL (União Química) |
|              | Escopolamina Gel Sachê 20mg Manip                         |
| Mebeverina   | Duspatalin 200mg Cap Lib Prolongada                       |
| Propantelina | Propantelina Brometo 15mg Gel Manip                       |

**Antiespasmódicos e Analgésicos**

|                                 |                               |
|---------------------------------|-------------------------------|
| Escopolamina Brometo + Dipirona | Buscopan Composto Amp 5ml     |
|                                 | Buscopan Composto Cp Rev      |
|                                 | Buscopan Composto Gts Fr 20ml |
|                                 | Hypocina Composto Amp 5ml     |

**Antiespasmódicos urinários**

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Oxibutinina Cloridrato | Retemic 5mg Cp |
|------------------------|----------------|

**Antifisético**

|            |                                            |
|------------|--------------------------------------------|
| Simeticona | Luftal Gel 125mg Cap Gelationosa           |
|            | Luftal Gts 75mg/ml Fr 15ml                 |
|            | Simeticona Gts 75mg/ml Fr 15ml (EUROFARMA) |
|            | Simeticona Gts 75mg/ml Fr 15ml (MEDLEY)    |
|            | Mylanta Plus Suspensão Oral Fr 240mL       |
|            | Simeticona Gts 75mg/mL Fr 15mL (Ems)       |

**Antifúngico Sistêmico**

|                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| Anfotericina B Lipossomal | Ambisome 50mg Fap         |
| Anidulafungina            | Ecalta 100mg Fap          |
|                           | Anidulafungina 100mg FA   |
| Caspofungina              | Cancidas 50mg Fap         |
|                           | Cancidas 70mg Fap         |
| Fluconazol                | Fluconazol 50mg Cap Manip |
|                           | Zoltec 100mg Cap          |
|                           | Zoltec 200mg Bolsa 100ml  |

|                                           |                                                                     |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Fluconazol                                | Hiconazol 200mg Bolsa 100mL                                         |
|                                           | Zoltec 50mg Cap                                                     |
| Itraconazol                               | Itraspor 100 mg                                                     |
|                                           | Sporanox 100mg Cap                                                  |
| Micafungina Sódica                        | Mycamine 100mg Fap                                                  |
| Nistatina                                 | Neo-mistatin Oral 100.000ui/ml Suspensão Oral Fr                    |
|                                           | Nistatina 100.000ui/ml Suspensão Oral Fr                            |
| Posaconazol                               | Noxafil Susp Oral 4,2g Fr 105mL                                     |
| Voriconazol                               | Vfend 200mg Cp Rev                                                  |
|                                           | Vfend 200mg Fap                                                     |
|                                           | Vori 200 mg Cp Rev                                                  |
|                                           | Veac 200mg Cp Rev                                                   |
|                                           | Veac 200mg FA                                                       |
|                                           | Voriconazol 200mg Cp Rev (Cristália)                                |
| <b>Antifúngico Tópico</b>                 |                                                                     |
| Cetoconazol                               | Nizoral Creme Bis 30g                                               |
| Clotrimazol                               | Canesten 1% Creme Dermatológico Bis 20g                             |
|                                           | Clotrimazol 1% Creme Dermatológico Bis 20g (EMS)                    |
|                                           | Clotrimazol 1% Creme Dermatológico Bis 20g (Medley)                 |
| Isoconazol                                | Icaden Creme 20g                                                    |
| Miconazol                                 | Vodol 20mg/g Pó Fr 30g                                              |
| Nistatina + Óxido de Zinco                | Dermodex Pomada Bis 60g                                             |
|                                           | Nistatina + Óxido de Zinco (100.000UI/g + 200mg/g) Bis 60g (EMS)    |
|                                           | Nistatina + Óxido de Zinco (100.000UI/g + 200mg/g) Bis 60g (Medley) |
| <b>Antiglaucomatoso, Indutor da Miose</b> |                                                                     |
| Dorzolamida + Timolol                     | Cosopt Solução Oftálmica Fr 5ml                                     |
| Latanoprost + Cloreto de Benzalcônio      | Xalatan Sol Oft Fr 2,5 mL                                           |
| <b>Antigotoso</b>                         |                                                                     |
| Alopurinol                                | Alopurinol 300mg Cp (Prati Donaduzzi)                               |
|                                           | Alopurinol 100mg Cp (Prati Donaduzzi)                               |
|                                           | Alopurinol 100mg Cp (Medley)                                        |

|                                                                 |                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Alopurinol                                                      | Alopurinol 300mg Cp (Medley)                                    |
|                                                                 | Alopurinol 300mg Cp (Sandoz)                                    |
|                                                                 | Zyloric 100mg Cp                                                |
|                                                                 | Zyloric 300mg Cp                                                |
| Colchicina                                                      | Colchis 0,5mg Cp                                                |
| <b>Anti-hemorragicos</b>                                        |                                                                 |
| Eltrombopag Olamina                                             | Revolade 25mg Cp                                                |
| <b>Anti-hemorroidário</b>                                       |                                                                 |
| Policresuleno +<br>Cinchocaína                                  | Proctyl Sup                                                     |
|                                                                 | Policresuleno 500mg/g + Cinchocaína 10mg/g Pomada Bis 30g Manip |
|                                                                 | Proctyl Pomada Bis 30g                                          |
| <b>Anti-histamínicos H1</b>                                     |                                                                 |
| Bilastina                                                       | Alektos 20mg Cp                                                 |
| Cetirizina Dicloridrato                                         | Cetirizina Dicloridrato 10mg Cp Rev (Medley)                    |
|                                                                 | Dicloridrato de Cetirizina 10mg Cp Rev (Sandoz)                 |
|                                                                 | Zyrtec 10mg Cp                                                  |
| Dexclorfeniramina                                               | Polaramine 2mg Cp                                               |
| Difenidramina                                                   | Difenidrin 50mg Amp 1mL                                         |
| Difenidramina Cloridrato<br>+ Sódio Citrato + Amônio<br>Cloreto | Benalet Pastilha                                                |
| Fexofenadina                                                    | Allegra 120mg Cp Rev                                            |
|                                                                 | Allegra 180mg Cp Rev                                            |
| Fexofenadina +<br>Pseudoefedrina                                | Allegra D 60/120mg Cp Rev                                       |
| Hidroxizina                                                     | Hixizine 25mg Cp                                                |
|                                                                 | Prurizin 25mg Cp                                                |
| Loratadina                                                      | Claritin 10mg Cp                                                |
|                                                                 | Desalex 5mg Cp Rev                                              |
| Prometazina                                                     | Fenergan 50mg Amp 2ml                                           |
|                                                                 | Fenergan 25mg Cp Rev                                            |

### Anti-infecciosos Ginecológicos Tópicos

|                       |                                                               |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------|
| Clostebol + Neomicina | Trofodermin Creme Vaginal Bis 45g                             |
| Nistatina             | Micostatin 25.000ui/g Creme Vaginal Tubo 60g                  |
|                       | Neo Mistatin Creme Vaginal 25.000ui/g Tubo 60g                |
|                       | Nistatina Creme Vaginal 25.000ui/g Tubo 60g (EMS)             |
|                       | Nistatina Creme Vaginal 25.000ui/g Tubo 60g (Medley)          |
|                       | Nistatina Creme Vaginal 25.000UI/g Tubo 60g (Neo Química)     |
|                       | Nistatina Creme Vaginal 25.000ui/g Tubo 60g (Prati Donaduzzi) |

### Anti-inflamatório Esteroidal (Corticoide) Tópico

|                                                                |                                                   |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Betametasona Valerato                                          | BETAmetasona Valerato Creme 0,1% Bis 30g (Germed) |
|                                                                | BETAmetasona Valerato Creme 0,1% Bis 30g (Medley) |
|                                                                | Betnovate 0,1% Creme Bis 30g                      |
| Cetoconazol + Betametasona                                     | Candicort Creme Bis 30g                           |
|                                                                | Cetoconazol + Betametasona Bis 30g (Medley)       |
|                                                                | Cetoconazol + Betametasona Bis 30g (EMS)          |
| Hidrocortisona + Alumínio Subacetato + Lidocaína + Zinco Óxido | Xyloproct Pomada Bis 25g                          |
| Triancinolona Acetonida                                        | Omcilon A Orabase 1mg/g Bis 10g                   |
|                                                                | Triancinolona Orabase 1mg/g Bis 10g (Eurofarma)   |
|                                                                | Triancinolona Orabase 1mg/g Bis 10g (Medley)      |
|                                                                | Triancinolona Orabase 1mg/g Bisnaga 10g (Germed)  |

### Anti-inflamatório Esteroidal Sistêmico

|                                                            |                                     |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Beclometasona Dipropionato + Fumarato de Formoterol        | Fostair Spray 100mcg + 6mcg         |
| Betametasona Acetato + Betametasona Fosfato Dissódico      | Celestone Soluspan Amp 1ml          |
| Betametasona Dipropionato + Betametasona Fosfato Dissódico | Diprosan 5mg + 2mg Amp 1mL          |
| Budesonida                                                 | Budesonida 3mg Cap Gatorresistente  |
|                                                            | Budesonida 2mg Fr Enema 100mL Manip |
|                                                            | Entocort 3mg Cap Lib Prolongada     |

|                             |                                                         |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------|
| Deflazacort                 | Calcort 30mg Cp                                         |
| Dexametasona                | Decadron 0,5mg Cp                                       |
|                             | Decadron 10mg FA 2,5ml                                  |
|                             | Decadron 2mg Amp 1ml                                    |
|                             | Decadron 4mg Cp                                         |
|                             | DEXAmetasona 4mg Cp (EMS)                               |
| Fludrocortisona             | Florinefe 0,1 mg Cp                                     |
|                             | Fludrocortisona 0,1mg Cp Manip (Buenos Aires)           |
|                             | Fludrocortisona 0,1mg Cp Manip                          |
| Fluticasona                 | Plurair Spray 50mcg/dose Fr 120 Doses                   |
|                             | Flixonase Aquoso Spray Nasal 50mcg/dose Fr 120 doses    |
| Hidrocortisona Succinato    | Ariscorten 100mg FA                                     |
|                             | Cortisonal 100mg FA (União Química)                     |
|                             | Cortisonal 500mg FA                                     |
|                             | Gliocort 100mg FA                                       |
|                             | Gliocort 500mg FA                                       |
|                             | Hidrocortisona Succinato Sódico 100mg FA (Eurofarma)    |
| Metilprednisolona Acetato   | Depo-medrol Im 80mg FA 2ml                              |
|                             | Predi Medrol Im 80mg FA 2ml                             |
| Metilprednisolona Succinato | Metilprednisolona Succinato Sódico 500mg FA (Novafarma) |
|                             | Metilprednisolona Succinato Sódico 125mg FA (Novafarma) |
|                             | Solu-medrol 125mg FA                                    |
|                             | Solu-medrol 500mg FA                                    |
|                             | Unimedrol 125mg FA                                      |
|                             | Unimedrol 500mg FA                                      |
| Prednisolona                | Predsim 5mg Cp                                          |
|                             | Prelone 5mg Cp                                          |
| Prednisona                  | Meticorten 5mg Cp                                       |
|                             | Meticorten 20mg Cp                                      |
|                             | Prednisona 5mg Cp (Medley)                              |

|                                                          |                                     |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Prednisona                                               | Prednisona 5mg Cp (EMS)             |
|                                                          | Prednisona 20mg Cp (Medley)         |
| Triancinolona                                            | Triancil 100mg FA 5ml               |
| <b>Anti-inflamatório não Esteroidal Seletivo da COX2</b> |                                     |
| Celecoxibe                                               | Celebra 100mg Cap                   |
| Etoricoxibe                                              | Arcoxia 60mg Cp Rev                 |
| Parecoxibe                                               | Bextra 40mg FA                      |
| <b>Anti-inflamatório não Esteroidal Sistêmico</b>        |                                     |
| Cetoprofeno                                              | Cetoprofeno 100mg Iv FA (Cristália) |
|                                                          | Artrinid 100mg Amp 2ml              |
|                                                          | Artrinid Iv 100mg FA                |
|                                                          | Cetoprofeno 100mg FA (Eurofarma)    |
|                                                          | Profenid 50mg Cap                   |
|                                                          | Profenid Entérico 100mg Cp Rev      |
|                                                          | Profenid Im 100mg Amp 2ml           |
|                                                          | Profenid Iv 100mg FA                |
| Diclofenaco Sódico                                       | Diclofenaco Sódico 50mg Cp (EMS)    |
|                                                          | Voltaren 50mg Cp Rev                |
|                                                          | Voltaren 75mg Amp 3ml               |
| Flurbiprofeno                                            | Strepsils 8,75mg Pastilha           |
|                                                          | Targus Adv Transdérmico 40mg        |
| Ibuprofeno                                               | Advil 200mg Cp                      |
|                                                          | Alivium Gotas Fr 30ml               |
| Indometacina                                             | Indometacina 100mg Sup Manip        |
|                                                          | Indocid 50mg Cap                    |
| Naproxeno                                                | Flanax 275mg Cp                     |
| Nimesulida                                               | Nimesulida 100mg Cp (Biosintética)  |
|                                                          | Nimesulida 100mg Cp (EMS)           |
|                                                          | Nisulid 100mg Cp                    |
|                                                          | Scaflan 100mg Cp                    |
| Tenoxicam                                                | Teflan 20mg Cp                      |
|                                                          | Teflan 20mg FA                      |

|                       |                                          |
|-----------------------|------------------------------------------|
| Tenoxicam             | Tenotec 20mg Cp                          |
|                       | Tenoxicam 20mg FA (Cristália)            |
|                       | Tenoxicam 20mg FA (Eurofarma)            |
|                       | Tenoxicam 20mg Cp (Neo Química)          |
|                       | Tenoxican 20mg Cp (EMS)                  |
|                       | Tilatil 20mg Cp                          |
| Trometamol Cetorolaco | Cetorolaco Trometamol 30mg Amp 1mL Manip |
|                       | Toradol 30mg Amp 1ml                     |
|                       | Toragesic 10mg Cp Sublingual             |
|                       | Cetrolac 30mg Amp 1 mL                   |
|                       | Toragesic 30mg Amp 1ml                   |

**Anti-inflamatório não Esteroidal Tópico**

|                                      |                                          |
|--------------------------------------|------------------------------------------|
| Cordia Verbenacea                    | Acheflan Creme 5mg/g Bis 30g             |
| Diclofenaco Dietilamônio             | Cataflam Emulgel 11,6mg/g Pomada Bis 60g |
| Polissulfato de Mucopolissacarídeo   | Hirudoid 3mg/g Gel Bis 40g               |
| Propionato de Clobetasol + Alantoína | Clob-X Creme Bis 30g                     |

**Anti-inflamatório Oftálmico**

|              |                                |
|--------------|--------------------------------|
| Dexametasona | Maxidex 1mg/ml Susp Oft Fr 5ml |
|--------------|--------------------------------|

**Antimicrobiano Aminoglicosídeo**

|             |                                      |
|-------------|--------------------------------------|
| Amicacina   | Amicacina 500mg Amp 2 mL (Novafarma) |
|             | Amicacina 500mg Amp 2 mL (Teuto)     |
| GENTAmicina | Gentamicin 80mg Amp 2 mL             |
| Neomicina   | Neomicina Sulfato 500mg Cap Manip    |
| Tobramicina | Tobramina 75mg Amp 1,5mL             |

**Antimicrobiano Anaeróbico**

|              |                                            |
|--------------|--------------------------------------------|
| Metronidazol | Flagyl 250mg Cp Rev                        |
|              | Flagyl 400mg Cp Rev                        |
|              | Flagyl 500mg Bolsa 100 mL                  |
|              | Metronack 500mg Bolsa 100mL                |
|              | Metronidazol 250 Cp Rev (Prati Donaduzzi)  |
|              | Metronidazol 500mg Bolsa 100 mL (Isofarma) |
|              | Metroniflex 500mg Bolsa 100 mL             |



**Antimicrobiano Carbapenêmico**

|                        |                                                          |
|------------------------|----------------------------------------------------------|
| Ertapenem Sódico       | Invanz 1g FA                                             |
| Imipenem + Cilastatina | Imipenem 500mg + Cilastatina Sódica 500mg FA (Abl)       |
|                        | Imipenem 500mg + Cilastatina Sódica 500mg FA (Novafarma) |
|                        | Tienam 500mg/500mg FA                                    |
| Meropeném              | Meronem 1g FA (Astrazeneca)                              |
|                        | Meronem 500mg Fap (Astrazeneca)                          |
|                        | Meropenem 1000 mg FA (Eurofarma)                         |
|                        | Meropenem 1000mg FA (Abl)                                |
|                        | MEROpenem 500mg FA (Abl)                                 |
|                        | Zylpen 500mg FA                                          |

**Antimicrobiano Cefalosporina 1ª Geração**

|            |                                   |
|------------|-----------------------------------|
| Cefadroxil | Cefadroxila 500mg Cap (Medley)    |
|            | Cefadroxila 500mg Cap (EMS)       |
|            | Cefadroxila 500mg Cap (Eurofarma) |
|            | Cefamox 500mg Cap                 |
| Cefalexina | Keflex 500mg Drg                  |
|            | Keforal 500mg Cap                 |
| Cefalotina | Cefalotina 1g FA (Blausiegel)     |
|            | Cefalotina Sódica 1g FA (Abl)     |
|            | Cefariston 1g FA (Blausiegel)     |
|            | Keflin Neutro 1g FA               |
| Cefazolina | Cefazolina 1g FA (Abl)            |
|            | Cefazolina 1g FA (Aurobindo)      |
|            | Cellozina 1g FA                   |
|            | Fazolon 1g FA                     |
|            | Kefazol 1g FA                     |

**Antimicrobiano Cefalosporina 2ª Geração**

|            |                             |
|------------|-----------------------------|
| Cefaclor   | Cefaclor 500mg Cap (EMS)    |
|            | Cefaclor 500mg Cap (Germed) |
|            | Ceclor Bd 500mg Drg         |
| Cefoxitina | Kefox 1g FA                 |

|                   |                           |
|-------------------|---------------------------|
| Cefuroxima Sódica | Keroxime 750mg FA         |
|                   | Zinacef 750mg FA          |
|                   | Axetilcefuroxima 250mg Cp |
|                   | Zinnat 250mg Cp Rev       |

**Antimicrobiano Cefalosporina 3ª Geração**

|                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| Cefotaxima              | Cetazima 1g FA (Novafarma) |
| Ceftazidima             | Ceftazidon 1g FA           |
|                         | Fortaz 1g FA               |
|                         | Kefadim 1g FA              |
| Ceftazidima + Avibactam | Torgena 2,5g FA            |
| Ceftriaxona Dissódica   | Ceftriaxona EV 1g FA (Abl) |
|                         | Rocefin IM 1g FA           |
|                         | Rocefin EV 1g FA           |
|                         | KefTRON EV 1g FA           |

**Antimicrobiano Cefalosporina 4ª Geração**

|                          |                                       |
|--------------------------|---------------------------------------|
| Cefepima                 | Cefepima Cloridrato 1g FA (Abl)       |
|                          | Cefepima Cloridrato 1g FA (Novafarma) |
|                          | Cemax 1g FA                           |
|                          | Maxcef 1g FA                          |
| Ceftarolina              | Zinforo 600mg FA                      |
| Ceftolozona + Tazobactam | Zerbaxa 1,5g FA                       |

**Antimicrobiano Gliciliciclina**

|             |                 |
|-------------|-----------------|
| Tigeciclina | Tygacil 50mg FA |
|-------------|-----------------|

**Antimicrobiano Glicopeptídeo**

|              |                                                |
|--------------|------------------------------------------------|
| Teicoplanina | Targocid 200mg FA                              |
|              | Koplan 400mg FA 3mL                            |
|              | Targocid 400mg FA                              |
|              | Koplan 200mg FA                                |
|              | Bactomax 400mg FA                              |
|              | Teiplan 200mg FA                               |
| Vancomicina  | Cloridrato de Vancomicina 500mg FA (Eurofarma) |
|              | Vancocina 500mg FA                             |

|                                    |                                                    |
|------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Vancomicina                        | Vancomicina 125mg Cap Manip                        |
|                                    | Vancomicina 500mg FA (Abl)                         |
|                                    | Vancomicina Cloridrato 500mg FA (Abl)              |
| <b>Antimicrobiano Lincosamida</b>  |                                                    |
| Clindamicina Cloridrato            | Dalacin C 300mg Cap                                |
|                                    | Clindamicina 300mg Cap (União Química)             |
|                                    | Clindamicina 300mg Cap Manip                       |
|                                    | Clindamicina Cloridrato 300mg Cap (Teuto)          |
| Clindamicina Fosfato               | Clindamicina Fosfato 600mg Amp 4mL (Hipolabor)     |
|                                    | Clindamicina Fosfato 600mg Amp 4mL (Novafarma)     |
|                                    | Clindamicina Fosfato 600mg Amp 4mL (União Química) |
| Fosfomicina                        | Monuril 8g Env                                     |
| <b>Antimicrobiano Lipopeptídeo</b> |                                                    |
| Daptomicina                        | Cubicin 500mg FA                                   |
| <b>Antimicrobiano Macrolídeo</b>   |                                                    |
| Azitromicina                       | Astro 500mg Cp Rev                                 |
|                                    | Azitromicina 500mg Cp Rev (Prati Donaduzzi)        |
|                                    | Azitromicina 500mg Cp Rev (EMS)                    |
|                                    | Zitromax 500mg Cp Rev                              |
|                                    | Zitromax Iv 500mg FA                               |
|                                    | Astro 500mg FA                                     |
| Claritromicina                     | Claritromicina 500mg Cp (EMS)                      |
|                                    | Claritromicina 500mg Cp (Medley)                   |
|                                    | Claritromicina 500mg FA (Abl)                      |
|                                    | Claritromicina 500mg FA (Aspen)                    |
|                                    | Klaricid 500mg FA                                  |
| Eritromicina Estolato              | Eritromicina 500mg Cp (Prati Donaduzzi)            |
|                                    | Ilosone 500mg Drg                                  |
| Eritromicina Lactobionato          | Tromaxil 1000mg FA                                 |
| <b>Antimicrobiano Nitrofurano</b>  |                                                    |
| Nitrofurantóina                    | Macroantina 100mg Cap                              |

**Antimicrobiano Oftálmico**

|                |                                                |
|----------------|------------------------------------------------|
| Ciprofloxacino | Biamotil 0,35% Colírio Fr 5ml                  |
|                | Ciloxan 0,3% Colírio Fr 5ml                    |
| Tobramicina    | Tobramicina 0.3% Sol Oft Fr 5ml (Biosintética) |
|                | Tobramicina 0.3% Sol Oft Fr 5ml (Cristália)    |
|                | Tobrex 0,3% Sol Oft Fr 5ml                     |

**Antimicrobiano Oftálmico e Corticoide**

|                                                                       |                                           |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Dexametasona + Moxifloxacino                                          | Vigadexa Sol Oft Fr 5ml                   |
| Dexametasona + Neomicina                                              | Decadron Colírio Fr 5ml                   |
| Dexametasona + Neomicina Sulfato + Polimixina B Sulfato + Hipromelose | Maxitrol Susp Oft Fr 5ml                  |
| Dexametasona + Neomicina Sulfato + Polimixina B Sulfato               | Maxinom Pomada Oft Bis 3,5g               |
|                                                                       | Maxitrol Pomada Oft Bis 3,5g              |
| Tobramicina + Dexametasona                                            | Tobracin - D Colírio Fr 5ml               |
|                                                                       | Tobradex Colírio Fr 5ml                   |
|                                                                       | Tobramicina Colírio Fr 5mL (Biosintética) |

**Antimicrobiano Oxazolidinona**

|            |                                          |
|------------|------------------------------------------|
| Linezolida | Zyvox 600mg Bolsa 300ml                  |
|            | Adiloz 600mg Cp Rev                      |
|            | Linezolida 600mg Bolsa 300mL (Eurofarma) |
|            | Zyvox Cp Rev 600mg                       |

**Antimicrobiano Penicilina**

|             |                                         |
|-------------|-----------------------------------------|
| Amoxicilina | Amoxil 500mg Cap                        |
|             | Amoxicilina 500mg Cap (Biosintética)    |
|             | Amoxicilina 500mg Cap (EMS)             |
|             | Amoxicilina 500mg Cap (Germed)          |
|             | Amoxicilina 500mg Cap (Medley)          |
|             | Amoxicilina 500mg Cap (Prati Donaduzzi) |
|             | Amoxicilina 500mg Cap (Sandoz)          |

|                                       |                                                                   |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Amoxicilina + Clavulanato de Potássio | Amoxicilina 1000mg + Clavulanato de Potássio 200mg FA (Eurofarma) |
|                                       | Clavulin Injetável 1000mg/200mg FA                                |
|                                       | Doclaxin 1000mg/200mg FA                                          |
| Ampicilina                            | Ampicilina 1g FA (Teuto)                                          |
|                                       | Ampicilina 500mg Cp (EMS)                                         |
|                                       | Ampicilina 500mg Cp (Sandoz)                                      |
|                                       | Ampicilina 500mg FA (Teuto)                                       |
|                                       | Amplatil 1g FA                                                    |
|                                       | Amplatil 500mg FA                                                 |
|                                       | Binotal 500mg Cp                                                  |
|                                       | Cilnon 1g FA                                                      |
|                                       | Cilnon 500mg FA                                                   |
| Ampicilina + Sulbactam                | Ampicilina 1g + Sulbactam 0,5g FA (Eurofarma)                     |
|                                       | Ampicilina 1g + Sulbactam 0,5g FA (Novafarma)                     |
|                                       | Unasyn Injetável 1g + 0,5g FA                                     |
|                                       | Ampicilina 1g + Sulbactam 0,5g FA (Mylan)                         |
| Benzilpenicilina Benzatina            | Bepeben Benzilpenicilina Benzatina 600.000ui                      |
| Benzilpenicilina Potássica            | Benzilpenicilina Potássica 5mUI FA (Novafarma)                    |
|                                       | Aricilina 5mUI FA (Blausiegel)                                    |
| Oxacilina                             | Oxacilil 500mg FA                                                 |
|                                       | Oxacilina 500mg A (Blausiegel)                                    |
|                                       | Oxacilina Sódica 500mg FA (Eurofarma)                             |
|                                       | Oxanon 500mg FA                                                   |
| Penicilina G Benzatina                | Benzetacil 1.200.000ui FA (Eurofarma)                             |
|                                       | Bepeben 1.200.000ui FA                                            |
|                                       | Biozatin 1.200.000ui FA                                           |
| Piperacilina + Tazobactam             | Piperacilina 2g + Tazobactam 0,25g FA (Eurofarma)                 |
|                                       | Piperacilina 2g + Tazobactam 0,25g FA (Mylan)                     |
|                                       | Piperacilina 4g + Tazobactam 0,5g FA (Mylan)                      |
|                                       | Piperacilina 4g + Tazobactam 0,5g FA (Novafarma)                  |
|                                       | Piperacilina 4g + Tazobactam 0,5g FA (Aurobindo)                  |

|                                  |                                                  |
|----------------------------------|--------------------------------------------------|
| Piperacilina +<br>Tazobactam     | Piperacilina 4g + Tazobactam 0,5g FA (Eurofarma) |
|                                  | Tazocin 2,25g FA                                 |
|                                  | Tazocin 4,5g FA                                  |
| <b>Antimicrobiano Polimixina</b> |                                                  |
| Polimixina B                     | Bedfordpoly B FA 500.000ui                       |
|                                  | Polimixina B 500.000ui FA (Eurofarma)            |
| <b>Antimicrobiano Quinolona</b>  |                                                  |
| Ciprofloxacin                    | Cipro Iv Flexibag 200mg Bolsa 100ml              |
|                                  | Cipro 500mg Cp Rev                               |
|                                  | Cipro Iv 400mg Bolsa 200ml                       |
|                                  | Ciprobacter 200mg Bolsa 100mL (Isofarma)         |
|                                  | Ciprobacter 400mg Bolsa 200mL (Isofarma)         |
|                                  | CIPROfloxacin 200mg Bolsa 100ml (Halex Istar)    |
|                                  | Ciprofloxacin 200mg Bolsa 100mL (Isofarma)       |
|                                  | CIPROfloxacin 400mg Bolsa 200ml (Halex Istar)    |
|                                  | Ciprofloxacin 500mg Cp Rev (Germed)              |
|                                  | Ciprofloxacin 500mg Cp Rev (Medley)              |
|                                  | Ciprofloxacin 500mg Cp Rev (Sandoz)              |
|                                  | Ciprofloxacin 500mg Cp Rev (EMS)                 |
|                                  | CIPROfloxacin Cld 500mg Cp Rev (Prati Donaduzzi) |
|                                  | Fresoflox 400mg Bolsa 200ml                      |
|                                  | Quinoflox 500mg Cp Rev                           |
| Levofloxacin                     | Levaquin 500mg Cp Rev                            |
|                                  | LEVOFloxacin 500mg Cp Rev (EMS)                  |
|                                  | Levofloxacin 500mg Cp Rev (Medley)               |
|                                  | Levofloxacin 500mg Cp Rev (Germed)               |
|                                  | Levotac 500mg Bolsa 100mL                        |
|                                  | Levaflox 750mg (5mg/ml) Bolsa 150ml              |
| Moxifloxacin                     | Avalox 400mg Cp Rev                              |
|                                  | Avalox 400mg Bolsa 250mL                         |
| Norfloxacin                      | Floxacin 400mg Cp Rev                            |
|                                  | Norfloxacin 400mg Cp (União Química)             |

|                                                       |                                                                |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Norfloxacin                                           | Norfloxacin 400mg Cp (Medley)                                  |
|                                                       | Norfloxacin 400mg Cp (União Química)                           |
|                                                       | Norfloxacin 400mg Cp Rev (Germed)                              |
|                                                       | NORfloxacin 400mg Cp Rev (Sandoz)                              |
| <b>Antimicrobiano Sulfa</b>                           |                                                                |
| Sulfadiazina                                          | Suladrin 500mg Cp                                              |
|                                                       | Sulfadiazina 500mg Cap                                         |
| Sulfametoxazol + Trimetoprima                         | Bac-sulfitrin 400mg + 80mg Amp 5ml                             |
|                                                       | Bactrim 400mg + 80mg Cp                                        |
|                                                       | Bactrim F 800mg + 160mg Cp                                     |
|                                                       | Sulfametoxazol 400mg + Trimetoprima 80mg Cp (Prati Donaduzzi)  |
|                                                       | Sulfametoxazol 400mg + Trimetoprima 80mg Cp (Sandoz)           |
|                                                       | Sulfametoxazol 800mg + Trimetoprima 160mg Cp (Prati Donaduzzi) |
| Sulfassalazina                                        | Azulfin 500mg Cp Rev                                           |
| <b>Antimicrobiano Tetraciclina</b>                    |                                                                |
| Doxiciclina                                           | Doxiciclina 100mg Cp Rev (EMS)                                 |
|                                                       | Doxiciclina 100mg Cp Rev (Sigma Pharma)                        |
|                                                       | Neo Doxycilin 100mg Cp Rev                                     |
|                                                       | Vibramicina 100mg Cp Solúvel                                   |
|                                                       | Vibramicina 100mg Cp Rev                                       |
| <b>Antimicrobiano Tópico</b>                          |                                                                |
| Ácido Fusídico                                        | Verutex Creme Bis 15g (Leo Pharma)                             |
| Bacitracina + Neomicina                               | Nebacetin Pomada Bis 15g                                       |
|                                                       | Bacitracina 250ui/g + Neomicina Sulfato 5mg/g Bis 15g (Medley) |
| Cloranfenicol + Aminoácidos + Metionina + Viatamina A | Epitezan Pomada Oft Bis 3,5g                                   |
|                                                       | Regencel Pomada Oft Tubo 3,5g                                  |
| Cloranfenicol + Colagenase                            | Iruxol Pomada Bis 30g                                          |
| Cloranfenicol + Desoxirribonuclease + Fibrinolisisa   | Fibrinase Com Cloranfenicol Pomada Bis 30g                     |
|                                                       | Fibrase Pomada Bis 30g                                         |

|                                          |                                                 |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Gentamicina Sulfato                      | Sulfato de Gentamicina 0.1% Creme Bis 30g Manip |
|                                          | Diprogenta Creme Bis 30g                        |
|                                          | Duotrat Creme Bis 30g                           |
|                                          | Quadridem Creme Bis 20g                         |
|                                          | Trok-G Creme Bis 30g                            |
| Hexamidina + Tetracaína                  | Hexomeline Colutório Spray Fr 50mL              |
| Mupirocina                               | Mupirocina 2% Pomada Bis 15g (Cristália)        |
| Sulfadiazina de Prata + Nitrato de Cério | Dermacerium Creme Tubo 50g                      |
| Nitrofurazona                            | Furacin 0,2% Solução Fr 30ml                    |

#### Antimicrobiano Tópico e Corticóide

|                                                       |                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Betametasona + Gentamicina                            | Duotrat Creme Bis 30g                                                                                              |
|                                                       | Diprogenta Creme Bis 30g                                                                                           |
|                                                       | Trok G Crème Bis 30g                                                                                               |
| Betametasona + Clotrimazol + Gentamicina + Tolnaftato | Quadriderm Creme Bis 20g                                                                                           |
| Gramicidina + Neomicina + Nistatina + Triancinolona   | Gramicidina 0,25mg/g + Neomicina 2,5mg/g + Nistatina 100.000u/g + Triancinolona 1,0mg/g Creme Tubo 30g (EMS)       |
|                                                       | Gramicidina 0,25mg/g + Neomicina 2,5mg/g + Nistatina 100.000u/g + Triancinolona 1,0mg/g Creme Tubo 30g (Eurofarma) |
|                                                       | Gramicidina 0,25mg/g + Neomicina 2,5mg/g + Nistatina 100.000u/g + Triancinolona 1,0mg/g Creme Tubo 30g (Medley)    |
|                                                       | Omcilon-a M Creme Tubo 30g                                                                                         |
|                                                       | Oncileg Creme Tubo 30g                                                                                             |
|                                                       | Mud Cr Tubo 30g                                                                                                    |
|                                                       | Mud Cr Bis 10g                                                                                                     |
| Mometasona                                            | Topison 1mg/g Creme Bis 20g                                                                                        |

#### Antimicrobiano Tuberculostático

|             |                             |
|-------------|-----------------------------|
| Isoniazida  | Isoniazida 100mg Cap Manip  |
| Rifampicina | Rifaldin 300mg Cp           |
|             | Rifampicina 300mg Cap       |
|             | Rifampicina 300mg Cap Manip |



### Antineoplásico Anticorpo Monoclonal

|               |                                  |
|---------------|----------------------------------|
| Bevacizumabe  | Avastin 100mg (25mg/mL) FA 4mL   |
|               | Avastin 400mg (25mg/mL) FA 16mL  |
| Brentuximabe  | Adcetris 50mg FA (Takeda)        |
| Cetuximabe    | Erbitux 100mg (5mg/mL) FA 20mL   |
| Daratumumab   | Dalinvir 100mg (20mg/mL) FA      |
|               | Dalinvir 400mg (20mg/mL) FA      |
| Durvalumabe   | Imfinzi 120mg/2,4mL FA 2,4mL     |
|               | Imfinzi 500mg/10mL FA 10mL       |
| Nivolumab     | Opdivo 100mg/10mL                |
|               | Opdivo 40mg (10mg/mL) Amp 4mL    |
| Panitumumab   | Vectibix 100mg FA 5mL            |
| Pembrolizumab | Keytruda 100 Mg FA               |
| PERTUzumabe   | Perjeta 420mg FA                 |
| Ramucirumab   | Cyramza 100mg FA 10mL            |
|               | Cyramza 500mg FA 50mL            |
| Rituximabe    | Mabthera 500mg (10mg/mL) FA 50mL |
|               | Mabthera Sc 1400mg FA 15mL       |
|               | Mabthera 100mg (10mg/mL) FA 10mL |
| Trastuzumabe  | Herceptin 440mg FA               |

### Antineoplásicos Citotóxicos

|              |                              |
|--------------|------------------------------|
| Azacitidina  | Vidaza 100mg FA              |
| Bleomicina   | Bleomicina 15Ui FA ( Baxter) |
|              | Bonar 15 Ui FA               |
| Bortezomibe  | Velcade 3,5mg FA             |
| Bussulfano   | Busilvex 60mg FA             |
| Carboplatina | Fauldcarbo 150mg Amp 15mL    |
|              | Fauldcarbo 450mg Amp 45mL    |
|              | Fauldcarbo 50mg Amp 5mL      |
|              | Platamine 150mg FA 15ml      |
|              | Platamine 450mg FA 45ml      |
|              | Platamine 50mg FA 5ml        |

|                          |                                              |
|--------------------------|----------------------------------------------|
| Carmustina               | Becenun 100mg FA                             |
| Ciclofosfamida           | Genuxal 1000mg FA                            |
|                          | Genuxal 200mg FA                             |
| Cisplatina               | Fauldcispla 10mg FA                          |
|                          | Fauldcispla 50mg FA                          |
|                          | Platistine 10mg FA                           |
|                          | Platistine 50mg FA                           |
| Citarabina               | Aracytin Cs 1000mg FA                        |
|                          | Aracytin Cs 100mg FA                         |
|                          | Citarabina 100mg FA 1mL                      |
|                          | Citarabina 500mg FA 5mL                      |
|                          | Citarabina 1g FA 10mL                        |
|                          | Citarax 500mg FA                             |
|                          | Fauldcita 1000mg FA                          |
|                          | FauldCITA 500mg Amp 5 mL                     |
| Dacarbazina              | Dacarb 200mg FA                              |
|                          | Fauldacar 200mg FA                           |
| Daunorrubicina           | Daunoblastina 20mg FA                        |
|                          | Evoclass 20mg FA                             |
| Decitabina               | Dacogen 50mg FA                              |
| Docetaxel                | Docelibbs 20mg FA                            |
|                          | Docelibbs 80mg FA                            |
|                          | Docelibbs 120mg FA                           |
|                          | Taxotere 20mg FA                             |
|                          | Taxotere 80mg FA                             |
| Doxorrubicina            | Adriblastina Rd 10mg FA                      |
|                          | Adriblastina Rd 50mg FA                      |
|                          | Doxorrubicina Cloridrato 50mg FA (Eurofarma) |
|                          | Fauldoxo 10mg FA                             |
|                          | Fauldoxo 10mg FA                             |
| Doxorrubicina Lipossomal | Caelyx 20mg FA                               |
|                          | Doxopeg 20mg FA                              |

|              |                                                 |
|--------------|-------------------------------------------------|
| Epirubicina  | Cloridrato de Epirubicina 10mg FA 5mL (Accord)  |
|              | Cloridrato de Epirubicina 50mg FA 25mL (Accord) |
|              | Farmorubicina Cs 10mg FA                        |
|              | Farmorubicina Cs 50mg FA                        |
| Etoposideo   | Epósido 100mg FA 5mL                            |
|              | Eunades Cs 100mg FA                             |
|              | Evoposdo 100mg Amp 5mL                          |
|              | Tevaetopo 100mg FA                              |
| Fludarabina  | Fludalibbs 50mg FA                              |
|              | Fludara 50mg FA                                 |
| Fluoruracila | Fauldfluor 2500 mg FA                           |
|              | Fauldfluor 500mg FA                             |
| Gencitabina  | Gemzar 200mg FA                                 |
|              | Gemzar 100mg FA                                 |
|              | Gemzar 1000mg FA                                |
|              | Genlibbs 1000mg FA                              |
|              | Genlibbs 200mg FA                               |
| Idarrubicina | Zavedos 5mg FA                                  |
|              | Zavedos 10mg FA                                 |
|              | IDA 10mg FA                                     |
|              | IDA 5mg FA                                      |
| Ifosfamida   | Holoxane 1000mg FA                              |
|              | Holoxane 500mg FA                               |
| Irinotecano  | Camptosar 100mg (20mg/ml) FA                    |
|              | Camptosar 40mg (20mg/ml) FA                     |
|              | Irinotecano Cloridrato 100mg FA (Eurofarma)     |
|              | Irinotecano Cloridrato 100mg FA (Glenmarck)     |
|              | Irinotecano Cloridrato 40mg FA (Eurofarma)      |
|              | Irinotecano Cloridrato 40mg FA (Glenmarck)      |
|              | Tecnotecan 100mg (20mg/ml) FA                   |
|              | Tecnotecan 40mg (20mg/ml) FA                    |
|              | Trebyxan 40mg FA 2mL                            |
|              | Trebyxan 100mg FA 5mL                           |

|                         |                                   |
|-------------------------|-----------------------------------|
| Melfalano               | Alkeran 50mg FA                   |
| Metotrexato             | Fauldmetro 1g (100mg/mL) Amp 10mL |
|                         | Fauldmetro 50mg (25mg/mL) FA 2mL  |
|                         | Miantrex 1g (100mg/mL) FA 10mL    |
|                         | Miantrex CS 50mg FA 2mL           |
| Mitoxantrona            | Evomixan 20mg FA                  |
| Oxaliplatina            | Eloxatin 100mg FA                 |
|                         | Eloxatin 50mg FA                  |
|                         | Oxalibbs 100mg FA 20mL            |
|                         | Oxalibbs 50mg FA 10mL             |
| Paclitaxel              | Ontax 100mg FA 16,7ml             |
|                         | Ontax 30mg FA 5ml                 |
|                         | Ontax 150mg FA 25ml               |
|                         | Tarvexol 30mg FA 5ml              |
|                         | Taxol 100mg FA 16,7ml             |
|                         | Taxol 30mg FA 5ml                 |
| Pemetrexede             | Atred 100mg FA                    |
|                         | Atred 500mg FA                    |
|                         | Alimta 100mg FA                   |
|                         | Alimta 500mg FA                   |
| Vimblastina             | Faulblastina 10mg FA              |
|                         | Velban 10mg FA                    |
| Vincristina             | Fauldvinciri 1mg FA               |
| Vinorelbina Ditartarato | Navelbine 50mg FA                 |
|                         | Navelbine 10mg FA                 |
|                         | Neocitec 10mg FA                  |

#### Antineoplásicos Orais

|              |                                   |
|--------------|-----------------------------------|
| Anastrozol   | Anastrozol 1mg Cp Rev (Eurofarma) |
|              | Arimidex 1mg Cp Rev               |
| Bicalutamida | Casodex 50mg Cp Rev               |
| Bussulfano   | Myleran 2mg Cp                    |
| Capecitabina | Xeloda 500mg Cp Rev               |
|              | Corretal 500mg Cp Rev             |

|                |                                        |
|----------------|----------------------------------------|
| Hidroxiureia   | Hydrea 500mg Cap                       |
| Melfalano      | Alkeran 2mg Cp                         |
| Mercaptopurina | Purinethol 50mg Cp                     |
| Tamoxifeno     | Citrato de Tamoxifeno 20mg Cp (Sandoz) |
|                | Festone 20mg Cp Rev                    |
|                | Nolvadex D 20mg Cp                     |
| Tretinoína     | Vesanoid 10mg Cap Gelatinosa           |

#### Antiparasitário, Anti-helmíntico

|                   |                                              |
|-------------------|----------------------------------------------|
| Albendazol        | Albendazol 400mg Cp Mastigável (Neo Química) |
|                   | Albel 400mg Cp Mastigável                    |
|                   | Monozol 400mg Cp Mastigável                  |
|                   | Parasin 400mg Cp Mastigável                  |
|                   | Zentel 400mg Cp                              |
| Hidroxicloroquina | Plaquinol 400mg Cp                           |
|                   | Reuquinol 400mg Cp                           |
| Ivermectina       | Ivermec 6mg Cp                               |
|                   | Ivermectina 6mg Cp                           |
|                   | Revectina 6mg Cp                             |
|                   | Leverctin 6mg Cp                             |
| Nitazoxanida      | Annita 500mg Cp Rev                          |
| Pirimetamina      | Daraprim 25mg Cp                             |

#### Antiparasitários Citotóxicos

|             |                      |
|-------------|----------------------|
| Pentamidina | Pentamidina 300mg FA |
|-------------|----------------------|

#### Antiparkinsonianos

|                        |                                   |
|------------------------|-----------------------------------|
| Amantadina             | Mantidan 100mg Cp                 |
| Biperideno             | Akineton 2mg Cp                   |
|                        | Cinetol 2mg Cp                    |
| Entacapona             | Comtan 200mg Cp                   |
|                        | Entarkin 200mg Cp                 |
| Levodopa + Benserazida | Prolopa Hbs 100/25mg Cap          |
|                        | Prolopa BD 100mg/25mg Cp          |
|                        | Prolopa 200mg/50mg Cp             |
|                        | Prolopa 100mg/25mg Cp Dispersível |

|                                     |                                                |
|-------------------------------------|------------------------------------------------|
| Memantina                           | Alois 10mg Cp Rev                              |
|                                     | Ebix 10mg Cp Rev                               |
|                                     | Memantina 10mg Cp Rev (Eurofarma)              |
| Pramipexol                          | Pramipexol 0,25mg Cp (Biosintética)            |
|                                     | Sifrol 0,125mg Cp                              |
|                                     | Sifrol 0,25mg Cp                               |
|                                     | Sifrol 1mg Cp                                  |
| Rivastigmina                        | Exelon 1,5mg Cap                               |
|                                     | Exelon Patch 5 Adv Transdérmico 9mg            |
|                                     | Exelon Patch 15 Adv Transdérmico 13,3mg/       |
|                                     | Exelon Patch 10 Adv Transdérmico 9,5mg/24h     |
| Rotigotina                          | Neupro Adv Transdérmico 2mg                    |
| <b>Antipsicótico, Neurolépticos</b> |                                                |
| Clorpromazina                       | Ampticil 25mg Amp 5ml                          |
|                                     | Ampticil 25mg Cp Rev                           |
|                                     | Ampticil 4% Gts Fr 20ml                        |
|                                     | Longactil 25mg Amp 5ml                         |
|                                     | Longactil 25mg Cp                              |
|                                     | Longactil 4% Gts Fr 20ml (Cristália)           |
| Droperidol                          | Droperdal 2,5mg Amp 1ml                        |
| Droperidol + Fentanila              | Nilperidol Amp 2ml                             |
| Haloperidol                         | Haldol 1mg Cp                                  |
|                                     | Haldol 5mg Amp 1ml                             |
|                                     | Haldol 5mg Cp                                  |
|                                     | Haldol Gts 2mg/ml Fr 30ml                      |
|                                     | Halo 1mg Cp                                    |
|                                     | Halo 5mg Amp 1ml                               |
|                                     | Halo 5mg Cp                                    |
|                                     | Haloperidol Gts 2mg/ml Fr 20ml (União Química) |
|                                     | Uni Haloper 5mg Amp 1mL (União Química)        |
| Levomepromazina                     | Neozine 4% Gts Fr 20ml                         |

|                                   |                                          |
|-----------------------------------|------------------------------------------|
| Olanzapina                        | Axonium 2,5mg Cp                         |
|                                   | Olanzapina 2,5mg Cp Rev (Medley)         |
|                                   | Olanzapina 5mg Cp Rev (Aché)             |
|                                   | Olanzapina 5mg Cp Rev (Eurofarma)        |
|                                   | Olanzapina 5mg Cp Rev (Medley)           |
|                                   | Olanzapina 2,5mg Cp (Aché)               |
|                                   | Olanzapina 2,5mg Cp (Eurofarma)          |
|                                   | Zyprexa 2,5mg Cp Rev                     |
|                                   | Zyprexa 5mg Cp Rev                       |
| Periciazina                       | Neuleptil 4% (40mg/ml) Gts Fr 20ml       |
| Quetiapina                        | Quetiapina 100mg C Cp Rev (Biosintética) |
|                                   | Quetiapina Fumarato 25mg Cp Rev (Sandoz) |
|                                   | Quetiapina 100mg Cp Rev (EMS)            |
|                                   | Quetiapina 25mg Cp Rev (EMS)             |
|                                   | Quetros 25mg Cp Rev                      |
|                                   | Seroquel 100mg Cp Rev                    |
|                                   | Seroquel 25mg Cp Rev                     |
| Risperidona                       | Respidon 1mg Cp                          |
|                                   | Risperidon 1mg Cp                        |
|                                   | Rispalum 1mg Cp                          |
|                                   | Zargus 1mg Cp (Biosintética)             |
|                                   | Risperdal 1mg Cp                         |
|                                   | Risperidona 1mg Cp (Biosintética)        |
|                                   | Risperidona 1mg Cp (Eurofarma)           |
| Sulpirida                         | Equilid 50mg Cap                         |
| <b>Antirreumáticos</b>            |                                          |
| Abatacepte                        | Orencia 250mg FA 15mL                    |
| Adalimumabe                       | Humira Ser 40mg/0,8ml                    |
| Condroitina Sulfato + Glicosamina | Artrolive Cap                            |
|                                   | Condroflex Cap                           |
| Golimumab                         | Simponi 25mg Caneta 0,5mL                |
| Hialuronato de Sódio              | Polireumin 20mg (10mg/mL) FA 2mL         |
|                                   | Synovium 75mg (25mg/mL) Ser 3mL          |

|                                 |                                                       |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Hialuronato de Sódio + Sorbitol | Synolis Va 40mg + Sorbitol 40mg/mL Ser 2mL            |
|                                 | Synolis Va 80mg/160mg Ser 4ml (Aptissen)              |
| Leflunomida                     | Arava 20mg Cp                                         |
|                                 | Leflunomida 20mg Cp Rev (Cristália)                   |
| Tocilizumabe                    | Actemra 200mg FA 10ml                                 |
|                                 | Actemra 80mg FA 4ml                                   |
| <b>Antisséptico Topico</b>      |                                                       |
| Álcool Etílico Hidratado        | Álcool Etílico 70% Fr 100ml (Rialcool)                |
|                                 | Álcool Etílico Hidratado 70% Fr 60ml                  |
|                                 | Álcool Gel Refil 1000ml                               |
| Clorexidina                     | Riohex Loção Aquosa 0,2% Almotolia 100mL              |
|                                 | Riohex Loção Aquosa 0,5% Almotolia 100mL              |
|                                 | Riohex 2% Almotolia 100mL                             |
|                                 | Riohex Degermante Com Tensoativo 2% Almotolia 30mL2   |
|                                 | Riohex Degermante Com Tensoativo 2% Almotolia 1000mL  |
|                                 | Chlorohex Sabão 2% Fr 1L                              |
|                                 | Riohex Solução Alcoólica 0,5% Almotolia 30mL          |
|                                 | Riohex Solução Alcoólica 0,5% Almotolia 100mL         |
| Hidrogênio Peróxido             | Água Oxigenada 10 Vol. Almotolia 100ml                |
|                                 | Água Oxigenada Estéril 10 Vol. Frasco 100ml Manip     |
|                                 | Água Oxigenada Estéril 10 Vol. (3%) Frasco 50ml Manip |
| Iodopovidona                    | Riodeine Dermo Suave Degermante 10% Almotolia 100ml   |
|                                 | Riodeine Dermo Suave Tópico 10% Almotolia 100mL       |
|                                 | Riodeine Tintura Almotolia 100ml                      |
|                                 | Riodeine Dermo Suave Tópico Almotolia 30ml            |
|                                 | Riodeine Degermante Almotolia 30ml                    |
|                                 | Riodeine Degermante Fr 1000ml                         |
|                                 | Riodeine Dermo Suave Degermante Galão 100mL           |
| <b>Antissépticos Bucal</b>      |                                                       |
| Cetilpiridínio                  | Cepacol Solução 0,5mg/ml Fr 250ml                     |
|                                 | Cepacol Solução 0,5mg/mL Fr 250mL - Dose              |



|                                                          |                                               |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Clorexidina + Fluoreto de Sódio                          | Cariax Solução Bucal Com Clorexidina Fr 250ml |
|                                                          | Colgate Periogard 0,12% Solução Fr 250ml      |
|                                                          | Periokin Gel Oral Tubo 36g                    |
| Enxaguante Bucal Enzimático sem Álcool e sem Clorexidina | Bioxtra Enxaguatório Bucal Fr 250mL           |
| <b>Antissépticos e Analgésicos Urinários</b>             |                                               |
| Fenazopiridina                                           | Pyridium 100mg Drg                            |
|                                                          | Urovit 100mg Drg                              |
| Metenamina + Metiltionínio                               | Sepurin 120mg + 20mg Drg                      |
| <b>Antitabagismo</b>                                     |                                               |
| Nicotina                                                 | Niquitin 7mg Adv Transdérmico                 |
|                                                          | Nicorette 2mg Goma                            |
|                                                          | Niquitin 14mg Adv Transdérmico                |
|                                                          | Niquitin 21mg Adv Transdérmico                |
|                                                          | Nicotinell 14mg Adv Transdérmico              |
| Vareniclina Tartarato                                    | Champix Kit Tratamento Cp Rev 0,5mg + 1mg     |
| <b>Antitussígenos</b>                                    |                                               |
| Cloperastina                                             | Seki 3,54mg/ml Xrp Fr 120ml                   |
| <b>Antiulceroso</b>                                      |                                               |
| Dexlansoprazol                                           | Dexilant 30mg Cápsula De Lib Prolongada       |
| Esomeprazol Magnésio                                     | Nexium 20mg Cp Rev Lib Retardada              |
| Esomeprazol Sódico                                       | Ésio Iv 40mg FA                               |
|                                                          | NEXium Iv 40mg FA                             |
| Omeprazol Magnésico                                      | Losec Mups 20mg Cp Rev                        |
| Omeprazol Sódico                                         | Omeprazol Sódico 40mg FA (Cristália)          |
|                                                          | Omeprazol Sódico 40mg FA (Eurofarma)          |
|                                                          | Oprazon 40mg FA 10ml                          |
| Pantoprazol                                              | Pantocal Iv 40mg FA                           |
|                                                          | Pantopaz 40mg Cp                              |
|                                                          | Pantoprazol 40mg Cp (EMS)                     |
|                                                          | Pantoprazol 40mg Cp (Biosintética)            |

|                        |                                                    |
|------------------------|----------------------------------------------------|
| Pantoprazol            | Pantoprazol 40mg Cp (Eurofarma)                    |
|                        | Pantoprazol 40mg FA (Eurofarma)                    |
|                        | Pantozol 40mg Cp                                   |
|                        | Pantozol Ev 40mg FA                                |
| Ranitidina             | Antak 150mg Cp                                     |
|                        | Antak 50mg Amp 2ml                                 |
|                        | Ranitidina 150mg Cp (EMS)                          |
|                        | Ranitidina Cloridrato 50mg Amp 2ml (Teuto)         |
|                        | Ranitidina Cloridrato 50mg Amp 2ml (União Química) |
| Sucralfato             | Sucrafilm 200mg/mL Flac 10ml                       |
|                        | Sucrafalto 200mg/mL Flac 10mL Manip                |
| <b>Antivertiginoso</b> |                                                    |
| Betaistina             | Labirin 8mg Cp                                     |
| Flunarizina            | Flunarin 10mg Cap                                  |
|                        | Sibelium 10mg Cap                                  |
|                        | Vertex 10mg Cap                                    |
| <b>Antivirais</b>      |                                                    |
| Aciclovir              | Aciclovir 200mg Cp (Biosintética)                  |
|                        | Aciclovir 200mg Cp (Merck)                         |
|                        | Aciclovir 200mg Cp (Neo Química)                   |
|                        | Aciclovir 200mg Cp (Prati Donaduzzi)               |
|                        | Aciclovir 50mg/g Creme Bis 10g                     |
|                        | Antivirax 200mg Cp                                 |
|                        | Univir 200mg Cp                                    |
|                        | Uni-vir Aciclovir 250mg FA                         |
|                        | ZoviRAX (50mg/g) Creme Bis 10g                     |
|                        | Zovirax 200mg Cp                                   |
|                        | Zovirax 250mg FA                                   |
|                        | Zynvir Aciclovir 250mg FA                          |
| Alfapeginterferona 2b  | Pegintron 80mcg FA                                 |
| Dolutegravir           | Tivicay 50mg Cp Rev                                |

|              |                                          |
|--------------|------------------------------------------|
| Lamivudina   | Lamivudina 150mg Cp                      |
|              | Epivir 150mg Cp Rev                      |
|              | Vudirax 150mg Cp Rev                     |
| Oseltamivir  | Tamiflu 30mg Cap Secretaria da Saúde     |
|              | Tamiflu 75mg Cap Secretaria da Saúde     |
| Ribavirina   | Ribavirina 250mg Cap Secretaria da Saúde |
|              | Ribavirin 250mg Cap                      |
| Tenofovir    | Viread 300mg Cp                          |
| Valaciclovir | Valtrex 500mg Cp                         |

#### Antivirais Citotóxicos

|                  |                                         |
|------------------|-----------------------------------------|
| Foscarnet Sódico | Foscavir 24mg/mL Fr 250mL               |
| Ganciclovir      | Cymevene 500mg FA                       |
|                  | Ganciclovir Sódico 500mg FA (Eurofarma) |
|                  | Ganciclotrat 500mg FA                   |

#### Bloqueador de Canal de Cálcio

|            |                                  |
|------------|----------------------------------|
| Anlodipino | Anlodipino 5mg Cp (Biosintética) |
|            | Nicord 5mg Cp                    |
|            | Norvasc 5mg Cp                   |
|            | Pressat 5mg Cp                   |
|            | Novanlo 2,5mg Cp                 |
| Nimodipino | Nimodipino 30mg Cp (Germed)      |
|            | Nimodipino 30mg Cp (EMS)         |
|            | Nimovas 30mg Cp Rev              |
|            | Vasodipina 30mg Cp Rev           |

#### Bloqueador Neuromuscular

|                       |                                                            |
|-----------------------|------------------------------------------------------------|
| Cisatracúrio Besilato | Nimbium 10mg Amp 5ml                                       |
|                       | Cis 10mg Amp 5mL                                           |
| Fenoterol             | Berotec Gts 0,5% Fr 20ml                                   |
|                       | Bromidrato de Fenoterol Gts 0,5% Fr 20ml (Prati Donaduzzi) |

|                          |                                                                   |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Rocurônio                | Esmeron 50mg FA 5ml                                               |
|                          | Rocuron 50mg FA 5ml                                               |
|                          | Brometo de Rocurônio 50mg FA 5mL (Eurofarma)                      |
| Suxametônio              | Succinil Colin 100mg FA                                           |
|                          | Succitrat 100mg FA                                                |
| <b>Broncodilatadores</b> |                                                                   |
| Aminofilina              | Aminofilina 240mg Amp 10ml (Hipolabor)                            |
|                          | Aminofilina 100mg Cp (Teuto)                                      |
|                          | Aminofilina 240mg Amp 10ml (Farmace)                              |
|                          | Aminofilina 240mg Amp 10ml (Teuto)                                |
|                          | Aminofilina 240mg Fap 10ml Manip (Verbenna)                       |
|                          | Asmapen 100mg Cp (Neo Química)                                    |
| Bamifilina               | Bamifix 300mg Drg                                                 |
| Budesonida               | Budecort Aqua 64mcg/dose Spray Nasal Fr                           |
|                          | Pulmicort 0,5mg/mL                                                |
| Budesonida + Formoterol  | Alenia 12mcg + 400mcg Caps Inalatórias                            |
|                          | Foraseq 12mcg + 400mcg Caps Inalatórias                           |
| Fluticasona + Salmeterol | Seretide Spray 25/250mcg Fr 120 Doses                             |
|                          | Seretide 50/250mcg Disco 60 Doses                                 |
| Ipratrópio Brometo       | Atrovent 0,25mg/mL Fr 20mL                                        |
|                          | Brometo de IPRAtrópio 0,025% Fr 20mL (Biosintética)               |
|                          | Brometo de Ipratrópio 0,025% Fr 20mL (Prati Donaduzzi)            |
|                          | Brometo de Ipratrópio 0,025% Fr 20mL (EMS)                        |
|                          | Ipratrópio 0,025% (250mcg/mL) Fr 20mL (Germed)                    |
| Salbutamol               | Aerolin 5mg/ml Sol Nebulização Fr 10mL                            |
|                          | Aerolin 5mg/mL Solução Nebulização Fr 10mL - Dose                 |
|                          | Aerolin Spray 100mcg/dose Fr                                      |
| Teofilina                | Teolong 200mg Cap Lib Prolongada                                  |
| Terbutalina              | Sulfato de Terbutalina/ Terbutil 0,5mg/ml Amp 1mL (União Química) |
|                          | Sulfato de Terbutalina 0,5mg/mL Amp 1mL (Hipolabor)               |
| Tiotrópio Brometo        | Spiriva Respimat 2,5mcg/dose Fr 4mL                               |

## Cardiotônicos

|               |                                   |
|---------------|-----------------------------------|
| Deslanosídeo  | Deslanol 0,4mg Amp 2ml            |
| Digoxina      | Digoxina 0,25mg Cp (Teuto)        |
|               | Digoxina 0,25mg Cp (Aspen Pharma) |
|               | Digoxina 0,25mg Cp (Pharmalab)    |
|               | Neo Digoxin 0,25mg Cp             |
| Levosimendana | Simdax 12,5mg (2,5mg/ml) FA 5ml   |
| Milrinona     | Primacor 10mg Amp 10mL            |

## Colinérgico, Disfunção Vesicoesfincteriana

|           |                          |
|-----------|--------------------------|
| Betanecol | Betanecol 10mg Cap Manip |
|-----------|--------------------------|

## Contrastes

|                                                            |                                          |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Ácido Gadotérico                                           | Dotarem 5mmol (0,5mmol/ml) FA 10ml       |
|                                                            | Dotarem 7,5mmol (0,5mmol/ml) FA 15ml     |
|                                                            | Dotarem 10mmol (0,5mmol/ml) FA 20ml      |
| Bário Sulfato                                              | Bariogel 100% (1g/ml) Susp Or Copo 150ml |
| Gadobutrol                                                 | Gadovist 604,72mg/ml FA 15ml             |
| Gadopentetato de Dimeglumina                               | Magnevistan 469mg/ml FA 10mL             |
|                                                            | Magnevistan 469mg/ml FA 15 mL            |
| Gadoxetato                                                 | Primovist 181,43mg/0,25mL/mL Ser 10mL    |
| Iodixanol                                                  | Visipaque 320 FA 100ml                   |
|                                                            | Visipaque 320 FA 50ml                    |
| Iopamidol                                                  | Iopamiron 612mg/mL FA 100 mL             |
|                                                            | Iopamiron 300 FA 50ml                    |
| Iopromida                                                  | Ultravist 370 FA 50ml                    |
| Ioversol                                                   | Optiray 320 Ser 100ml                    |
|                                                            | Optiray 320 Ser 125ml                    |
|                                                            | Optiray 320 - 68% Ser 75ml               |
|                                                            | Optiray 350 Ser 100ml                    |
|                                                            | Optiray 350 Ser 125ml                    |
|                                                            | Optiray 350 Ser 75ml                     |
| Meglumina (Meglumina Ioxitalamato) + Ioxitalamato de Sódio | Telebrix Coronar FA 100mL                |

|                                                  |                               |
|--------------------------------------------------|-------------------------------|
| Meglumina (Meglumina Ioxitalamato ) + Polividona | Telebrix Hystero FA 20ml      |
| Meglumina Ioxitalamato                           | Telebrix 30% FA 50mL          |
| Óleo Iodado de Papoula + Iodo                    | Lipiodol Ultrafluído Amp 10ml |

**Debridante**

|                     |                                   |
|---------------------|-----------------------------------|
| Octil Cianoacrilato | Dermabond Adv Líquido             |
| Papaína             | Gel de Papaína 2% Tubo 30g Manip  |
|                     | Gel de Papaína 6% Tubo 30g Manip  |
|                     | Gel de Papaína 10% Tubo 30g Manip |
|                     | Papaína 1g Env Manip              |

**Descongestionante Nasal**

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Benzalcônico + Sódio Cloreto | Rinosoro Gts Fr 30ml        |
|                              | Sorine Infantil Gts Fr 30ml |
| Desloratadina                | Desalex 5mg Cp Rev          |
| Oximetazolina                | Aturgyl Sol Nasal Fr 15ml   |

**Digestivos**

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| Ácido Ursodesoxicólico      | Ursacol 150mg Cp   |
| Lipase + Protease + Amilase | Creon 10.000UI Cap |
|                             | Creon 25.000UI Cap |

**Diuréticos**

|                                  |                                   |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| Acetazolamida                    | Diamox 250mg Cp                   |
| Amilorida                        | Moduretic 25/2,5mg Cp             |
|                                  | Moduretic 50/5mg Cp               |
| Clortalidona                     | Clortalidona 12,5mg Cp            |
|                                  | Higroton 12,5mg Cp                |
| Espironolactona                  | Aldactone 100mg Cp                |
|                                  | Aldactone 25mg Cp                 |
|                                  | Espironolactona 100mg Cp (Germed) |
| Furosemida                       | Furosemida 20mg Amp 2ml (Teuto)   |
|                                  | Lasix 20mg Amp 2ml                |
|                                  | Lasix 40mg Cp                     |
| Furosemida + Cloreto de Potássio | Hidrion 40mg/100mg Cp             |

|                   |                                       |
|-------------------|---------------------------------------|
| Hidroclorotiazida | Clorana 25mg Cp                       |
| Manitol 20%       | Manitol 20% Fr 250ml (Baxter)         |
|                   | Manitol 20% Fr 250ml (Bbraun)         |
|                   | Manitol 20% Fr 250ml (Fresenius Kabi) |
|                   | Manitol 20% Fr 250ml (JP)             |

### Eletrólito Oral

|                                  |                                                                |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Carbonato de Cálcio              | Oscal 500mg Cp                                                 |
| Carbonato de Cálcio + Vitamina D | Oscal D 500mg + 400ui Cp Rev                                   |
| Cloreto de Potássio              | Cloreto de Potássio 1,91g Env Manip                            |
|                                  | Cloreto de Potássio 6% Sol Oral (sem açúcar)<br>Fr 100mL Manip |
|                                  | Ionclor 6% Sol Oral Fr 150mL                                   |
|                                  | Slow K 600mg Drg                                               |
| Cloreto de Sódio                 | Cloreto de Sódio 500mg Cap Manip                               |
| Magnésio Sulfato                 | Sulfato de Magnésio 650mg Flac Manip                           |
|                                  | Sulfato de Magnésio 500mg Cap Manip                            |

### Eletrólitos, Diluentes

|                                                           |                                               |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Água Bidestilada                                          | Água Destilada Fr 1000mL                      |
|                                                           | Água Destilada (Deionizada) 1L                |
|                                                           | Água Bidestilada Bolsa 1000mL (Halex Istar)   |
|                                                           | Água Bidestilada Fr 1000mL (Eurofarma)        |
|                                                           | Água Bidestilada Fr 1000mL (Fresenius Kabi)   |
| Bicarbonato de Sódio                                      | Bicarbonato de Sódio 10% Amp 10ml Manip       |
|                                                           | Bicarbonato de Sódio 10% Amp 10ml (Hypofarma) |
|                                                           | Bicarbonato de Sódio 8,4% Fr 250mL            |
|                                                           | Bicarbonato de Sódio 8,4% Amp 10ml Manip      |
| Cloreto de Cálcio                                         | Cloreto de Cálcio 10% Amp 10ml Manip          |
| Cálcio Cloreto + Potássio + Sódio Cloreto                 | Ringer Simples Bolsa 500ml                    |
| Cálcio Cloreto + Potássio + Sódio Cloreto + Sódio Lactato | Ringer Lactato Bolsa 500ml                    |

|                         |                                                             |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Cloreto de Potássio     | Cloreto de Potássio 19.1% Amp 10ml                          |
| Cloreto de Sódio        | Cloreto de Sódio 0,9% Ser 3mL                               |
|                         | Cloreto de sódio 0,9% Ser 10mL (Equiplex)                   |
|                         | Cloreto de Sódio 0,9% Amp 10ml                              |
|                         | Soro Fisiológico 0,9% Amp 10ml                              |
|                         | Soro Fisiológico 0,9% Bolsa 1000ml                          |
|                         | Soro Fisiológico 0,9% Bolsa 100ml                           |
|                         | Soro Fisiológico 0,9% Bolsa 100ml (Eurofarma)               |
|                         | Soro Fisiológico 0,9% Bolsa 250ml                           |
|                         | Soro Fisiológico 0,9% Bolsa 500ml                           |
|                         | Soro Fisiológico 0,9% Bolsa 50ml                            |
|                         | Soro Fisiológico 0,9% Bolsa 2000ml                          |
|                         | Soro Fisiológico 0,9% Trilamido 250ml (Halex Istar)         |
|                         | Soro Fisiológico 0,9% Trilaminado Bolsa 100ml (Eurofarma)   |
|                         | Soro Fisiológico 0,9% Trilaminado Bolsa 250ml (Eurofarma)   |
|                         | Soro Fisiológico 0,9% Trilaminado Bolsa 500ml (Eurofarma)   |
|                         | Soro Fisiológico 0,9% Trilaminado Bolsa 500ml (Halex Istar) |
|                         | Soro Fisiológico 0.9% Bolsa 2000ml                          |
| Fosfato de Potássio     | Fosfato de Potássio 17,5% (2meq/ml) Amp 10ml                |
|                         | Fosfato de Potássio 17,5% (2meq/ml) Amp 10ml Manip          |
| Glicerofosfato de Sódio | Glycophós Amp 20 mL                                         |
|                         | Glicerofosfato de Sódio 10% Amp 20mL Manip                  |
| Gliconato de Cálcio     | Gliconato de Cálcio 10% Amp 10mL Manip                      |
|                         | Gliconato de Cálcio 10% Amp 10mL (Isofarma)                 |
|                         | Gliconato de Cálcio 10% Amp 10mL (Halex Istar)              |
|                         | Gluconato de Cálcio 10% Amp 10mL (Fresenius)                |
| Glicose                 | Glicose 10% Bolsa 1000ml                                    |
|                         | Glicose 25% Amp 10ml (Isofarma)                             |



|                                                      |                                                   |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Glicose                                              | Glicose 5% Bolsa 50ml                             |
|                                                      | Glicose 50% Amp 10ml                              |
|                                                      | Glicose 50% Bolsa 500ml (Isofarma)                |
|                                                      | Glicose 75% Amp 10mL Manip                        |
|                                                      | Soro Glicosado 10% Bolsa 500mL                    |
|                                                      | Soro Glicosado 5% Bolsa 250ml                     |
|                                                      | Soro Glicosado 5% Bolsa 1000ml                    |
|                                                      | Soro Glicosado 5% Bolsa 100ml                     |
|                                                      | Soro Glicosado 5% Bolsa 500ml (Baxter)            |
|                                                      | Soro Glicosado 5% Trilaminado Bolsa 250ml         |
|                                                      | Soro Glicosado 5% Trilaminado Bolsa 500mL         |
| Glicose + Cloreto de Sódio                           | Soro Glico-fisiológico Bolsa 500ml                |
| Magnésio Sulfato                                     | Magnoston 10% (100mg/ml) Ampola 10ml              |
|                                                      | Sulfato de Magnésio 10% Amp10ml (Samtec)          |
|                                                      | Sulfato de Magnésio 10% Amp Polietileno 10mL      |
|                                                      | Sulfato de Magnésio 10% Amp10ml Manip             |
| Sódio Cloreto + Potássio Cloreto + Soro Glicosado 5% | Mixistar Solução 0,4%                             |
|                                                      | Mixistar Solução 0,8%                             |
| <b>Estimulante Adrenérgico</b>                       |                                                   |
| Adrenalina                                           | Adren 1mg Amp 1ml                                 |
|                                                      | Efrinalin 1mg Amp 1ml                             |
|                                                      | Epifrin 1mg Amp 1ml                               |
| Dobutamina                                           | Dobtan 250mg Amp 20mL                             |
|                                                      | Dobutamina 250mg Amp 20mL (Novafarma)             |
|                                                      | Dobutrex 250mg Amp 20mL                           |
| Dopamina                                             | Dopacris 50mg Amp 10ml                            |
|                                                      | DoPAMina Cloridrato 50mg Amp 10ml (Teuto)         |
|                                                      | DoPAMina Cloridrato 50mg Amp 10ml (União Química) |
| Efedrina                                             | Efedrin Sulfato 50mg Amp 1ml                      |
|                                                      | Unifedrine 50mg/mL Amp 1mL                        |
| Fenilefrina                                          | Fenilefrin 1% 10mg Amp 1ml                        |

|               |                                       |
|---------------|---------------------------------------|
| Isoprenalina  | Isoproterenol 0,2mg Amp 1mL Manip     |
| Metaraminol   | Aramin 10mg Amp 1ml                   |
| Norepinefrina | Norepinefrina 8mg Amp 4ml             |
|               | Norepinefrina 8mg Amp 4mL (Novafarma) |

#### Estimulante da Formação de Células Sanguíneas

|                 |                              |
|-----------------|------------------------------|
| Filgrastim      | Filgrastim 300mcg FA 1mL     |
|                 | Filgrastine 300mcg FA 1mL    |
|                 | Filgrastine 300mcg Ser 0,5ml |
|                 | Granulokine 300mcg FA 1mL    |
|                 | Granulokine 300mcg Ser 0,5ml |
| Lipegfilgrastim | Lonquex 6mg Ser 0,6mL        |
| Pegfilgrastim   | Neulastim 6mg Ser 0,6ml      |
| Plerixafor      | Mozobil 20mg FA 1,2ml        |

#### Expansor de Volume Sanguíneo

|                                               |                                                   |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Albumina Humana                               | Albumina Humana 20% Fr 50ml (Baxter)              |
|                                               | Albumina Humana 20% Fr 50ml (Grifols)             |
|                                               | Albumina Sérica Humana 20% Bolsa 50ml (Baxter)    |
|                                               | Alburex 20 % Fr 50ml                              |
|                                               | Octalbin Albumina Humana 20% Fr 50ml (Octapharma) |
|                                               | Albiomin 20% Fr 50mL                              |
| Gelatina + Cloreto Sódio + Hidróxido de Sódio | Gelafundin 4% Fr 500ml                            |
| Hidroxietilamido                              | Plasmin 6% Bolsa 500ml                            |
|                                               | Venofundin 6% Ecoflac Bolsa 500ml                 |
|                                               | Voluven Solução 6% Bolsa 500ml                    |
| Solução de eletrólitos                        | Plasma Lyte Bolsa 500ml                           |

#### Fator de Coagulação

|                        |                                       |
|------------------------|---------------------------------------|
| Complexo Protrombínico | Beriplex P/n 500ui FA + Diluente 20ml |
|                        | Octaplex 500ui FA                     |
|                        | Prothromplex T 600ui FA               |

|                                                                 |                                 |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Fator de Von Willebrand + Fator VIII                            | Haemate P 500ui FA 20 mL        |
| Fator Recombinante de Coagulação VII A                          | Novoseven 50kui (1,0mg) Fr      |
| Gelatina + Trombina                                             | Floseal FA 5mL                  |
| Matriz Gelatinosa Derivada Bovina + Derivado de Trombina Humana | Floseal FA + Diluente + Ser 5ml |

#### Hormônio Androgênico

|                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| Nandrolona Decanoato       | Deca-durabolin 25mg FA 1ml |
| Undecilato de Testosterona | Nebido 1g Amp 4ml          |

#### Hormônio Antiestrogênico

|              |                        |
|--------------|------------------------|
| Fulvestranto | Faslodex 250mg Ser 5ml |
|              | Poemmy 250mg Ser 5ml   |

#### Hormônio Antiandrogênico

|             |                  |
|-------------|------------------|
| Ciproterona | Androcur 50mg Cp |
|-------------|------------------|

#### Hormônio Antidiurético

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| Desmopressina | Ddavp 4mcg Amp 1ml |
|               | Ddavp 0,1mg Cp     |

#### Hormônio Antitirodiano

|                 |                      |
|-----------------|----------------------|
| Propiltiouracil | Propil 100mg Cp      |
|                 | Propilracil 100mg Cp |
| Tiamazol        | Tapazol 5mg Cp       |

#### Hormônio Estrogênico

|                |                               |
|----------------|-------------------------------|
| Levornogestrel | Mirena 52mg Endoceptivo (DIU) |
|----------------|-------------------------------|

#### Imunoglobulina

|                             |                                 |
|-----------------------------|---------------------------------|
| Imunoglobulina Antitetânica | Tetanogamma 250ui Amp 1ml       |
| Imunoglobulina Humana       | Flebogamma Dif 5g (10%) Fr 50ml |

#### Imunomodulador

|             |                        |
|-------------|------------------------|
| Belimumabe  | Benlysta 120mg Fap     |
|             | Benlysta 400mg Fap     |
| Infliximabe | Remicade 100mg Fap     |
| Natalizumab | Tysabri 300mg Fap 15mL |

**Imunossupressor**

|                                              |                                            |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Azatioprina                                  | Imunen 50mg Cp                             |
|                                              | Imuran 50mg Cp Rev                         |
| Basiliximabe                                 | Simulect 20mg Fap 5ml                      |
| Ciclosporina                                 | Ciclosporina 100mg Cap (Germed)            |
|                                              | Sandimmun 50mg Amp 1ml                     |
|                                              | Sandimmun Neoral 100mg Cap                 |
|                                              | Sandimmun Neoral 100mg/ml Sol Oral Fr 50ml |
|                                              | Sandimmun Neoral 25mg Cap                  |
| Everolimo                                    | Certican 0,5mg Cp                          |
|                                              | Certican 0,75mg Cp                         |
| Imunoglobulina Antitimócito Humanos (COELHO) | Thymoglobuline 25mg FA                     |
| Micofenolato de Mofetila                     | Cellcept 500mg Cp                          |
| Micofenolato Sódico                          | Myfortic 180 mg Cp Rev                     |
|                                              | Myfortic 360mg Cp Rev                      |
| Sirolimus                                    | Rapamune 1mg Drg                           |
| Tacrolimo                                    | Prograf 1mg Cap                            |
|                                              | Prograf 5mg Amp 1ml                        |
|                                              | Prograf 5mg Cap                            |
|                                              | Tacrolimo 0,5mg Cap Manip                  |
|                                              | Tacrolimo 1mg Cap Secretaria da Saúde      |
|                                              | Tarfic 1mg Cap                             |
|                                              | Tarfic 5mg Cap                             |

**Inibidores da Reabsorção Óssea**

|                       |                                   |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Pamidronato Dissódico | Pamidrom 90mg FA 10ml             |
| Zoledrônico Ácido     | Aclasta 5mg Fr 100ml              |
|                       | Zometa 4mg FA                     |
|                       | Ácido Zoledrônico 4mg FA (Sandoz) |
|                       | Zolibbs 4mg FA                    |

**Irrigação Vesical**

|         |                               |
|---------|-------------------------------|
| Glicina | Glicina 1,5% Sol Bolsa 3000ml |
|---------|-------------------------------|

## Laxantes

|                                                                          |                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Bisacodil                                                                | Dulcolax 5mg Drg                                       |
| Bisacodil + Docusato Sódico                                              | Humectol D Cp Rev                                      |
| Fosfato de Sódio Dibásico + Fosfato de Sódio                             | Enemaplex Fosfatado Fr 130ml                           |
|                                                                          | Fleet Enema Fr 130ml                                   |
|                                                                          | Phosfoenema Fr 130ml                                   |
|                                                                          | Solução Fosfato Para Preparo Intestinal Fr 45 mL Manip |
| Glicerina                                                                | Glicerín Sup Adulto (EMS)                              |
|                                                                          | Clisterol / Soro Glicerinado 12% Fr 500mL              |
|                                                                          | Glicenax 12 Fr 500ml                                   |
|                                                                          | Glicerina 12% (120mg/ml) Fr 500ml (Halex Istar)        |
|                                                                          | Glicerina 12% Fr 500mL (Sanobiol)                      |
|                                                                          | Glicerina Adulto Sup (Pfizer)                          |
|                                                                          | Glicerina Adulto Sup (Pharmascience)                   |
|                                                                          | Glicerina Sup Adulto (Granado)                         |
| Lactitol                                                                 | Osmolac 10g Sachê                                      |
| Lactulose                                                                | Farlac 667mg/ml Xrp Fr 120ml                           |
|                                                                          | Lactulona 667mg/ml Xrp Fr 120ml                        |
| Macrogol + Bicarbonato de Sódio + Cloreto de Sódio + Cloreto de Potássio | Muvinlax 14g Sachê                                     |
| Óleo Mineral                                                             | Nujol Fr 120ml                                         |
| Prucaloprida                                                             | Resolor 1mg Cp Rev                                     |
| Picossulfato Sódico                                                      | Guttalax 7,5mg/mL Gts Fr 30mL                          |
| Plantago                                                                 | Metamucil 5,8g Env                                     |
|                                                                          | Plantaben 5g Env                                       |
| Sene + Associações                                                       | Naturetti Cap                                          |
|                                                                          | Tamarine Cap                                           |
|                                                                          | Tamarine Geléia Pote 150g                              |
| Sorbitol + Lauril Sulfato de Sódio                                       | Minilax 6,5g Bis                                       |

## Lubrificante Oftálmico

|                    |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| Ácido Poliacrílico | Refresh Gel 0,3% Gel Tubo     |
|                    | Vidisic Gel 0,2% Gel Tubo 10g |

|                                         |                                  |
|-----------------------------------------|----------------------------------|
| Álcool Polivinílico + Povidona          | Refresh Sol Oft Flac 0,4 mL      |
| Carboximetilcelulose Sódico (Carmelose) | Fresh Tears Colírio 0,5% Fr 10ml |
| Carmelose Sódica + Associações          | Optive Ud Flac 0,4ml             |
| Dextrano + Hipromelose + Poliquad       | Lacrima Plus Sol Oft Fr 15ml     |
| Hidroxipropilmetilcelulose              | Vistagel Ser 2,5ml               |
| Hialuronato de Sódio                    | Hyabak 0,15% Fr10ml Colírio      |

**Midriático**

|             |                                |
|-------------|--------------------------------|
| Atropina    | Atropina 0,5% Colírio Fr 5ml   |
| Fenilefrina | Fenilefrina 10% Sol Oft Fr 5ml |
| Tropicamida | Mydriacyl 1% Sol Oft Fr 5ml    |

**Mucolítico**

|                |                                      |
|----------------|--------------------------------------|
| Acetilcisteína | Acetilcisteína 200mg Env (EMS)       |
|                | Acetilcisteína 200mg Env (Eurofarma) |
|                | Flucistein 10% (300mg) Amp 3ml       |
|                | Fluimucil 10% (300mg) Amp 3ml        |
|                | Fluimucil 200mg Env                  |
|                | Fluimucil 600mg Cp Eferv             |

**Orexígeno**

|                                                     |              |
|-----------------------------------------------------|--------------|
| Cobamamida + Coenzima B12 + Vitaminas + Associações | Cobavital Cp |
| Vitamina A + Vitamina B12 + L Carnitina + L Lisina  | Carnabol Cp  |

**Otológico Tópico**

|                                   |                |
|-----------------------------------|----------------|
| Hidroxiquinolina + Trietanolamina | Cerumin Fr 8mL |
|-----------------------------------|----------------|

**Outros - Aparelho Cardiovascular**

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| Cumarina + Troxerrutina | Venalot Drg             |
| Diosmina+ Hesperidina   | Daflon 500mg Cp Rev     |
| Ivabradina              | Procoralan 5mg Cp Rev   |
| Monoetanolamina Oleato  | Ethamolin 100mg Amp 2ml |

|                                                                                                                      |                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Polidocanol                                                                                                          | Polidocanol 1% Amp 2ml Manip                   |
| Solução Cardioplégica                                                                                                | Solução Cardioplégica 10 mL Amp Manip          |
| <b>Outros - Aparelho Digestivo, Metabolismo e Nutrição</b>                                                           |                                                |
| Mesalazina                                                                                                           | Mesacol 250mg Sup                              |
|                                                                                                                      | Mesacol 400mg Cp Rev                           |
|                                                                                                                      | Mesalazina Envelope 3g + Frasco Enema 100ml    |
|                                                                                                                      | Pentasa 500mg Cp Lib Lenta                     |
| Saliva Artificial                                                                                                    | Saliform Saliva Artificial Spray Fr 40ml Manip |
|                                                                                                                      | Kin Hidrat Spray 40ml                          |
| <b>Outros - Aparelho Respiratório</b>                                                                                |                                                |
| Montelucaste Sódico                                                                                                  | Singulair 10mg Cp Mastig                       |
| <b>Outros - Dermatológicos, Otológicos e Oftálmicos</b>                                                              |                                                |
| Ácido Acético                                                                                                        | Ácido Acético 2% Fr 10ml Manip                 |
|                                                                                                                      | Ácido Acético 5% (50mg/mL) Fr 100mL            |
| Condroitina + Hialuronato                                                                                            | Discovisc Ser 1ml                              |
|                                                                                                                      | Viscoat Large Ser 0,75ml                       |
| Iodo + Iodeto                                                                                                        | Lugol 2% Fr 100mL Bico Dosador Manip           |
|                                                                                                                      | Lugol 2% Fr 50mL Bico Dosador Manip            |
| Pilocarpina                                                                                                          | Pilocarpina 2% Sol Oft 2% Fr 10ml              |
| Solução Salina: Cálcio Cloreto + Magnésio Cloreto + Potássio Cloreto + Sódio Acetato + Sódio Citrato + Sódio Cloreto | Bss Solução Salina Balanceada Fr 500mL         |
| <b>Outros - Hormônios e Metabolismo</b>                                                                              |                                                |
| Acetato de Degarelix                                                                                                 | Firmagon 80mg FA                               |
|                                                                                                                      | Firmagon 120mg FA                              |
| Glucagon                                                                                                             | Glucagen 1mg FA                                |
| Gosserrelina                                                                                                         | Zoladex La 10,8mg Ser                          |
|                                                                                                                      | Zoladex 3,6mg Ser                              |
| <b>Outros - Sangue e Órgãos Hematopoiéticos</b>                                                                      |                                                |
| Ciclo-taurolidina + Citrato + Uroquinase                                                                             | Tautolock U 25000 UI FA 5mL                    |
| Hialuronidase                                                                                                        | Hialuronidase 200ui Amp 1mL                    |

|                      |                              |
|----------------------|------------------------------|
| Hilano G-f 20        | Synvisc Classic 16mg Ser 2mL |
|                      | Synvisc One 48mg Ser 6ml     |
| Icatibanto           | Firazyr 30mg Ser 3ml         |
| Prasugrel Cloridrato | Effient 10mg Cp Rev          |

**Outros - Sistema Músculo Esquelético**

|            |                      |
|------------|----------------------|
| Denosumabe | Prolia 60mg Ser 1mL  |
|            | Xgeva 120mg FA 1,7mL |

**Outros - Sistema Nervoso**

|                        |                                 |
|------------------------|---------------------------------|
| Monossialogangliosídeo | Sygen 100mg Amp 5ml             |
| Riluzol                | Riluzol 50mg Cp Rev (Cristália) |
|                        | Fzolcris 50mg Cp Rev            |

**Outros - Aparelho Genitourinário**

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Citrato de Potássio | Litocit 10meq Cp |
|---------------------|------------------|

**Outros Medicamentos**

|                          |                                   |
|--------------------------|-----------------------------------|
| Extrato de Componentes   | Bioxtra Gel Oral Bis 40mL         |
| Fenol                    | Fenol 5% Amp 5ml                  |
| Nanquim                  | Nanquim Estéril Amp 2ml Manip     |
| N-butil-2-cianoacrilato  | Histoacryl Cola Amp               |
| Permanganato de Potássio | Permanganato de Potássio 100mg Cp |
| Sildenafil               | Revatio 20mg Cp Rev               |
| Verde Brilhante          | Verde Brilhante 2% Amp 10ml Manip |

**Psicoestimulante**

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| Metilfenidato | Ritalina 10mg Cp   |
| Modafinila    | Stavigile 200mg Cp |

**Quelante**

|             |                                   |
|-------------|-----------------------------------|
| Deferasirox | Exjade 250mg Cp Dispersível       |
| Sevelâmer   | Renagel 800mg Cp Rev              |
|             | Sevelamer Cloridrato 800mg Cp Rev |



## Relaxantes Musculares

|                                  |                                           |
|----------------------------------|-------------------------------------------|
| Alpinia Zerumbet                 | Ziclague 2,4mL Fr 30mL                    |
| Baclofeno                        | Lioresal 10mg Cp                          |
|                                  | Baclofen 10mg Cp (Teuto)                  |
|                                  | Baclofeno 10mg Cp (Teuto)                 |
|                                  | Baclofeno 10mg Cp (União Química)         |
| Ciclobenzaprina                  | Ciclobenzaprina 5mg Cp Rev (Biosintética) |
|                                  | Ciclobenzaprina 5mg Cp Rev (Eurofarma)    |
|                                  | Miosan 5mg Cp                             |
|                                  | Mirtax 5mg Cp Rev                         |
| Dantroleno Sódico                | Dantrolen 20mg FA                         |
| Dipirona + Orfenadrina + Cafeína | Dorflex Cp                                |
| Tiocolchicosídeo                 | Coltrax 4mg Amp 2ml                       |
|                                  | Coltrax 4mg Cp                            |
| Tizanidina                       | Sirdalud 2mg Cp                           |
| Toxina Botulínica Tipo A         | Botox 100u FA                             |
|                                  | Dysport 500UI FA                          |

## Resina de Troca Iônica

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| Cálcio Poliestirenosulfonato | Calnate 900mg/g Env 30g |
|                              | Sorcal 900mg/g Env 30g  |

## Solução para Conservação de Órgãos

|                                                                  |                                                                              |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Minerais + Histidina + Triptofano + Manitol + Alfa-cetoglutarato | Custodiol Bolsa 1000mL                                                       |
|                                                                  | Custodial Bolsa 2000mL                                                       |
| Solução de Conservação de Órgãos                                 | Sps-1 - Solução de Preservação de Órgãos 1000ml (Organ Recovery - Importado) |
|                                                                  | Solução Para Conservação de Órgãos Igl-1                                     |

## Solução para Diálise

|                    |                                                                  |
|--------------------|------------------------------------------------------------------|
| Citrato Trissódico | Citrato Trissódico 4% (40mg/ml) Bolsa 3000ml Manip (Life Pharma) |
|                    | Citrato Trissódico 4% (40mg/ml) Bolsa 3000ml Manip (Phynton)     |

|                                                                                                                                  |                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Solução Ácida Para Hemodiálise                                                                                                   | Cphd 22-90 Solução Ácida de Diálise 960ml                                     |
|                                                                                                                                  | Cphd 24-90 Solução Ácida de Diálise 960ml                                     |
|                                                                                                                                  | Cphd 32-90 Solução Ácida de Diálise 960ml                                     |
|                                                                                                                                  | Solução Ácida 22g/34 Na138 K2,0                                               |
|                                                                                                                                  | Solução Ácida 24g/34 Na138 K2,0                                               |
| Solução Básica de Diálise:<br>Bicarbonato de Sódio + Cloreto de Sódio + Glicose Anidra                                           | Solução Básica - Ds 138/35-90                                                 |
| Solução de Diálise : Bicarbonato de Sódio                                                                                        | Hd Bicarbonato de Sódio 8,4% Galão 5L                                         |
| Solução de Diálise Peritoneal                                                                                                    | Solução de Diálise Peritoneal Pd2 1,5% Glicose 6l                             |
|                                                                                                                                  | Solução de Diálise Peritoneal Pd2 2,5% Glicose 6l                             |
|                                                                                                                                  | Solução de Diálise Peritoneal Pd2 4,25% Glicose 6l                            |
| Solução de Diálise: Cloreto de sódio + Cloreto de Potássio + Associações                                                         | Hd 170 Bic Ac Potas Com Acetato Galão 5000 mL                                 |
| Solução de Diálise: Cloreto de sódio + Sulfato de Magnésio Heptaidratado s/ Glicose                                              | Solução de Diálise Hemolenta                                                  |
|                                                                                                                                  | Solução de Diálise 0,61%                                                      |
| Solução de Diálise: Cloreto de Sódio + Sulfato de Magnésio + Heptaidratado sem Glicose + Bicarbonato de Sódio                    | Solução de Diálise (Na + K + Mg + PO4 + HCO3 + Cl) Bolsa 5000mL (Life Pharma) |
| Solução de Diálise: Cloreto de Cálcio Diidratado + Cloreto de Sódio + Glicose + Cloreto de Magnésio Hexaidratado + Sódio Lactato | Bolsa Ultrabag 1,5% 2L                                                        |

### Terapêutica das Afecções Dermatológicas

|                       |                                                              |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------|
| Clostebol + Neomicina | Acetato de Clostebol + Sulfato de Neomicina Bis 30g (Medley) |
|                       | Novaderm Pomada Bis 30g                                      |
|                       | Trofodermin Creme Bis 30g                                    |
| Desonida              | Desonol Creme Tubo 30g                                       |

### Terapêutica Prostática

|                                        |                                            |
|----------------------------------------|--------------------------------------------|
| Citidina + Uridina + Hidroxocobalamina | Etna Cap                                   |
|                                        | Etna 10mg Pó Liófilo FA                    |
| Doxazosina                             | Carduran XI 4 mg Cp Lib Controlada         |
|                                        | Unoprost 2mg Cp                            |
| Dutasterida                            | Avodart 0,5mg Cap Gelatinosa Mole          |
|                                        | Combodart Cap                              |
|                                        | Dastene 0,5mg Cap Gelatinosa Mole          |
| Finasterida                            | Finasterida 5mg Cp (Biosintética)          |
|                                        | Finasterida 5mg Cp (EMS)                   |
|                                        | Finasterida 5mg Cp (Eurofarma)             |
|                                        | Finasterida 5mg Cp Rev (Medley)            |
|                                        | Finasterida 5mg Cp (Merck)                 |
|                                        | Proscar 5mg Cp                             |
| Tansulosina                            | Secotex Adv 0,4mg Cp Rev de Lib Controlada |
|                                        | Omnisc Oncas 0,4mg Cp Rev                  |
|                                        | Tansulosina 0,4mg Cap Lib Controlada Manip |
|                                        | Combodart Cap                              |

### Trombolíticos

|           |                  |
|-----------|------------------|
| Alteplase | Actilyse 50mg FA |
|           | Actilyse 10mg FA |

### Vacina Antitetânica

|                   |                                                                 |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Vacina Antitetano | Vacina Dupla Adulto (Antitetânica + Difteria) 10 Doses Fr 0,5mL |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------|

### Vacinas

|                                                       |                                  |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Bacillus de Calmette-Guérin Mycobacterium Bovis (BCG) | Imuno BCG 40mg Amp               |
| Vacina Contra Hepatite B                              | Euvax B Amp 1mL                  |
|                                                       | Vacina Engerix B Amp 1ml         |
| Vacina Pneumocócica                                   | Pneumo 23 Fr 0,5ml               |
|                                                       | Pneumovax Fr 0,5ml               |
|                                                       | Vacina Pneumocócica 23 (VALENTE) |

**Vasoconstritores e Hipertensores**

|              |                     |
|--------------|---------------------|
| Vasopressina | Encrise 20u Amp 1ml |
|--------------|---------------------|

**Vasodilatador Periférico, Cerebral**

|               |                                           |
|---------------|-------------------------------------------|
| Papaverina    | Hypoverin 100mg/2ml Amp                   |
|               | Papaverina Cloridrato 100mg Amp 2ml       |
| Pentoxifilina | Pentoxifilina 400mg Cp Rev Lib Prolongada |
|               | Trental 400mg Cp Rev                      |
|               | Vascer 100mg Amp 5mL                      |

**Vitaminas e Suplementos Minerais**

|                                                                                           |                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Arginina + Fosfoferina +<br>Fosfotreonina + Glutamina +<br>Tryptofana + Hidroxocobalamina | Forten Fr 10ml                                         |
| Benfotiamina                                                                              | Milgamma 150mg Cp                                      |
| Calcitriol                                                                                | Calcijex 1mcg Amp 1ml                                  |
|                                                                                           | Rocaltrol 0,25mcg Cap                                  |
|                                                                                           | Sigmatriol 0,25mcg Cap                                 |
| Vitamina + Poliminerais                                                                   | Centrum Cp                                             |
| Vitamina A + Vitamina D                                                                   | Ad-TIL Gts Fr 20ML                                     |
| Vitamina B1                                                                               | Benerva 300mg Cp                                       |
|                                                                                           | Tiamina 100mg/mL Amp 1mL Manip (Centro Paulista)       |
|                                                                                           | Tiamina 100mg/mL Amp 1mL Manip (Health Tech)           |
|                                                                                           | Tiamina 100mg/ml Amp 1ml Manip (Verbenna)              |
| Vitamina B1 + Vitamina B6 +<br>Vitamina B12                                               | Citoneurin 5000 Drg                                    |
|                                                                                           | Citoneurin 5000 Amp                                    |
|                                                                                           | Vitamina B1 + Vitamina B6 + Vitamina B12 Amp 1mL Manip |
| Vitamina B12                                                                              | Cronobê 5000mcg Amp 2,5ml                              |
| Vitamina B6                                                                               | Vitamina B6 100mg Cap Manip                            |
| Vitamina C                                                                                | Cewin 500mg Cp de Desintegração Lenta                  |
|                                                                                           | Cewin 1g Cp Efervescente S/Açúcar                      |
|                                                                                           | Vitamina C (ácido Ascórbico) 1g (200mg/ml) Amp         |
| Vitamina D3                                                                               | Addera D3 3300UI/mL Fr 10ml                            |

|                                  |                                             |
|----------------------------------|---------------------------------------------|
| Vitamina E                       | Emama 400mg Cap                             |
|                                  | Ephynal 400mg Cap                           |
| Vitaminas                        | Frutovitam Amp 10ml                         |
| Vitaminas + Ácido Fólico         | Cerne 12 Fr 5 mL                            |
| Vitaminas Complexo B s/ vit B1   | Complexo B (B2 + B3 + Pró Vitamina B5 + B6) |
| Vitaminas do Complexo B          | Hyplex B Amp 2mL                            |
| Zinco + Cobre + Manganês + Cromo | Ad-element Amp 2mL                          |
|                                  | Olig Trat Amp 2mL                           |

## MEDICAMENTOS PADRONIZADOS POR ORDEM ALFABÉTICA DE PRINCÍPIO ATIVO

### ABATACEPTE <sup>1</sup>

Antirreumático

Nome comercial:

Orencia 250 mg FA 15 mL + Seringa <sup>1\*</sup>

#### POSOLOGIA

##### Adultos:

|           |         |
|-----------|---------|
| < 60 kg:  | 500 mg  |
|           | 750 mg  |
| > 100 kg: | 1000 mg |

##### Crianças 6 a 17 anos:

*Artrite Idiopática Juvenil:*

|          |                                        |
|----------|----------------------------------------|
| < 75 kg: | 10 mg/kg                               |
| > 75 kg: | seguir esquema posológico para adultos |

##### ► Ajuste de dose:

Não é necessário ajuste

##### ► ADMINISTRAÇÃO

Intravenoso

Diluir a dose recomendada em 100 mL de SF e infundir por 30 min. Após infusão inicial, administrar na 2ª e 4ª semana, e depois a cada 4 semanas.

##### ► ARMAZENAMENTO:

Conservar sob refrigeração em temperatura entre 2°C e 8°C, protegido da luz.

Após diluição: estabilidade de 24 horas.

##### ► Atenção

\* Este medicamento é livre de látex.

### ABCIXIMABE <sup>1</sup>

Antiagregante Plaquetário

Nome comercial:

Reopro 10 mg (2 mg/mL) Fr 5 mL<sup>1</sup>

#### POSOLOGIA

##### Adultos:

IV direto: 0,25 mg/kg

IV: 0,125 mcg/kg/min

##### ► Ajuste de dose:

Não há ajuste especificado.

##### ► ADMINISTRAÇÃO

Intravenoso

Injeção direta, sem diluição, por 1 min, 10 a 60 min antes da intervenção, seguido de infusão por 12 horas (10mg em 250mL SF/SG 5%).

##### ► ARMAZENAMENTO:

Conservar sob refrigeração em temperatura entre 2°C e 8°C, protegido da luz.

Após diluição: estabilidade de 24 horas em temperatura de 2°C a 8°C.

**ACETATO DE DEGARELIX <sup>1</sup>**

Antineoplásico Imunoestimulante

Nome comercial:

Firmagon 80 mg FA 6 mL<sup>1\*</sup>Firmagon 120 mg FA 6 mL<sup>1\*</sup>**POSOLOGIA****Adultos:**

Dose inicial: 240 mg (2 injeções de 120 mg)

Dose de manutenção: 80 mg, a depender da indicação e esquema Quimioterápico.

▶ **Ajuste de dose:**

Não é necessário ajuste

▶ **ADMINISTRAÇÃO**

Subcutâneo

Injeções na região abdominal

Administrar dose de manutenção mensalmente. Preparo na quimioterapia.

▶ **ARMAZENAMENTO:**

Conservar em local fresco (temperatura máxima de 30°C).

Após diluição: estabilidade de 2 horas.

▶ **Atenção**

\* Estas apresentações são livres de látex.

**ACETAZOLAMIDA <sup>1,2</sup>**

Diurético

Nome comercial:

Diamox 250 mg Cp <sup>1,2</sup>**POSOLOGIA****Adultos:**

|                                    |                                                                          |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Glaucoma simples:                  | 250 a 1000 mg/dia                                                        |
| Glaucoma secundário:               | 250 mg a cada 12 ou 4 horas.                                             |
| Epilepsia:                         | 8 a 30 mg/kg/dia                                                         |
| Insuficiência Cardíaca Congestiva: | 250 a 375 mg/dia, pela manhã.                                            |
| Edema Induzido por medicamento:    | 250 a 375 mg/dia, por um ou dois dias alternando com um dia de descanso. |
| Doença aguda das montanhas         | 500 a 1000 mg/dia                                                        |

▶ **Ajuste de dose:**

|                                  |                          |                                                 |
|----------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|
| Clearance de creatinina (mL/min) | < 10 (ou em hemodiálise) | 10-50                                           |
| Regime terapêutico               | Contraindicado           | Reduzir dose pela metade ou intervalo de 12/12h |

▶ **ADMINISTRAÇÃO:**

Oral

- ▶ **Administração via sonda:**  
Triturar e dispersar em 15ml de água, após dissolução administrar imediatamente
- ▶ **ARMAZENAMENTO:**  
Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

ACETILCISTEÍNA <sup>1,2</sup>

Mucolítico

Nome comercial:  
Acetilcisteína 10% (300mg) Amp 3mL (União Química) <sup>1,2</sup>  
Fluimucil 10% (300 mg) Amp 3mL <sup>1,2</sup>  
Flucistein 10% (300 mg) Amp 3mL <sup>1,2</sup>

POSOLOGIA

Adultos e crianças:

|                               |                   |              |
|-------------------------------|-------------------|--------------|
| Mucolítico                    | 300 mg Inalatório |              |
| Intoxicação por acetaminofeno | Dose de ataque:   | 150 mg/kg IV |
|                               | Segunda dose:     | 50 mg/kg IV  |
|                               | Terceira dose:    | 100 mg/kg IV |

- ▶ **Ajuste de dose:**  
Não é necessário ajuste
- ▶ **ADMINISTRAÇÃO:**  
Inalatório  
Nebulização da dose, diluída ou não em igual quantidade de SF, a cada 12 horas.  
Intravenoso  
Infusão da dose de ataque de 150 mg/kg de peso diluídos em 200 mL de SF ou SG 5% por 60 minutos; a seguir 50 mg/kg diluídos em 500 mL infundidos por 4 horas, seguidos de 100mg/kg diluídos em 1000 mL por 16 horas.
- ▶ **ARMAZENAMENTO:**  
Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.  
Após aberto, para uso intravenoso: utilizar imediatamente.  
Após aberto, para uso inalatório: estabilidade de 24 horas em temperatura entre 2°C a 8°C.

ACETILCISTEÍNA <sup>1,2</sup>

Mucolítico

Nome comercial:  
Acetilcisteína 200mg Env (EMS) <sup>1,2</sup>  
Acetilcisteína 200mg Env (Eurofarma) <sup>1,2</sup>  
Fluimucil 200mg Granulado Env <sup>1,2</sup>  
Fluimucil 600mg Cp Eferv <sup>1</sup>

POSOLOGIA

Adultos:

|                               |                      |                                      |
|-------------------------------|----------------------|--------------------------------------|
| Afecções pulmonares           | 200 a 400 mg         | 2 a 3 vezes ao dia                   |
|                               | 600 mg               | 1 vez ao dia, de preferência à noite |
| Intoxicação por acetaminofeno | Dose de ataque:      | 140 mg/kg                            |
|                               | Doses de manutenção: | 70 mg/kg                             |



**Crianças:**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                        |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|
| Afecções pulmonares                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 100 a 200 mg                           | 2 a 4 vezes ao dia |
| Intoxicação por acetaminofeno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | seguir esquema posológico para adultos |                    |
| <p>► <b>Ajuste de dose:</b><br/>Não é necessário ajuste</p> <p>► <b>ADMINISTRAÇÃO:</b><br/>Oral<br/>Diluir em 150 mL de água.<br/>Esquema para intoxicação: 140 mg/kg de peso; a seguir 70 mg/kg a cada 4 horas por 1 a 3 dias.</p> <p>► <b>Administração via sonda:</b><br/>Dissolver completamente a dose em água e administrar.</p> <p>► <b>ARMAZENAMENTO:</b><br/>Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C, protegido da umidade.<br/>Após dissolvido, utilizar imediatamente.</p> |                                        |                    |

**ACICLOVIR <sup>1,2</sup>**

Antiviral

Nome comercial:  
Zovirax 50mg/g Creme Bis 10g <sup>1,2</sup>  
Aciclovir 50mg/g Creme Bis 10g (EMS) <sup>1,2</sup>

**POSOLOGIA**

**Adultos e crianças:**

Aplicar quantidade suficiente para cobrir a região afetada, 5 vezes ao dia, suprimindo-se a aplicação noturna, durante 5 dias.

- **ADMINISTRAÇÃO:**  
Tópico
- **ARMAZENAMENTO:**  
Conservar em temperatura abaixo de 30°C.

**ACICLOVIR <sup>1,2</sup>**

Antiviral

Nome comercial:  
Aciclovir 200 mg Cp (Biosintética) <sup>1,2</sup>  
Aciclovir 200 mg Cp (Merck) <sup>1,2</sup>  
Aciclovir 200 mg Cp (Neo Química) <sup>1,2</sup>  
Aciclovir 200 mg Cp (Prati Donaduzzi) <sup>1,2</sup>  
Antivirax 200mg Cp <sup>1,2</sup>  
Uni-vir 200 mg Cp <sup>1,2</sup>  
Zovirax 200 mg Cp <sup>1,2</sup>

**POSOLOGIA**

**Adultos e crianças:**

|                                      |                                                            |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Herpes simples                       | 200 mg, 5 vezes/dia, omitindo-se dose noturna, por 5 dias. |
| Herpes simples em imunocomprometidos | 200 mg, 4 vezes/dia                                        |

|                                                          |                                                           |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Herpes Zoster                                            | 800 mg, 5 vezes/dia, omitindo-se dose noturna, por 7 dias |
| Herpes Zoster em pacientes seriamente imunocomprometidos | 800 mg, 4 vezes/dia                                       |

► **Ajuste de dose:**

|                                  |        |       |
|----------------------------------|--------|-------|
| Clearance de creatinina (mL/min) | < 10   | 10-50 |
| Regime terapêutico               | 12/12h | 8/8h  |

► **ADMINISTRAÇÃO:**

Oral

► **Administração via sonda:**

Triturar e dispersar em 40mL de água, após dissolução administrar imediatamente.

► **ARMAZENAMENTO:**

Conservar em temperatura abaixo de 30°C.

## ACICLOVIR <sup>1,2</sup>

Antiviral

Nome comercial:

Zovirax 250 mg FA <sup>1,2</sup>

Zynvir Aciclovir 250 mg FA <sup>1,2</sup> \*

Uni-vir Aciclovir 250 mg FA <sup>1,2</sup>

### POSOLOGIA

**Adultos e criança > 12 anos:**

|                                                                   |                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Herpes simples/Varicela Zoster/ HSV mucocutâneo                   | 5 mg/kg a cada 8 horas.                                                |
| Varicela Zoster em imunodeprimidos ou meningoencefalite herpética | 10 mg/kg a cada 8 horas.                                               |
| Profilaxia para CMV em transplantados de medula óssea             | 500 mg/m <sup>2</sup> a cada 8h durante 5 a 30 dias após o transplante |

► **Ajuste de dose:**

|                                  |                            |             |             |
|----------------------------------|----------------------------|-------------|-------------|
| Clearance de creatinina (mL/min) | < 10                       | 10 - 25     | 25 - 50     |
| Regime terapêutico               | Metade da dose a cada 24 h | A cada 24 h | A cada 12 h |

► **ADMINISTRAÇÃO:**

Intravenoso

Reconstituir em 10 mL de água destilada.

Dose 250 - 500 mg: Diluir em 100 mL SF, infundir por 1 hora.

Dose 500 - 1000 mg: Diluir em 250 mL SF, infundir por 1 hora

Concentração máxima de diluição: 10 mg/mL.

► **ARMAZENAMENTO:**

Conservar em temperatura abaixo de 25°C, protegido da umidade.

Após preparado: estabilidade de 12 horas em temperatura de 15°C a 25°C.

► **Atenção**

\* Este medicamento é livre de látex.

Nome comercial:  
Ácido acético 2% (20mg/mL) Fr 10mL <sup>1</sup>  
Ácido acético 5% (50mg/mL) Fr 100mL <sup>1,2</sup>

**POSOLOGIA**

A critério médico.

- ▶ **ARMAZENAMENTO:**  
Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

ÁCIDO ACETILSALICÍLICO <sup>1,2</sup> Analgésico, Antipirético, Antiagregante Plaquetário

Nome comercial:  
AAS Infantil 100mg Cp <sup>1,2</sup>

**POSOLOGIA**

**Adultos e crianças:**

|                           |                                   |                                  |
|---------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| Analgésico/Antipirético   | 325 a 650 mg, a cada 4 ou 6 horas |                                  |
| Anti-inflamatório         | Dose inicial:                     | 2,4 a 3,6 g/dia, doses divididas |
|                           | Doses de manutenção:              | 3,6 a 5,4 g/dia, doses divididas |
| Antiagregante plaquetário | 75 a 325 mg/dia                   |                                  |

- ▶ **Ajuste de dose:**  
Evitar uso em pacientes com insuficiência renal severa (ClCr < 10) e insuficiência hepática.
- ▶ **ADMINISTRAÇÃO:**  
Oral
- ▶ **Administração com alimentos:**  
Administrar, preferencialmente, após as refeições ou com volume grande de água ou de leite. Evitar ingestão de frutas frescas contendo vitamina C, bebidas alcoólicas, alho, angélica chinesa, Artemísia, castanha da índia, chá verde, gengibre, ginseng, ginkgo, prímula, trevo vermelho, unha de gato, pó de curry, páprica, ameixas, uvas-passas, chá-preto, pickles e alcaçuz.
- ▶ **Administração via sonda:**  
Pode ser administrado via sonda. Triturar e dispersar em 10ml de água, após dissolução administrar imediatamente
- ▶ **ARMAZENAMENTO:**  
Conservar em temperatura abaixo de 40°C, protegido da umidade.

ÁCIDO ACETILSALICÍLICO  
TAMPONADO <sup>1,2</sup>

Analgésico, Antipirético, Antiagregante Plaquetário

Nome comercial:  
Aspirina Prevent 100mg Cp <sup>1,2</sup>  
Somalgin Cardio 100mg Cp <sup>1,2</sup>

**POSOLOGIA****Adultos:**

|                                                                                                                                                                                                   |                                                                     |                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Prevenção primária de infarto do miocárdio<br>Angina estável crônica                                                                                                                              | 81 a 162 mg/dia                                                     |                             |
| Síndromes coronarianas agudas<br>Prevenção secundária de infarto do miocárdio                                                                                                                     | Dose inicial:                                                       | 81 a 325 mg                 |
|                                                                                                                                                                                                   | Doses de manutenção:                                                | 81 a 162 mg/dia             |
| AVC agudo isquêmico (pacientes que não receberão trombólise)                                                                                                                                      | 162 a 325 mg/dia<br>(preferencialmente nas primeiras 48h do evento) |                             |
| - Prevenção primária de AVC em pacientes que apresentaram AIT<br>- Prevenção secundária de AVC não cardioembólico<br>- Prevenção de tromboembolismo após cirurgia vascular ou outras intervenções | 81 a 325 mg/dia                                                     |                             |
| Prevenção de trombose venosa profunda e embolia pulmonar após imobilização prolongada                                                                                                             | 81 a 200 mg/dia ou, 325mg a cada 48 horas                           |                             |
| Analgésico/Antipirético/Anti-inflamatório                                                                                                                                                         | Dose inicial:                                                       | 750 mg                      |
|                                                                                                                                                                                                   | Doses de manutenção:                                                | 325 mg, a cada 6 ou 8 horas |

▶ **Ajuste de dose:**

Evitar uso em pacientes com insuficiência renal severa (ClCr < 10) e insuficiência hepática.

▶ **ADMINISTRAÇÃO:**

Oral

▶ **Administração com alimentos:**

Administrar com bastante líquidos, de preferência, antes das refeições. Evitar o consumo de bebidas alcoólicas, alho, angélica chinesa, Artemísia, castanha da Índia, chá verde, gengibre, ginseng, ginkgo, primula, trevo vermelho, unha de gato, pó de curry, páprica e alcaçuz.

▶ **ARMAZENAMENTO:**

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C, protegido da umidade.

**ÁCIDO EPSILON AMINOCAPRÓICO <sup>1,2</sup>**

Hemostático

Nome comercial:

Ipsilon 1g FA 20mL <sup>1,2</sup>

**POSOLOGIA****Adultos:**

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Dose inicial:        | 4 a 5 g |
| Doses de manutenção: | 1 g/h   |

**Crianças:**

100 a 200 mg/kg, diariamente, divididos em três a quatro vezes.

▶ **Ajuste de dose:**

Pode ser necessário reduzir as doses, monitorar.

▶ **ADMINISTRAÇÃO:**

Intravenoso

Intravenosa direta: sem diluição, na velocidade máxima de 50 mg/min.

Infusão intermitente: diluir a dose em 100 a 250 mL de SF/SG 5% por 1 hora.

Infusão contínua: diluir a dose de 2000 mg em 500mL SF/SG 5% e administrar na taxa de 1 g/h.

▶ **ARMAZENAMENTO:**

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C, protegido da umidade e luz solar direta.

**ÁCIDO EPSILON AMINOCAPROICO <sup>1</sup>**

Hemostático

Nome comercial:

Ipsilon 500mg Cp <sup>1</sup>

**POSOLOGIA****Adultos:**

2 a 4 cp, a cada 8 ou 6 horas

**Crianças:**

100 a 200 mg/kg, diariamente, divididos em três a quatro vezes.

▶ **Ajuste de dose:**

Pode ser necessário reduzir as doses, monitorar.

▶ **ADMINISTRAÇÃO:**

Oral

▶ **Administração via sonda:**

Triturar e dispersar em 20ml de água, após dissolução administrar imediatamente

▶ **ARMAZENAMENTO:**

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C, protegido da umidade e luz solar direta.

**ÁCIDO FÓLICO <sup>1,2</sup>**

Antianêmico

Nome comercial:

Endofolin 5mg Cp Rev <sup>1,2</sup>

**POSOLOGIA****Adultos:**

5 mg a cada 24 h

▶ **Ajuste de dose:**

Pode ser necessário ajustes de doses.

▶ **ADMINISTRAÇÃO:**

Oral

▶ **Administração via sonda:**

Pode ser administrado via sonda. Triturar e dispersar em 20ml de água, após dissolução administrar imediatamente

▶ **ARMAZENAMENTO:**

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C, protegido da luz e umidade.

## ÁCIDO FÓLICO + FERROCARBONILA + CÁLCIO PANTOTÊNICO + VITAMINAS + POLIMINERAIS <sup>1</sup>

Antianêmico

Nome comercial:

Combiron Fólico Cp Rev <sup>1,2</sup>

### POSOLOGIA

#### Adultos:

1 cp rev a cada 24 h

#### ► Ajuste de dose:

Pode ser necessário reduzir as doses, monitorar.

#### ► ADMINISTRAÇÃO:

Oral

#### ► Administração com alimentos:

Administrar antes das refeições. Evitar a ingestão de fitatos, laticínios, proteína de soja, soja, chá verde e chá preto.

#### ► ARMAZENAMENTO:

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C, protegido da luz e umidade.

## ÁCIDO FUSÍDICO <sup>1</sup>

Antimicrobiano Tópico

Nome comercial:

Verutex Creme Bis 15g <sup>1</sup>

### POSOLOGIA

#### Adultos:

Aplicar sobre a área afetada, 2 a 3 vezes/dia até obtenção de resultado favorável.

#### ► ADMINISTRAÇÃO:

Tópica

#### ► ARMAZENAMENTO:

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

#### ► Atenção:

Receita Branca (2 vias).

## ÁCIDO GADOTÉRICO <sup>1</sup>

Contraste

Nome comercial:

Dotarem 5mmol (0,5mmol/ml) FA 10ml <sup>1\*</sup>

Dotarem 7,5mmol (0,5mmol/ml) FA 15ml <sup>1\*</sup>

Dotarem 10mmol (0,5mmol/ml) FA 20ml <sup>1\*</sup>

### POSOLOGIA

#### Adultos:

A critério médico.

#### ► ADMINISTRAÇÃO:

Intravenosa

#### ► ARMAZENAMENTO:

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

#### ► Atenção

\* Estas apresentações são livres de látex.

## ÁCIDO GRAXOS ESSENCIAIS (A.G.E.)<sup>1,2</sup>

Hidratante, Protetor Epidérmico

Nome comercial:

Supriderme Óleo com Calêndula/Curativo Age 100mL<sup>1,2</sup>

### POSOLOGIA

#### Adultos e Crianças:

Aplicar sobre a pele higienizada, 3 vezes/dia. Aplicar apenas sobre a pele íntegra.

#### ► ADMINISTRAÇÃO:

Tópica

#### ► ARMAZENAMENTO:

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

## ÁCIDO POLIACRÍLICO<sup>1,2</sup>

Lubrificante Oftálmico

Nome comercial:

Refresh 0,3% Gel Tubo 10g<sup>1</sup>

Vidisic Gel 2 mg/g Gel Tubo 10g<sup>1,2</sup>

### POSOLOGIA

#### Adultos e Crianças:

1 gota, 2 a 4 vezes/dia.

#### ► ADMINISTRAÇÃO:

Oftálmica

Instilar no saco conjuntival.

#### ► ARMAZENAMENTO:

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

Após aberto: estabilidade de 30 dias.

#### ► Atenção:

Não utilizar lentes de contato durante a aplicação.

## ÁCIDO TRANEXÂMICO<sup>1</sup>

Hemostático

Nome comercial:

Transamin 250 mg Cp<sup>1</sup>

Ácido Tranexâmico 250 mg Cp (EMS)<sup>1</sup>

### POSOLOGIA

#### Adultos:

Fibrinólise local:

15 a 25 mg/kg, a cada 12 ou 8 horas.

#### Crianças:

Fibrinólise local:

10 mg/kg, a cada 12 ou 8 horas

#### ► Ajuste de dose:

| Clearance de creatinina (mL/min) | < 10                   | 10-50                  | >50                    |
|----------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Regime terapêutico               | 10% ou 15 mg/kg 48/48h | 25% ou 15 mg/kg 24/24h | 50% ou 15 mg/kg 12/12h |

► **ADMINISTRAÇÃO:**

Oral

► **Administração via sonda:**

Pode ser administrado via sonda. Triturar e dispersar em 10ml de água, após dissolução administrar imediatamente.

► **ARMAZENAMENTO:**

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

## ÁCIDO TRANEXÂMICO <sup>1,2</sup>

Hemostático

Nome comercial:

Transamin 250mg Amp 5mL <sup>1,2</sup>

Ácido Tranexâmico 250mg (50mg/ml) Amp 5mL (Blausiegel) <sup>1,2</sup>

Ácido Tranexâmico 250mg (50mg/ml) Amp 5mL (Hipolabor) <sup>1,2</sup>

### POSOLOGIA

#### Adultos:

|                                       |                     |                              |
|---------------------------------------|---------------------|------------------------------|
| Fibrinólise local                     | Dose inicial:       | 500 a 1000mg, a cada 8 horas |
|                                       | Dose de manutenção: | 25 a 50mg/kg/dia             |
| Fibrinólise sistêmica                 | 1000mg dose única   |                              |
| Neutralização de terapia trombolítica | 10mg/kg             |                              |

#### Crianças:

|                    |                                |
|--------------------|--------------------------------|
| Fibrinólise local: | 10 mg/kg, a cada 12 ou 8 horas |
|--------------------|--------------------------------|

► **Ajuste de dose:**

|                                  |                        |                        |                        |
|----------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Clearance de creatinina (mL/min) | < 10                   | 10-50                  | >50                    |
| Regime terapêutico               | 10% ou 15 mg/kg 48/48h | 25% ou 15 mg/kg 24/24h | 50% ou 15 mg/kg 12/12h |

► **ADMINISTRAÇÃO:**

Intravenoso

Intravenosa direta: sem diluição, na velocidade máxima de 1 mL/min.

Infusão intermitente: diluir a dose em 100 mL de SF/SG 5% por 1 hora.

► **ARMAZENAMENTO:**

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

Após aberto: estabilidade de 4 horas em temperatura ambiente.

## ÁCIDO URSODESOXICÓLICO <sup>1,2</sup>

Digestivo

Nome comercial:

Ursacol 150mg Cp <sup>1,2</sup>

### POSOLOGIA



**Adultos:**

|                                                  |                               |
|--------------------------------------------------|-------------------------------|
| Dissolução de cálculos biliares                  | 300 a 600 mg, a cada 24 horas |
| Sintomas dispépticos e manutenção                | 150 mg, a cada 12 horas       |
| Terapia coadjuvante da litotripsia extracorpórea | 600 mg, a cada 24 horas       |
| Cirrose biliar primária                          | 10 a 16 mg/kg/dia             |

- ▶ **Ajuste de dose:**  
Não é necessário ajuste
- ▶ **ADMINISTRAÇÃO**  
Oral
- ▶ **Administração com alimentos:**  
Administrar o medicamento com alimentos.  
Não administrar junto com antiácidos e/ou sequestrantes ácidos da bile.
- ▶ **Administração via sonda:**  
Pode ser administrado via sonda. Triturar e dispersar em 10ml de água, após dissolução administrar imediatamente
- ▶ **ARMAZENAMENTO**  
Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

**ADALIMUMABE <sup>1</sup>**

Antirreumático

Nome comercial:  
Humira 40mg Ser 0,8mL <sup>1</sup>

**POSOLOGIA**

**Adulto:**

|                        |                                                                                                                                                                             |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artrite Reumatoide     | 40mg, a cada 14 dias                                                                                                                                                        |
| Artrite Psoriásica     | 40mg, a cada 14 dias                                                                                                                                                        |
| Espondiloartrite Axial | 40mg, a cada 14 dias                                                                                                                                                        |
| Doença de Crohn        | - Semana 0: 4 injeções de 40mg por dia, por 2 dias consecutivos<br>- Semana 2: 2 injeções de 40mg em um dia<br>- Dose manutenção: a partir da semana 4, 40mg a cada 14 dias |
| Colite ulcerativa      | - Semana 0: 4 injeções de 40mg por dia, por 2 dias consecutivos<br>- Semana 2: 2 injeções de 40mg em um dia<br>- Dose manutenção: 40mg, a cada 14 dias                      |
| Psoríase em Placas     | 2 injeções de 40mg, seguidas de 40mg em semanas alternadas, uma semana após a dose inicia                                                                                   |
| Hidradenite Supurativa | 4 injeções de 40mg, seguidas de 2 injeções de 40mg duas semanas depois, no dia 15. No dia 29 continuar com uma dose de 40mg, a cada 7 dias                                  |
| Uveíte                 | 2 injeções de 40mg, seguidas de doses de 40mg em semanas alternadas, começando na semana seguinte à dose inicial                                                            |

**Criança:**

|                            |  |                             |
|----------------------------|--|-----------------------------|
| Artrite idiopática juvenil |  | 20mg, em semanas alternadas |
|----------------------------|--|-----------------------------|

▶ **Ajuste de dose:**

Não é necessário ajuste de dose.

▶ **ADMINISTRAÇÃO**

Subcutânea e Intravenosa

Subcutânea: Aplicar no abdome ou na face anterior da coxa.

Intravenosa: Infundir de 3 a 5 minutos.

▶ **ARMAZENAMENTO**

Conservar em refrigeração entre 2°C e 8°C.

▶ **Atenção:**

Alto Custo.

**ADENOSINA** <sup>1,2</sup>

Antiarrítmico

Nome comercial:

Adenocard 6 mg (3mg/mL) Amp 2mL <sup>1,2</sup>

**POSOLOGIA****Adulto:**

|                                           |                                                                                      |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Dose padrão                               | Infusão de 6mg                                                                       |
| Administração subsequente (se necessário) | Segunda ou terceira dose de 12mg após 1 a 2 minutos em caso de persistência cardíaca |

▶ **Ajuste de dose:**

Não é necessário ajuste de dose.

▶ **ADMINISTRAÇÃO**

Intravenosa

Administrar diretamente durante 1 a 2 segundos, em acesso periférico.

▶ **ARMAZENAMENTO**

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C. Não deve ser refrigerado, risco de cristalização.

**ADIFENINA + DIPIRONA + PROMETAZINA** <sup>1,2</sup>

Analgésico e Antipirético

Nome comercial:

Lisador Gts Fr 15mL <sup>1,2</sup>

Dorilen Gts Fr 15mL (Adifenina 10mg + Dipirona 500mg + Prometazina 5mg) <sup>1,2</sup>

**POSOLOGIA****Adulto e Adolescente (> 15 anos de idade):**

|             |                               |
|-------------|-------------------------------|
| Dose padrão | 20 a 40 gotas, uma vez ao dia |
| Dose máxima | 160 gotas ao dia              |

**Criança:**

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| 5 a 8kg (3 a 11 meses) | 2 a 5 gotas  |
| 9 a 15kg (1 a 3 anos)  | 3 a 10 gotas |

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| 16 a 23kg (4 a 6 anos)   | 5 a 15 gotas  |
| 24 a 30kg (7 a 9 anos)   | 8 a 20 gotas  |
| 31 a 45kg (10 a 12 anos) | 10 a 30 gotas |
| 46 a 53kg (13 a 14 anos) | 15 a 35 gotas |

- ▶ **Ajuste de dose:**  
Não é necessário ajuste de dose.
- ▶ **ADMINISTRAÇÃO**  
Oral
- ▶ **Administração via sonda:**  
Pode ser administrado via sonda. Diluir em 10mL de água para cada 30 gotas, administrando imediatamente.
- ▶ **ARMAZENAMENTO**  
Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

## ADIFENINA + DIPIRONA + PROMETAZINA <sup>1</sup>

Analgésico e Antipirético

Nome comercial:

Lisador (Adifenina 10mg + Dipirona 500mg + Prometazina 5mg) Cp <sup>1</sup>

### POSOLOGIA

#### Adulto:

Dose padrão

1 a 2 comprimido, a cada 6 horas

- ▶ **Ajuste de dose:**  
Não é necessário ajuste de dose.
- ▶ **ADMINISTRAÇÃO**  
Oral
- ▶ **Administração via sonda:**  
Pode ser administrado via sonda. Triturar e diluir em 20mL de água, administrando imediatamente.
- ▶ **ARMAZENAMENTO**  
Evitar calor excessivo (temperatura superior a 40°C). Proteger da luz e umidade.

## ADRENALINA <sup>1,2</sup>

Estimulante Adrenérgico

Nome comercial:

Adren 1mg Amp 1mL <sup>1,2</sup>

Efrinalin 1mg Amp 1mL <sup>1,2</sup>

Epifrin 1mg Amp 1mL <sup>1,2</sup>

### POSOLOGIA

#### Adulto:

|                                  |                                                                                  |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Choque Anafilático               | 0,5mL, a cada 5 minutos quando necessário                                        |
| Suporte Intensivo Cardiovascular | 1mg, repetida quantas vezes for necessário.<br>Intervalo mínimo de 2 a 3 minutos |
| Exacerbação Aguda da Asma        | 0,3 a 0,5mL, a cada 4 ou 6 horas                                                 |

**Criança:**

|                    |                                                                                                                                  |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Choque Anafilático | 50µg para crianças com menos de 6 meses; 120µg para crianças de 6 meses e 6 anos de idade; 250µg para crianças entre 6 e 12 anos |
| Broncodilatador    | 0,01 a 0,3mg, em intervalos de 20 minutos ou a cada 4 horas, se necessário                                                       |

▶ **Ajuste de dose:**

Não é necessário ajuste de dose.

▶ **ADMINISTRAÇÃO**

Intravenosa, Intramuscular e Subcutânea

Intravenosa direta: - Adultos: infundir de 3 a 5 minutos

- Criança: diluir até a concentração máxima

Intravenosa intermitente: - Adulto: administrar em acesso central, iniciando-se 1mcg/min.

- Criança: diluir em SF numa concentração máxima de 64µg/mL e infundir numa velocidade de 0,1mcg/kg/min.

▶ **ARMAZENAMENTO**

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

▶ **Atenção:**

Alta vigilância.

**AGOMELATINA <sup>1</sup>**

Antidepressivos

Nome comercial:

Valdoxan 25mg Cp Rev <sup>1</sup>

**POSOLOGIA****Adulto:**

|             |                                                                                           |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dose padrão | 25mg, ao deitar-se. Após duas semanas, se não houver melhoras, aumentar para 50mg ao dia. |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|

▶ **Ajuste de dose:**

Insuficiência hepática: uso contraindicado.

▶ **ADMINISTRAÇÃO**

Oral

▶ **Administração com alimentos:**

Evitar o consumo de álcool.

▶ **ARMAZENAMENTO**

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

**ÁGUA DESTILADA <sup>1,2</sup>**

Eletrólito, Diluente

Nome comercial:

Água Destilada Fr 1000mL <sup>1</sup>

Água Destilada (Deionizada) 1L <sup>1</sup>

Água Bidestilada Bolsa 1000mL (Halex Istar) <sup>1</sup>

Água Bidestilada Fr 1000mL (Eurofarma) <sup>1,2</sup>

Água Bidestilada Fr 1000mL(Fresenius Kabi) <sup>1,2</sup>

**POSOLOGIA****Adultos e Crianças:**

Dose usual: utilizar como diluente, a critério médico.

► **ADMINISTRAÇÃO**

Diluyente

► **ARMAZENAMENTO**

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

## **ALANTOÍNA + FOMBLIN**

### **+ ÓLEO DE SILICONE <sup>1</sup>**

Hidratante, Protetor Epidérmico

Nome comercial:

Fomblin 3% + Alantoína 1% + Óleo de Silicone Creme Tubo 100g <sup>1</sup>

Clob-x Creme Bisnaga 30g <sup>1</sup>

#### **POSOLOGIA**

##### **Adultos e Crianças:**

Aplicar uma camada do produto sobre a extensão da região afetada, uma a duas vezes ao dia por até 4 semanas.

► **ADMINISTRAÇÃO**

Tópico

► **ARMAZENAMENTO**

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

## **ALANTOINA + TRICLOSAN + FENOXIETANOL +**

### **ÓLEO VEGETAL DE MILHO <sup>1</sup>**

Hidratante, Protetor Epidérmico

Nome comercial:

Proderm Emulsão Fr 120mL <sup>1</sup>

#### **POSOLOGIA**

##### **Adultos e Crianças:**

Aplicar uma camada do produto sobre a extensão da região afetada.

► **ADMINISTRAÇÃO**

Tópico

► **ARMAZENAMENTO**

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

## **ALBENDAZOL <sup>1</sup>**

Antiparasitário, Anti-helmíntico

Nome comercial:

Albel 400mg Cp Mastigável <sup>1</sup>

Albendazol 400mg Cp Mastigável (Neo Química) <sup>1</sup>

Monozol 400mg Cp Mastigável <sup>1</sup>

Parasin 400mg Cp Mastigável <sup>1</sup>

Zentel 400mg Cp <sup>1</sup>

#### **POSOLOGIA**

##### **Adulto e Criança (> 2 anos de idade):**

|                                                               |                       |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Ascaris lumbricoides; Necator americanus; Trichuris trichiura | 400mg, uma vez ao dia |
| Enterobius vermicularis; Ancylostoma duodenale                | 400mg, uma vez ao dia |

|                                                            |                                          |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Strongyloides stercoralis; Taenia sp.;<br>Hymenolepis nana | 400mg, uma vez ao dia durante 3 dias     |
| Giardíase                                                  | 400mg, uma vez ao dia durante 5 dias     |
| Larva migrans cutânea                                      | 400mg, uma vez ao dia durante 1 a 3 dias |
| Opistorquíase                                              | 400mg, a cada 12 horas durante 3 dias    |

► **Ajuste de dose:**

Não é necessário ajuste de dose.

► **ADMINISTRAÇÃO**

Oral

► **Administração via sonda:**

Pode ser administrado via sonda. Dispersar em água e administrar separadamente da dieta enteral.

► **ARMAZENAMENTO**

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

## ALBUMINA HUMANA <sup>1,2</sup>

Expansor de Volume Sanguíneo

Nome comercial:

Albumina humana 20% Fr 50mL (Grifols) <sup>1</sup>

Albumina humana 20% Fr 50mL (Baxter) <sup>1</sup>

Albumina Sérica humana 20% Bolsa 50mL1 (Baxter) <sup>1,2</sup>

Alburex 20% Fr 50mL <sup>1</sup>

Octalbin Albumina Humana 20% Fr 50mL (Octapharma) <sup>1</sup>

Albiomin 20% Fr 50mL <sup>1\*</sup>

### POSOLOGIA

**Adulto:**

A dose necessária depende do tamanho do paciente, da gravidade do trauma ou doença e da perda contínua de fluido e proteína.

► **Ajuste de dose:**

Não é necessário ajuste de dose.

► **ADMINISTRAÇÃO**

Intravenosa

Administrar na velocidade de 1 a 2mL/min.

► **ARMAZENAMENTO**

Conservar em temperatura ambiente menor que 25°C.

► **Atenção:**

Alto Custo.

\* Este medicamento é livre de látex.

## ÁLCOOL ABSOLUTO 99,6° GL <sup>1,2</sup>

Antídoto

Nome comercial:

Álcool Absoluto 99,6° Gl Amp 10mL <sup>1,2</sup>

### POSOLOGIA

**Adulto:**

|                                                    |                                 |
|----------------------------------------------------|---------------------------------|
| Tratamento de ingestão de metanol ou etilenoglicol | 600mg/kg                        |
| Não alcoolista                                     | Dose manutenção de 66mg/kg/hora |
| Alcoolista crônico                                 | 154mg/kg/hora                   |

- ▶ **Ajuste de dose:**  
Não é necessário ajuste de dose.
- ▶ **ARMAZENAMENTO**  
Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

**ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70% <sup>1,2</sup>**

Antisséptico tópico

Nome comercial:

Álcool Etílico Hidratado 70% Fr 60mL <sup>1</sup>Álcool Etílico Hidratado 70% Fr 100mL <sup>1,2</sup>Álcool Gel Refil 1000mL <sup>1</sup>**POSOLOGIA**

Aplicar o produto puro sobre a pele e friccionar até absorção.

- ▶ **ADMINISTRAÇÃO**  
Tópico
- ▶ **ARMAZENAMENTO**  
Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

**ÁLCOOL POLIVINÍLICO + POVIDONA <sup>1</sup>**

Lubrificante Oftálmico

Nome comercial:

Refresh Sol Oft Flac 0,4mL <sup>1</sup>**POSOLOGIA****Adultos:**

Dose padrão | 1 a 2 gotas ao dia

- ▶ **Ajuste de dose:**  
Não é necessário ajuste de dose.
- ▶ **ADMINISTRAÇÃO**  
Tópico
- ▶ **ARMAZENAMENTO**  
Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

**ALFAPEGINTERFERONA 2B <sup>1</sup>**

Antiviral

Nome comercial:

Pegintron 80mcg FA <sup>1\*</sup>

**POSOLOGIA****Adulto:**

|                    |                                                                                       |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Hepatite B Crônica | 0,5 a 1mcg/kg, uma vez na semana durante pelo menos 24 semanas e máximo de 52 semanas |
| Hepatite C Crônica | 0,5 a 1mcg/kg, uma vez na semana durante pelo menos 6 meses                           |

▶ **Ajuste de dose:**

Insuficiência renal: reduzir 25% da dose inicial em insuficiência renal moderada e em 50% em insuficiência renal grave.

Insuficiência hepática grave: uso contraindicado.

▶ **ADMINISTRAÇÃO**

Subcutânea

Reconstituir em 0,7mL de diluente próprio.

▶ **ARMAZENAMENTO**

Conservar em refrigeração entre 2°C e 8°C.

Após reconstituição, possui estabilidade de 24 horas em refrigeração entre 2°C e 8°C.

▶ **Atenção:**

\* Este medicamento é livre de látex.

**ALFENTANILA** <sup>1,2</sup>

Analgésico Narcótico

Nome comercial:

Alfast 2,5mg Amp 5mL <sup>1,2</sup>

Rapifen 2,5mg Amp 5mL <sup>1,2</sup>

**POSOLOGIA****Adulto:**

|                                                           |                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Procedimentos de curta duração em pacientes ambulatoriais | 7 a 15 mcg/kg para procedimentos que não ultrapassam 10 minutos                                |
| Procedimentos de média duração                            | - De 10 a 30 min: 20 a 40mcg/kg<br>- De 30 a 60min: 40 a 80 mcg/kg<br>- >60min: 80 a 150mcg/kg |
| Indução anestésica                                        | Igual ou superior a 120mcg/kg                                                                  |

▶ **Ajuste de dose:**

Não é necessário ajuste de dose.

▶ **ADMINISTRAÇÃO**

Intravenosa

Diluir em SF/SG 5% e administrar lentamente de 3 a 5 minutos.

▶ **ARMAZENAMENTO**

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

▶ **Atenção:**

Receita Amarela.

**ALIZAPRIDA** <sup>1,2</sup>

Antiemético, Procinético

Nome comercial:

Superan 50mg Amp 2mL <sup>1,2</sup>



POSOLOGIA

Adulto:

|             |                             |
|-------------|-----------------------------|
| Dose padrão | 100 a 200mg, uma vez ao dia |
|-------------|-----------------------------|

- ▶ **Ajuste de dose:**  
Não é necessário ajuste de dose.
- ▶ **ADMINISTRAÇÃO**  
Intramuscular ou Intravenosa  
Infusão direta: não diluir e administrar lentamente.  
Infusão intermitente: diluir até 200mg em 50mL de SF.
- ▶ **ARMAZENAMENTO**  
Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

ALOPURINOL <sup>1,2</sup>

Antigotoso

Nome comercial:  
 Alopurinol 300mg Cp (Prati Donaduzzi) <sup>1</sup>  
 Alopurinol 100mg Cp (Prati Donaduzzi) <sup>1,2</sup>  
 Alopurinol 100mg Cp (Medley) <sup>1,2</sup>  
 Alopurinol 300mg Cp (Medley) <sup>1</sup>  
 Alopurinol 300mg Cp (Sandoz) <sup>1</sup>  
 Zyloric 100mg Cp <sup>1,2</sup>  
 Zyloric 300mg Cp <sup>1</sup>

POSOLOGIA

Adulto e Criança (> 10 anos de idade):

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| Condições leves                | 100 a 200mg ao dia |
| Condições moderadamente graves | 300 a 600mg ao dia |
| Condições graves               | 700 a 900mg ao dia |

Criança (< 10 anos de idade):

|             |                     |
|-------------|---------------------|
| Dose padrão | 10 a 20mg/kg ao dia |
| Dose máxima | 400mg ao dia        |

- ▶ **Ajuste de dose:**  
Insuficiência renal:

| Dose com Função Renal Normal | Dose Insuficiência Renal<br>clearance de creatinina (mL/min) |             |             |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
|                              | >50                                                          | 10-50       | <10         |
| 100 a 300mg                  | Não alterar dose                                             | 50% da dose | 30% da dose |

- ▶ **ADMINISTRAÇÃO**  
Oral  
Ingerir após refeição.
- ▶ **Administração com alimentos:**  
Evitar consumo de álcool.
- ▶ **Administração via sonda:**  
Pode ser administrado via sonda. Triturar e diluir em 20mL de água, administrando imediatamente.

► **ARMAZENAMENTO**

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

**ALPINIA ZERUMBET <sup>1</sup>**

Relaxante Muscular

Nome comercial:

Ziclague 2,4mL Fr 30mL <sup>1</sup>

**POSOLOGIA**

**Adultos e Crianças (> 12 anos de idade):**

|                                                      |             |
|------------------------------------------------------|-------------|
| Tetraplégico ou tetraparético                        | 5 a 6 jatos |
| Hemiplégico/Hemiparético ou paraplégico/paraparético | 3 a 4 jatos |

**Criança:**

|                                                      |                                                                                      |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Tetraplégico ou tetraparético                        | - 1 a 3 anos: 1 a 2 jatos<br>- 4 a 6 anos: 2 a 3 jatos<br>- 7 a 12 anos: 3 a 4 jatos |
| Hemiplégico/Hemiparético ou paraplégico/paraparético | - 1 a 3 anos: 1 jato<br>- 4 a 6 anos: 2 jatos<br>- 7 a 12 anos: 3 jatos              |

► **Ajuste de dose:**

Não é necessário ajuste de dose.

► **ADMINISTRAÇÃO**

Tópico

Aplicar sobre a pele, sem friccionar, na altura do músculo espástico a ser trabalhado.

► **ARMAZENAMENTO**

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

**ALPRAZOLAM <sup>1,2</sup>**

Ansiolítico

Nome comercial:

Apraz 0,5mg Cp <sup>1,2</sup>

Frontal 0,5mg Cp <sup>1,2</sup>

Alprazolam 0,5mg Cp (Germed) <sup>1,2</sup>

Alprazolam 0,5mg Cp (Medley) <sup>1,2</sup>

**POSOLOGIA**

**Adulto:**

|                                                    |                              |
|----------------------------------------------------|------------------------------|
| Transtornos de ansiedade                           | 0,25 a 0,5mg, a cada 8 horas |
| Transtorno do pânico                               | 0,5mg, a cada 8 horas        |
| Pacientes geriátricos ou em condições debilitantes | 0,25, a cada 8 ou 6 horas    |

**Idoso:**  
Recomenda-se utilizar a menor dose eficaz para evitar sedação excessiva ou ataxia.

- Criança:**  
Eficácia não definida.
- ▶ **Ajuste de dose:**  
Não é necessário ajuste de dose.
  - ▶ **ADMINISTRAÇÃO**  
Oral
  - ▶ **Administração com alimentos:**  
Evitar o consumo de álcool.
  - ▶ **Administração via sonda:**  
Pode ser administrado via sonda. Triturar e diluir em 15mL de água, administrando imediatamente.
  - ▶ **ARMAZENAMENTO**  
Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.
  - ▶ **Atenção:**  
Receita Azul.

**ALPROSTADIL <sup>1</sup>**
Antianginoso, Vasodilatador

Nome comercial:  
Prostvasin 20mcg Amp <sup>1</sup>

**POSOLOGIA**

**Adulto:**

|                                              |                            |
|----------------------------------------------|----------------------------|
| Terapia intra-arterial nos estágios III e IV | 10mcg, em 60 a 120 minutos |
| Terapia intravenosa no estágio III           | 40mcg, a cada 12 horas     |

- ▶ **Ajuste de dose:**  
Não é necessário ajuste de dose.
- ▶ **ADMINISTRAÇÃO**  
Intravenosa e Intra-arterial  
Intravenosa: Diluir em 50 a 250mL de SF e infundir por 2 horas.  
Intra-arterial: Diluir em 50mL de SF e administrar em 60 a 120 minutos.
- ▶ **Administração com alimentos:**  
Evitar o consumo de álcool.
- ▶ **ARMAZENAMENTO**  
Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.  
Após diluição, possui estabilidade de 24 horas em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

**ALTEPLASE <sup>1,2</sup>**
Trombolíticos

Nome comercial:  
Actilyse FA 10mg + Diluente Amp 10mL <sup>1,2</sup>  
Actilyse FA 50mg + Diluente Amp 50mL <sup>1,2</sup>

**POSOLOGIA**

**Adulto:**

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Infarto agudo do miocárdio                 | - Peso > ou igual a 65kg: 15mg em bólus, seguida de infusão intravenosa de 50mg durante os primeiros 30 minutos, seguida de infusão intravenosa de 35mg, durante os 60 minutos seguintes<br>- Peso < 65kg: 15mg em bólus, seguida de infusão de 0,75 mg/kg durante os 30 primeiros minutos, seguida por infusão intravenosa de 0,5 mg/kg durante os 60 minutos seguintes |
| Embolia pulmonar                           | - Peso > ou igual a 65kg: 10mg em bólus durante 1 a 2 minutos, seguida de 90mg como infusão intravenosa durante 2 horas<br>- Peso < 65kg: 10mg em bólus durante 1 a 2 minutos, seguida de infusão intravenosa até a dose máxima de 1,5mg/kg                                                                                                                              |
| Acidente Vascular Cerebral isquêmico agudo | - 1ª etapa: 10% de 0,9 mg/kg em bólus de 1 a 2 minutos<br>- 2ª etapa: 90% de 0,9 mg/kg em infusão intravenosa por 60 minutos                                                                                                                                                                                                                                             |

▶ **Ajuste de dose:**

Não é necessário ajuste de dose.

▶ **ADMINISTRAÇÃO**

Intravenosa

IV em bólus: sem diluir.

IV manutenção: reconstituir em SF e administrar em 1 a 2 horas.

▶ **Administração com alimentos:**

Evitar o consumo de álcool.

▶ **ARMAZENAMENTO**

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

Após reconstituído, possui estabilidade de 8 horas em temperatura entre 2 e 30°C.

▶ **Atenção:**

Alta Vigilância.

Alto Custo.

Este medicamento contém látex.

**AMANTADINA <sup>1</sup>**

Antiparkinsoniano

Nome comercial:

Mantidan 100mg Cp <sup>1</sup>

**POSOLOGIA****Adulto:**

|             |                        |
|-------------|------------------------|
| Dose padrão | 100mg, a cada 12 horas |
| Dose máxima | 400mg/dia              |

▶ **Ajuste de dose:**

Insuficiência renal:

| Dose com Função Renal Normal | Dose Insuficiência Renal<br>Clearance de creatinina (mL/min/1,73m <sup>2</sup> ) |                                                  |                    |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------|
|                              | 30 a 50                                                                          | 15 a 29                                          | <15                |
| -100mg cada 12h              | 200mg primeiro dia, após 100mg por dia                                           | 200mg Primeiro dia após 100mg em dias alternados | 200mg, Cada 7 dias |

## ADMINISTRAÇÃO

Oral

### Administração com alimentos:

Evitar o consumo de álcool.

### Administração via sonda:

Pode ser administrado via sonda. Dispersar em água e administrar imediatamente.

## ARMAZENAMENTO

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

### Atenção:

Receita Médica Branca (2 vias).

## AMICACINA <sup>1,2</sup>

Antimicrobiano Aminoglicosídeo

Nome comercial:

Amicacina 500mg Amp 2mL (Novafarma) <sup>1,2</sup>

Amicacina 500mg Amp 2mL (Teuto) <sup>1,2</sup>

## POSOLOGIA

### Adulto e Criança:

Dose padrão

7,5 mg/kg, a cada 12 horas ou 5 mg/kg, a cada 8 horas

### Ajuste de dose:

Insuficiência renal:

| Dose com Função Renal Normal | Dose Insuficiência Renal<br>clearance de creatinina (mL/min) |                    |                    |                    |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                              | >60                                                          | 40-60              | 20-40              | <20                |
| 7,5mg/Kg 12/12h              | 7,5mg/Kg<br>8/8h                                             | 7,5mg/Kg<br>12/12h | 7,5mg/Kg<br>24/24h | 7,5mg/Kg<br>48/48h |

## ADMINISTRAÇÃO

Intravenosa ou Intramuscular

Intravenosa: dilui em SF/SG 5% e infundir por 30 a 60 minutos.

## ARMAZENAMENTO

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

Após diluído, possui estabilidade de 24 horas em ambiente entre 15°C e 30°C.

### Atenção:

Receita Médica Branca (2 vias).

## AMILORIDA <sup>1</sup>

Diurético

Nome comercial:

Moduretic 25/2,5mg Cp <sup>1</sup>

Moduretic 50/5mg Cp <sup>1</sup>

## POSOLOGIA

### Adulto:

|                             |                                                  |
|-----------------------------|--------------------------------------------------|
| Hipertensão                 | 50mg/5mg, uma vez ao dia ou em doses fracionadas |
| Edema de origem cardíaca    | 50mg/5mg, uma vez ao dia                         |
| Cirrose Hepática com Ascite | 50mg/5mg, uma vez ao dia                         |

▶ **Ajuste de dose:**

Insuficiência renal:

| Dose com Função Renal Normal | Dose Insuficiência Renal<br>clearance de creatinina (mL/min) |            |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------|
| 5-10mg                       | 10-50                                                        | < 10       |
|                              | 50% dose                                                     | Evitar uso |

▶ **ADMINISTRAÇÃO**

Oral

▶ **Administração via sonda:**

Pode ser administrado via sonda. Triturar e diluir em 15mL de água, administrando imediatamente. Pode ser irritante se não for bem diluído.

▶ **ARMAZENAMENTO**

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

## AMINOÁCIDOS + GLICOSE + LÍPIDIOS + NA + K+ MQ + CA + PO4+ ZN + SO-4+ CL + ACETATO <sup>1</sup>

Alimentação e Reposição Hidroeletrolítica Parenteral

Nome comercial:

Smofkabiven Fr 1477mL<sup>1</sup>**POSOLOGIA****Adulto:**

|             |                                                |
|-------------|------------------------------------------------|
| Dose padrão | 13 a 31mL/kg, uma vez ao dia                   |
| Obesos      | A dose deve ser baseada no peso ideal estimado |

**Criança (de 2 a 11 anos de idade):**

|             |                              |
|-------------|------------------------------|
| Dose padrão | 1 a 35 mL/kg, uma vez ao dia |
|-------------|------------------------------|

▶ **Ajuste de dose:**

Não é necessário ajuste de dose.

▶ **ADMINISTRAÇÃO**

Intravenosa

▶ **ARMAZENAMENTO**

Conservar em temperatura inferior a 25°C.

▶ **Atenção:**

Só deve ser infundido após a mistura das três câmaras.

**AMINOFILINA <sup>1,2</sup>**

Broncodilatador

Nome comercial:

Aminofilina 240mg Amp 10mL (Hipolabor) <sup>1,2</sup>Aminofilina 240mg Amp 10mL (Teuto) <sup>1,2</sup>Aminofilina 240mg Amp 10mL (Farmace) <sup>1,2</sup>Aminofilina 24mg/ml FA 10mL Manip <sup>1,2</sup>**POSOLOGIA**

**Adulto:**

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dose de ataque  | 6mg/kg, infundida em 25 minutos                                                                                                                                                                                                                                           |
| Dose manutenção | - Não fumantes: 0,7mg/kg nas primeiras 12 horas e 0,5mg/kg além de 12 horas<br>- Cor pulmonare: 0,6mg/kg nas primeiras 12 horas e 0,3mg/kg além de 12 horas<br>- Insuficiência cardíaca ou hepática: 0,5mg/kg nas primeiras 12 horas e de 0,1 a 0,2mg/kg além de 12 horas |

**Idosos:**

|                 |                                                             |
|-----------------|-------------------------------------------------------------|
| Dose padrão     | 6mg/kg, infundida em 25 minutos                             |
| Dose manutenção | 0,6mg/kg nas primeiras 12 horas e 0,3mg/kg além de 12 horas |

- ▶ **Ajuste de dose:**  
Não é necessário ajuste de dose.
- ▶ **ADMINISTRAÇÃO**  
Intravenosa  
Diluir 1mg/mL em SF/SG 5% e infundir em 20 a 30 minutos.
- ▶ **ARMAZENAMENTO**  
Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

**AMINOFILINA <sup>1</sup>**

Broncodilatador

Nome comercial:

Aminofilina 100mg Cp (Teuto) <sup>1</sup>Asmapen 100mg Cp (Brainfarma) <sup>1</sup>**POSOLOGIA****Adulto:**

Asma brônquica e broncoespasmo, associado com bronquite crônica e enfisema

100 a 200mg, a cada 12 ou 8 horas

- ▶ **Ajuste de dose:**  
Não é necessário ajuste de dose.
- ▶ **ADMINISTRAÇÃO**  
Oral  
Preferencialmente após as refeições.
- ▶ **Administração via sonda:**  
Pode ser administrado via sonda. Triturar e diluir em volume de água adequado, administrando imediatamente e separadamente da dieta enteral.
- ▶ **ARMAZENAMENTO**  
Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

**AMIODARONA <sup>1,2</sup>**

Antiarrítmico

Nome comercial:

Amiodarona 150mg Amp 3mL (Hipolabor) <sup>1,2</sup>Amiodarona 150mg Amp 3mL Manip <sup>1,2</sup>

**POSOLOGIA****Adulto:**

|             |                              |
|-------------|------------------------------|
| Dose padrão | 5mg/kg, a cada 12 ou 8 horas |
| Dose máxima | 1,2g/dia                     |

**Idoso:**

Administrar com cautela. Pode resultar em alterações de QT e é pouco efetiva em idosos.

▶ **Ajuste de dose:**

Não é necessário ajuste de dose.

▶ **ADMINISTRAÇÃO**

Intravenosa

Diluir 1 ampola em 25 a 100mL de SF/SG 5% e infundir de 1 a 2 horas.

▶ **ARMAZENAMENTO**

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

Após diluído, possui estabilidade de 24 horas em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

**AMIODARONA <sup>1,2</sup>**

Antiarrítmico

Nome comercial:

Amiodarona Gts 200mg/mL Fr 30mL Manip <sup>1,2</sup>

Ancoron Gts 200mg Fr 30mL <sup>1</sup>

Amiodarona Cloridrato 200mg Cp (Biosintética) <sup>1,2</sup>

Ancoron 200mg Cp <sup>1,2</sup>

Atlansil 200mg Cp <sup>1,2</sup>

Miodaron 200mg Cp <sup>1,2</sup>

Amiodarona Cloridrato 100mg Cp <sup>1</sup>

Ancoron 100mg Cp Rev <sup>1</sup>

Atlansil 100mg Cp <sup>1</sup>

**POSOLOGIA****Adulto:**

|                 |                                          |
|-----------------|------------------------------------------|
| Dose de ataque  | 600 a 1000mg ao dia, durante 8 a 10 dias |
| Dose manutenção | 100 a 400mg diários                      |

**Idoso:**

Administrar com cautela. Pode resultar em alterações de QT e é pouco efetiva em idosos.

▶ **Ajuste de dose:**

Não é necessário ajuste de dose.

▶ **ADMINISTRAÇÃO**

Oral

Ingerir durante ou após refeições.

▶ **Administração via sonda:**

Pode ser administrado via sonda. Triturar e diluir em 15mL de água, administrando imediatamente.

▶ **ARMAZENAMENTO**

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.



AMITRIPTILINA <sup>1,2</sup>

Antidepressivo

Nome comercial:  
Amytril 25mg Cp <sup>1,2</sup>

POSOLOGIA

Adulto:

|             |                |
|-------------|----------------|
| Dose padrão | 50 a 100mg/dia |
|-------------|----------------|

Adolescente e Idoso:

|             |                |
|-------------|----------------|
| Dose padrão | 10 a 50mg/ dia |
|-------------|----------------|

Criança (< 12 anos de idade):

|                 |                         |
|-----------------|-------------------------|
| Enurese Noturna | 10 a 20mg, ao deitar-se |
|-----------------|-------------------------|

Criança (> 12 anos de idade):

|           |          |
|-----------|----------|
| Depressão | 25mg/dia |
|-----------|----------|

|                 |                         |
|-----------------|-------------------------|
| Enurese Noturna | 25 a 50mg, ao deitar-se |
|-----------------|-------------------------|

- ▶ **Ajuste de dose:**  
Não é necessário ajuste de dose.
- ▶ **ADMINISTRAÇÃO**  
Oral
- ▶ **Administração com alimentos:**  
Evitar o consumo de álcool.
- ▶ **Administração via sonda:**  
Pode ser administrado via sonda. Triturar e diluir em 10mL de água, administrando imediatamente.
- ▶ **ARMAZENAMENTO**  
Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.
- ▶ **Atenção:**  
Receita Médica Branca (2 vias).  
Risco de Queda.

AMOXICILINA <sup>1</sup>

Antimicrobiano Penicilina

Nome comercial:  
Amoxicilina 500mg Cap (Sandoz) <sup>1</sup>  
Amoxicilina 500mg Cap (Medley) <sup>1</sup>  
Amoxicilina 500mg Cap (Biosintética) <sup>1</sup>  
Amoxicilina 500mg Cap (Prati Donaduzzi) <sup>1</sup>  
Amoxicilina 500mg Cap (Germed) <sup>1</sup>  
Amoxicilina 500mg Cap (EMS) <sup>1</sup>  
Amoxil 500mg Cap <sup>1</sup>

POSOLOGIA

**Adulto e Criança (> 10 anos de idade):**

|                                                                       |                       |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Dose padrão                                                           | 250mg, a cada 8 horas |
| Infecções graves                                                      | 500mg, a cada 8 horas |
| Infecção purulenta grave ou recorrente do trato respiratório inferior | 3g, a cada 12 horas   |
| Gonorréia                                                             | Dose única de 3g      |

**Criança (até 10 anos de idade):**

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| Dose padrão      | 125mg, a cada 8 horas |
| Infecções graves | 250mg, a cada 8 horas |

► **Ajuste de dose:**

Insuficiência renal:

| Dose com Função Renal Normal | Dose Insuficiência Renal<br>clearance de creatinina (mL/min) |                  |                  |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|                              | >30                                                          | 10-30            | <10              |
| 250-500mg 8/8h               | 250-500mg 8/8h                                               | 250-500mg 12/12h | 250-500mg 24/24h |

► **ADMINISTRAÇÃO**

Oral

► **Administração com alimentos:**

Evitar o consumo de álcool.

► **Administração via sonda:**

Pode ser administrado via sonda. Triturar e diluir em 30 a 40mL de água, administrando imediatamente.

► **ARMAZENAMENTO**

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

► **Atenção:**

Receita Médica Branca (2 vias).

**AMOXICILINA+CLAVULANATO DE POTÁSSIO<sup>1,2</sup>** Antimicrobiano Penicilina

Nome comercial:

Amoxicilina 1000mg + Clavulanato de Potássio 200mg FA (Eurofarma) <sup>1,2</sup>

Clavulin Injetável (Amoxicilina 1000mg + Clavulanato de Potássio 200mg) FA <sup>1,2</sup>

Doclaxin (Amoxicilina 1000mg + Clavulanato de Potássio 200mg) FA <sup>1,2\*</sup>

**POSOLOGIA**

**Adulto:**

|                                             |                                           |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Procedimentos de menos de 1 hora de duração | 1,2g administrado na indução da anestesia |
| Cirurgias mais longas                       | Doses subsequentes de 1,2g                |
| Intervalos                                  | De 0, 8, 16 e 24 horas                    |

► **Ajuste de dose:**

Insuficiência renal:

| Dose com Função Renal Normal | Dose Insuficiência Renal<br>clearance de creatinina (mL/min) |                  |                  |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|                              | >30                                                          | 10-30            | <10              |
| 500/125mg 8/8h               | 500/125mg 8/8h                                               | 250-500mg 12/12h | 250-500mg 24/24h |

► **ADMINISTRAÇÃO**

Injeção ou Infusão Intravenosa

Injeção: Reconstituir em 20mL de água para injetáveis e administrar lentamente por 3 a 4 minutos.

Infusão: Reconstituir em 100mL de água para injetáveis ou NaCl 0,9% e infundir por 30 a 40 minutos.

► **ARMAZENAMENTO**

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

► **Atenção:**

Receita Médica Branca (2 vias).

\* Este medicamento é livre de látex.

## AMOXICILINA+CLAVULANATO DE POTÁSSIO<sup>1,2</sup> Antimicrobiano Penicilina

Nome comercial:

Clavulin (Amoxicilina 500mg + Clavulanato de Potássio 125mg) Cp <sup>1,2</sup>

Amoxicilina 500mg + Clavunato de Potássio 125mg Cp Rev (EMS) <sup>1,2</sup>

Amoxicilina 500mg + Clavunato de Potássio 125mg Cp Rev (Sandoz) <sup>1,2</sup>

Clavicin 500mg /125mg Cp Rev (Cellofarm) <sup>1,2</sup>

Sinot Clav 875mg + Clavunato de Potássio 125mg Cp Rev <sup>1,2</sup>

### POSOLOGIA

#### Adulto e Criança (> 12 anos de idade):

Dose padrão

1 comprimido, a cada 8 horas

► **Ajuste de dose:**

Insuficiência renal:

| Dose com Função Renal Normal | Dose Insuficiência Renal<br>clearance de creatinina (mL/min) |                  |                  |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|                              | >30                                                          | 10-30            | <10              |
| 500/125mg 8/8h               | 500/125mg 8/8h                                               | 250-500mg 12/12h | 250-500mg 24/24h |

► **ADMINISTRAÇÃO**

Oral

► **Administração com alimentos:**

Evitar o consumo de álcool.

► **ARMAZENAMENTO**

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

► **Atenção:**

Receita Médica Branca (2 vias).

**AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO<sup>1</sup>** Antimicrobiano Penicilina

Nome comercial:

Clavulin BD 875/125mg Cp Rev Lib Prolongada <sup>1</sup>

Sigma-Clav BD 875/125mg Cp Rev Lib Prolongada <sup>1</sup>

Amoxicilina 875mg + Clavulanato de Potássio 125mg Cp Rev Lib Prolongada (EMS)<sup>1</sup>

**POSOLOGIA**

**Adulto:**

|             |                        |
|-------------|------------------------|
| Dose padrão | 875mg, a cada 12 horas |
|-------------|------------------------|

► **Ajuste de dose:**

Insuficiência renal: Para pacientes com TFG < 30mL/min, o uso não é recomendado.

► **ARMAZENAMENTO**

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

► **Atenção:**

Receita Médica Branca (2 vias).

**AMPICILINA <sup>1,2</sup>** Antimicrobiano Penicilina

Nome comercial:

Ampicilina 500mg FA (Teuto) <sup>1</sup>

Amplatil 500mg FA <sup>1</sup>

Cilinson 500mg FA <sup>1\*</sup>

Ampicilina 1g FA (Teuto) <sup>1,2</sup>

Amplatil 1g FA <sup>1,2</sup>

Cilinson 1g FA <sup>1,2\*</sup>

**POSOLOGIA**

**Adulto:**

|                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| Vias Respiratórias     | 200 a 50mg, a cada 6 horas |
| Trato Gastrointestinal | 500mg, a cada 6 horas      |
| Vias Genitourinárias   | 500mg, a cada 6 horas      |
| Meningite Bacteriana   | 8 a 14g, a cada 24 horas   |

**Criança:**

|                        |                                         |
|------------------------|-----------------------------------------|
| Vias Respiratórias     | 25 a 50 mg/kg/dia, a cada 8 ou 6 horas  |
| Trato Gastrointestinal | 50 a 100 mg/kg/dia, a cada 8 ou 6 horas |
| Vias Genitourinárias   | 50 a 100 mg/kg/dia, a cada 8 ou 6 horas |
| Meningite Bacteriana   | 100 a 200 mg/kg/dia                     |

► **Ajuste de dose:**

Insuficiência renal:

| Dose com Função Renal Normal | Dose Insuficiência Renal clearance de creatinina (mL/min) |                        |                          |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|
|                              | >50                                                       | 10-50                  | <10                      |
| 250- 2g 6/6h                 | 250- 2g 6/6h                                              | 250- 2g 6/6h ou 12/12h | 250- 2g 12/12h ou 24/24h |

▶ **ADMINISTRAÇÃO**

Intravenosa e Intramuscular  
 Intramuscular: Reconstituir em 3mL de água para injetáveis e aplicar a injeção no quadrante superior externo do glúteo.  
 Intravenosa: Reconstituir em 3mL de água para injetáveis e infundir lentamente de 3 a 5 minutos (500mg) e de 10 a 15 minutos (1000mg).

▶ **Administração com alimentos:**

Evitar o consumo de álcool.

▶ **ARMAZENAMENTO**

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

▶ **Atenção:**

Receita Médica Branca (2 vias).  
 \* Estas apresentações são livres de látex.

AMPICILINA <sup>1,2</sup>

Antimicrobiano Penicilina

Nome comercial:  
 Ampicilina 500mg Cp (Sandoz) <sup>1,2</sup>  
 Ampicilina 500mg Cp (EMS) <sup>1,2</sup>  
 Binotal 500mg Cp <sup>1,2</sup>

**POSOLOGIA**

**Adulto:**

|             |                                                  |
|-------------|--------------------------------------------------|
| Dose padrão | 500mg, a cada 8 ou 6 horas, por no mínimo 7 dias |
|-------------|--------------------------------------------------|

▶ **Ajuste de dose:**

Insuficiência renal:

| Dose com Função Renal Normal | Dose Insuficiência Renal<br>clearance de creatinina (mL/min) |                        |                          |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|
|                              | >50-90                                                       | 10-50                  | <10                      |
| 250- 2g 6/6h                 | 250- 2g 6/6h                                                 | 250- 2g 6/6h ou 12/12h | 250- 2g 12/12h ou 24/24h |

▶ **ADMINISTRAÇÃO**

Oral

▶ **Administração com alimentos:**

Ingerir 1 ou 2 horas antes da refeição.

▶ **Administração via sonda:**

Pode ser administrado via sonda. Triturar e diluir em 30 a 50mL de água, administrando imediatamente.

▶ **ARMAZENAMENTO**

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

▶ **Atenção:**

Receita Médica Branca (2 vias).

AMPICILINA + SULBACTAM <sup>1,2</sup>

Antimicrobiano Penicilina

Nome comercial:  
 Ampicilina 1g + Sulbactam 0,5g FA (Eurofarma) <sup>1,2</sup>  
 Ampicilina 1g + Sulbactam 0,5g FA (Novafarma) <sup>1,2</sup>  
 Ampicilina 1g + Sulbactam 0,5g FA (Mylan) <sup>1,2\*</sup>  
 Unasyn (Ampicilina 1g + Sulbactam 0,5g) FA <sup>1,2</sup>

**POSOLOGIA****Adulto:**

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| Infecção leve     | 1,5 a 3g ao dia |
| Infecção moderada | Até 6g ao dia   |
| Infecção grave    | Até 12g ao dia  |

**Recém-nascidos, lactentes e crianças**

|                                                  |                                   |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Dose padrão                                      | 150mg/kg/dia, a cada 8 ou 6 horas |
| Recém-nascidos durante a primeira semana de vida | 75 mg/kg/dia, a cada 12 horas     |

▶ **Ajuste de dose:**

Insuficiência renal:

| Dose com Função Renal Normal | Dose Insuficiência Renal<br>clearance de creatinina (mL/min) |                                  |                          |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|
|                              | >50-90                                                       | 10-50                            | <10                      |
| 2g AMP + 1g SB<br>6/6h       | 2g AMP + 1g SB<br>6/6h                                       | 2g AMP + 1g SB<br>8/8h ou 12/12h | 2g AMP + 1g SB<br>24/24h |

▶ **ADMINISTRAÇÃO**

Intramuscular ou Intravenosa

Diluir em 3,2mL de diluente e administrar.

▶ **ARMAZENAMENTO**

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

▶ **Atenção:**

Receita Médica Branca (2 vias).

\* Este medicamento é livre de látex.

**ANASTROZOL <sup>1</sup>**

Antineoplásico Oral

Nome comercial:

Anastrozol 1mg Cp <sup>1</sup>Arimidex 1mg Cp <sup>1</sup>**POSOLOGIA****Adulto:**

|             |                                                            |
|-------------|------------------------------------------------------------|
| Dose padrão | 1mg, uma vez ao dia, a depender do esquema quimioterápico. |
|-------------|------------------------------------------------------------|

▶ **Ajuste de dose:**

Não é necessário ajuste de dose.

▶ **ADMINISTRAÇÃO**

Oral

▶ **Administração com alimentos:**

Ingerir com ou sem alimentos.

▶ **Administração via sonda:**

Pode ser administrado via sonda. Triturar e diluir em 15mL de água, administrando imediatamente. Preparo deve ser feito na Quimioterapia.



► **ADMINISTRAÇÃO**

Intravenosa

Reconstituir com 30mL de água para injetáveis e diluir em SF/SG. Infundir em 90 min (100mg) ou 180 min (200mg).

► **ARMAZENAMENTO**

Conservar em refrigeração entre 2°C e 8°C.

Após reconstituição, possui estabilidade de 1 horas em refrigeração entre 2°C e 8°C.

Após diluição, possui estabilidade de 24 horas em refrigeração entre 2°C e 8°C.

► **Atenção:**

\* Este medicamento é livre de látex.

## ANLODIPINO BESILATO <sup>1,2</sup>

Bloqueador de Canal de Cálcio

Nome comercial:

Nicord 5mg Cp <sup>1,2</sup>

Norvasc 5mg Cp <sup>1,2</sup>

Pressat 5mg Cp <sup>1,2</sup>

Novanlo 2,5mg Cp <sup>1</sup>

Anlodipino 5mg Cp (Biosintética) <sup>1,2</sup>

### POSOLOGIA

**Adulto:**

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| Hipertensão e angina | 5mg, uma vez ao dia |
| Dose máxima          | 10mg ao dia         |

► **Ajuste de dose:**

Não é necessário ajuste de dose.

► **ADMINISTRAÇÃO**

Oral

► **Administração com alimentos:**

Ingerir com ou sem alimento.

► **Administração via sonda:**

Pode ser administrado via sonda. Diluir em 10mL água e administrar separadamente da dieta enteral.

► **ARMAZENAMENTO**

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

► **Atenção:**

Risco de Queda.

## APIXABANA <sup>1,2</sup>

Anticoagulante

Nome comercial:

Eliquis 2,5mg Cp Rev <sup>1,2</sup>

### POSOLOGIA

**Adulto:**

|                                      |                                                                                     |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Prevenção de tromboembolismo venoso  | 2,5mg, a cada 12 horas. Dose inicial deve ser tomada 12 a 24 horas após a cirurgia. |
| Prevenção de AVC e embolia sistêmica | 5mg, a cada 12 horas                                                                |



|                                   |                                                                        |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Tratamento de TVP e EP            | 10mg, a cada 12 horas, durante 7 dias. Em seguida, 5mg a cada 12 horas |
| Prevenção de TVP e EP recorrentes | 2,5mg, a cada 12 horas, após pelo menos 6 meses de tratamento          |

#### Idoso (> ou igual a 80 anos e com peso < ou igual a 60kg)

|             |                        |
|-------------|------------------------|
| Dose padrão | 2,5mg, a cada 12 horas |
|-------------|------------------------|

#### ► Ajuste de dose:

Insuficiência renal e hepática:

|          |                                 |
|----------|---------------------------------|
| Leve     | Não é necessário ajuste de dose |
| Moderada | Não é necessário ajuste de dose |
| Grave    | O uso é contraindicado          |

#### ► ADMINISTRAÇÃO

Oral

#### ► ARMAZENAMENTO

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

#### ► Atenção:

Deve ser descontinuado pelo menos 48 horas antes do horário marcado para a cirurgia ou procedimentos invasivos (agressivos).

### ARGININA + FOSFOSERINA + FOSFOTREONINA + GLUTAMINA + TRIPTOFANA + HIDROXOCOBALAMINA <sup>1</sup>

Vitamina e Suplemento Mineral

Nome comercial:

Forten Fr 10mL <sup>1</sup>

#### POSOLOGIA

##### Adulto:

|             |                                                      |
|-------------|------------------------------------------------------|
| Dose padrão | 1 a 2 frascos, uma vez ao dia, durante 2 a 3 semanas |
| Dose máxima | 2 frascos ao dia                                     |

##### Criança (acima de 2 anos de idade):

|             |                                                 |
|-------------|-------------------------------------------------|
| Dose padrão | 1 frasco, uma vez ao dia, durante 2 a 3 semanas |
| Dose máxima | 1 frasco ao dia                                 |

#### ► Ajuste de dose:

Não é necessário ajuste de dose.

#### ► ARMAZENAMENTO

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

**ATENOLOL** <sup>1,2</sup>

Agente Anti-hipertensivo

Nome comercial:

Ablok 25mg Cp <sup>1,2</sup>Angipress 25mg Cp <sup>1,2</sup>Atenol 25mg Cp <sup>1,2</sup>Atenolol 25mg Cp (Prati Donaduzzi) <sup>1,2</sup>Atenolol 25mg Cp (Biosintética) <sup>1,2</sup>Atenolol 25mg Cp (EMS) <sup>1,2</sup>Atenolol 25mg Cp (Medley) <sup>1,2</sup>Atenolol 25mg Cp (Sandoz) <sup>1,2</sup>Atenolol 25mg Cp (Germed) <sup>1,2</sup>Atenolol 50mg Cp (Biosintética) <sup>1</sup>Atenolol 50mg Cp (EMS) <sup>1</sup>Atenolol 50mg Cp (Medley) <sup>1</sup>Ablok 50mg Cp <sup>1</sup>Atenol 50mg Cp <sup>1</sup>**POSOLOGIA****Adulto:**

|                      |                                                                            |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Hipertensão          | 50 a 100mg, uma vez ao dia durante 1 ou 2 semanas                          |
| Angina               | 100mg, uma vez ao dia ou 50mg, a cada 12 horas                             |
| Arritmias cardíacas  | Com arritmia controlada, a dose manutenção é de 50 a 100mg, uma vez ao dia |
| Infarto do miocárdio | 100mg, uma vez ao dia                                                      |

▶ **Ajuste de dose:**

Insuficiência renal:

| Dose com Função Renal Normal | Dose Insuficiência Renal<br>clearance de creatinina (mL/min) |                                 |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 50 a 100mg/dia               | 15-35                                                        | <15                             |
|                              | Máximo 50mg/dia                                              | Máximo 50mg, em dias alternados |

▶ **ADMINISTRAÇÃO**

Oral

Preferencialmente no mesmo horário todos os dias.

▶ **Administração via sonda:**

Pode ser administrado via sonda. Triturar e diluir em 15mL de água, administrando imediatamente.

▶ **ARMAZENAMENTO**

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

**ATORVASTATINA CÁLCICA** <sup>1,2</sup>

Hipolipêmico

Nome comercial:

Citalor 10mg Cp Rev <sup>1,2</sup>Lípitor 10mg Cp Rev <sup>1,2</sup>Lípitor 40mg Cp Rev <sup>1,2</sup>Atorvastatina 10mg Cp (Medley) <sup>1,2</sup>Atorvastatina 10mg Cp (Eurofarma) <sup>1,2</sup>

**POSOLOGIA****Adulto:**

Hipercolesterolemia Primária e  
Hiperlipidemia Combinada

10mg, uma vez ao dia durante 2 a 4  
semanas

**Criança (entre 10 e 17 anos):**

|                                             |           |
|---------------------------------------------|-----------|
| Hipercolesterolemia Familiar Heterozigótica | 10mg/ dia |
| Dose máxima                                 | 20mg/dia  |

▶ **Ajuste de dose:**

Não é necessário ajuste de dose.

▶ **ADMINISTRAÇÃO**

Oral

▶ **Administração com alimentos:**

Evitar o consumo de álcool.

▶ **Administração via sonda:**

Pode ser administrado via sonda. Triturar e diluir em 15mL de água, administrando imediatamente.

▶ **ARMAZENAMENTO**

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

**ATROPINA <sup>1</sup>**

Anticolinérgico

Nome comercial:

Atropion 0,5mg Amp 1mL <sup>1</sup>

Hytropin 0,5mg Amp 1mL <sup>1</sup>

**POSOLOGIA****Adulto:**

|                                                                           |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Antisialogogo ou outra atividade antivagal                                | 0,5 a 1mg, 30 a 60 minutos pré-operatório. Se necessário, repetir a cada 6 ou 4 horas |
| Envenenamento por organofosforados, carbamatos, cogumelos ou muscarínicos | 1 a 6mg, repetindo conforme necessário a cada 3 a 5 minutos                           |
| Bradicardia sintomática                                                   | 0,5 ou 1 a 2mg, repetindo conforme necessário a cada 3 a 5 minutos                    |

**Criança:**

|                                                                          |                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Antisialogogo ou outra atividade antivagal                               | 0,02 mg/kg, 30 a 60 minutos pré-operatório                                                                  |
| Envenenamento por organofosforados, carbamatos ou cogumelos muscarínicos | 0,02 a 0,06 mg/kg, repetindo conforme necessário a cada 5 minutos                                           |
| Bradicardia sintomática                                                  | 0,02 mg/kg IV/IO ou 0,04 a 0,06 mg/kg via tubo endotraqueal, repetindo conforme necessário a cada 5 minutos |

▶ **Ajuste de dose:**

Não é necessário ajuste de dose.

▶ **ADMINISTRAÇÃO**

Intravenosa (preferencialmente), Subcutânea, Intramuscular, Endotraqueal e Intraóssea

Intravenosa: sem diluir, em bolus em 2 minutos ou em infusão.

Endotraqueal: Diluir em 3 a 5mL de SF.

Intraóssea: Diluir em 5mL de SF ou água destilada.

▶ **ARMAZENAMENTO**

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

**ATROPINA**<sup>1</sup>

Midriático

Nome comercial:

Atropina 0,5% Colírio Fr 5mL<sup>1</sup>

**POSOLOGIA****Adultos:**

A critério do médico.

▶ **ADMINISTRAÇÃO**

Oftálmica

Instilar no saco conjuntival a dose recomendada do colírio. O saco lacrimal deve ser comprimido por 1 ou 2 min, após a instilação do colírio, para reduzir ou evitar a absorção sistêmica da droga.

▶ **ARMAZENAMENTO**

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

Após aberto: estabilidade de 60 dias.

**AZACITIDINA**<sup>1</sup>

Antineoplásico Citotóxico

Nome comercial:

Vidaza 100mg FA<sup>1</sup>

**POSOLOGIA**

Conforme esquema quimioterápico.

▶ **ARMAZENAMENTO**

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

▶ **Atenção:**

\* Este medicamento é livre de látex.

**AZATIOPRINA**<sup>1,2</sup>

Imunossupressor

Nome comercial:

Imunem 50mg Cp<sup>1,2</sup>

Imuran 50mg Cp Rev<sup>1,2</sup>

**POSOLOGIA****Adulto e Criança:**

|             |                                                                                                        |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Transplante | 5mg/kg, uma vez ao dia no primeiro dia de tratamento.<br>- Dose manutenção: 1 a 4mg/kg, uma vez ao dia |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Dose padrão

1 a 3mg/kg, uma vez ao dia

► Ajuste de dose:

Insuficiência renal:

| Dose com Função Renal Normal | Dose com Insuficiência Renal<br>clearance de creatinina (mL/min) |             |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|
| 50mg 24/24h                  | 10-50                                                            | <10         |
|                              | 75% da dose                                                      | 50% da dose |

► ADMINISTRAÇÃO

Oral

► Administração com alimentos:

Ingerir pelo menos 1 hora antes ou 3 horas após refeição ou ingestão de leite.

► Administração via sonda:

Pode ser administrado via sonda. Triturar e diluir em 15mL de água, administrando imediatamente.

► ARMAZENAMENTO

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

## AZITROMICINA <sup>1,2</sup>

Antimicrobiano Macrolídeo

Nome comercial:

Astro 500mg Cp Rev <sup>1,2</sup>

Azitromicina 500mg Cp Rev (Prati Donaduzzi) <sup>1,2</sup>

Azitromicina 500mg Cp Rev (EMS) <sup>1,2</sup>

Zitromax 500mg Cp Rev <sup>1,2</sup>

### POSOLOGIA

#### Adulto:

|                                                                                                          |                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Infecções por <i>Chlamydia trachomatis</i> ,<br><i>Haemophilus ducreyi</i> , <i>Neisseria gonorrhoea</i> | 1000mg, em dose única                |
| Outras indicações                                                                                        | 500mg, uma vez ao dia durante 3 dias |

#### Criança (> 45kg):

|                          |                                                       |
|--------------------------|-------------------------------------------------------|
| Faringite estreptocócica | 10 mg/kg em dose única diária ou 20 mg/kg, por 3 dias |
| Dose máxima diária       | 500 mg                                                |

- **Ajuste de dose:**  
Insuficiência renal: ClCr < 10mL/min, monitorar.  
Insuficiência hepática: pode ser necessário reduzir a dose, monitorar.
- **ADMINISTRAÇÃO**  
Oral
- **Administração com alimentos:**  
Ingerir com ou sem alimento.
- **Administração via sonda:**  
Pode ser administrado via sonda. Utilizar suspensão e diluir em 20mL de água, administrando imediatamente.

► **ARMAZENAMENTO**

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

► **Atenção:**

Receita Médica Branca (2 vias).

## AZITROMICINA <sup>1</sup>

Antimicrobiano Macrolídeo

Nome comercial:

Zitromax 500mg FA <sup>1\*</sup>

Astro 500mg FA <sup>1</sup>

### POSOLOGIA

**Adulto:**

|                                                                    |                                                   |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Pneumonia adquirida na comunidade causada por organismos sensíveis | 500mg, em dose única diária, por no mínimo 2 dias |
| Doença inflamatória pélvica causada por organismos sensíveis       | 500mg, em dose única diária, por 1 a 2 dias       |

► **Ajuste de dose:**

Insuficiência renal: ClCr < 10mL/min, monitorar.

Insuficiência hepática: pode ser necessário reduzir a dose, monitorar.

► **ADMINISTRAÇÃO**

Intravenosa

Infusão intermitente: Reconstituir em 4,8mL de água destilada e diluir até 500mg em 250mL de SF/SG 5%.

► **ARMAZENAMENTO**

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

► **Atenção:**

Receita Médica Branca (2 vias).

\* Este medicamento é livre de látex.

## AZUL DE METILENO <sup>1,2</sup>

Antídoto

Nome comercial:

Azul de Metileno 2% Amp 5mL Manip <sup>1,2</sup>

### POSOLOGIA

**Adultos e crianças:**

|           |                      |                                                 |
|-----------|----------------------|-------------------------------------------------|
| Antídoto: | Dose inicial:        | 1 a 2 mg/kg                                     |
|           | Doses de manutenção: | 1 a 2 mg/kg, repetir após 1 hora, se necessário |

► **ADMINISTRAÇÃO**

Intravenoso

Infusão lenta da dose diluída em 500 mL de SF ou SG 5%.

► **ARMAZENAMENTO**

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

Nome comercial:  
Azul Patente 2,5% Amp 2ml Manip <sup>1,2</sup>  
Bleu Patente 2,5% Amp 2mL <sup>1,2</sup>

**POSOLOGIA**

**Adultos e crianças:**

A critério do médico.

► **ADMINISTRAÇÃO**

Subcutâneo

Administrar de 0,5 a 1mL da solução.

► **ARMAZENAMENTO**

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

## **BACILLUS DE CALMETTE-GUÉRIN MYCOBACTERIUM BOVIS (BCG) <sup>1</sup>**

Vacina

Nome comercial:

Imuno BCG 40mg Amp <sup>1</sup>

### **POSOLOGIA**

#### **Adultos:**

Dose usual de 80mg (2 ampolas reconstituídas). Tratamento de 8 a 12 semanas, de acordo com o esquema indicado.

#### ▶ **Ajuste de dose:**

Não é necessário ajuste.

#### ▶ **ADMINISTRAÇÃO**

Intravesical.

Reconstituir 80mg em 50mL de SF.

#### ▶ **ARMAZENAMENTO**

Conservar sob refrigeração em temperatura entre 2°C e 8°C.

Após preparado estabilidade de 4 horas.

## **BACITRACINA + NEOMICINA <sup>1,2</sup>**

Antimicrobiano Tópico

Nome comercial:

Nebacetin Pomada Bis 15g <sup>1</sup>

Bacitracina 250ui/g + Neomicina Sulfato 5mg/g Bis 15g (Medley) <sup>1,2</sup>

### **POSOLOGIA**

#### **Adultos e Crianças:**

Aplicar sobre a região afetada uma fina camada 2 a 5 vezes ao dia com o auxílio de uma gaze, deve ser continuado por 2 a 3 dias após os sintomas terem desaparecidos.

#### ▶ **Ajuste de dose:**

Não é necessário ajuste.

#### ▶ **ADMINISTRAÇÃO**

Tópico

#### ▶ **ARMAZENAMENTO**

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

## **BACLOFENO <sup>1,2</sup>**

Relaxante Muscular

Nome comercial:

Lioresal 10mg Cp <sup>1</sup>

Baclofen 10mg Cp (Teuto) <sup>1</sup>

Baclofeno 10mg Cp (Teuto) <sup>1,2</sup>

Baclofeno 10mg Cp (União Química) <sup>1,2</sup>

### **POSOLOGIA**

#### **Adultos:**

Dose inicial: 5mg, oral, a cada 8 horas. Aumentar a dose de 5mg, a cada 8 horas, a cada 3 dias, conforme necessidade.

Dose usual: 30 a 80mg/dia.

Dose máxima: 120mg/dia.



- ▶ **Ajuste de Dose:**  
Insuficiência Renal: Pode ser necessário reduzir a dose, monitorar.
- ▶ **ADMINISTRAÇÃO**  
Oral
- ▶ **Administração com Alimentos:**  
Pode ser administrado com leite ou alimentos em caso de pacientes que refiram náusea constante, apesar de diminuir absorção. Evitar a ingestão de bebidas alcoólicas, *Centella asiática*, Erva-de-São-João, kava kava e valeriana.
- ▶ **Administração via sonda:**  
Pode ser administrado via sonda. Triturar e dispersar em 20ml de água, após dissolução administrar imediatamente.
- ▶ **ARMAZENAMENTO**  
Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

**BAMIFILINA <sup>1,2</sup>** Broncodilatador

Nome comercial:  
Bamifix 300mg Drg <sup>1,2</sup>

**POSOLOGIA**

**Adultos:**  
Dose usual: 600mg, oral, pela manhã e à noite.  
Dose máxima: 1800mg/dia.

- ▶ **Ajuste de dose:**  
Dado não disponível.
- ▶ **ADMINISTRAÇÃO**  
Oral
- ▶ **Administração com Alimentos:**  
Administrar antes das refeições.
- ▶ **Administração via sonda:**  
Pode ser administrado via sonda. Triturar e dispersar em 20mL de água, após dissolução administrar imediatamente.
- ▶ **ARMAZENAMENTO**  
Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

**BÁRIO SULFATO <sup>1</sup>** Contraste

Nome comercial:  
Bariogel Geleia 100% Copo 150mL <sup>1</sup>

**POSOLOGIA**

**Adultos e Crianças:**  
A critério médico.

- ▶ **ADMINISTRAÇÃO**  
Oral
- ▶ **ARMAZENAMENTO**  
Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

**BASILIXIMABE <sup>1</sup>** Imunossupressor

Nome comercial:  
Simulect 20mg FA + Diluente Amp 5mL <sup>1</sup>

## POSOLOGIA

### Adultos e criança Peso > 35Kg:

Dose usual:

1ª dose de 20mg, IV, 2h antes da cirurgia de transplante renal.

2ª dose de 20mg, IV, administrar por 4 dias após o transplante renal.

► **Ajuste de dose:**

Não é necessário ajuste.

► **ADMINISTRAÇÃO**

Intravenoso

Reconstituir em 5mL de água destilada.

Injeção direta, sem diluição.

Infusão: 20mg em 50mL de SF/SG 5%, 20 a 30 min.

► **ARMAZENAMENTO**

Conservar sob refrigeração em temperatura entre 2°C e 8°C.

Após reconstituição, o prazo de validade é de 24 horas à temperatura de 2°C a 8°C ou em temperatura ambiente (entre 15°C e 30°C) por 4 horas.

► **Atenção:**

Alto Custo.

## BECLOMETASONA DIPROPIONATO <sup>1</sup>

Antiasmáticos

Nome comercial:

Clenil A 400mcg/ml Flac 2mL <sup>1</sup>

## POSOLOGIA

### Adultos:

Dose usual: 2mL a cada administração, a cada 12 ou 24 horas.

Dose máxima: 1600mcg/dia (2 flaconetes)

### Crianças:

Dose usual: 1mL a cada administração, a cada 12 ou 24 horas.

Dose máxima: 800mcg/dia (1 flaconete)

► **Ajuste de dose:**

Não é necessário ajuste.

► **ADMINISTRAÇÃO**

Inalatório

Pode ser diluído em SF na proporção de 1:1, ou seja, 1mL de soro para cada 1mL do produto.

► **ARMAZENAMENTO**

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

Após aberto o flaconete, este deve ser conservado em refrigerador e utilizado dentro de 24 horas.

## BECLOMETASONA + FORMOTEROL <sup>1</sup>

Anti-inflamatório Esteroidal Sistêmico

Nome comercial:

Fostair Spray 100mcg + 6mcg <sup>1</sup>

## POSOLOGIA

### Adultos

1 a 2 inalações a cada 12 horas.

- ▶ **Ajuste de dose:**  
Não é necessário ajuste.
- ▶ **ADMINISTRAÇÃO**  
Inalatório
- ▶ **ARMAZENAMENTO**  
Conservar sob refrigeração em temperatura entre 2°C e 8°C.  
Após aberto, conservar em temperatura ambiente (15°C a 30°C), por no máximo 2 meses.

## BELIMUMABE <sup>1</sup>

Imunomodulador

Nome comercial:  
Benlysta 120mg FA <sup>1</sup>  
Benlysta 400mg FA <sup>1</sup>

### POSOLOGIA

Dose usual: 10mg/kg, IV, tempo de infusão 60 min, no 1º dia de tratamento, no 14º e no 28º dia. Em seguida, em intervalos de 4 semanas.

- ▶ **Ajuste de dose:**  
Não é necessário ajuste.
- ▶ **ADMINISTRAÇÃO**  
Intravenoso  
Dose 120mg: Reconstituir em 1,5mL de água para injeção e diluir em 250mL SF, infundir por 1 hora.  
Dose 400mg: Reconstituir em 4,8mL de água para injeção e diluir em 250ml SF, infundir por 1 hora
- ▶ **ARMAZENAMENTO**  
Conservar sob refrigeração em temperatura entre 2°C e 8°C.  
Após preparado estabilidade de 8 horas entre 2°C e 8°C.

## BENFOTIAMINA <sup>1</sup>

Vitaminas e Suplementos Minerais

Nome comercial:  
Milgamma 150mg Cp <sup>1</sup>

### POSOLOGIA

#### Adultos

Dose inicial: 300 a 450mg/dia fracionado a cada 6 ou 8 horas, durante 4 a 8 semanas.  
Dose de manutenção: 150mg, uma vez ao dia.

- ▶ **Ajuste de dose:**  
Não é necessário ajuste.
- ▶ **ADMINISTRAÇÃO**  
Oral
- ▶ **Administração via sonda:**  
Dado não disponível.
- ▶ **ARMAZENAMENTO**  
Conservar em temperatura ambiente 15°C e 30°C.

## BENZALCÔNIO + SÓDIO CLORETO <sup>1</sup>

Descongestionante Nasal

Nome comercial:

Rinosoro Gts Fr 30mL <sup>1</sup>  
 Sorine Infantil Gts Fr 30mL <sup>1</sup>

## POSOLOGIA

### Adultos e Crianças:

Dose usual: 2 a 4 gotas, a cada 6 ou 4 horas.

#### ► ADMINISTRAÇÃO

Nasal

#### ► ARMAZENAMENTO

Conservar em temperatura ambiente 15°C e 30°C.

## BENZILPENICILINA BENZATINA <sup>1</sup>

Antimicrobiano Penicilina

Nome comercial:

Bepeben Benzilpenicilina Benzatina 600.000UI FA <sup>1</sup>

## POSOLOGIA

### Adulto:

|                                                                    |                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Infecções estreptocócicas do trato respiratório superior e da pele | Injeção única de 1.200.000 UI                                        |
| Sífilis Primária, secundária e latente                             | Injeção única de 2.400.000 UI                                        |
| Sífilis tardia                                                     | 3 injeções de 2.400.000 UI, com intervalo de 1 semana entre as doses |
| Bouba, bejel e pinta                                               | Injeção única de 1.200.000 UI                                        |
| Profilaxia da febre reumática e da glomerulonefrite                | Injeção de 1.200.000 UI, a cada 4 semanas                            |

### Criança:

|                                                                    |                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Infecções estreptocócicas do trato respiratório superior e da pele | - Crianças maiores: Injeção única de 900.000 UI<br>- Crianças até 27kg: Injeção única de 300.000 a 600.000 UI |
| Sífilis congênita                                                  | Crianças menores de 2 anos: Injeção de 50.000 UI por quilograma                                               |

#### ► Ajuste de dose:

Não é necessário ajuste de dose.

#### ► ADMINISTRAÇÃO

Intramuscular

#### ► ARMAZENAMENTO

Conservar em temperatura ambiente 15°C e 30°C.

## BENZILPENICILINA POTÁSSICA <sup>1</sup>

Antimicrobiano Penicilina

Nome comercial:

Aricilina 5mUI FA (Blausiegel) <sup>1</sup> \*

Benzilpenicilina Potássica 5mUI FA (Novafarma) <sup>1</sup>

**POSOLOGIA**

**Adulto:**

|             |                                                                                   |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Dose padrão | Injeção de 1.000.000 a 5.000.000 UI, com intervalos de 2 a 6 horas entre cada uma |
| Endocardite | Injeção de 10.000.000 a 30.000.000 UI, uma vez ao dia                             |

**Criança:**

|                                                         |                                                        |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Dose padrão                                             | Injeção de 100.000 a 250.000 UI/kg/dia, a cada 6 horas |
| Recém-nascidos com menos de 7 dias (peso menor que 2kg) | Injeção de 50.000 UI/kg/dia, a cada 12 horas           |
| Recém-nascidos com menos de 7 dias (peso maior que 2kg) | Injeção de 75.000 UI/kg/dia, a cada 8 horas            |
| Maiores de 7 dias (peso menor que 2kg)                  | 75.000 UI/kg/dia, a cada 8 horas                       |
| Maiores de 7 dias (peso maior que 2kg)                  | 100.000 UI/kg/dia, a cada 6 horas                      |
| Meningite em neonatos                                   | 150.000 a 250.000UI/kg/dia, a cada 4 a 6 horas         |
| Meningite em maiores                                    | 250.000 UI/kg/dia, a cada 3 a 6 horas                  |

- ▶ **Ajuste de dose:**  
Não é necessário ajuste de dose.
- ▶ **ADMINISTRAÇÃO**  
Intravenosa e Intramuscular  
Intramuscular: Reconstituir em 2mL de água para injetáveis a cada 1 milhão de UI.  
Intravenosa: diluir em SF/SG 5% a solução reconstituída e infundir por 30 a 60 minutos.
- ▶ **ARMAZENAMENTO**  
Conservar em temperatura ambiente 15°C e 30°C.
- ▶ **Atenção:**  
\* Este medicamento é livre de látex.

**BETAISTINA <sup>1,2</sup>**

Antivertiginoso

Nome comercial:  
Labirin 8mg Cp <sup>1,2</sup>

**POSOLOGIA**

**Adultos:**

Dose usual: 8mg, oral, 3 vezes ao dia, durante as refeições.  
Dose máxima: 48mg/dia.

- ▶ **Ajuste de dose:**  
Não é necessário ajuste.
- ▶ **ADMINISTRAÇÃO**  
Oral
- ▶ **Administração com alimentos:**  
Preferencialmente com as refeições.

► **Administração via sonda:**

Pode ser administrado via sonda. Triturar e dispersar em 20ml de água, após dissolução administrar imediatamente.

► **ARMAZENAMENTO**

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

**BETAMETASONA + CLIOQUINOL +  
GENTAMICINA + TOLNAFTATO <sup>1</sup>**

Antimicrobiano Tópico e Corticóide

Nome comercial:

Quadriderm Creme Bis 20g <sup>1</sup>

**POSOLOGIA**

Dose usual: Fina camada de 2 a 3 vezes ao dia.

► **ADMINISTRAÇÃO**

Tópico

► **ARMAZENAMENTO**

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

**BETAMETASONA + GENTAMICINA <sup>1,2</sup>**

Antimicrobiano Tópico e Corticóide

Nome comercial:

Diprogenta Creme Bis 30g <sup>1,2</sup>

Duotrat Creme Bis 30g <sup>1,2</sup>

Trok G Crème Bis 30g <sup>1,2</sup>

**POSOLOGIA**

**Adultos e Crianças:**

Dose usual: Aplicar a quantidade suficiente sobre a área atingida 2 vezes ao dia, manhã e à noite.

► **ADMINISTRAÇÃO**

Tópico

► **ARMAZENAMENTO**

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

► **Atenção:**

Receita Branca (2 vias).

**BETAMETASONA ACETATO + BETAMETASONA  
FOSFATO DISSÓDICO <sup>1</sup>**

Anti-inflamatório Esteroidal Sistêmico

Nome comercial:

Celestone Soluspan Amp 1mL <sup>1</sup>

**POSOLOGIA**

**Adultos e Crianças:**

Dose usual: 1mL, IM, ajustar a dose conforme patologia.

Em casos mais graves, poderá ser necessário 2mL.

► **Ajuste de dose:**

Não é necessário ajuste.

► **ADMINISTRAÇÃO**

Intramuscular

**► ARMAZENAMENTO**

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

**BETAMETASONA DIPROPIONATO + BETAMETASONA FOSFATO DISSÓDICO <sup>1</sup>**

Anti-inflamatório Esteroidal Sistêmico

Nome comercial:

Diprosan 5mg + 2mg Amp 1mL <sup>2</sup>

**POSOLOGIA****Adultos e Crianças:**

Dose usual: 1 a 2mL, IM, ajustar a dose conforme patologia.

**► Ajuste de dose:**

Não é necessário ajuste.

**► ADMINISTRAÇÃO**

Intramuscular

**► ARMAZENAMENTO**

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

**BETAMETASONA VALERATO <sup>1,2</sup>**

Anti-inflamatório Esteroidal Tópico

Nome comercial:

Betametasona Valerato Creme 0,1% Bis 30g (Germed) <sup>1,2</sup>

Betametasona Valerato Creme 0,1% Bis 30g (Medley) <sup>1,2</sup>

Betnovate 0,1% Creme Bis 30g <sup>1</sup>

**POSOLOGIA****Adultos e Crianças:**

Dose usual: O creme deve ser aplicado suavemente, em pequenas quantidades sobre a área afetada, 2 a 3 vezes/dia, a critério médico.

**► ADMINISTRAÇÃO**

Tópico

**► ARMAZENAMENTO**

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

**BETANECOL <sup>1</sup>**

Colinérgico, Disfunção Vesicoesfincteriana

Nome comercial:

Betanecol 10mg Cap Manip <sup>1</sup>

**POSOLOGIA****Adultos e Crianças:**

*Para Retenção Urinária*

Dose usual: 10-50mg, oral, a cada 6 a 8 horas.

*Para Refluxo Gastroesofágico*

Dose usual: 25mg, oral, a cada 6 horas.

**► Ajuste de dose:**

Dado não disponível.

**► ADMINISTRAÇÃO**

Oral

► **Administração com alimentos:**

Administrar 1 hora antes ou 2 horas após a refeição.

► **Administração via sonda:**

Pode ser administrado via sonda. Dispersar o conteúdo da cápsula em 20mL de água. Administrar imediatamente.

► **ARMAZENAMENTO**

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

## BEVACIZUMABE <sup>1</sup>

Antineoplásico Anticorpo Monoclonal

Nome comercial:

Avastin 100mg FA 4mL <sup>1</sup>

Avastin 400mg FA 16mL <sup>1</sup>

### POSOLOGIA

**Adultos:**

De 5 a 15mg/kg de peso corporal, a depender da indicação e esquema quimioterápico.

► **Ajuste de dose:**

A eficácia e a segurança em pacientes com insuficiência renal ou hepática não foram estudadas.

► **ADMINISTRAÇÃO**

Preparo na quimioterapia.

► **ARMAZENAMENTO**

Conservar em refrigeração entre 2°C e 8°C

► **Atenção:**

Alto Custo.

## BEZAFIBRATO <sup>1,2</sup>

Hipolipêmico

Nome comercial:

Bezafibrato 200mg Cp Revestido (EMS) <sup>1,2</sup>

Bezafibrato 200mg Cp Revestido (Germed) <sup>1,2</sup>

### POSOLOGIA

**Adultos:**

Dose inicial: 200mg, oral, a cada 8 horas.

Dose de manutenção: 200mg, oral, a cada 12 horas.

► **Ajuste de dose:**

Insuficiência Renal

| Dose com Função Renal Normal | Dose Insuficiência Renal<br>clearance de creatinina (mL/min) |                 |                           |                    |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|--------------------|
|                              | >60                                                          | 60-40           | 40-15                     | <15                |
| 200mg                        | 200mg<br>8/8h                                                | 200mg<br>12/12h | 200mg<br>24/24h ou 48/48h | Contra<br>indicado |

► **ADMINISTRAÇÃO**

Oral



- ▶ **Administração com Alimentos:**  
Administrar pela manhã ou a tarde, com ou após as refeições.
- ▶ **Administração via sonda:**  
Dissolver em 15mL de água. Após dissolução, administrar imediatamente.
- ▶ **ARMAZENAMENTO**  
Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

## BICALUTAMIDA <sup>1</sup>

Antineoplásico Oral

Nome comercial:  
Casodex 50mg Cp Rev <sup>1</sup>

### POSOLOGIA

#### Adultos:

De 50mg a 150mg/dia, conforme esquema quimioterápico.

- ▶ **Ajuste de dose:**  
Não é necessário ajuste.
- ▶ **ADMINISTRAÇÃO**  
Oral
- ▶ **Administração via sonda:**  
Pode ser administrado via sonda. Triturar e dispersar em 20mL de água, após dissolução administrar imediatamente.  
Preparo na quimioterapia.
- ▶ **ARMAZENAMENTO**  
Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

## BICARBONATO DE SÓDIO <sup>1</sup>

Antiácido

Nome comercial:  
Bicarbonato de Sódio 500mg Cap Manip <sup>1</sup>

### POSOLOGIA

#### Adultos e Crianças > 13 anos:

Alcalinização da urina:

Dose inicial: 4g, oral, a seguir 1 a 2g, oral, a cada 4 horas.

#### Pacientes até 60 anos:

Dose usual: 16 g, oral, a cada 24 horas.

#### Pacientes > 60 anos:

Dose usual: 8g, oral, a cada 24 horas.

#### Antiácido:

Dose usual: 325mg a 2g, oral, a cada 24 ou 6 horas por, no máximo, 2 semanas.

- ▶ **ADMINISTRAÇÃO**  
Oral
- ▶ **Administração com Alimentos:**  
Administrar entre 1 e 3 horas após as refeições. Pode reduzir a absorção de ferro.
- ▶ **Administração via sonda:**  
Pode ser administrado via sonda. Dissolver em 20mL de água, após dissolução administrar imediatamente.
- ▶ **ARMAZENAMENTO**  
Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

**BICARBONATO DE SÓDIO** <sup>1,2</sup>

Eletrólito, Diluente

Nome comercial:

Bicarbonato de Sódio 10% Amp 10mL (Hypofarma) <sup>1</sup>Bicarbonato de Sódio 10% Amp 10mL Manip <sup>1</sup>Bicarbonato de Sódio 8,4% Amp 10mL Manip <sup>1,2</sup>Bicarbonato de Sódio 8,4% Fr 250mL <sup>1,2</sup>**POSOLOGIA****Adultos:***Parada Cardiorrespiratória:*

Dose usual: 1mEq/Kg, IV, seguido de 0,5mEq/Kg, a cada 10 min, até que a reanimação seja completa.

*Acidez metabólica:*

Dose usual: 2 a 5mEq/Kg, IV lento, a cada 4 a 8 horas.

Administrar em via exclusiva.

*Alcalinizante urinário:*

Dose usual: 2 a 5mEq/Kg, IV lento, a cada 4 a 8 horas.

▶ **ADMINISTRAÇÃO**

Intravenoso

▶ **ARMAZENAMENTO**

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

**BILASTINA** <sup>1</sup>

Anti-histamínico H1

Nome comercial:

Alektos 20mg Cp <sup>1</sup>**POSOLOGIA****Adultos:**

Dose usual: 20mg, oral, a cada 24 horas.

▶ **Ajuste de dose:**

Não é necessário ajuste.

▶ **ADMINISTRAÇÃO**

Oral

A linha de sulco (divisão) pode ser usada para dividir o comprimido em duas partes, caso haja dificuldade de deglutição.

▶ **Administração com Alimentos:**

Os comprimidos devem ser ingeridos com água em quantidade suficiente, em jejum, 1 hora antes ou 2 horas após a ingestão de alimentos ou bebidas.

▶ **Administração via sonda:**

Pode ser administrado via sonda. Triturar e dispersar em 20mL de água, após dissolução administrar imediatamente

▶ **ARMAZENAMENTO**

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

**BIPERIDENO** <sup>1</sup>

Antiparkinsoniano

Nome comercial:

Akineton 2mg Cp <sup>1</sup>Cinetol 2mg Cp <sup>1</sup>

**POSOLOGIA****Adultos:**

Dose usual: 2mg, oral, a cada 6 ou 8 horas.

Dose máxima: 16mg/dia.

Crianças 3 a 15 anos:

Dose usual: 1 a 2mg/dia.

▶ **Ajuste de dose:**

Dado não disponível.

▶ **ADMINISTRAÇÃO**

Oral

▶ **Administração com Alimentos:**

Evitar o consumo de bebidas alcoólicas (aumenta a sedação). Administrar preferencialmente durante ou após uma refeição, para minimizar os efeitos indesejáveis no sistema gastrointestinal.

▶ **Administração via sonda:**

Pode ser administrado via sonda. Triturar e dispersar em 20mL de água, após dissolução administrar imediatamente.

▶ **ARMAZENAMENTO**

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

▶ **Atenção:**

Receita Branca (2 vias).

**BISACODIL <sup>1,2</sup>**

Laxante

Nome comercial:

Dulcolax 5mg Drg <sup>1,2</sup>

**POSOLOGIA****Adultos e Crianças >12 anos:**

Dose usual: 5 a 10mg, oral, à noite.

Dose máxima: 30mg/dia.

▶ **Ajuste de dose:**

Dado não disponível.

▶ **ADMINISTRAÇÃO**

Oral

▶ **Administração com Alimento:**

As drágeas não devem ser ingeridas com produtos que reduzem a acidez no trato gastrointestinal superior, como leite, antiácidos ou inibidores da bomba de prótons, para que o revestimento entérico não se dissolva prematuramente.

▶ **Administração via sonda:**

Não recomendado por risco de obstrução.

▶ **ARMAZENAMENTO**

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

**BISACODIL + SÓDIO DOCUSATO <sup>1</sup>**

Laxante

Nome comercial:

Humectol D Cp Rev <sup>1</sup>

**POSOLOGIA****Adultos:**

Dose usual: 1 a 2 Cp Rev, oral, ao deitar-se.

**Crianças > 5 anos:**

Dose usual: 1 Cp Rev, oral, ao deitar-se.

▶ **Ajuste de dose:**

Dado não disponível.

▶ **ADMINISTRAÇÃO**

Oral

▶ **ARMAZENAMENTO**

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

**BISOPROLOL** <sup>1,2</sup>

Agente Anti-hipertensivo

Nome comercial:

Concor 2,5mg Cp Rev <sup>1,2</sup>

**POSOLOGIA****Adultos:**

*Hipertensão arterial, cardiopatias coronarianas (angina de peito):*

Dose usual: 5 a 10mg, oral, pela manhã.

*Insuficiência cardíaca congestiva crônica estável, de grau médio a grave, com função ventricular sistólica deprimida:*

Dose inicial: 1,25mg/dia, oral, pela manhã, aumentar lentamente até 10mg máximo.

▶ **Ajuste de dose:**

Pacientes com Insuficiência Renal/Hepática não devem exceder a dose diária de 10mg.

▶ **ADMINISTRAÇÃO**

Oral

▶ **Administração com Alimento:**

Administrar com algum líquido, pela manhã, antes, durante ou após o café da manhã.

▶ **Administração via sonda:**

Pode ser administrado via sonda. Não triturar. Dispersar em 20mL de água, após dissolução administrar imediatamente

▶ **ARMAZENAMENTO**

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

**BLEOMICINA** <sup>1</sup>

Antineoplásico Citotóxico

Nome comercial:

Bleomicina 15UI FA (Baxter) <sup>1</sup>

Bonar 15UI FA <sup>1</sup>

**POSOLOGIA****Adultos:**

0,25 a 0,50 unidades/kg uma ou duas vezes por semana, a depender da indicação e esquema quimioterápico.

▶ **Ajuste de dose:**

| Clearance de creatinina (ml/min.) | % Dose |
|-----------------------------------|--------|
| >50                               | 100%   |
| 40 a 50                           | 70%    |

|         |     |
|---------|-----|
| 30 a 40 | 60% |
| 20 a 30 | 55% |
| 10 a 20 | 45% |
| 5 a 10  | 40% |

- ▶ **ADMINISTRAÇÃO**  
Preparo na quimioterapia.
- ▶ **ARMAZENAMENTO**  
Conservar em refrigeração entre 2°C e 8°C.  
Após reconstituído é estável em até 24 horas em temperatura ambiente entre 15°C a 30°C.

**BORTEZOMIBE** <sup>1</sup> Antineoplásico Citotóxico

Nome comercial:  
Velcade 3,5mg FA <sup>1</sup> \*

**POSOLOGIA**

**Adultos:**  
Dose usual: 1,3 mg/m<sup>2</sup>/dose administrada 2 vezes por semana durante 2 semanas (Dias 1, 4, 8 e 11), seguido por um período de repouso de 10 dias (Dias 12 a 21).  
Ou conforme esquema quimioterápico.

- ▶ **Ajuste de dose:**  
Não é necessário ajuste de dose para insuficiência renal.  
Para insuficiência hepática, o tratamento deve ser iniciado utilizando uma dose reduzida de 0,7 mg/m<sup>2</sup> por injeção durante o primeiro ciclo e subseqüentes aumentos gradativos da dose para 1,0 mg/m<sup>2</sup> ou reduções de dose para 0,5 mg/m<sup>2</sup> podem ser considerados, com base na tolerância do paciente
- ▶ **ADMINISTRAÇÃO**  
Preparo na quimioterapia.
- ▶ **ARMAZENAMENTO**  
Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.  
Após preparo, manter por até 8 horas no frasco original ou por até 3 horas na seringa, a uma temperatura inferior a 25°C.
- ▶ **Atenção:**  
Alto Custo.  
\* Este medicamento é livre de látex.

**BRENTUXIMABE** <sup>1</sup> Antineoplásico Anticorpo Monoclonal

Nome comercial:  
Adcetris 50mg FA (Takeda) <sup>1</sup> \*

**POSOLOGIA**

**Adultos:**  
De 1,2 a 1,8mg/kg de peso corporal, a depender da indicação e esquema quimioterápico.

- ▶ **Ajuste de dose:**  
pacientes com insuficiência hepática e renal 1,2 mg/kg de peso corporal.
- ▶ **ADMINISTRAÇÃO**  
Preparo na quimioterapia.

► **ARMAZENAMENTO**

Conservar em refrigeração entre 2°C e 8°C.

Solução diluída: administrar imediatamente ou conservar em refrigeração entre 2°C e 8°C por até 24h.

► **Atenção:**

\* Este medicamento é livre de látex.

## BROMAZEPAM<sup>1,2</sup>

Ansiolítico

Nome comercial:

Lexotan 3mg Cp<sup>1,2</sup>

Somalium 3mg Cp<sup>1,2</sup>

### POSOLOGIA

**Adultos:**

Dose usual: 1,5 a 12mg, oral, em doses fracionadas a cada 12 ou 8 horas.

Casos *Graves*:

Dose usual: 6 a 12mg, oral, em doses fracionadas a cada 12 ou 8 horas.

Dose máxima: 36mg/dia.

► **Ajuste de dose:**

Insuficiência hepática deve-se ajustar para a menor dose possível.

► **ADMINISTRAÇÃO**

Oral

► **Administração via sonda:**

Pode ser administrado via sonda. Triturar e dispersar em 20mL de água, após dissolução administrar imediatamente.

► **ARMAZENAMENTO**

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

► **Atenção:**

Receita B1 Azul.

## BROMOPRIDA<sup>1,2</sup>

Antiemético, Procinético

Nome comercial:

Bromogex 10mg (5mg/ml) Amp 2ml<sup>1,2</sup>

Bromoprida 10mg Amp 2ml (União Química)<sup>1,2</sup>

Bromoprida 10mg (5mg/ml) Amp 2ml (Novafarma)<sup>1,2</sup>

Digesan 10mg Amp 2mL<sup>1,2</sup>

Plamet 10mg Amp 2mL<sup>1,2</sup>

### POSOLOGIA

**Adultos:**

Dose usual: 10 a 20mg, IM ou IV, 1 vez ao dia.

**Crianças:**

Dose usual: 0,5 a 1mg/Kg/dia, IM ou IV, fracionado a cada 8 horas.

► **Ajuste de dose:**

pacientes com depuração de creatinina inferior a 40 mL/min, o tratamento deve ser iniciado com aproximadamente metade da dose recomendada.

► **ADMINISTRAÇÃO**

Intravenoso, intramuscular

*Intravenoso*: 10mg em 10mL de SF ou SG5%. Infundir lentamente, superior a 3 minutos.

Concentração máxima de diluição: 40mg em 10mL SF.

**► ARMAZENAMENTO**

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

**BROMOPRIDA <sup>1</sup>**

Antiemético, Procinético

Nome comercial:

Digesan 10mg Cap <sup>1</sup>

**POSOLOGIA****Adultos:**

Dose usual: 10mg, oral, a cada 12 ou 8 horas.

Dose máxima: 60mg/dia

**► Ajuste de dose:**

pacientes com depuração de creatinina inferior a 40 mL/min, o tratamento deve ser iniciado com aproximadamente metade da dose recomendada.

**► ADMINISTRAÇÃO**

Oral

**► Administração com Alimentos:**

Evitar consumo de bebidas alcoólicas durante o tratamento, pois a bromoprida acelera a sua absorção.

**► Administração via sonda:**

Substituir pela apresentação em solução oral.

**► ARMAZENAMENTO**

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

**BROMOPRIDA <sup>1,2</sup>**

Antiemético, Procinético

Nome comercial:

Bromoprida Gts 4mg/mL Fr 20mL (EMS) <sup>1,2</sup>

Bromoprida Gts 4mg/mL Fr 20mL (Medley) <sup>1,2</sup>

Bromoprida Gts 4mg/mL Fr 20mL (Biosintética) <sup>1,2</sup>

Plamet 4mg/mL Fr 20mL <sup>1,2</sup>

Digesan Gts 4mg/mL Fr 20mL <sup>1,2</sup>

**POSOLOGIA****Adultos**

Dose recomendada: 10mL (10mg) a cada 12 ou 8 horas.

Dose máxima: 60mg/dia

**Crianças**

Dose usual: 1 a 2 gotas/kg, 3 vezes ao dia.

**► Ajuste de dose:**

pacientes com depuração de creatinina inferior a 40 mL/min, o tratamento deve ser iniciado com aproximadamente metade da dose recomendada.

**► ADMINISTRAÇÃO**

Oral

**► Administração com Alimentos:**

Evitar consumo de bebidas alcoólicas durante o tratamento, pois a bromoprida acelera a sua absorção.

**► Administração via sonda:**

Pode ser administrado via sonda. Diluir em 20mL de água.

**► ARMAZENAMENTO**

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

**BUDESONIDA <sup>1</sup>**

Anti-inflamatório Esteroidal Sistêmico

Nome comercial:

Budesonida 3mg Cap Gastrorresistente Manip <sup>1</sup>Entocort 3mg Cap Lib Prolongada <sup>1</sup>**POSOLOGIA****Adultos:**

Dose usual: 9mg, 24/24h, pela manhã, oral ou 4,5mg, 12/12h (manhã e noite), por 8 semanas, oral.

▶ **Ajuste de dose:**

Insuficiência Hepática pode ser necessário redução da dose, monitorar.

▶ **ADMINISTRAÇÃO**

Oral

▶ **Administração via sonda:**

Não se recomenda a administração via sonda.

▶ **ARMAZENAMENTO**

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

**BUDESONIDA <sup>1</sup>**

Anti-inflamatório Esteroidal Sistêmico

Nome comercial:

Budesonida 2mg Fr Enema 100mL Manip <sup>1</sup>**POSOLOGIA****Adultos**

Dose usual: 2mg, VR, a cada 24 horas.

▶ **Ajuste de dose:**

Dado não disponível

▶ **ADMINISTRAÇÃO**

Retal

▶ **ARMAZENAMENTO**

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

**BUDESONIDA <sup>1,2</sup>**

Broncodilatador

Nome comercial:

Pulmicort 0,5mg/mL Suspensão p/ Nebulização Fr 2mL <sup>1,2</sup>**POSOLOGIA****Adultos:**

Dose inicial: 1 a 2mg, 24/24h, inalatório.

Dose de manutenção: 0,5 a 4mg, 24/24h, via inalatório.

▶ **Ajuste de dose:**

Dado não disponível

▶ **ADMINISTRAÇÃO**

Inalatório

Diluir em SF ou em soluções para nebulização de terbutalina, salbutamol, fenoterol, acetilcisteína, cromoglicato de sódio ou brometo de ipratrópio. A mistura deve ser usada em até 30 minutos.



► **ARMAZENAMENTO**

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

Após abertura de um frasco, o conteúdo do mesmo deve ser usado dentro de 12 horas.

**BUDESONIDA** <sup>1,2</sup>

Broncodilatador

Nome comercial:

Budecort Aqua 64mcg/dose Spray Nasal Fr <sup>1,2</sup>

**POSOLOGIA**

Dose usual: 256mcg, 24/24h, pela manhã ou 128mcg, 12/12h, pela manhã e à noite, via nasal.

Dose de manutenção: ajustar para a menor dose, necessária ao controle dos sintomas.

► **Ajuste de dose:**

Dado não disponível

► **ADMINISTRAÇÃO**

Nasal

► **ARMAZENAMENTO**

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

**BUDESONIDA+ FORMOTEROL** <sup>1</sup>

Broncodilatador

Nome comercial:

Alenia 12mcg + 400mcg Caps Inalatórias <sup>1</sup>

Foraseq 12mcg + 400mcg Caps Inalatórias <sup>1</sup>

**POSOLOGIA**

**Adultos:**

Dose usual: 6mcg de formoterol e 100 mcg de budesonida a 12mcg de formoterol e 200 mcg de budesonida, 2 vezes ao dia.

Dose máxima: 24mcg de formoterol e 400mcg de budesonida/dia.

► **Ajuste de dose:**

Não é necessário ajuste.

► **ADMINISTRAÇÃO**

Inalatório

► **ARMAZENAMENTO**

Conservar em temperatura entre 15°C e 30°C.

**BUPIVACAÍNA** <sup>1,2</sup>

Anestésico Local

Nome comercial:

Bupstesc 0,5% S/ Adrenalina FA 20mL <sup>1,2</sup>

Neocaína 0,5% S/ Adrenalina FA 20mL <sup>1,2 \*</sup>

**POSOLOGIA**

**Adultos:**

*Infiltração local:*

Dose usual: até 150mg

*Bloqueio Peridural:*

Dose usual: 50 a 150mg

*Bloqueio Caudal:*

Dose usual: 20 a 150mg

*Nervos periféricos:*

Dose usual: 50 a 150mg

► **Ajuste de dose:**

Dado não disponível

► **ADMINISTRAÇÃO**

Epidural

► **ARMAZENAMENTO**

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

► **Atenção:**

\* Este medicamento é livre de látex.

## BUPIVACAÍNA <sup>1</sup>

Anestésico Local

Nome comercial:

Neocaína Isobárica 0,5% Amp 4mL <sup>1,2</sup>

### POSOLOGIA

**Adultos:**

Dose usual: 15 a 20mg.

Dose máxima: 20mg.

► **Ajuste de dose:**

Dado não disponível

► **ADMINISTRAÇÃO**

Peridural

► **ARMAZENAMENTO**

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

## BUPIVACAÍNA + EPINEFRINA <sup>1,2</sup>

Anestésico Local

Nome comercial:

Neocaína 0,5% C/ Epinefrina FA 20mL <sup>1,2</sup> \*

Bupstestic 0,5% C/ Epinefrina FA 20mL <sup>1,2</sup> \*

### POSOLOGIA

**Adultos:**

Dose máxima: 2mg/Kg até 150mg em um período de 4 horas.

*Bloqueio do trigêmeo:*

Dose usual: 2,5 a 12,5mg.

*Anestesia peridural contínua:*

Dose usual: 50mg, seguido de 15 a 40mg, cada 6 ou 4 horas.

*Bloqueio Intercostal:*

Dose usual: 10 a 15mg.

*Bloqueios maiores:*

Dose usual: 75 a 150mg.

► **Ajuste de dose:**

Dado não disponível

► **ADMINISTRAÇÃO**

Peridural

► **ARMAZENAMENTO**

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

► **Atenção:**

\* Estas apresentações são livres de látex.

## BUPIVACAÍNA + GLICOSE <sup>1,2</sup>

Anestésico Local

Nome comercial:

Neocaína Pesada 0,5% Amp 4mL <sup>1,2</sup>

### POSOLOGIA

**Adultos (raquianestesia):**

*Anestesia para extremidades inferiores e para procedimentos cirúrgicos perineais e histerectomia vaginal:*

Dose usual: 7,5mg ou 1,5mL, sob anestesia espinal.

*Anestesia em procedimentos no baixo abdômen como histerectomia abdominal, ligação tubária, apendicectomias:*

Dose usual: 12mg ou 2,4mL, sob anestesia espinal.

*Uso obstétrico como parto vaginal:*

Dose usual: 6mg, sob anestesia espinal.

Dose máxima: 7,5 a 10,5mg (1,5 a 2,1mL).

► **Ajuste de dose:**

Dado não disponível

► **ADMINISTRAÇÃO**

Peridural

► **ARMAZENAMENTO**

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

## BUPRENORFINA <sup>1,2</sup>

Analgésicos Narcóticos

Nome comercial:

Restiva 5mg Adv Transdérmico <sup>1,2</sup>

Restiva 10mg Adv Transdérmico <sup>1</sup>

Transtec 20mg Adv Transdérmico <sup>1</sup>

Transtec 30mg Adv Transdérmico <sup>1</sup>

Transtec 40mg Adv Transdérmico <sup>1</sup>

### POSOLOGIA

**Dose inicial: 5 mg.**

A titulação deve continuar a cada 3-7 dias, até que a analgesia adequada seja alcançada.

► **Ajuste de dose:**

Pacientes com insuficiência hepática grave podem acumular buprenorfina durante o tratamento.

► **ADMINISTRAÇÃO**

Tópico

Uso transdérmico por 7 dias.

► **ARMAZENAMENTO**

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

► **Atenção:**

Não pode ser cortado.

**BUPROPIONA** <sup>1,2</sup>

Antidepressivo

Nome comercial:

Bup 150mg Cp Ação Prolongada <sup>1,2</sup>Bupropiona 150mg Cp Ação prolongada (Germed) <sup>1,2</sup>Bupropiona 150mg Cp Lib Lenta (Eurofarma) <sup>1,2</sup>Bupropiona 150mg Cp Rev Lib lenta (EMS) <sup>1,2</sup>Wellbutrin Sr 150mg Cp Rev Ação Prolongada <sup>1,2</sup>Zyban 150mg Cp Ação Prolongada <sup>1,2</sup>Zetron 150mg Cp Rev Ação Prolongada <sup>1,2</sup>**POSOLOGIA****Adulto:**

|             |                                                                                                   |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dose padrão | 150mg, uma vez ao dia                                                                             |
| Tabagismo   | - Dose padrão: 150mg, por 3 dias<br>- Dose manutenção: 150mg, a cada 12 horas, por 7 a 12 semanas |

▶ **Ajuste de dose:**

Insuficiência Hepática: pode ser necessário redução de dose.

▶ **ADMINISTRAÇÃO**

Oral

Orientação da administração do medicamento.

▶ **Administração com alimentos:**

Evitar o consumo de álcool.

▶ **ARMAZENAMENTO**

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

▶ **Atenção:**

Receita Médica Branca (2 vias).

**BUSPIRONA** <sup>1</sup>

Ansiolítico

Nome comercial:

Ansitec 10mg Cp <sup>1</sup>**POSOLOGIA****Adulto:**

|                 |                                                                      |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------|
| Dose padrão     | 5mg, a cada 8 horas (preferencialmente nos intervalos das refeições) |
| Dose manutenção | 5mg, a cada 2 ou 3 dias                                              |

▶ **Ajuste de dose:**

Insuficiência renal: em casos graves, não é recomendado.

Insuficiência hepática: em casos graves, não é recomendado.

▶ **ADMINISTRAÇÃO**

Oral

Orientação da administração do medicamento.

▶ **Administração via sonda:**

Pode ser administrado via sonda. Dispersar em 10mL de água e administrar imediatamente separadamente da via enteral.

▶ **ARMAZENAMENTO**

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

- ▶ **Atenção:**  
Receita Médica Branca (2 vias).  
Risco de Queda.

**BUSSULFANO <sup>1</sup>**
Antineoplásico Citotóxico

Nome comercial:  
Busilvex 60mg FA 10mL <sup>1</sup>

**POSOLOGIA**

**População:**  
Conforme esquema quimioterápico.

- ▶ **ARMAZENAMENTO**  
Conservar em refrigeração entre 2°C e 8°C.

**BUSSULFANO <sup>1</sup>**
Antineoplásico Oral

Nome comercial:  
Myleran 2mg Cp <sup>1</sup>

**POSOLOGIA**

**População:**  
Conforme esquema quimioterápico.

- ▶ **Administração via sonda:**  
Pode ser administrado via sonda. Triturar e dispersar em 20ml de água, após dissolução administrar imediatamente.  
Preparo deve ser feito na quimioterapia.
- ▶ **ARMAZENAMENTO**  
Conservar em refrigeração entre 2°C e 8°C.

**CARBONATO DE CÁLCIO <sup>1,2</sup>**

Eletrólito Oral

Nome comercial:  
Oscal 500mg Cp <sup>1,2</sup>

**POSOLOGIA****Adultos e Crianças:**

500 mg a cada 24 h.

▶ **Ajuste de Insuficiência Renal:**

Pode ser necessário o ajuste de dose, monitorar.

Em caso grave: não é recomendado o uso.

▶ **ADMINISTRAÇÃO**

Oral

▶ **ARMAZENAMENTO**

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

**CARBONATO DE CÁLCIO + VITAMINA D <sup>1</sup>**

Eletrólito Oral

Nome comercial:  
Oscal D 500mg + 400ui Cp Rev <sup>1</sup>

**POSOLOGIA****Adultos:**

500 mg a cada 24 ou 12 h

**Crianças:**

500 mg a cada 24 h

▶ **Ajuste de Insuficiência Renal:**

Pode ser necessário o ajuste de dose, monitorar.

Em caso grave: não é recomendado o uso.

▶ **ADMINISTRAÇÃO**

Oral, preferencialmente durante as refeições

▶ **ARMAZENAMENTO**

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

**CÁLCIO CLORETO + POTÁSSIO + SÓDIO CLORETO <sup>1</sup>**

Eletrólito, Diluente

Nome comercial:  
Soro Ringer Simples Bolsa 500mL <sup>1</sup>

**POSOLOGIA****Adultos e Crianças:**

A critério médico.

▶ **Armazenagem:**

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

**CÁLCIO CLORETO + POTÁSSIO + SÓDIO  
CLORETO + SÓDIO LACTATO <sup>1</sup>**

Eletrólito, Diluente

Nome comercial:  
Soro Ringer Lactato Bolsa 500mL <sup>1</sup>

## POSOLOGIA

### Adultos e Crianças:

A critério médico.

#### ► **Armazenagem:**

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

## CÁLCIO POLIESTIRENOSSULFONATO <sup>1</sup>

Resina de Troca Iônica

Nome comercial:

Calnate 900mg/g Env 30g <sup>1</sup>

Sorcal 900mg/g Env 30g <sup>1</sup>

## POSOLOGIA

### Adultos:

15g, oral, a cada 8 ou 6 horas.

### Em caso de vômito:

30g, via retal, retido por 9 horas.

### Crianças:

1g/Kg/dia em doses divididas. Dose de manutenção: 0,5g/Kg/dia em doses divididas.

### Em caso de vômito:

1g/Kg/dia em doses divididas via retal, retido por 9 horas.

#### ► **ADMINISTRAÇÃO**

Via oral

Via retal: diluir em 100 mL de sorbitol. Aquecer a temperatura corporal (36,5°C).

#### ► **Administração com Alimentos:**

Evitar a administração com sucos de frutas ou bebidas ricas em potássio.

#### ► **ARMAZENAMENTO**

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

## CALCITRIOL <sup>1</sup>

Vitamina e Suplemento Mineral

Nome comercial:

Calcijex 1mcg/mL Amp 1mL <sup>1</sup>

## POSOLOGIA

### Adultos:

Dose usual: 1mcg (0,02mcg/Kg) a 2mcg, 3 vezes/semana, em dias alternados.

#### ► **ADMINISTRAÇÃO**

Intravenosa Direta: não diluir.

#### ► **ARMAZENAMENTO**

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C. Proteger da luz.

## CALCITRIOL <sup>1,2</sup>

Vitamina e Suplemento Mineral

Nome comercial:

Rocaltrol 0,25mcg Cap <sup>1,2</sup>

Sigmatriol 0,25mcg Cap <sup>1,2</sup>

## POSOLOGIA

### Adultos:

A dose diária recomendada deve ser cuidadosamente determinada em função do nível sérico de cálcio de cada paciente, sendo sempre iniciada com as doses mais baixas possíveis.

*Osteoporose:*

Dose de 0,25 mcg duas vezes ao dia.

*Osteodistrofia renal (paciente em diálise):*

Normocálcicos: 0,25 mcg a cada dois dias

*Hipoparatiroidismo e raquitismo:*

Dose de 0,25 mcg/dia, pela manhã.

**Crianças:**

Dose usual: 0,25 a 2mcg/dia, oral.

#### ► **ADMINISTRAÇÃO**

##### **Administração com Alimentos:**

O medicamento deve ser administrado, preferencialmente, com alimentos para reduzir o desconforto gastrointestinal. Deve-se calcular a ingestão diária aproximada de cálcio com a dieta e mantê-la constante durante o tratamento.

##### **Administração via Sonda:**

Pode ser administrado via sonda. Esvaziar o conteúdo da cápsula, adicioná-lo a 15mL de água e administrar imediatamente.

#### ► **ARMAZENAMENTO**

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C. Proteger da luz e umidade.

## **CAMOMILA EXTRATO <sup>1</sup>**

Hidratante, Protetor Epidérmico

Nome comercial:

Camomila Extrato 2% (20mg/g) Creme Bis 30g Manip <sup>1</sup>

### **POSOLOGIA**

#### **Adultos e Crianças:**

Dose usual: Aplicar uma fina camada sobre a área afetada, 3 vezes/dia ou a critério médico. Verificando a melhora do quadro clínico, aplicar 2 vezes/dia.

#### ► **ADMINISTRAÇÃO**

Via Tópica

#### ► **ARMAZENAMENTO**

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

## **CANDESARTANA <sup>1</sup>**

Agente Anti-hipertensivo

Nome comercial:

Atacand 8mg Cp <sup>1</sup>

Blopress 8mg Cp <sup>1</sup>

### **POSOLOGIA**

#### **Adultos:**

4 a 8mg, oral, a cada 24 horas.

Dose de manutenção: 8 a 16mg, oral, a cada 24 horas.

Dose máxima: 32mg/dia, para pacientes que requerem maior redução de pressão sanguínea.

#### ► **Ajuste de Insuficiência Renal/Hepática:**

Pode ser necessário o ajuste de dose, monitorar.

#### ► **ADMINISTRAÇÃO**

Via oral



- Administrar o medicamento com ou sem alimentos. Evitar angélica chinesa (atividade de estrogênica), efedra, ginseng, ioimbina (aumenta a hipertensão) e alho (aumento do efeito anti-hipertensivo).
- ▶ **Via Sonda**  
Pode ser administrado via sonda. Triturar e dispersar em 10mL de água, após dissolução administrar imediatamente.
  - ▶ **ARMAZENAMENTO**  
Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

**CAPECITABINA <sup>1</sup>**
Antineoplásico Oral

Nome comercial:  
Corretal 500mg Cp Rev <sup>1</sup>  
Xeloda 500mg Cp Rev <sup>1</sup>

**POSOLOGIA**

**Adultos:**  
1.250 mg/m², duas vezes ao dia, conforme esquema quimioterápico.

- ▶ **ADMINISTRAÇÃO**  
**Via Oral**  
Ingerir com água junto ou em até 30 minutos após as refeições. Alimentos reduzem a taxa e a extensão da absorção da capecitabina.  
**Via Sonda**  
Pode ser administrado via sonda. Triturar e dispersar em 50ml de água, após dissolução administrar imediatamente.  
Preparo deve ser feito na quimioterapia
- ▶ **ARMAZENAMENTO**  
Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

**CAPTOPRIL <sup>1,2</sup>**
Agente Anti-hipertensivo

Nome comercial:  
Captopril 12,5mg Cp (EMS) <sup>1,2</sup>  
Captopril 12,5mg Cp (Medley) <sup>1,2</sup>  
Captopril 25mg Cp (EMS) <sup>1,2</sup>  
Captopril 25mg Cp (Medley) <sup>1,2</sup>  
Captopril 25mg Cp (Prati Donaduzzi) <sup>1,2</sup>

**POSOLOGIA**

|                                                                                                                    |                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Adultos:</b>                                                                                                    |                                                                                     |
| Hipertensão<br>Inicial: 25 mg                                                                                      | oral, 2x ao dia                                                                     |
| Manutenção: 50 – 100 mg<br>Dose máxima: 450mg/dia.                                                                 | oral, 1x ao dia                                                                     |
| Insuficiência cardíaca<br>6,25 ou 12,5mg, dose máxima 450 mg/dia                                                   | oral, a cada 12 ou 8 horas                                                          |
| Infarto do miocárdio:<br>Dose inicial: 6,25mg/dia, oral<br>Intermediária: para 37,5mg/dia<br>Manutenção: 150mg/dia | 3 dias após o episódio de infarto<br>Fracionado, 3x ao dia<br>Fracionado, 3x ao dia |

► **Ajuste de Insuficiência Renal:**

| Dose com Função Renal Normal | Dose Insuficiência Renal<br>clearance de creatinina (mL/min) |             |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------|
| 450 mg                       | 10-50                                                        | < 10        |
|                              | 75% da dose                                                  | 50% da dose |

► **ADMINISTRAÇÃO****Via oral**

Preferencialmente, 1 hora antes das refeições. Evitar angélica chinesa, efedra, ginseng, ioimbina e alho.

**Via Sonda**

Não triturar. Dispersar em 10mL de água, após dissolução administrar imediatamente.

► **ARMAZENAMENTO**

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

**CARBAMAZEPINA** <sup>1,2</sup>

Anticonvulsivante

Nome comercial:

Tegretol 200mg Cp <sup>1,2</sup>

Tegretol 400mg Cp <sup>1</sup>

Tegretol CR 200mg Cp <sup>1,2</sup>

**POSOLOGIA****Adultos:**

Dose inicial: 100 a 200mg, oral, a cada 24 ou 12 horas (aumentar a dose gradualmente).

Dose usual: 800 a 1200mg, oral, fracionados a cada 12 ou 8 horas.

Dose máxima: 2000mg/dia.

► **Ajuste de Insuficiência Renal:**

| Dose com Função Renal Normal | Dose Insuficiência Renal<br>clearance de creatinina (mL/min) |       |                    |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------|--------------------|
| 1- 2g 8/8h                   | >80                                                          | 80-50 | 50-10              |
|                              | Sem ajuste                                                   |       | 75% da dose normal |

► **ADMINISTRAÇÃO****Via Oral:**

Administrar o medicamento preferencialmente com alimentos. Evitar o consumo de bebidas alcoólicas, prímula, suco de toranja (grapefruit), Erva-de-São-João, *Centella asiática*, kava kava, valeriana.

**Via sonda:**

Pode ser administrado via sonda. Triturar e dispersar em 10ml de água, após dissolução administrar imediatamente.

► **ARMAZENAMENTO**

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

► **Atenção:**

Receita Branca (2 vias).

Risco de Queda.

# CARBOPLATINA <sup>1</sup>

Antineoplásico Citotóxico

Nome comercial:

- Fauldcarbo 50mg FA 5mL <sup>1</sup> \*
- Platamine 50mg FA 5mL <sup>1</sup>
- Fauldcarbo 150mg FA 15mL <sup>1</sup> \*
- Platamine 150mg FA 15mL <sup>1</sup>
- Fauldcarbo 450mg FA 45mL <sup>1</sup> \*
- Platamine 450mg FA 45mL <sup>1</sup>

## POSOLOGIA

### Adultos:

Conforme esquema quimioterápico.

#### ▶ ADMINISTRAÇÃO

Preparo na quimioterapia.

#### ▶ ARMAZENAMENTO

Conservar em temperatura ambiente menor que 25°C.

Após diluição, estável por 24h sob refrigeração de 2°C à 8°C.

#### ▶ Atenção:

\* Estas apresentações são livres de látex.

# CARBOXIMALTOSÉ FÉRRICA <sup>1</sup>

Antianêmicos

Nome comercial:

- Ferinject 500mg FA 10mL <sup>1</sup> \*

## POSOLOGIA

### Adulto:

A dose, a forma de administração, frequência e duração do tratamento devem ser estabelecidos pelo médico levando em conta os parâmetros hematológicos de deficiência de ferro.

A dose acumulativa para reposição de ferro é determinada com base no peso corporal do paciente e no nível de hemoglobina, não devendo ser excedida:

|               |                                               |
|---------------|-----------------------------------------------|
| 35 a 70kg     | - Hb g/dL<10: 1500mg<br>- Hb g/dL> 10: 1000mg |
| Acima de 70kg | - Hb g/dL<10: 2000mg<br>-Hb g/dL > 10: 1500mg |

#### ▶ Ajuste de dose:

Não é necessário ajuste de dose.

#### ▶ ADMINISTRAÇÃO

Intravenosa

Diluir: 100 a 200mg em 50mL de SF.

> 200 a 500mg em 100mL de SF.

> 500 a 1000mg em 250mL de SF.

#### ▶ ARMAZENAMENTO

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

#### ▶ Atenção:

\* Este medicamento é livre de látex.

## CARBOXIMETILCELULOSESÓDICA(CARMELOSE)<sup>1,2</sup> Lubrificante Oftálmico

Nome comercial:

Fresh Tears Sol Oft Fr 10mL <sup>1,2</sup>

### POSOLOGIA

#### Adulto e Criança:

Dose padrão | 1 a 2 gotas nos olhos afetados, quantas vezes forem necessárias

► **Ajuste de dose:**

Não é necessário ajuste de dose.

► **ADMINISTRAÇÃO**

Via ocular.

► **ARMAZENAMENTO**

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

## CARMELOSE SÓDICA + ASSOCIAÇÕES <sup>1</sup>

Lubrificante Oftálmico

Nome comercial:

Optive UD Flac 0,4mL <sup>1</sup>

### POSOLOGIA

#### Adulto e Criança:

Dose padrão | 1 a 2 gotas nos olhos, quantas vezes forem necessárias

► **Ajuste de dose:**

Não é necessário ajuste de dose.

► **ADMINISTRAÇÃO**

Via ocular.

► **ARMAZENAMENTO**

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

## CARMUSTINA <sup>1</sup>

Antineoplásico Citotóxico

Nome comercial:

Becenun 100mg FA <sup>1</sup>

### POSOLOGIA

#### Adulto:

Conforme esquema quimioterápico.

► **ARMAZENAMENTO**

Conservar em refrigeração entre 2°C e 8°C.

Após preparo, possui estabilidade de 24 horas em refrigeração entre 2°C e 8°C.

## CARVÃO ATIVADO <sup>1,2</sup>

Antídoto

Nome comercial:

Carvão Ativado 10g Env Manip <sup>1,2</sup>

**POSOLOGIA**

**Adulto:**

|                      |                                                                    |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Suplemento dietético | 500 a 520mg, após as refeições. Se necessário, repetir em 2 horas. |
| Intoxicação aguda    | 10g para cada 1g de toxina. Não ultrapassar 2 doses/dia.           |

- ▶ **Ajuste de dose:**  
Não é necessário ajuste de dose.
- ▶ **ADMINISTRAÇÃO**  
Oral
- ▶ **ARMAZENAMENTO**  
Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

**CARVEDILOL** <sup>1,2</sup>

Agente Anti-hipertensivo

Nome comercial:  
 Carvedilol 3,125mg Cp (EMS) <sup>1</sup>  
 Carvedilol 3,125mg Cp (Biosintética) <sup>1</sup>  
 Cardilol 3,125mg Cp <sup>1</sup>  
 Cardilol 12,5mg Cp <sup>1</sup>  
 Carvedilol 6,25mg Cp (Biosintética) <sup>1,2</sup>  
 Carvedilol 6,25mg Cp (EMS) <sup>1,2</sup>  
 Carvedilol 6,25mg Cp (Germed) <sup>1,2</sup>  
 Carvedilol 6,25mg Cp (Medley) <sup>1,2</sup>  
 Divelol 6,25mg Cp <sup>1,2</sup>  
 Carvedilol 12,5mg Cp (Biosintética) <sup>1</sup>  
 Carvedilol 12,5mg Cp (Libbs) <sup>1</sup>  
 Coreg 12,5mg Cp <sup>1</sup>

**POSOLOGIA**

**Adulto:**

|                                         |                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hipertensão essencial                   | 12,5mg, a cada 24 horas, durante os dois primeiros dias. A seguir, utilizar 25mg, a cada 24 horas.                                                                                                               |
| Angina                                  | 12,5mg, a cada 12 horas durante os dois primeiros dias. Aumentar para 25mg, a cada 12 horas.                                                                                                                     |
| Insuficiência cardíaca congestiva (ICC) | 3,125mg, a cada 12 horas durante 2 semanas. Se tolerada, a dose pode ser aumentada a intervalos mínimos de 2 semanas, para:<br>- 6,25mg, a cada 12 horas<br>- 12,5mg, a cada 12 horas<br>- 25mg, a cada 12 horas |

- ▶ **Ajuste de dose:**  
Não é necessário ajuste de dose.
- ▶ **ADMINISTRAÇÃO**  
Oral  
Administrar preferencialmente com alimentos.
- ▶ **Administração com alimentos:**  
Evitar a ingestão de gengibre, pimenta de caiena, cóleo e papoula da Califórnia.
- ▶ **Administração via sonda:**  
Pode ser administrado via sonda. Triturar e diluir em 15mL de água, administrando imediatamente.

## ► ARMAZENAMENTO

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C. Proteger da luz e umidade.

## CASPOFUNGINA <sup>1</sup>

Antifúngico Sistêmico

Nome comercial:

Cancidas 50mg FA <sup>1</sup>

Cancidas 70mg FA <sup>1</sup>

## POSOLOGIA

### Adulto:

|                                    |                                                     |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Candidíase invasiva                | 70mg, a cada 24 horas, seguida de 50mg diariamente. |
| Candidíase esofágica e orofaríngea | 50mg, a cada 24 horas                               |
| Aspergilose invasiva               | 70mg, a cada 24 horas, seguida de 50mg diariamente  |

### ► Ajuste de dose:

Insuficiência hepática: Utilizar 35mg ao dia e se a infecção for invasiva, utilizar 70mg no primeiro dia, seguido de 35mg ao dia.

### ► ADMINISTRAÇÃO

Intravenosa

Reconstituir em 10,5mL de SF ou água estéril.

Infusão intermitente: diluir até 50mg em 100mL de SF, durante 60 minutos.

Diluir até 70mg em 250mL de SF, durante 60 minutos.

### ► ARMAZENAMENTO

Conservar em refrigeração entre 2°C e 8°C.

Após reconstituição, possui estabilidade de 24 horas em temperatura ambiente menor que 25°C.

Após diluição, possui estabilidade de 24 horas em temperatura ambiente menor que 25°C e de 48 horas em refrigeração entre 2°C e 8°C.

### ► Atenção:

Alto Custo.

## CEFACLOR <sup>1</sup>

Antimicrobiano Cefalosporina 2ª Geração

Nome comercial:

Ceclor Bd 500mg Drg <sup>1</sup>

Cefaclor 500mg Cap (Germed) <sup>1</sup>

Cefaclor 500mg Cap (EMS) <sup>1</sup>

## POSOLOGIA

### Adulto:

|                           |                                     |
|---------------------------|-------------------------------------|
| Dose padrão               | 250 a 500mg, a cada 8 horas         |
| Bronquite e pneumonia     | 250mg, a cada 8 horas               |
| Uretrite gonocócica aguda | 3g combinada com 1g de probenecida. |
| Sinusite                  | 250mg, a cada 8 horas               |
| Infecções mais graves     | 500mg, a cada 8 horas               |

► **Ajuste de dose:**  
Insuficiência renal:

| Dose com Função Renal Normal | Dose com Insuficiência Renal<br>clearance de creatinina (mL/min) |          |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------|
| 250 a 500mg 8/8h             | 10-50                                                            | <10      |
|                              | 50-100% dose                                                     | 50% dose |

► **ADMINISTRAÇÃO**

Oral

Administrar 1 hora antes ou 2 horas depois das refeições.

► **Administração via sonda:**

Pode ser administrado via sonda. Abrir a cápsula e diluir em 20mL de água, administrando imediatamente.

► **ARMAZENAMENTO**

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

► **Atenção:**

Receita Branca (2 vias).

**CEFADROXIL <sup>1</sup>**

Antimicrobiano Cefalosporina 1ª Geração

Nome comercial:

Cefadroxila 500mg Cap (EMS) <sup>1</sup>

Cefadroxila 500mg Cap (Eurofarma) <sup>1</sup>

Cefadroxila 500mg Cap (Medley) <sup>1</sup>

Cefamox 500mg Cap <sup>1</sup>

**POSOLOGIA**

**Adulto:**

|                                                         |                                                      |  |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--|
| Dose padrão                                             | 1 a 2g, fracionados a cada 12 horas                  |  |
| Faringite ou amigdalite estreptocócicas beta-hemolítica | 1g ao dia, em uma única dose ou em duas doses iguais |  |
| Infecções complicadas das vias urinárias                | 2g, fracionado a cada 12 horas                       |  |

► **Ajuste de dose:**

Insuficiência renal:

| Dose com Função Renal Normal | Dose com Insuficiência Renal<br>clearance de creatinina (mL/min) |               |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1 a 2g 12/12h                | 10-25                                                            | <10           |
|                              | 1 a 2g 24/24h                                                    | 1 a 2g 36/36h |

► **ADMINISTRAÇÃO**

Oral

Administrar com ou sem alimento.

► **Administração via sonda:**

Pode ser administrado via sonda. Abrir a cápsula e diluir em 15mL de água, administrando imediatamente.

► **ARMAZENAMENTO**

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

► **Atenção:**

Receita Branca (2 vias).

## CEFALEXINA <sup>1,2</sup>

Antimicrobiano Cefalosporina 1ª Geração

Nome comercial:  
Keforal 500mg Cap <sup>1,2</sup>  
Keflex 500mg Drg <sup>1</sup>

### POSOLOGIA

#### Adulto e Adolescente:

|                                                                                 |                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Cistite não complicada; faringite; infecção da pele e tecidos moles; amigdalite | 500mg, a cada 12 horas                                                      |
| Endocardite bacteriana em pacientes alérgicos à penicilina                      | 2g em dose única, uma hora antes do início do procedimento                  |
| Outras infecções                                                                | - Leve a moderada: 250mg, a cada 6 horas<br>- Grave: até 1g, a cada 6 horas |

► **Ajuste de dose:**

Insuficiência renal:

| Dose com Função Renal Normal | Dose com Insuficiência Renal<br>clearance de creatinina (mL/min) |                            |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 250-1000mg 6/6h              | 10-50                                                            | <10                        |
|                              | 500mg 8/8h ou 12/12h                                             | 250-500mg 12/12h ou 24/24h |

► **ADMINISTRAÇÃO**

Oral

Administrar independentemente das refeições.

► **Administração via sonda:**

Pode ser administrado via sonda. Triturar e diluir em 20mL de água, administrando imediatamente.

► **ARMAZENAMENTO**

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

► **Atenção:**

Receita Branca (2 vias).

## CEFALOTINA <sup>1</sup>

Antimicrobiano Cefalosporina 1ª Geração

Nome comercial:  
Keflin Neutro 1g FA <sup>1</sup>  
Cefariston 1g FA (Blausiegel) <sup>1 \*</sup>  
Cefalotina Sódica 1g FA (Abl) <sup>1</sup>  
Cefalotina 1g FA (Blausiegel) <sup>1</sup>



**POSOLOGIA**

**Adulto e Adolescente:**

|                                                                                |                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pneumonia não complicada; infecção do trato urinário; furunculose com celulite | 500mg IV/IM, a cada 6 horas                                                                                                                                                       |
| Profilaxia cirúrgica                                                           | - Antes da cirurgia: 2g IV, 30 a 60 minutos antes do início.<br>- Durante a cirurgia: 2g IV<br>- Depois da cirurgia: 2g IV, a cada 6 horas, após a cirurgia, durante até 48 horas |
| Outras infecções                                                               | 500mg a 2g IV/IM, a cada 6 ou 4 horas                                                                                                                                             |

► **Ajuste de dose:**

Insuficiência renal:

| Dose com Função Renal Normal | Dose Insuficiência Renal<br>clearance de creatinina (mL/min) |        |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------|
| 500mg 6/6h                   | 10-50                                                        | < 10   |
|                              | 6/6h ou 8/8h                                                 | 12/12h |

► **ADMINISTRAÇÃO**

Intramuscular e Intravenosa

Intramuscular: Reconstituir em 5mL de água bidestilada/Xylestesin 1% s/ vasoconstritor.

Intravenosa: Reconstituir em 10mL de água bidestilada.

Infusão intermitente: até 200mg em 100mL de SF/SG 5%, de 30 a 60 minutos.

Infusão contínua: sim.

► **ARMAZENAMENTO**

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

Após reconstituição, possui estabilidade de 12 horas em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C ou de 96 horas em refrigeração entre 2°C e 8°C.

Após diluição, possui estabilidade de 12 horas em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C e por até 7 dias em refrigeração entre 2°C e 8°C.

► **Atenção:**

Receita Branca (2 vias).

\* Este medicamento é livre de látex.

**CEFAZOLINA <sup>1,2</sup>**

Antimicrobiano Cefalosporina 1ª Geração

Nome comercial:

Kefazol 1g FA <sup>1,2</sup>

Fazolon 1g FA <sup>1,2</sup>

Cellozina 1g FA <sup>1,2</sup> \*

Cefazolina 1g FA (Abl) <sup>1,2</sup> \*

Cefazolina 1g FA (Aurobindo) <sup>1,2</sup>

## POSOLOGIA

### Adulto e Adolescente:

|                                          |                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Infecção Urinária Aguda (não complicada) | 1g infusão IV, a cada 12 horas                                                                                                                                                                                       |
| Pneumonia Pneumocócica                   | 500mg infusão IV, a cada 12 horas                                                                                                                                                                                    |
| Endocardite (profilaxia)                 | 1g infusão IV, 30 minutos antes da cirurgia                                                                                                                                                                          |
| Profilaxia cirúrgica                     | - Antes da cirurgia: 1g infusão IV, 30 a 60 minutos antes do início<br>- Durante a cirurgia: 500mg a 1g infusão IV<br>- Depois da cirurgia: 500mg a 1g infusão IV, a cada 8 ou 6 horas, até 24 horas após a cirurgia |
| Infecções leves                          | 250 a 500mg infusão IV, a cada 8 horas                                                                                                                                                                               |
| Infecções moderadas a graves             | 500mg a 1g infusão IV, a cada 8 ou 6 horas                                                                                                                                                                           |

### Criança (> 1 mês de idade):

|                          |                                                                     |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Endocardite (profilaxia) | 25mg/kg infusão IV, 30 minutos antes do início                      |
| Infecção leve a moderada | 6,25 a 12,5mg/kg, a cada 6 horas ou 8,3 a 16,7mg/kg, a cada 8 horas |
| Infecção grave           | 25mg/kg, a cada 6 horas ou 33,3mg/kg, a cada 8 horas                |

### Criança (< 1 mês de idade):

|             |                               |
|-------------|-------------------------------|
| Dose padrão | 20mg/kg, a cada 12 ou 8 horas |
|-------------|-------------------------------|

#### ► Ajuste de dose:

Insuficiência renal:

| Dose com Função Renal Normal | Dose Insuficiência Renal<br>clearance de creatinina (mL/min) |                |                          |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------|
|                              | 50-90                                                        | 11-34          | <10                      |
| 1-2g 8/8h                    | 1-2g<br>8/8h ou 12/12h                                       | 1-2g<br>12/12h | 1-2g<br>24/24h ou 48/48h |

#### ► ADMINISTRAÇÃO

Intramuscular e Intravenosa

Intramuscular: Reconstituir em 2,5mL de água bidestilada/diluyente próprio.

Intravenosa: Reconstituir em 10mL de água bidestilada.

Intravenosa direta: Até 1000mg em 10mL de água bidestilada, de 3 a 5 minutos.

Infusão intermitente: até 1000mg em 100mL de SF/SG 5% por 50 a 60 minutos.

Infusão contínua: sim.

#### ► ARMAZENAMENTO

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

Após preparo, possui estabilidade de 12 horas em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C e por até 24 horas em refrigeração entre 2°C e 8°C.

#### ► Atenção:

Receita Branca (2 vias).

\* Este medicamento é livre de látex.

**CEFEPIMA <sup>1,2</sup>**

Antimicrobiano Cefalosporina 4ª Geração

Nome comercial:  
 Cefepima Cloridrato 1g FA (Abl) <sup>1,2</sup> \*  
 Cefepima Cloridrato 1g FA (Novafarma) <sup>1,2</sup>  
 Cemax 1g FA <sup>1,2</sup>  
 Maxcef 1g FA <sup>1,2</sup>

**POSOLOGIA**

**Adulto e Criança (> 40kg):**

|                                                                               |                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Infecções leves a moderadas do trato urinário                                 | 500mg a 1g IV/IM, a cada 12 horas |
| Outras infecções leves a moderadas, diferente das infecções do trato urinário | 1g IV/IM, a cada 12 horas         |
| Infecções graves                                                              | 2g IV, a cada 12 horas            |
| Infecções muito graves ou com risco de morte                                  | 2g IV, a cada 8 horas             |

► **Ajuste de dose:**

Insuficiência renal:

| Dose com Função Renal Normal | Dose Insuficiência Renal<br>clearance de creatinina (mL/min) |                        |              |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|
|                              | >50-90                                                       | 10-50                  | <10          |
| 2g 8/8h<br>(dose máxima)     | 2g<br>8/8h                                                   | 2g<br>12/12h ou 24/24h | 1g<br>24/24h |

► **ADMINISTRAÇÃO**

Intravenosa e Intramuscular  
 Intravenosa: Reconstituir em 10mL de água bidestilada.  
 Intravenosa direta: por 3 a 5 minutos.  
 Infusão intermitente: até 2000mg em 100mL de SF/SG 5%, por 30 minutos.  
 Infusão contínua: não recomendado.  
 Intramuscular: reconstituir em 3mL de água bidestilada.

► **ARMAZENAMENTO**

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C  
 Após preparo, as soluções são estáveis por 4 horas à temperatura ambiente (entre 15 e 30°C).

► **Atenção:**

Receita Branca (2 vias).  
 \* Este medicamento é livre de látex.

**CEFOTAXIMA <sup>1</sup>**

Antimicrobiano Cefalosporina 3ª Geração

Nome comercial:  
 Cetazima 1g FA (Novafarma) <sup>1</sup> \*

**POSOLOGIA**

**Adulto e Adolescente (> 12 anos de idade):**

|                                                                                                |                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Infecção típica em que um patógeno susceptível é conhecido ou suspeito                         | 1g IV/IM, a cada 12 horas         |
| Infecção em que vários patógenos com alta a média susceptibilidade são conhecidos ou suspeitos | 1 a 2g IV/IM, a cada 12 horas     |
| Infecção não identificada que não pode ser localizada, em que há risco de vida                 | 2 a 3g IV/IM, a cada 8 ou 6 horas |

**Criança (< 12 anos de idade):**

|             |                                            |
|-------------|--------------------------------------------|
| Dose padrão | 50 a 100 mg/kg IV/IM, a cada 12 ou 6 horas |
|-------------|--------------------------------------------|

► **Ajuste de dose:**

Insuficiência renal:

| Dose com Função Renal Normal | Dose Insuficiência Renal<br>clearance de creatinina (mL/min) |                        |              |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|
|                              | >50-90                                                       | 10-50                  | <10          |
| 2g 8/8h                      | 2g<br>8/8h-12/12h                                            | 2g<br>12/12h ou 24/24h | 2g<br>24/24h |

► **ADMINISTRAÇÃO**

Intravenosa e Intramuscular

Intramuscular: Reconstituir em 2mL de diluente próprio/lidocaína 1% s/ vasoconstritor.

Intravenosa: Reconstituir em 4mL de diluente próprio.

Intravenosa direta: até 2000mg em 16mL de água bidestilada, de 3 a 5 minutos.

Infusão intermitente: até 2000mg em 50 a 100mL de SF/SG 5%, de 50 a 60 minutos.

► **ARMAZENAMENTO**

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

Após preparo, possui estabilidade de 12 horas em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C ou por 24 horas em refrigeração de 2°C a 8°C.

► **Atenção:**

Receita Branca (2 vias).

\* Este medicamento é livre de látex.

**CEFOXITINA <sup>1,2</sup>**

Antimicrobiano Cefalosporina 2ª Geração

Nome comercial:

Kefox 1g FA <sup>1,2</sup> \*

**POSOLOGIA**

Adulto:

|                              |                                                  |
|------------------------------|--------------------------------------------------|
| Infecção leve não complicada | 1g IV, a cada 8 ou 6 horas                       |
| Infecção moderada a grave    | 2g IV, a cada 8 ou 6 horas ou 1g, a cada 4 horas |
| Infecção com risco de morte  | 2g IV, a cada 4 horas ou 3g, a cada 6 horas      |
| Dose máxima                  | 12g ao dia                                       |

► **Ajuste de dose:**  
Insuficiência renal:

| Dose com Função Renal Normal | Dose Insuficiência Renal<br>clearance de creatinina (mL/min) |                   |                     |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
|                              | >50-90                                                       | 10-50             | <10                 |
| 2g 8/8h                      | 2g 8/8h                                                      | 2g 8/8h ou 12/12h | 2g 24/24h ou 48/48h |

► **ADMINISTRAÇÃO**

Intravenosa e Intramuscular  
Intramuscular: Reconstituir em 2mL de diluente próprio.  
Intravenosa: Reconstituir em 10mL de diluente próprio.  
Intravenosa direta: de 3 a 5 minutos.  
Infusão intermitente: até 1000mg em 50mL de SF/SG 5%, de 20 a 30 minutos.  
Infusão contínua: não recomendado.

► **ARMAZENAMENTO**

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.  
Após reconstituição, possui estabilidade de 6 horas em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C ou por 48 horas em refrigeração de 2°C a 8°C.  
Após diluição, possui estabilidade de 18 horas em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C ou por 48 horas em refrigeração de 2°C a 8°C.

► **Atenção:**

Receita Branca (2 vias).  
\* Este medicamento é livre de látex.

**CEFTAROLINA <sup>1</sup>**

Antimicrobiano Cefalosporina 3ª Geração

Nome comercial:  
Zinforo 600mg FA <sup>1</sup> \*

**POSOLOGIA**

**Adulto:**

|                                               |                           |
|-----------------------------------------------|---------------------------|
| Infecções complicadas de pele e tecidos moles | 600mg IV, a cada 12 horas |
| Pneumonia adquirida na comunidade             | 600mg IV, a cada 12 horas |

► **Ajuste de dose:**  
Insuficiência renal:

| Dose com Função Renal Normal | Dose Insuficiência Renal<br>clearance de creatinina (mL/min) |                   |                     |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
|                              | >50-90                                                       | 10-50             | <10                 |
| 2g 8/8h                      | 2g 8/8h                                                      | 2g 8/8h ou 12/12h | 2g 24/24h ou 48/48h |

► **ADMINISTRAÇÃO**

Intravenosa e Intramuscular  
Reconstituir em 20mL de água estéril.  
Diluir em SF/SG 5%.

► **ARMAZENAMENTO**

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.  
Após diluição, possui estabilidade de 6 horas em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C ou por 24 horas em refrigeração de 2°C a 8°C.

► **Atenção:**

Receita Branca (2 vias).

\* Este medicamento é livre de látex.

## CEFTAZIDIMA <sup>1</sup>

Antimicrobiano Cefalosporina 3ª Geração

Nome comercial:

Ceftazidon 1g FA <sup>1,2</sup> \*

Fortaz 1g FA <sup>1,2</sup>

Kefadim 1g FA <sup>1,2</sup>

### POSOLOGIA

#### Adulto:

|                                                              |                                           |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Infecções do trato urinário e nas de menor gravidade         | 500mg a 1g, a cada 12 horas               |
| Maioria das infecções                                        | 1g, a cada 8 horas ou 2g, a cada 12 horas |
| Infecções graves (pacientes imunossuprimidos, neutropênicos) | 2g, a cada 8 ou 12 horas                  |
| Infecções pulmonares                                         | 100 a 150 mg/kg/dia, a cada 8 horas       |

#### Lactentes (até 2 meses de idade):

|             |                                                |
|-------------|------------------------------------------------|
| Dose padrão | 25 a 60 mg/kg/dia, dividido em duas aplicações |
|-------------|------------------------------------------------|

#### Criança (maiores de 2 meses de idade):

|             |                                                        |
|-------------|--------------------------------------------------------|
| Dose padrão | 30 a 100 mg/kg, fracionado em duas ou três aplicações. |
|-------------|--------------------------------------------------------|

► **Ajuste de dose:**

Insuficiência renal:

| Dose com Função Renal Normal | Dose Insuficiência Renal<br>clearance de creatinina (mL/min) |                     |                     |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
|                              | >50-90                                                       | 10-50               | <10                 |
| 2g 8/8h                      | 2g 8/8h ou 12/12h                                            | 2g 12/12h ou 24/24h | 2g 24/24h ou 48/48h |

► **ADMINISTRAÇÃO**

Intravenosa e Intramuscular

Intramuscular: reconstituir em 3mL de diluente próprio.

Intravenosa: reconstituir em 10mL de diluente próprio.

Intravenosa direta: até 2000mg em 10mL de SF, por 3 a 5 minutos.

Infusão intermitente: até 2000mg em 50mL de SF/SG 5%, por 15 a 30 minutos.

► **ARMAZENAMENTO**

Conservar em temperatura ambiente abaixo de 25°C e protegida da luz.

Após preparo, possui estabilidade de 18 horas em temperatura ambiente abaixo de 25°C ou por 7 dias em refrigeração de 2°C a 8°C.

► **Atenção:**

Receita Branca (2 vias).

\* Este medicamento é livre de látex.

CEFTAZIDIMA + AVIBACTAM

Antimicrobiano Cefalosporina 3ª Geração

Nome comercial:  
Torgena 2,5g FA <sup>1</sup> \*

POSOLOGIA

**Adulto:**  
1 FA, 8/8h. Duração do tratamento a depender da condição clínica do paciente.  
**Criança (maiores de 2 meses de idade):**

|                    |                                                        |
|--------------------|--------------------------------------------------------|
| 6 meses a <18 anos | 50 mg/kg / 12,5 mg/kg a um máximo de 2 g / 0,5 g, 8/8h |
| 3 meses a <6 meses | 40 mg/kg / 10 mg/kg, 8/8h                              |

- **Ajuste de dose:**  
Insuficiência renal:

| Faixa Etária                                            | Dose Insuficiência Renal<br>clearance de creatinina (mL/min) |                           |                         |                             |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-----------------------------|
|                                                         | 31 -50                                                       | 16 - 30                   | 6 - 15                  | < 6                         |
| Adultos                                                 | 1 g / 0,25 g, 8/8h                                           | 0,75 g / 0,1875 g, 12/12h | 0,75 g/0,1875 g, 24/24h | 0,75 g/0,1875 g, a cada 48h |
| Pacientes pediátricos com idade entre 2 anos e <18 anos | 25 mg/kg / 6,25 mg/kg a um máximo de 1 g/0,25 g, 8/8h        |                           |                         |                             |

- **ADMINISTRAÇÃO**  
Intravenosa  
Intravenosa: reconstituir em 10 ml de água estéril, diluir em 100mL SF 0,9%, SG 5%, SF 0,45% + SG 2,5% ou Ringer Lactato. Infundir por 2 horas.
- **ARMAZENAMENTO**  
Conservar em temperatura ambiente (entre 15 e 30°C).  
Após preparo, possui estabilidade de 12 horas em temperatura ambiente abaixo de 25°C.
- **Atenção:**  
Receita Branca (2 vias).  
\* Este medicamento é livre de látex.

CEFTOLOZONA + TAZOBACTAM <sup>1</sup>

Antimicrobiano Cefalosporina 4ª Geração

Nome comercial:  
Zerbaxa 1,5g FA <sup>1</sup>

POSOLOGIA

**Adultos:**

|                                                                  |                                  |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Infecções intra-abdominais complicadas                           | 1,5g a cada 8 horas de 4-14 dias |
| Infecções do trato urinário complicadas, incluindo pielonefrite  | 1,5g a cada 8 horas de 7 dias    |
| Pneumonia nosocomial, incluindo pneumonia associada à ventilação | 3g a cada 8 horas de 8-14 dias   |

▶ **Ajuste de dose:**

Insuficiência renal:

| ClCr estimada | Infecção intra-abdominal complicada e Infecções do trato urinário complicada, Incluindo pielonefrite | Pneumonia nosocomial, incluindo Pneumonia associada à ventilação |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 30 a 50       | 750 mg a cada 8h                                                                                     | 1,5 g a cada 8h                                                  |
| 15 a 29       | 375 mg a cada 8h                                                                                     | 750mg a cada 8h                                                  |

▶ **ADMINISTRAÇÃO**

Intravenosa

Reconstituir cada frasco em 10ml de água estéril ou SF0,9%. Após, diluir em 100ml de SF0,9% ou Glicose 5%

▶ **ARMAZENAMENTO**

Conservar em refrigeração entre 2°C e 8°C.

**CEFTRIAXONA DISSÓDICA <sup>1,2</sup>**

Antimicrobiano Cefalosporina 3ª Geração

Nome comercial:

Rocefin IM 1g FA <sup>1,2</sup>**POSOLOGIA****Adulto e Criança (> 12 anos de idade):**

|             |                            |
|-------------|----------------------------|
| Dose padrão | 1 a 2g IM, a cada 24 horas |
| Dose máxima | 4g ao dia                  |

**Recém-nascidos, lactentes e crianças (15 dias até 12 anos):**

|             |                                   |
|-------------|-----------------------------------|
| Dose padrão | 20 a 80 mg/kg IM, a cada 24 horas |
|-------------|-----------------------------------|

**Recém-nascidos (abaixo de 14 dias):**

|             |                                   |
|-------------|-----------------------------------|
| Dose padrão | 20 a 50 mg/kg IM, a cada 24 horas |
|-------------|-----------------------------------|

▶ **Ajuste de dose:**

Insuficiência renal:

| Dose com Função Renal Normal | Dose com Insuficiência Renal<br>clearance de creatinina (mL/min) |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|                              | < 10                                                             |
| 1 a 2g 24/24h                | Máximo 2g/dia                                                    |



▶ **ADMINISTRAÇÃO**

Intramuscular  
Reconstituir em 3,5mL de diluente próprio.

▶ **ARMAZENAMENTO**

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.  
Após preparo, possui estabilidade de 6 horas em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C ou por 24 horas em refrigeração de 2°C a 8°C.

▶ **Atenção:**

Receita Branca (2 vias).

**CEFTRIAXONA DISSÓDICA <sup>1,2</sup>**

Antimicrobiano Cefalosporina 3ª Geração

Nome comercial:

Rocefin IV 1g FA 1,2

Ceftriaxona IV 1g FA (Abl) <sup>1,2</sup> \*

KefTRON IV 1g FA <sup>1,2</sup> \*

**POSOLOGIA**

**Adulto e Criança (> 12 anos de idade):**

|             |                            |
|-------------|----------------------------|
| Dose padrão | 1 a 2g IM, a cada 24 horas |
| Dose máxima | 4g ao dia                  |

**Recém-nascidos, lactentes e crianças (15 dias até 12 anos):**

|             |                                   |
|-------------|-----------------------------------|
| Dose padrão | 20 a 80 mg/kg IM, a cada 24 horas |
|-------------|-----------------------------------|

**Recém-nascidos (abaixo de 14 dias):**

|             |                                   |
|-------------|-----------------------------------|
| Dose padrão | 20 a 50 mg/kg IM, a cada 24 horas |
|-------------|-----------------------------------|

▶ **Ajuste de dose:**

Insuficiência renal:

| Dose com Função Renal Normal | Dose com Insuficiência Renal clearance de creatinina (mL/min) |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|                              | < 10                                                          |
| 1 a 2g 24/24h                | Máximo 2g/dia                                                 |

▶ **ADMINISTRAÇÃO**

Intravenosa  
Reconstituir em 10mL de diluente próprio.  
Intravenosa direta: sim, de 2 a 4 minutos.  
Infusão intermitente: até 2000mg em 50mL de SF, por 30 minutos.  
Infusão contínua: não recomendado.

▶ **ARMAZENAMENTO**

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.  
Após preparo, possui estabilidade de 6 horas em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C ou por 24 horas em refrigeração de 2°C a 8°C.

▶ **Atenção:**

Receita Branca (2 vias).

\* Estas apresentações são livres de látex

**CEFUROXIMA SÓDICA <sup>1</sup>**

Antimicrobiano Cefalosporina 2ª Geração

Nome comercial:  
Zinnat 250mg Cp Rev <sup>1</sup>  
Axetilcefuroxima 250mg Cp <sup>1</sup>

**POSOLOGIA**

**Adulto:**

|                                       |                        |
|---------------------------------------|------------------------|
| Infecções do trato urinário           | 125mg, a cada 12 horas |
| Infecções da pele e dos tecidos moles | 250mg, a cada 12 horas |
| Amigdalite, faringite e sinusite      | 250mg, a cada 12 horas |
| Bronquite                             | 250mg, a cada 12 horas |
| Pneumonia                             | 500mg, a cada 12 horas |
| Pielonefrite                          | 250mg, a cada 12 horas |
| Gonorréia não complicada              | 1000mg em dose única   |

**Criança:**

|             |                              |
|-------------|------------------------------|
| Dose padrão | 125 a 250mg, a cada 12 horas |
|-------------|------------------------------|

► **Ajuste de dose:**

Insuficiência renal:

| Dose com Função Renal Normal | Dose Insuficiência Renal<br>clearance de creatinina (mL/min) |                    |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|
| 250 a 500mg 12/12h           | 10-20                                                        | < 10               |
|                              | 250 a 500mg 12/12h                                           | 250 a 500mg 24/24h |

► **ADMINISTRAÇÃO**

Oral  
Administrar preferencialmente junto às refeições.

► **Administração via sonda:**

Pode ser administrado via sonda. Triturar e diluir em 15mL de água, administrando imediatamente.

► **ARMAZENAMENTO**

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

► **Atenção:**

Receita Branca (2 vias).

**CEFUROXIMA SÓDICA <sup>1,2</sup>**

Antimicrobiano Cefalosporina 2ª Geração

Nome comercial:  
Zinacef 750mg FA <sup>1,2</sup>  
Keroxime 750mg FA <sup>1,2</sup> \*

**POSOLOGIA**

<sup>1</sup> Medicamento padrão Unidade Paulista

<sup>2</sup> Medicamento padrão Unidade Vergueiro.

Adulto:

|                                          |                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dose padrão                              | 750mg a 1,5g IV/IM, a cada 8 ou 6 horas                                                                                                         |
| Gonorreia                                | 1,5g em duas injeções IM de 750mg em dose única                                                                                                 |
| Meningite                                | 3g IV, a cada 8 horas                                                                                                                           |
| Pneumonia                                | 1,5g IV/IM, a cada 12 ou 8 horas por um período de 48 a 72 horas, seguida por uma dose de 500mg, a cada 12 horas por um período de 7 a 10 dias  |
| Exacerbações agudas de bronquite crônica | 750mg IV/IM, a cada 12 ou 8 horas por um período de 48 a 72 horas, seguida por uma dose de 500mg, a cada 12 horas por um período de 7 a 10 dias |

Criança:

|             |                                                    |
|-------------|----------------------------------------------------|
| Dose padrão | 30 a 100 mg/kg/dia IV/IM, a cada 8 ou 6 horas      |
| Meningite   | 150 a250 mg/kg/dia IV, fracionadas em 3 ou 4 doses |

► **Ajuste de dose:**

Insuficiência renal:

| Dose com Função Renal Normal | Dose Insuficiência Renal clearance de creatinina (mL/min) |                          |                  |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|
|                              | >50-90                                                    | 10-50                    | <10              |
| 0,75-1,5g 8/8h               | 0,75-1,5g 8/8h                                            | 0,75-1,5g 8/8h ou 12/12h | 0,75-1,5g 24/24h |

► **ADMINISTRAÇÃO**

Intravenosa e Intramuscular

Intramuscular: reconstituir em 3mL de água bidestilada.

Intravenosa: reconstituir em 7,5mL de diluente próprio.

Intravenosa direta: reconstituir em 6mL de água bidestilada e diluir até 750mg em 4mL de água bidestilada, infundir de 3 a 5 minutos.

Infusão intermitente: até 1500mg em 100mL de SF/SG 5%, por 30 a 60 minutos.

► **ARMAZENAMENTO**

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

Após reconstituição, possui estabilidade de 5 horas em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C e por 48 horas em refrigeração de 2°C a 8°C.

Após diluição, possui estabilidade de 5 horas em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C e de 48 horas em refrigeração de 2°C a 8°C.

► **Atenção:**

Receita Branca (2 vias).

\* Este medicamento é livre de látex.

**CELECOXIBE <sup>1</sup>**

Anti-inflamatório não Esteroidal Seletivo da COX2

Nome comercial:

Celebra 100mg Cap <sup>1</sup>

**POSOLOGIA****Adulto:**

|                                                   |                                                                     |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Dor aguda                                         | 400mg inicialmente, seguidos de 200mg, após 12 horas se necessário. |
| Dismenorreia primária                             | 400mg inicialmente, seguidos de 200mg, após 12 horas se necessário  |
| Dor crônica                                       | Mínima dose diária                                                  |
| Tratamento Sintomático da Osteoartrite (OA)       | 200mg, a cada 24 horas ou 100mg, a cada 12 horas                    |
| Tratamento Sintomático da Artrite Reumatoide (AR) | 100mg ou 200mg, a cada 12 horas                                     |
| Espondilite anquilosante (EA)                     | 200mg, a cada 24 horas ou 100mg, a cada 12 horas                    |
| Lombalgia                                         | 200mg ou 400mg diários                                              |

▶ **Ajuste de dose:**

Insuficiência Renal: Pode ser necessário ajuste de dose, monitorar. Em caso de nefropatia avançada, o uso não é recomendado.

Insuficiência hepática: Pode ser necessário ajuste de dose, monitorar. A biodisponibilidade pode aumentar de 40 a 180%. Em casos graves, o uso é contraindicado.

▶ **ADMINISTRAÇÃO**

Oral

Administrar com ou sem alimentos.

▶ **Administração com alimentos:**

Evitar o consumo de álcool, camomila, chá verde, erva doce, feno grego e alfafa.

▶ **Administração via sonda:**

Pode ser administrado via sonda. Abrir a cápsula e diluir em 15mL de água, administrando imediatamente.

▶ **ARMAZENAMENTO**

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

▶ **Atenção:**

Receita Branca (2 vias).

**CETAMINA<sup>1,2</sup>**

Anestésico Geral

Nome comercial:

Ketamin S 50mg/mL Amp 2mL<sup>1,2</sup>

Ketamin S 50mg/mL FA 10mL<sup>1 \*</sup>

**POSOLOGIA****Adulto:**

|                         |                                                                        |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Dose padrão             | 1 a 4,5 mg/kg IV, ou 3 a 8 mg/kg IM                                    |
| Manutenção da anestesia | Cada dose adicional deve ser metade da dose total IV ou IM recomendada |

**Criança:**

|             |                                    |
|-------------|------------------------------------|
| Dose padrão | 3 a 7 mg/kg IM ou 0,5 a 2 mg/kg IV |
|-------------|------------------------------------|

- ▶ **Ajuste de dose:**  
Não é necessário ajuste de dose.
- ▶ **ADMINISTRAÇÃO**  
Intravenosa e Intramuscular  
Intravenosa direta: sim, por 5 minutos (lenta).  
Infusão intermitente: até 250mg em 100mL de SF/SG 5%, por 5 a 20 mcg/kg/min.  
Até 500mg em 250mL de SF/SG 5%, por 5 a 20 mcg/kg/min.  
Até 1000mg em 500mL de SF/SG 5%, por 5 a 20 mcg/kg/min.
- ▶ **ARMAZENAMENTO**  
Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.
- ▶ **Atenção:**  
Receita Branca (2 vias).  
\* Este medicamento é livre de látex.

CETILPIRIDINIO CLORETO <sup>1,2</sup>

Antisséptico Bucal

Nome comercial:  
Cepacol Solução 0,5mg/mL Fr 250mL <sup>1,2</sup>  
Cepacol Solução 0,5mg/mL Fr 250mL Dose <sup>1,2</sup>

**POSOLOGIA**  
**Adulto e Criança (> 6 anos de idade):**

|             |                                          |
|-------------|------------------------------------------|
| Dose padrão | 20mL em gargarejo, de 4 a 6 vezes ao dia |
|-------------|------------------------------------------|

- ▶ **Ajuste de dose:**  
Não é necessário ajuste de dose.
- ▶ **ADMINISTRAÇÃO**  
Oral  
Diluir a solução em ½ copo de água.
- ▶ **ARMAZENAMENTO**  
Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

CETIRIZINA <sup>1</sup>

Anti-histamínico H1

Nome comercial:  
Zyrtec 10mg Cp <sup>1</sup>  
Cetirizina Dicloridrato Cp Rev 10mg (Medley) <sup>1</sup>  
Dicloridrato de Cetirizina Cp Rev 10mg (Sandoz) <sup>1</sup>

**POSOLOGIA**  
**Adulto e Criança (> 12 anos de idade):**

|             |                       |
|-------------|-----------------------|
| Dose padrão | 10mg, a cada 24 horas |
|-------------|-----------------------|

- ▶ **Ajuste de dose:**  
Insuficiência renal:

| Dose com Função Renal Normal | Dose Insuficiência Renal<br>clearance de creatinina (mL/min) |                |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------|
|                              | 11-31                                                        | < 11           |
| 10mg 24/24h                  | 5mg 24/24h                                                   | Contraindicado |

► **ADMINISTRAÇÃO**

Oral

Ingerir com líquido.

► **Administração com alimentos:**

Evitar o consumo de álcool.

► **Administração via sonda:**

Pode ser administrado via sonda. Triturar e diluir em 15mL de água, administrando imediatamente.

► **ARMAZENAMENTO**

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C. Proteger da luz.

## CETOCONAZOL <sup>1</sup>

Antifúngico Tópico

Nome comercial:

Nizoral Creme 30g <sup>1</sup>

### POSOLOGIA

#### Adulto e Criança:

Dose padrão | Aplicar uma camada na área afetada e ao seu redor, a cada 24 horas

► **Ajuste de dose:**

Não é necessário ajuste de dose.

► **ADMINISTRAÇÃO**

Tópico

Higienizar e secar o local de aplicação antes da administração.

► **ARMAZENAMENTO**

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

## CETOCONAZOL + BETAMETASONA

<sup>1,2</sup>

Anti-inflamatório

Esteroidal

(Corticoide)

Tópico

Nome comercial:

Candicort Creme Bis 30g <sup>1,2</sup>

Cetoconazol + Betametasona Bis 30g (Medley) <sup>1,2</sup>

Cetoconazol + Betametasona Bis 30g (EMS) <sup>1,2</sup>

### POSOLOGIA

#### Adulto e Criança:

Dose padrão | Aplicar na área afetada, a cada 24 horas

► **Ajuste de dose:**

Não é necessário ajuste de dose.

► **ADMINISTRAÇÃO**

Tópico

► **ARMAZENAMENTO**

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

## CETOPROFENO <sup>1,2</sup>

Anti-inflamatório não Esteroidal Sistêmico

Nome comercial:

Cetoprofeno 100mg IV FA (Eurofarma) <sup>1,2</sup>

Profenid IV 100mg FA <sup>1,2</sup>

Artrínid IV 100mg FA <sup>1,2</sup>  
Cetoprofeno 100mg IV FA (Cristália) <sup>1,2</sup> \*

**POSOLOGIA**

**Adulto:**

Dose padrão | 100 a 300mg IV, a cada 24 horas

- ▶ **Ajuste de dose:**  
Insuficiência renal: Pode ser necessário ajuste de dose, monitorar.  
Insuficiência hepática: Pode ser necessário ajuste de dose, monitorar.
- ▶ **ADMINISTRAÇÃO**  
Intravenosa  
Reconstituir em 5mL de SF.  
Infusão intermitente: 100mg em 100mL de SF/SG 5%, por 20 minutos.
- ▶ **Administração com alimentos:**  
Evitar o consumo de álcool.
- ▶ **ARMAZENAMENTO**  
Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C. Proteger da luz.
- ▶ **Atenção:**  
\* Este medicamento é livre de látex.

**CETOPROFENO <sup>1,2</sup>**

Anti-inflamatório não Esteroidal Sistêmico

Nome comercial:  
Profenid 50mg Cap <sup>1,2</sup>

**POSOLOGIA**

**Adulto:**

Dose padrão | 100mg, a cada 12 horas ou 50mg, a cada 8 horas

- ▶ **Ajuste de dose:**  
Insuficiência renal: Pode ser necessário ajuste de dose, monitorar. Comprometimento leve: dose máxima de 150mg/dia. ClCr < 25 mL/min: dose máxima de 100mg/dia.  
Insuficiência hepática: Pode ser necessário ajuste de dose, monitorar. Dose máxima: 100mg/dia.
- ▶ **ADMINISTRAÇÃO**  
Oral  
Administrar durante ou logo após as refeições.
- ▶ **Administração com alimentos:**  
Evitar o consumo de álcool.
- ▶ **Administração via sonda:**  
Pode ser administrado via sonda. Triturar e diluir em 15mL de água, administrando imediatamente.
- ▶ **ARMAZENAMENTO**  
Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C. Proteger da luz.

**CETOPROFENO <sup>1</sup>**

Anti-inflamatório não Esteroidal Sistêmico

Nome comercial:  
Profenid Entérico 100mg Cp Rev <sup>1,2</sup>

**POSOLOGIA**

**Adulto:**

|             |                            |
|-------------|----------------------------|
| Dose padrão | 200mg/dia, a cada 12 horas |
| Dose máxima | 300mg ao dia               |

▶ **Ajuste de dose:**

Insuficiência renal: Pode ser necessário ajuste de dose, monitorar. Comprometimento leve: dose máxima de 150mg/dia. ClCr < 25 mL/min: dose máxima de 100mg/dia.

Insuficiência hepática: Pode ser necessário ajuste de dose, monitorar. Dose máxima: 100mg/dia.

▶ **ADMINISTRAÇÃO**

Oral

Administrar durante ou logo após as refeições.

▶ **Administração com alimentos:**

Evitar o consumo de álcool.

▶ **ARMAZENAMENTO**

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C. Proteger da luz.

**CETOPROFENO** <sup>1,2</sup>

Anti-inflamatório não Esteroidal Sistêmico

Nome comercial:

Profenid IM 100mg Amp 2mL <sup>1,2</sup>

Artrinid 100mg Amp 2mL <sup>1,2</sup>

**POSOLOGIA****Adulto:**

|             |                                |
|-------------|--------------------------------|
| Dose padrão | 100mg IM, a cada 12 ou 8 horas |
|-------------|--------------------------------|

▶ **Ajuste de dose:**

Insuficiência renal: Pode ser necessário ajuste de dose, monitorar. Comprometimento leve: dose máxima de 150mg/dia. ClCr < 25 mL/min: dose máxima de 100mg/dia.

Insuficiência hepática: Pode ser necessário ajuste de dose, monitorar. Dose máxima: 100mg/dia.

▶ **ADMINISTRAÇÃO**

Intramuscular

Aplicar lentamente e profundamente no quadrante superior da nádega.

▶ **ARMAZENAMENTO**

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C. Proteger da luz.

**CETUXIMABE** <sup>1</sup>

Antineoplásico Anticorpo Monoclonal

Nome comercial:

Erbix 100mg FA 20mL <sup>1</sup>

**POSOLOGIA****Adulto:**

Conforme esquema quimioterápico.

▶ **ARMAZENAMENTO**

Conservar em refrigeração entre 2°C e 8°C.

▶ **Atenção:**

Alto Custo.



CICLOBENZAPRINA 1,2

Relaxante Muscular

Nome comercial:  
Miosan 5mg Cp Rev 1,2  
Mirtax 5mg Cp Rev 1,2  
Ciclobenzaprina 5mg Cp Rev (Biosintética) 1,2  
Ciclobenzaprina 5mg Cp Rev (Eurofarma) 1,2

POSOLOGIA

Adulto:

|             |                                 |
|-------------|---------------------------------|
| Dose padrão | 20 a 40mg, a cada 6 ou 12 horas |
| Dose máxima | 60mg ao dia                     |

- ▶ **Ajuste de dose:**  
Insuficiência hepática: Pode ser necessário ajuste de dose, monitorar. Leve: 5mg, a cada 8 horas. Moderada a grave: O uso é contraindicado.
- ▶ **ADMINISTRAÇÃO**  
Oral
- ▶ **Administração com alimentos:**  
Evitar o consumo de álcool.
- ▶ **Administração via sonda:**  
Pode ser administrado via sonda. Triturar e diluir em 20mL de água, administrando imediatamente.
- ▶ **ARMAZENAMENTO**  
Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C. Proteger da luz.

CICLOFOSFAMIDA 1,2

Antineoplásico Citotóxico

Nome comercial:  
Genuxal 1g FA 1  
Genuxal 200mg FA 1,2

POSOLOGIA

Adulto:

Conforme esquema quimioterápico.

- ▶ **Administração com alimentos:**  
Evitar a ingestão de angélica chinesa e cimicífuga em tumores dependentes de estrogênio.
- ▶ **ARMAZENAMENTO**  
Conservar em temperatura ambiente menor que 25°C.

CICLOSPORINA 1

Imunossupressor

Nome comercial:  
Sandimmun Neoral 25mg Cap 1  
Sandimmun Neoral 100mg Cap 1  
Ciclosporina Cápsula 100mg (Germed) 1  
Sandimmun 100mg/ml Sol Oral Fr 50ml 1

**POSOLOGIA****Adulto:**

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Transplante de órgão sólido | 10 a 15 mg/kg, dividido em duas doses, 12 horas antes da cirurgia. Manter essa dose por 2 semanas após a cirurgia. Reduzir gradativamente até atingir a dose manutenção.                                                                                                              |
| Transplante de medula óssea | - Dose inicial: 3 a 5 mg/kg/dia IV. Administrar na véspera do transplante e continuar nessa dose durante o período imediato pós-transplante, por até 2 semanas, antes de mudar para terapia oral.<br>- Dose manutenção: 12,5 mg/kg/dia, dividido em 2 tomadas por 3 meses, no mínimo. |
| Síndrome Nefrótica          | 5 mg/kg, fracionado em 2 doses.                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Artrite reumatoide          | 3 a 5 mg/kg/dia, fracionado em duas doses.                                                                                                                                                                                                                                            |
| Psoríase                    | 2,5 a 5 mg/kg/dia, fracionado em duas doses.                                                                                                                                                                                                                                          |
| Uveíte endógena             | 5 mg/kg/dia, fracionado em duas doses. Pode-se aumentar para 7mg/kg/dia nos casos refratários.                                                                                                                                                                                        |
| Dermatite atópica           | Tratamento individualizado. A variação de dose recomendada é de 2,5 a 5 mg/kg/dia, fracionado em duas doses                                                                                                                                                                           |

**Criança:**

|             |                                   |
|-------------|-----------------------------------|
| Dose padrão | 6 mg/kg, fracionado em duas doses |
|-------------|-----------------------------------|

► **Ajuste de dose:**

Insuficiência Renal:

| Dose com Função Renal Normal | Dose Insuficiência Renal<br>clearance de creatinina (mL/min) |                                           |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                              | >25% acima dos níveis antes tratamento                       | >50% acima dos níveis antes do tratamento |
| 10 a 15mg/Kg, 12/12h         | 75-50% da dose                                               | 75-50% da dose                            |

Insuficiência hepática: Pode ser necessário ajuste, monitorar.

► **ADMINISTRAÇÃO**

Oral

Administrar com alimentos.

► **Administração com alimentos:**

Evitar o consumo de álcool.

► **ARMAZENAMENTO**

Conservar em refrigeração entre 2°C e 8°C cápsulas de 25mg.

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C cápsulas de 100mg.

**CICLOSPORINA <sup>1</sup>**

Imunossupressor

Nome comercial:

Sandimmun 50mg/mL Amp 1mL <sup>1</sup>

**POSOLOGIA**

**Adulto:**

|                             |                                                                                                                                      |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Transplante de órgão sólido | 3 a 5 mg/kg, 12 horas antes da cirurgia. Manter essa dose por 1 a 2 semanas pós cirurgia e reduzir gradativamente até 0,7 a 2 mg/kg. |
| Transplante de medula óssea | 3 a 5 mg/kg/dia, imediatamente após o transplante.                                                                                   |

► **Ajuste de dose:**

Insuficiência renal:

| Dose com Função Renal Normal | Dose Insuficiência Renal<br>clearance de creatinina (mL/min) |                                           |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                              | >25% acima dos níveis antes tratamento                       | >50% acima dos níveis antes do tratamento |
| 10 a 15mg/Kg, 12/12h         | 75-50% da dose                                               | 75-50% da dose                            |

Insuficiência hepática: Pode ser necessário reduzir a dose, monitorar.

► **ADMINISTRAÇÃO**

Intravenosa

Infusão intermitente: até 300mg em 250mL de SF/SG 5% trilaminado, por 2 a 6 horas.  
até 600mg em 500mL de SF/SG 5% trilaminado, por 2 a 6 horas.

► **Administração com alimentos:**

Evitar o consumo de álcool, suco de toranja (grapefruit), Erva-de-São-João, unha de gato e equinácea.

► **ARMAZENAMENTO**

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

Após preparo, possui estabilidade de 24 horas em temperatura ambiente entre 20°C e 25°C.

**CICLO-TAUROLIDINA + CITRATO + UROQUINASE <sup>1</sup>**

Outros – Sangue e Órgãos Hematopoiéticos

Nome comercial:

Taurolock U 25000 UI FA 5mL <sup>1</sup>

**POSOLOGIA**

**Adulto e Criança:**

|             |                                     |
|-------------|-------------------------------------|
| Dose padrão | Volume total do priming do cateter. |
|-------------|-------------------------------------|

► **Ajuste de dose:**

Não é necessário ajuste de dose.

► **ARMAZENAMENTO**

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

**CILOSTAZOL <sup>1,2</sup>**

Antiagregante Plaquetário

Nome comercial:

Cebralat 50mg Cp <sup>1,2</sup>

Vasogard 50mg Cp <sup>1,2</sup>

**POSOLOGIA****Adulto:**

Dose padrão

50 a 100mg, a cada 12 horas

▶ **Ajuste de dose:**

Não é necessário ajuste de dose.

▶ **ADMINISTRAÇÃO**

Oral

▶ **Administração com alimentos:**

Evitar o consumo de grapefruit.

▶ **Administração via sonda:**

Pode ser administrado via sonda. Triturar e diluir em 20mL de água, administrando imediatamente.

▶ **ARMAZENAMENTO**

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C. Proteger da luz e umidade.

**CIPROFIBRATO <sup>1</sup>**

Hipolipêmico

Nome comercial:

Lipless 100mg Cp <sup>1</sup>Oroxadin 100mg Cp <sup>1</sup>**POSOLOGIA****Adulto:**

Dose padrão

100mg, a cada 24 horas

▶ **Ajuste de dose:**

Insuficiência renal: Utilizar como dose 100mg em dias alternados e não utilizar em casos de insuficiência renal grave.

▶ **ADMINISTRAÇÃO**

Oral

Ingerir com líquido.

▶ **ARMAZENAMENTO**

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

**CIPROFLOXACINO <sup>1,2</sup>**

Antimicrobiano Quinolona

Nome comercial:

Cipro IV Flexibag 200mg Bolsa 100mL <sup>1,2</sup>Ciprobacter 200mg Bolsa 100mL (Isofarma) <sup>1,2</sup>Ciprobacter 400mg Bolsa 200mL (Isofarma) <sup>1,2</sup>Ciprofloxacino 200mg Bolsa 100mL (Halex Istar) <sup>1,2</sup>Ciprofloxacino 200mg Bolsa 100mL (Isofarma) <sup>1,2</sup>Cipro Iv 400mg Bolsa 200mL <sup>1,2</sup>Ciprofloxacino 400mg Bolsa 200mL (Halex Istar) <sup>1,2</sup>Fresflox 400mg Bolsa 200mL <sup>1,2</sup>**POSOLOGIA****Adulto:**

|                                                                                                                                             |                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Infecções do trato respiratório                                                                                                             | 200 a 400mg IV, a cada 12 horas |
| Infecções do trato urinário - aguda não complicada                                                                                          | 100mg IV, a cada 12 horas       |
| Infecções do trato urinário - cistite em mulheres (antes da menopausa)                                                                      | 100mg IV, em dose única         |
| Infecções do trato urinário - Complicada                                                                                                    | 200mg IV, a cada 12 horas       |
| Gonorreia extragenital                                                                                                                      | 100mg IV, a cada 12 horas       |
| Gonorreia aguda, não complicada                                                                                                             | 100mg IV em dose única          |
| Diarreia                                                                                                                                    | 200mg IV, a cada 12 horas       |
| Infecções graves, com risco para a vida.<br>Principalmente causadas por <i>Pseudomonas</i><br><i>Staphylococcus</i> ou <i>Streptococcus</i> | 400mg IV, a cada 8 horas        |

► **Ajuste de dose:**

Insuficiência renal:

| Dose com Função Renal Normal | Dose Insuficiência Renal<br>clearance de creatinina (mL/min) |              |     |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|-----|
|                              | >50-90                                                       | 10-50        | <10 |
| 400mg 12/12h                 | 100%                                                         | 400mg 24/24h | 50% |

► **ADMINISTRAÇÃO**

Intravenosa

Administrar lentamente por no mínimo 60 minutos.

► **Administração com alimentos:**

Evitar o consumo de Erva-de-São-João, lácteos e cafeinados, magnésio, zinco e an-gélica chinesa.

► **ARMAZENAMENTO**

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C. Proteger da luz.

► **Atenção:**

Receita Branca (2 vias).

**CIPROFLOXACINO** <sup>1,2</sup>

Antimicrobiano Quinolona

Nome comercial:

Cipro 500mg Cp Rev <sup>1,2</sup>

Ciprofloxacino Cld 500mg Cp Rev (Prati Donaduzzi) <sup>1,2</sup>

Ciprofloxacino 500mg Cp Rev (Germed) <sup>1,2</sup>

Ciprofloxacino 500mg Cp Rev (Sandoz) <sup>1,2</sup>

Ciprofloxacino 500mg Cp Rev (Medley) <sup>1,2</sup>

Ciprofloxacino 500mg Cp Rev (EMS) <sup>1,2</sup>

Quinoflox 500mg Cp Rev <sup>1,2</sup>

**POSOLOGIA**

**Adulto:**

|                                                    |                              |
|----------------------------------------------------|------------------------------|
| Infecções do trato respiratório                    | 250 a 500mg, a cada 12 horas |
| Infecções do trato urinário - aguda não complicada | 250mg, a cada 24 ou 12 horas |

|                                                                                                                                             |                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Infecções do trato urinário – cistite em mulheres (antes da menopausa)                                                                      | 250mg, em dose única         |
| Infecções do trato urinário – Complicada                                                                                                    | 250 a 500mg, a cada 12 horas |
| Diarreia                                                                                                                                    | 500mg, a cada 24 ou 12 horas |
| Infecções graves, com risco para a vida.<br>Principalmente causadas por <i>Pseudomonas</i><br><i>Staphylococcus</i> ou <i>Streptococcus</i> | 750mg, a cada 12 horas       |

**Crianças:**

|             |                                           |
|-------------|-------------------------------------------|
| Dose padrão | 20 a 30 mg/kg/dia, fracionado em 2 doses. |
|-------------|-------------------------------------------|

▶ **Ajuste de dose:**

Insuficiência renal:

| Dose com Função Renal Normal | Dose Insuficiência Renal<br>clearance de creatinina (mL/min) |              |     |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|-----|
|                              | >50-90                                                       | 10-50        | <10 |
| 400mg 12/12h                 | 100%                                                         | 400mg 24/24h | 50% |

▶ **ADMINISTRAÇÃO**

Oral

Ingerir com líquido.

▶ **Administração com alimentos:**

Evitar alimentos lácteos e cafeinados ou alimentos ricos em ferro, magnésio, zinco e cálcio, angélica chinesa, Erva-de-São-João.

▶ **Administração via sonda:**

Pode ser administrado via sonda. Triturar e diluir em 20mL de água, administrando imediatamente.

▶ **ARMAZENAMENTO**

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

▶ **Atenção:**

Receita Branca (2 vias).

**CIPROFLOXACINO** <sup>1,2</sup>

Antimicrobiano Oftálmico

Nome comercial:

Biamotil 3,5mg/mL Sol Oft Fr 5mL <sup>1,2</sup>Ciloxan Colírio 0,3% Fr 5mL <sup>1</sup>**POSOLOGIA****Adulto:**

|                         |                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Úlcera córnea           | - 1º dia: 2 gotas, a cada 15 minutos durante as 6 primeiras horas. No restante do dia, instilar 2 gotas, a cada 30 minutos.<br>- 2º dia: 2 gotas, a cada 1 hora<br>- 3º ao 14º dia: 2 gotas, a cada 4 horas |
| Conjuntivite bacteriana | Instilar 1 ou 2 gotas, a cada 2 horas nos primeiros dois dias de tratamento.<br>Instilar então, 1 a 2 gotas, a cada 4 horas, durante os 5 dias subsequentes.                                                |

- ▶ **Ajuste de dose:**  
Não é necessário ajuste de dose.
- ▶ **ADMINISTRAÇÃO**  
Via ocular.
- ▶ **ARMAZENAMENTO**  
Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C. Proteger da luz.
- ▶ **Atenção:**  
Receita Branca (2 vias).

CIPROTERONA <sup>1</sup>

Hormônio Antiandrogênico

Nome comercial:  
Androcur 50mg Cp <sup>1</sup>

**POSOLOGIA**

**Adulto:**  
Conforme protocolo.

- ▶ **Ajuste de dose:**  
Insuficiência renal: O uso é contraindicado.  
Insuficiência hepática: O uso é contraindicado.
- ▶ **ADMINISTRAÇÃO**  
Oral  
Administrar após as refeições.
- ▶ **Administração com alimentos:**  
Evitar o consumo de álcool.
- ▶ **Administração via sonda:**  
Risco ocupacional para o manipulador. Pode ser administrado via sonda. Triturar e diluir em 15mL de água, administrando imediatamente.
- ▶ **ARMAZENAMENTO**  
Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

CISATRACÚRIO BESILATO <sup>1,2</sup>

Bloqueador Neuromuscular

Nome comercial:  
Nimbium 10mg Amp 5mL <sup>1,2</sup>  
Cis 10mg Amp 5mL <sup>1,2</sup>

**POSOLOGIA**

**Adulto:**

|                       |                                                                                                                                              |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Intubação orotraqueal | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dose inicial: 0,15 mg/kg IV em bolus</li> <li>- Dose manutenção: 0,03 mg/kg, IV em bolus</li> </ul> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

- ▶ **Ajuste de dose:**  
Não é necessário ajuste de dose.
- ▶ **ADMINISTRAÇÃO**  
Intravenosa  
Infusão intermitente: 10mg em 100mL de SF/SG 5%, por 2mg/min.  
Intravenosa direta: sim.  
Infusão contínua: sim.
- ▶ **ARMAZENAMENTO**  
Conservar em refrigeração entre 2°C e 8°C.  
Após diluição, possui estabilidade de 24 horas em temperatura ambiente entre 5°C e 25°C.

**CISPLATINA <sup>1</sup>**

Antineoplásico Citotóxico

Nome comercial:

Fauldcispla 50mg FA 50mL <sup>1</sup> \*Fauldcispla 10mg FA 10mL <sup>1</sup> \*Platistine 10mg FA 10mL <sup>1</sup>Platistine 50mg FA 50mL <sup>1</sup>**POSOLOGIA****Adulto:**

Conforme esquema quimioterápico.

▶ **Administração com alimentos:**

Evitar o consumo de angélica chinesa e cimicífuga em tumores dependentes de estrogênio.

▶ **ARMAZENAMENTO**

Conservar em temperatura ambiente abaixo de 25°C.

▶ **Atenção:**

\* Estas apresentações são livres de látex.

**CITALOPRAM <sup>1,2</sup>**

Antidepressivo

Nome comercial:

Cipramil 20mg Cp <sup>1,2</sup>Procimax 20mg Cp <sup>1,2</sup>Citalopram 20mg cp (Biosintética) <sup>1,2</sup>Citalopram 20mg cp (Sandoz) <sup>1,2</sup>**POSOLOGIA****Adulto:**

|                                 |                                                       |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Depressão                       | 20mg, a cada 24 horas                                 |
| Transtorno Obsessivo Compulsivo | 20mg, a cada 24 horas                                 |
| Transtorno do Pânico            | 10mg na primeira semana, aumentando para 20mg ao dia. |

▶ **Ajuste de dose:**

Idosos: Reduzir a dose recomendada pela metade.

▶ **ADMINISTRAÇÃO**

Oral

Administrar independentemente das refeições.

▶ **Administração com alimentos:**

Evitar o consumo de álcool, Erva-de-São-João, kava kava e valeriana.

▶ **Administração via sonda:**

Pode ser administrado via sonda. Triturar e diluir em 15mL de água, administrando imediatamente.

▶ **ARMAZENAMENTO**

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

▶ **Atenção:**

Receita Branca (2 vias).



CITARABINA 1

Antineoplásico Citotóxico

Nome comercial:

- Aracytin CS 1g FA 10mL 1
- FauldCITA 1g FA 10ml 1 \*
- FauldCITA 500mg Amp 5 mL 1 \*
- Citarabina 1g FA 10mL (Accord) 1
- Aracytin CS 100mg FA 5mL 1
- Citarabina 100mg FA 1mL (Accord) 1 \*
- Citarabina 500mg FA 5mL (Accord) 1 \*
- Citarax 500mg FA 10mL 1 \*

POSOLOGIA

Adulto:

Conforme esquema quimioterápico.

- ▶ **ARMAZENAMENTO**  
Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.
- ▶ **Atenção:**  
Receita Branca (2 vias).  
\* Estas apresentações são livres de látex.

CITIDINA + URIDINA + HIDROXOCOBOLAMINA 1

Terapêutica Prostática

Nome comercial:

- Etna Cap 1
- Etna 10mg FA 2mL 1 \*

POSOLOGIA

Adulto:

- |             |                                                                                                           |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dose padrão | 2 cápsulas, a cada 8 horas ou 1 ampola IM por 3 dias, seguido de 2 cps, a cada 8 horas, por 30 a 60 dias. |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
- ▶ **Ajuste de dose:**  
Não é necessário ajuste de dose.
  - ▶ **ADMINISTRAÇÃO**  
Oral (cápsula)  
Intramuscular (frasco-ampola).
  - ▶ **ARMAZENAMENTO**  
Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.
  - ▶ **Atenção:**  
\* Este medicamento é livre de látex.

CITRATO DE POTÁSSIO 1

Outros - Aparelho Genitourinário

Nome comercial:

- Litocit 10mEq Cp 1

POSOLOGIA

Adulto:

|                         |                                                |
|-------------------------|------------------------------------------------|
| Hipocitratúria moderada | 10mEq, a cada 8 horas                          |
| Hipocitratúria grave    | 20mEq, a cada 8 horas ou 15mEq, a cada 6 horas |

- ▶ **Ajuste de dose:**  
Não é necessário ajuste de dose.
- ▶ **ADMINISTRAÇÃO**  
Oral  
Administrar durante ou até 30 minutos após as refeições.
- ▶ **ARMAZENAMENTO**  
Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C. Proteger da luz e umidade.

CITRATO TRISSÓDICO <sup>1,2</sup>

Solução para Diálise

Nome comercial:  
Citrato Trissódico 4% (40mg/mL) Bolsa 3000mL Manip (Life Pharma) <sup>1,2</sup>  
Citrato Trissódico 4% (40mg/mL) Bolsa 3000mL Manip (Phynton) <sup>1,2</sup>

**POSOLOGIA**  
A critério médico.

- ▶ **ARMAZENAMENTO**  
Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

CLARITROMICINA <sup>1,2</sup>

Antimicrobiano Macrolídeo

Nome comercial:  
Claritromicina 500mg Cp (EMS) <sup>1,2</sup>  
Claritromicina 500mg Cp (Medley) <sup>1,2</sup>

**POSOLOGIA**  
**Adulto:**

|                                                                                                                                    |                                                  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--|--|
| Faringite tonsilite                                                                                                                | 250mg, a cada 12 horas durante 10 dias           |  |  |
| Sinusite maxilar aguda                                                                                                             | 500mg, a cada 12 horas durante 14 dias           |  |  |
| Bronquite crônica com exacerbação bacteriana aguda causada por <i>S. pneumoniae</i> , <i>M. catarrhalis</i> , <i>H. influenzae</i> | 250 a 500mg, a cada 12 horas durante 7 a 14 dias |  |  |
| Pneumonia causada por <i>S. pneumoniae</i> e <i>M. catarrhalis</i>                                                                 | 250mg, a cada 12 horas durante 7 a 14 dias       |  |  |
| Infecções não-complicadas da pele e estruturas cutâneas                                                                            | 250mg, a cada 12 horas durante 7 a 14 dias       |  |  |

- ▶ **Ajuste de dose:**  
Insuficiência renal:

| Dose com Função Renal Normal | Dose Insuficiência Renal<br>clearance de creatinina (mL/min) |       |        |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------|--------|
|                              | >50-90                                                       | 10-50 | <10    |
| 0,5-1g 12/12h                | 100%                                                         | 75%   | 50-75% |

Insuficiência hepática: Pode ser necessário ajuste de dose, monitorar.

- ▶ **ADMINISTRAÇÃO**  
Oral  
Administrar independentemente das refeições.
- ▶ **Administração com alimentos:**  
Evitar o consumo de Erva-de-São-João.
- ▶ **ARMAZENAMENTO**  
Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C. Proteger da luz e umidade.
- ▶ **Atenção:**  
Receita Branca (2 vias).

**CLARITROMICINA <sup>1,2</sup>**

Antimicrobiano Macrolídeo

Nome comercial:  
 Claritromicina 500mg FA (Abl) <sup>1,2</sup> \*  
 Claritromicina 500mg FA (Aspen) <sup>1,2</sup>  
 Klaricid 500mg FA <sup>1,2</sup>

**POSOLOGIA**

**Adulto:**

|             |                                                                                                                                                   |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dose padrão | 250 a 500mg, a cada 12 horas durante 6 a 14 dias, durante 2 a 5 dias para doentes graves e deve ser modificada para terapia oral quando possível. |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

- ▶ **Ajuste de dose:**  
Insuficiência renal:

| Dose com Função Renal Normal | Dose Insuficiência Renal<br>clearance de creatinina (mL/min) |       |        |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------|--------|
|                              | >50-90                                                       | 10-50 | <10    |
| 0,5-1g 12/12h                | 100%                                                         | 75%   | 50-75% |

- Insuficiência hepática: Pode ser necessário ajuste de dose, monitorar.
- ▶ **ADMINISTRAÇÃO**  
Intravenosa  
Reconstituir em 10mL de água bidestilada.  
Infusão intermitente: 500mg em 250mL de SF/SG 5%, por 60 minutos.
  - ▶ **Administração com alimentos:**  
Evitar o consumo de Erva-de-São-João.
  - ▶ **ARMAZENAMENTO**  
Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C. Proteger da luz e umidade.
  - ▶ **Atenção:**  
Receita Branca (2 vias).  
\* Este medicamento é livre de látex

**CLINDAMICINA CLORIDRATO <sup>1,2</sup>**

Antimicrobiano Lincosamida

Nome comercial:  
 Clindamicina 300mg Cap Manip <sup>1,2</sup>  
 Dalacin C 300mg Cap <sup>1,2</sup>  
 Clindamicina 300mg Cap (Teuto) <sup>1,2</sup>  
 Clindamicina 300mg Cap (União Química) <sup>1,2</sup>

**POSOLOGIA****Adulto:**

|             |                                                    |
|-------------|----------------------------------------------------|
| Dose padrão | 600 a 1800mg, fracionada em 2, 3 ou 4 doses iguais |
|-------------|----------------------------------------------------|

- ▶ **Ajuste de dose:**  
Não é necessário ajuste de dose.
- ▶ **ADMINISTRAÇÃO**  
Oral  
Ingerir com líquido.
- ▶ **Administração com alimentos:**  
Evitar o consumo de Erva-de-São-João.
- ▶ **Administração via sonda:**  
Pode ser administrado via sonda. Abrir a cápsula e diluir em 15mL de água, administrando imediatamente.
- ▶ **ARMAZENAMENTO**  
Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C. Proteger da luz e umidade.
- ▶ **Atenção:**  
Receita Branca (2 vias).

**CLINDAMICINA FOSFATO <sup>1,2</sup>**

Antimicrobiano Lincosamida

Nome comercial:

Clindamicina 600mg Amp 4ml (União Química) <sup>1,2</sup>Clindamicina 600mg Amp 4ml (Hipolabor) <sup>1,2</sup>Clindamicina 600mg Amp 4ml (Novafarma) <sup>1,2</sup>**POSOLOGIA****Adulto:**

|                                                                                                   |                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Infecções intra-abdominais, infecções de pelve feminina e outras complicações ou infecções graves | 2.400 a 2.700 mg IV/IM, em 2, 3 ou 4 doses iguais |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|

|                     |                                                    |
|---------------------|----------------------------------------------------|
| Infecções moderadas | 1.200 a 1.800 mg/dia IV/IM, em 3 ou 4 doses iguais |
|---------------------|----------------------------------------------------|

**Criança (> 1 ano de idade):**

|             |                                                 |
|-------------|-------------------------------------------------|
| Dose padrão | 20 a 40 mg/kg/dia IV/IM, em 3 ou 4 doses iguais |
|-------------|-------------------------------------------------|

- ▶ **Ajuste de dose:**  
Não é necessário ajuste de dose.
- ▶ **ADMINISTRAÇÃO**  
Intravenosa e Intramuscular  
Infusão intermitente: 600mg em 50mL de SF/SG 5%, durante 10 a 40 minutos.
- ▶ **Administração com alimentos:**  
Evitar o consumo de Erva-de-São-João.
- ▶ **ARMAZENAMENTO**  
Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.
- ▶ **Atenção:**  
Receita Branca (2 vias).

**CLOBAZAM <sup>1,2</sup>**

Ansiolítico

Nome comercial:

Frisium 10mg Cp <sup>1,2</sup>Urbanil 10mg Cp <sup>1,2</sup>

POSOLOGIA

Adulto e Adolescente (> 15 anos de idade):

|                                                           |                                                         |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Estados de Ansiedade                                      | 20mg, a cada 24 horas. Aumentar até 30mg se necessário. |
| Epilepsia em combinação com um ou mais anticonvulsivantes | 5 a 15 mg/dia, aumentando até, no máximo, 80 mg/dia.    |

Idoso:

|             |                            |
|-------------|----------------------------|
| Dose padrão | 10 a 15mg, a cada 12 horas |
|-------------|----------------------------|

Criança:

|             |                                                                                |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Dose padrão | ½ comprimido de 10mg, a cada 12 horas ou 1 comprimido de 10mg, a cada 12 horas |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|

- ▶ **Ajuste de dose:**  
Insuficiência hepática: Pode ser necessário ajuste de dose, monitorar. Em casos graves, o uso é contraindicado.
- ▶ **ADMINISTRAÇÃO**  
Oral
- ▶ **Administração com alimentos:**  
Evitar o consumo de álcool, Erva-de-São-João e kava kava.
- ▶ **Administração via sonda:**  
Pode ser administrado via sonda. Triturar e diluir em 15mL de água, administrando imediatamente.
- ▶ **ARMAZENAMENTO**  
Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.
- ▶ **Atenção:**  
Receita Azul.  
Risco de Queda.

CLOMIPRAMINA <sup>1</sup>

Antidepressivo

Nome comercial:  
Anafranil 25mg Drg <sup>1</sup>  
Clo 25mg Cp Rev <sup>1</sup>  
Cloridrato de Clomipramina 25mg Drg (EMS) <sup>1</sup>

POSOLOGIA

Adulto:

|                                     |                                                                      |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Depressão, TOC e fobias             | 50 a 75 mg/dia. Aumentar gradativamente.                             |
| Ataques de pânico                   | 10mg ao dia e aumentar até 25 a 100mg, se necessário.                |
| Cataplexia acompanhando narcolepsia | 25 a 75 mg ao dia                                                    |
| Dor crônica                         | 10 a 150mg ao dia                                                    |
| Ejaculação precoce                  | 25mg ao dia inicialmente, podendo aumentar para 50mg após 2 semanas. |

**Criança:**

Enurese noturna

- Entre 5 a 8 anos: 20 a 30mg/dia
- Entre 9 a 12 anos: 25 a 50mg/dia
- Acima de 12 anos: 25 a 75mg/dia

▶ **Ajuste de dose:**

Não é necessário ajuste de dose.

▶ **ADMINISTRAÇÃO**

Oral

Administrar preferencialmente à noite.

▶ **Administração com alimentos:**

Evitar o consumo de álcool e Erva-de-São-João.

▶ **Administração via sonda:**

Pode ser administrado via sonda. Triturar e diluir em 15mL de água, administrando imediatamente.

▶ **ARMAZENAMENTO**

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

▶ **Atenção:**

Receita Branca (2 vias).

**CLONAZEPAM** <sup>1,2</sup>

Anticonvulsivante

Nome comercial:

Clonazepam Gts 2,5mg/mL Fr 20mL (EMS) <sup>1,2</sup>Rivotril 0,5mg Cp <sup>1,2</sup>Rivotril 2mg Cp <sup>1</sup>Rivotril 0,25mg Cp Sublingual <sup>1,2</sup>Rivotril Gts 2,5mg/mL Fr 20mL <sup>1,2</sup>**POSOLOGIA****Adulto:**

Distúrbios epilépticos

- 1,5 mg/dia, fracionado a cada 8 horas. Pode-se aumentar de 0,5 a 1mg a cada 3 dias, até controle da crise
- Dose máxima: 20mg/dia

**Criança (até 10 anos de idade ou 30kg):**Distúrbios  
epilépticos

- 0,01 a 0,03 mg/kg/dia, fracionados a cada 12 ou 8 horas. Pode-se aumentar em 0,25 a 0,5mg a cada 3 dias, até dose efetiva.
- Dose manutenção: 0,1 a 0,2 mg/kg/dia, a cada 8 horas
- Dose máxima: 0,2 mg/kg/dia

▶ **Ajuste de dose:**

Não é necessário ajuste de dose.

▶ **ADMINISTRAÇÃO**

Oral

Utilizar imediatamente após retirar da embalagem.

▶ **Administração com alimentos:**

Evitar o consumo de álcool e Erva-de-São-João.

▶ **Administração via sonda:**

Pode ser administrado via sonda. Triturar e diluir em 15mL de água, administrando imediatamente.

- ▶ **ARMAZENAMENTO**  
Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.
- ▶ **Atenção:**  
Receita Azul.  
Risco de Queda.

CLONIDINA <sup>1,2</sup>

Agente Anti-hipertensivo

Nome comercial:  
Clonidin 150mcg/mL Amp 1mL <sup>1,2</sup>

**POSOLOGIA**

**Adulto:**

|                              |                                                                                                         |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Medicação pré-anestésica     | - Longa duração: 150mcg IM/IV                                                                           |
| Analgesia pós-operatória     | Infusão epidural contínua: 30 mcg/horas                                                                 |
| Associação a outros fármacos | Adicionar 150mcg da solução injetável de clonidina à solução do anestésico escolhido antes da aplicação |

- ▶ **Ajuste de dose:**  
Insuficiência renal:

| Dose com Função Renal Normal | Dose com Insuficiência Renal<br>clearance de creatinina (mL/min) |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 0,1 a 0,2mg                  | <10                                                              |
|                              | 50-75% da dose normal                                            |

- ▶ **ADMINISTRAÇÃO**  
Intravenosa, Intramuscular Epidural  
Infusão intermitente: 150 mcg em 100mL de SF.  
Intravenosa direta: sim.
- ▶ **Administração com alimentos:**  
Evitar o consumo de álcool e Erva-de-São-João.
- ▶ **ARMAZENAMENTO**  
Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C. Proteger da luz.

CLONIDINA <sup>1,2</sup>

Agente Anti-hipertensivo

Nome comercial:  
Atensina 100mcg Cp <sup>1,2</sup>  
Atensina 150mcg Cp <sup>1,2</sup>

**POSOLOGIA**

**Adulto:**

|                             |                                  |
|-----------------------------|----------------------------------|
| Hipertensão leve a moderada | 0,075 a 0,200mg, a cada 24 horas |
| Dose máxima                 | 0,9 mg/dia, a cada 8 horas.      |

▶ **Ajuste de dose:**

Insuficiência renal:

| Dose com Função Renal Normal | Dose com Insuficiência Renal<br>clearance de creatinina (mL/min) |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 0,1 a 0,2mg                  | <10                                                              |
|                              | 50-75% da dose normal                                            |

▶ **ADMINISTRAÇÃO**

Oral

▶ **Administração com alimentos:**

Evitar o consumo de álcool e Erva-de-São-João.

▶ **Administração via sonda:**

Pode ser administrado via sonda. Triturar e diluir em 10mL de água, administrando imediatamente.

▶ **ARMAZENAMENTO**

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C. Proteger da luz e umidade.

**CLOPERASTINA** <sup>1,2</sup>

Antitussígeno

Nome comercial:

Seki 3,54mg/mL Fr 120mL <sup>1,2</sup>**POSOLOGIA****Adulto:**

|             |                      |
|-------------|----------------------|
| Dose padrão | 10mL, a cada 8 horas |
|-------------|----------------------|

**Criança (até 12 anos de idade):**

|             |                   |
|-------------|-------------------|
| Dose padrão | 0,5 a 1 mL/kg/dia |
|-------------|-------------------|

▶ **Ajuste de dose:**

Não é necessário ajuste de dose.

▶ **ADMINISTRAÇÃO**

Oral

▶ **ARMAZENAMENTO**

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

**CLOPIDOGREL** <sup>1,2</sup>

Antiagregante Plaquetário

Nome comercial:

Plavix 75mg Cp Rev <sup>1,2</sup>**POSOLOGIA****Adulto:**

|                          |                                                         |
|--------------------------|---------------------------------------------------------|
| Síndrome Coronária Aguda | 300mg como dose de ataque e manter uma dose de 75mg/dia |
| Fibrilação atrial        | 75mg, a cada 24 horas                                   |

▶ **Ajuste de dose:**



Não é necessário ajuste de dose.

► **ADMINISTRAÇÃO**

Oral

► **Administração via sonda:**

Pode ser administrado via sonda. Triturar e diluir em 15mL de água, administrando imediatamente.

► **ARMAZENAMENTO**

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C. Proteger da umidade

**CLORANFENICOL + AMINOÁCIDOS +  
METIONINA +VITAMINA A <sup>1</sup>**

Antimicrobiano Tópico

Nome comercial:

Epitezan Pomada Oft Tubo 3,5g <sup>1</sup>

Regencel Pomada Oft Tubo 3,5g <sup>1</sup>

**POSOLOGIA**

**Adulto e Criança:**

Dose padrão

Aplicar aproximadamente 1cm de pomada no saco conjuntival, a cada 8 ou 6 horas

► **Ajuste de dose:**

Não é necessário ajuste de dose.

► **ADMINISTRAÇÃO**

Tópico

► **ARMAZENAMENTO**

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

► **Atenção:**

Receita Branca (2 vias).

**CLORANFENICOL + COLAGENASE <sup>1,2</sup>**

Antimicrobiano Tópico

Nome comercial:

Iruxol Pomada Bis 30g <sup>1,2</sup>

**POSOLOGIA**

**Adulto e Criança:**

Dose padrão

Aplicar uniformemente, com espessura de 2mm. O curativo deve ser trocado diariamente, sendo possível aumentar o efeito enzimático, aplicando a pomada, a cada 12 horas.

► **Ajuste de dose:**

Não é necessário ajuste de dose.

► **ADMINISTRAÇÃO**

Tópico

► **ARMAZENAMENTO**

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

► **Atenção:**

Receita Branca (2 vias).

## CLORANFENICOL + DESOXIRRIBONUCLEASE + FIBRINOLISINA <sup>1</sup>

Antimicrobiano Tópico

Nome comercial:

Fibrase Pomada Bis 30g <sup>1</sup>

Fibrinase Com Cloranfenicol Pomada Bis 30g <sup>1</sup>

### POSOLOGIA

#### Adulto e Criança:

Dose padrão

Aplicar na área afetada em intervalos regulares durante o tempo que se deseja a ação enzimática do produto. O curativo deve ser coberto com gaze ou outro curativo aderente. Trocar o curativo, no mínimo, 1 vez ao dia.

#### ► Ajuste de dose:

Não é necessário ajuste de dose.

#### ► ADMINISTRAÇÃO

Tópico

#### ► ARMAZENAMENTO

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

#### ► Atenção:

Receita Branca (2 vias).

## CLORETO DE CÁLCIO <sup>1,2</sup>

Eletrólito, Diluente

Nome comercial:

Cloreto de Cálcio 10% Amp 10mL Manip <sup>1,2</sup>

### POSOLOGIA

#### Adultos:

*Hipocalcemia aguda:*

Dose usual: 200 mg a 1g (2 a 10 mL), em intervalos de 1 a 3 dias.

#### Crianças:

*Hipocalcemia:*

Dose usual: 2,7 a 5,0 mg/kg/dia (ou 0,027 a 0,05 mL da solução), IV, a cada 4 a 6 horas.

#### ► Ajuste de dose:

Pode ser necessário ajuste de dose, monitorar.

#### ► ADMINISTRAÇÃO

Intravenosa

Infusão intermitente: até 1000mg em 50mL de SF/SG 5%, acima de 30 minutos.

Infusão contínua: sim em 500mL a 1000mL.

#### ► ARMAZENAMENTO:

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

#### ► Atenção:

Alta Vigilância.

## CLORETO DE CÁLCIO <sup>1</sup>

Eletrólito, Diluente

Nome comercial:

Cloreto de Cálcio 10% Amp 10mL Manip <sup>1</sup>

### POSOLOGIA

**Adultos:**

*Hipocalcemia aguda:*

Dose usual: 200 mg a 1g (2 a 10 mL), em intervalos de 1 a 3 dias.

**Crianças:**

*Hipocalcemia:*

Dose usual: 2,7 a 5,0 mg/kg/dia (ou 0,027 a 0,05 mL da solução), IV, a cada 4 a 6 horas.

- ▶ **Ajuste de dose:**  
Pode ser necessário ajuste de dose, monitorar.
- ▶ **ADMINISTRAÇÃO**  
Intravenosa  
Infusão intermitente: até 1000mg em 50mL de SF/SG 5%, acima de 30 minutos.  
Infusão contínua: sim em 500mL a 1000mL.
- ▶ **ARMAZENAMENTO:**  
Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.  
Possui estabilidade de 24 horas em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.
- ▶ **Atenção:**  
Alta Vigilância.  
Risco de queda.

**CLORETO DE POTÁSSIO <sup>1,2</sup>**

Eletrólito Oral

Nome comercial:  
Cloreto de Potássio 6% Sol Oral (sem açúcar) Fr 100mL Manip <sup>1,2</sup>  
Ionclor 6% Sol Oral Fr 150mL <sup>1</sup>  
Cloreto de Potássio 1,91g Env Efervescente <sup>1</sup>

**POSOLOGIA**

**Adulto:**

|             |                                               |
|-------------|-----------------------------------------------|
| Dose padrão | 1 a 2 colheres de sopa (15mL), a cada 8 horas |
|-------------|-----------------------------------------------|

**Criança (6 meses a 2 anos de idade):**

|             |                                           |
|-------------|-------------------------------------------|
| Dose padrão | 1 colher de chá (5mL), até 4 vezes ao dia |
|-------------|-------------------------------------------|

**Criança (2 a 6 anos de idade):**

|             |                                                  |
|-------------|--------------------------------------------------|
| Dose padrão | 1 colher de sobremesa (10mL), até 4 vezes ao dia |
|-------------|--------------------------------------------------|

- ▶ **Ajuste de dose:**  
Não é necessário ajuste de dose.
- ▶ **ADMINISTRAÇÃO**  
Tópico
- ▶ **Administração via sonda:**  
Pode ser administrado via sonda.  
Solução: Diluir 1:1 e administrar imediatamente.  
Efervescente: Dispersar em 100mL de água e administrar imediatamente.
- ▶ **ARMAZENAMENTO**  
Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

**CLORETO DE POTÁSSIO <sup>1,2</sup>**

Eletrólito Oral

Nome comercial:  
Slow K 600mg Drg <sup>1,2</sup>

**POSOLOGIA****Adulto:**

|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| Prevenção de Hipocalemia | 2 a 3 drágeas ao dia          |
| Correção de Hipocalemia  | 5 a 6 e até 12 drágeas ao dia |

▶ **Ajuste de dose:**

Não é necessário ajuste de dose.

▶ **ADMINISTRAÇÃO**

Oral

Ingerir logo após as refeições.

▶ **ARMAZENAMENTO**

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C. Proteger da umidade.

**CLORETO DE POTÁSSIO <sup>1,2</sup>**

Eletrólito, Diluente

Nome comercial:  
Cloreto de Potássio 19,1% Amp 10mL <sup>1,2</sup>

**POSOLOGIA****Adulto:**

|                        |                                                                                                                                              |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dose padrão            | 10 a 15 mEq IV, a cada 8 ou 6 horas, normalmente não mais que 3mEq. Pacientes que utilizam diuréticos de alça, podem exigir 80 a 100 mEq/dia |
| Tratamento de urgência | 400 mEq/dia IV, em concentração apropriada e com velocidade de até 20 mEq/hora                                                               |
| Anti-hipocalêmica      | 40 a 60 mEq IV. Ajustar a dose em função da concentração sérica de potássio e do eletrocardiograma.                                          |

**Criança:**

|                 |                     |
|-----------------|---------------------|
| Dose manutenção | 2 a 3 mEq/kg/dia IV |
|-----------------|---------------------|

▶ **Ajuste de dose:**

Não é necessário ajuste de dose.

▶ **ADMINISTRAÇÃO**

Intravenosa

Infusão contínua: até 300mg/160mEq em 1000mL de SF/SG 5%, em 60mEq/h.

▶ **ARMAZENAMENTO**

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

▶ **Atenção:**

Alta Vigilância

# CLORETO DE SÓDIO <sup>1</sup>

Eletrólito Oral

Nome comercial:  
Cloreto de Sódio 500mg Cap Manip <sup>1</sup>

**POSOLOGIA**

A critério médico.

► **ARMAZENAMENTO**

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

# CLORETO DE SÓDIO <sup>1,2</sup>

Eletrólito, Diluente

Nome comercial:  
Soro Fisiológico 0,9% Trilaminado Bolsa 100mL (Eurofarma) <sup>1</sup>  
Soro Fisiológico 0,9% Trilaminado Bolsa 250mL (Eurofarma) <sup>1,2</sup>  
Soro Fisiológico 0,9% Trilaminado Bolsa 500mL (Eurofarma) <sup>1,2</sup>  
Soro Fisiológico 0,9% Trilaminado Bolsa 250mL (Halexistar) <sup>1,2</sup>  
Soro Fisiológico 0,9% Trilaminado Bolsa 500mL (Halexistar) <sup>1,2</sup>  
Soro Fisiológico 0,9% Amp 10mL <sup>1,2</sup>  
Soro Fisiológico 0,9% Bolsa 50mL <sup>1,2</sup>  
Soro Fisiológico 0,9% Bolsa 100mL <sup>1,2</sup>  
Soro Fisiológico 0,9% Bolsa 100mL (Eurofarma) <sup>1,2</sup>  
Soro Fisiológico 0,9% Bolsa 250mL <sup>1,2</sup>  
Soro Fisiológico 0,9% Bolsa 500mL <sup>1,2</sup>  
Soro Fisiológico 0,9% Bolsa 1000mL <sup>1,2</sup>  
Soro Fisiológico 0,9% Bolsa 2000mL <sup>1,2</sup>  
Cloreto de Sódio 0,9% Ser 3mL <sup>1</sup>  
Cloreto de Sódio 0,9% Ser 10mL <sup>1</sup>  
Cloreto de sódio 0,9% Ser 10mL (Equiplex) <sup>1</sup>

**POSOLOGIA**

A critério médico.

► **ARMAZENAMENTO**

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

# CLORETO DE SÓDIO <sup>1,2</sup>

Reposição Hidroeletrolítica Oral

Nome comercial:  
Cloreto de Sódio 500mg Cap Manip <sup>1,2</sup>

**POSOLOGIA**

A critério médico.

► **Administração via sonda:**

Pode ser administrado via sonda. Abrir e dissolver em 10ml de água e administrar.

► **ARMAZENAMENTO**

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

**CLORETO DE SÓDIO** <sup>1,2</sup>

Eletrólito, Diluente

Nome comercial:

Cloreto de Sódio 20% Amp 10mL <sup>1,2</sup>**POSOLOGIA**

A critério médico.

▶ **ADMINISTRAÇÃO**

Infusão contínua: 1000mL de SF/SG 5%.

▶ **ARMAZENAMENTO**

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

▶ **Atenção:**

Alta vigilância.

**CLOREXIDINA** <sup>1,2</sup>

Antisséptico Tópico

Nome comercial:

Riohex Loção Aquosa 0,2% Almotolia 100mL <sup>1,2</sup>Riohex Loção Aquosa 0,5% Almotolia 100mL <sup>1</sup>**POSOLOGIA**

Usar como degermante das mãos, descontaminação de campo operatório.

▶ **ARMAZENAMENTO**

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

**CLOREXIDINA** <sup>1</sup>

Antisséptico Tópico

Nome comercial:

Riohex 2% Almotolia 100mL <sup>1</sup>**POSOLOGIA**

Usar como degermante das mãos, descontaminação de campo operatório.

▶ **ARMAZENAMENTO**

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

**CLOREXIDINA** <sup>1,2</sup>

Antisséptico Tópico

Nome comercial:

Riohex Degermante Com Tensoativo 2% Almotolia 30mL <sup>1,2</sup>Riohex Degermante Com Tensoativo 2% Almotolia 1000mL <sup>1</sup>**POSOLOGIA**

Usar como degermante das mãos, descontaminação de campo operatório.

▶ **ARMAZENAMENTO**

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

## CLOREXIDINA <sup>1</sup>

Antisséptico Tópico

Nome comercial:

Chlorohex Sabão 2% Fr 1L <sup>1</sup>

### POSOLOGIA

Usar como degermante das mãos, descontaminação de campo operatório.

#### ▶ ARMAZENAMENTO

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

## CLOREXIDINA <sup>1,2</sup>

Antisséptico Tópico

Nome comercial:

Riohex Solução Alcoólica 0,5% Almotolia 30mL <sup>1,2</sup>

Riohex Solução Alcoólica 0,5% Almotolia 100mL <sup>1,2</sup>

### POSOLOGIA

Fazer antisepsia do campo operatório e antisepsia da pele antes do procedimento invasivo.

#### ▶ ARMAZENAMENTO

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

## CLOREXIDINA + FLUORETO DE SÓDIO <sup>1,2</sup>

Antisséptico Bucal

Nome comercial:

Cariax Sol Bucal Fr 250mL <sup>1,2</sup>

Colgate Periogard 0,12% Solução Fr 250mL <sup>1,2</sup>

### POSOLOGIA

Pacientes hospitalizados: efetuar enxágue de 6/6 horas - 4 vezes ao dia ou a critério médico, com 15mL do produto sem diluir durante 30 segundos. Aconselha-se não bochechar com água imediatamente após a sua administração. Não deve ser ingerido.

Pacientes de UTI: Utilizar um swab dental embebida com o produto e fazer a higiene oral.

#### ▶ ARMAZENAMENTO

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

## CLOREXIDINA + FLUORETO DE SÓDIO <sup>1</sup>

Antisséptico Bucal

Nome comercial:

Periokin Gel Oral Tubo 36g <sup>1</sup>

### POSOLOGIA

Aplicar o gel 2 ou 3 vezes ao dia com uma escova macia ou com algodão.

**OBS:** O contato com certas bebidas ou alimentos, tais como o vinho ou café, pode ser responsável pelo aparecimento de coloração nos dentes.

#### ▶ ARMAZENAMENTO

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

**CLORPROMAZINA** <sup>1,2</sup>

Antipsicótico, Neuroléptico

Nome comercial:

Amplictil 25mg Amp 5mL <sup>1,2</sup>Longactil 25mg Amp 5mL <sup>1,2</sup>**POSOLOGIA****Adulto:**

|              |                                                   |
|--------------|---------------------------------------------------|
| Dose inicial | 25 a 100mg IM, a cada 8 ou 6 horas, se necessário |
| Dose máxima  | 2g ao dia                                         |

**Idoso:**

|              |                                                                                               |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dose inicial | 10 a 25mg IV, a cada 12 a 24 horas. Aumentar incrementos de 10 a 25 mg/dia, a cada 4 a 7 dias |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|

**Criança (> 5 anos de idade):**

|             |              |
|-------------|--------------|
| Dose máxima | 75 mg ao dia |
|-------------|--------------|

▶ **Ajuste de dose:**

Não é necessário ajuste de dose.

▶ **ADMINISTRAÇÃO**

Intravenosa e Intramuscular

Infusão intermitente: até 100mg em 100mL de SF, por 30 minutos.

Infusão contínua: até 100mg em 500mL de SF.

▶ **Administração com alimentos:**

Evitar o consumo de álcool e Erva-de-São-João.

▶ **ARMAZENAMENTO**

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

▶ **Atenção:**

Receita Branca (2 vias).

Risco de Queda.

**CLORPROMAZINA** <sup>1</sup>

Antipsicótico, Neuroléptico

Nome comercial:

Amplictil 25mg Cp Rev <sup>1</sup>Amplictil 4% Gts Fr 20ml <sup>1</sup>Longactil 25mg Cp <sup>1</sup>Longactil 4% Gts Fr 20ml <sup>1</sup>**POSOLOGIA****Adulto:**

|             |                                             |
|-------------|---------------------------------------------|
| Dose padrão | 25 a 100mg, repetindo de 3 a 4 vezes ao dia |
|-------------|---------------------------------------------|

**Criança (> 2 anos de idade):**

|              |                                         |
|--------------|-----------------------------------------|
| Dose inicial | 0,5 a 1 mg/kg/dia, a cada 12 ou 8 horas |
| Dose máxima  | 2g ao dia                               |



- ▶ **Ajuste de dose:**  
Não é necessário ajuste de dose.
- ▶ **ADMINISTRAÇÃO**  
Oral
- ▶ **Administração com alimentos:**  
Evitar o consumo de álcool e Erva-de-São-João.
- ▶ **Administração via sonda:**  
Pode ser administrado via sonda. Triturar e diluir em 15mL de água, administrando imediatamente.
- ▶ **ARMAZENAMENTO**  
Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C. Proteger da luz e umidade.
- ▶ **Atenção:**  
Receita Branca (2 vias).  
Risco de Queda.

**CLORTALIDONA <sup>1,2</sup>**

Diurético

Nome comercial:  
Clortalidona 12,5mg Cp (EMS) <sup>1,2</sup>  
Higroton 12,5mg Cp <sup>1,2</sup>

**POSOLOGIA**

**Adulto:**

|                                                                           |                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Hipertensão                                                               | 12,5 a 50mg ao dia                                             |
| Insuficiência cardíaca congestiva estável<br>(classe funcional II ou III) | - Dose padrão: 25 a 50mg ao dia<br>- Dose máxima: 200mg ao dia |

**Criança (> 40kg):**

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| Dose padrão               | 0,3 mg/kg ao dia |
| Dose máxima de manutenção | 50mg ao dia      |

- ▶ **Ajuste de dose:**  
Insuficiência renal:

|                              |                                                                  |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Dose com Função Renal Normal | Dose com Insuficiência Renal<br>clearance de creatinina (mL/min) |
| 12,5 a 50mg 24/24h           | <10                                                              |
|                              | Evitar uso                                                       |

- ▶ **ADMINISTRAÇÃO**  
Oral
- ▶ **Administração via sonda:**  
Pode ser administrado via sonda. Triturar e diluir em 10mL de água, administrando imediatamente.
- ▶ **ARMAZENAMENTO**  
Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

**CLOSTEBOL + NEOMICINA <sup>1</sup>**

Terapêutica das Afecções Dermatológicas

Nome comercial:

Novaderm Pomada 30g <sup>1</sup>Trofodermin Creme Dermatológico Bis 30g <sup>1</sup>Acetato de Clostebol + Sulfato de Neomicina Bis 30g (Medley) <sup>1</sup>**POSOLOGIA****Adulto:**

Dose padrão

Aplicar uma fina camada, a cada 24 ou 12 horas sobre a área afetada, após a limpeza da mesma.

▶ **Ajuste de dose:**

Não é necessário ajuste de dose.

▶ **ADMINISTRAÇÃO**

Tópico

▶ **ARMAZENAMENTO**

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

▶ **Atenção:**

Receita Branca (2 vias).

**CLOSTEBOL + NEOMICINA <sup>1</sup>**

Anti-infeccioso Ginecológico Tópico

Nome comercial:

Trofodermin Creme Vaginal Bis 45g <sup>1</sup>**POSOLOGIA****Adulto:**

Dose padrão

5g, a cada 24 horas

▶ **Ajuste de dose:**

Não é necessário ajuste de dose.

▶ **ADMINISTRAÇÃO**

Via vaginal

▶ **ARMAZENAMENTO**

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

▶ **Atenção:**

Receita Branca (2 vias).

**CLOTRIMAZOL <sup>1</sup>**

Antifúngico Tópico

Nome comercial:

Canesten 1% Creme Dermatológico Bis 20g <sup>1</sup>Clotrimazol 1% Creme Dermatológico Bis 20g (EMS) <sup>1</sup>Clotrimazol 1% Creme Dermatológico Bis 20g (Medley) <sup>1</sup>**POSOLOGIA****Adulto e Criança:**

Dose padrão

Aplicar sobre a área afetada, a cada 12 ou 8 horas

▶ **Ajuste de dose:**

Não é necessário ajuste de dose.

- ▶ **ADMINISTRAÇÃO**  
Via vaginal
- ▶ **ARMAZENAMENTO**  
Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

CLOXAZOLAM <sup>1</sup>

Ansiolítico

Nome comercial:  
Olcadil 1mg Cp <sup>1</sup>  
Olcadil 2mg Cp <sup>1</sup>

**POSOLOGIA**  
**Adulto e Adolescente (> 15 anos de idade):**

|                                     |                                                                                   |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Distúrbios de grau leve a moderado  | 1 a 3 mg ao dia, fracionados a cada 12 ou 8 horas<br>- Dose manutenção: 6 a 12 mg |
| Distúrbios de grau moderado a grave | 2 a 6 mg ao dia, fracionados a cada 12 ou 8 horas<br>- Dose manutenção: 6 a 12 mg |

- ▶ **Ajuste de dose:**  
Não é necessário ajuste de dose.
- ▶ **ADMINISTRAÇÃO**  
Oral
- ▶ **Administração com alimentos:**  
Evitar o consumo de álcool.
- ▶ **Administração via sonda:**  
Pode ser administrado via sonda. Triturar e diluir em 15mL de água, administrando imediatamente.
- ▶ **ARMAZENAMENTO**  
Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.
- ▶ **Atenção:**  
Receita Azul.  
Risco de Queda.

COBAMAMIDA + COENZIMA B12 +  
VITAMINAS + ASSOCIAÇÕES <sup>1</sup>

Orexígeno

Nome comercial:  
Cobavital Cp <sup>1</sup>

**POSOLOGIA**  
**Adulto:**

|             |                              |
|-------------|------------------------------|
| Dose padrão | 1 comprimido, a cada 8 horas |
| Dose máxima | 12 mg ao dia                 |

**Criança (> 6 anos de idade):**

|             |                               |
|-------------|-------------------------------|
| Dose padrão | 1 comprimido, a cada 12 horas |
| Dose máxima | 8 mg ao dia                   |

- ▶ **Ajuste de dose:**  
Não é necessário ajuste de dose.

► **ADMINISTRAÇÃO**

Oral

► **Administração com alimentos:**

Evitar o consumo de álcool.

► **ARMAZENAMENTO**

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

## CODEÍNA <sup>1,2</sup>

Analgésico Narcótico

Nome comercial:

Codein 3mg/mL Sol Oral Fr 120mL <sup>1,2</sup>

### POSOLOGIA

**Adulto:**

|             |                                |
|-------------|--------------------------------|
| Dose padrão | 15 a 60mg, a cada 6 ou 4 horas |
| Dose máxima | 120mg ao dia                   |

**Criança (> 6 anos de idade):**

|             |                                         |
|-------------|-----------------------------------------|
| Dose padrão | 0,5 a 1 mg/kg/dose, a cada 6 ou 4 horas |
| Dose máxima | 60mg/kg/dose                            |

► **Ajuste de dose:**

Insuficiência renal:

| Dose com Função Renal Normal | Dose Insuficiência Renal<br>clearance de creatinina (mL/min) |          |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------|
| 15 a 60mg 4/4h ou 6/6h       | 10-50                                                        | < 10     |
|                              | 75% dose                                                     | 50% dose |

► **ADMINISTRAÇÃO**

Oral

► **Administração com alimentos:**

Evitar o consumo de álcool.

► **ARMAZENAMENTO**

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

► **Atenção:**

Receita Branca (2 vias).

## CODEÍNA FOSFATO + PARACETAMOL <sup>1</sup>

Analgésico Narcótico

Nome comercial:

Tylex 7.5mg/500mg Cp <sup>1</sup>

Tylex 500mg/30mg Cp <sup>1</sup>

### POSOLOGIA

Adulto:

|                     |                               |
|---------------------|-------------------------------|
| Dose padrão         | 7,5mg, a cada 4 horas         |
| Dores mais intensas | 2 comprimidos, a cada 6 horas |
| Dose máxima         | 240mg ao dia/400mg ao dia     |

- ▶ **Ajuste de dose:**  
Não é necessário ajuste de dose.
- ▶ **ADMINISTRAÇÃO**  
Oral
- ▶ **Administração com alimentos:**  
Evitar o consumo de álcool.
- ▶ **Administração via sonda:**  
Pode ser administrado via sonda. Triturar e diluir em 20mL de água, administrando imediatamente.
- ▶ **ARMAZENAMENTO**  
Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.
- ▶ **Atenção:**  
Receita Branca (2 vias).

COLCHICINA <sup>1,2</sup>

Antigotoso

Nome comercial:  
Colchis 0,5mg Cp <sup>1,2</sup>

POSOLOGIA

Adulto:

|                 |                                                 |
|-----------------|-------------------------------------------------|
| Dose padrão     | 0,5mg, a cada 2 ou 1 hora até controle de crise |
| Dose manutenção | 2 a 4 comprimidos                               |

Criança:

|             |                              |
|-------------|------------------------------|
| Dose padrão | 1 a 1,15 mg/dia, 2 a 3 vezes |
|-------------|------------------------------|

- ▶ **Ajuste de dose:**  
Insuficiência renal:

| Dose com Função Renal Normal | Dose Insuficiência Renal clearance de creatinina (mL/min) |                       |                        |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|
|                              | 35-49                                                     | 10-34                 | <10                    |
| 0,6mg 12/12h                 | 0,6mg 24/24h                                              | 0,6mg a cada 2-3 dias | Evitar uso ou 25% dose |

- ▶ **ADMINISTRAÇÃO**  
Oral
- ▶ **Administração com alimentos:**  
Evitar o consumo de álcool.
- ▶ **Administração via sonda:**  
Pode ser administrado via sonda. Triturar e diluir em 10mL de água, administrando imediatamente.
- ▶ **ARMAZENAMENTO**  
Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

**COLESTIRAMINA <sup>1</sup>**

Hipolipêmico

Nome comercial:

Questran Light Pó Env 4g <sup>1</sup>**POSOLOGIA****Adulto:**

|                               |                                  |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Redução de colesterol         | 4g, a cada 12 horas              |
| Alívio do prurido             | 4 a 8g, a cada 12 horas          |
| Alívio da diarreia            | 4g, a cada 8 horas               |
| Intoxicação por Clodercone    | 16g ao dia, em doses fracionadas |
| Super dosagem de femprocumona | 4g, a cada 8 horas               |

**Criança (> 6 anos de idade):**

|                       |                                 |
|-----------------------|---------------------------------|
| Redução de colesterol | 0,6 g/kg, a cada 12 ou 6 horas  |
| Alívio prurido        | 0,6 g/kg, a cada 24 ou 12 horas |

▶ **Ajuste de dose:**

Não é necessário ajuste de dose.

▶ **ADMINISTRAÇÃO**

Oral

▶ **ARMAZENAMENTO**

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

**COMPLEXO PROTROMBÍNICO <sup>1</sup>**

Fator de Coagulação

Nome comercial:

Beriplex P/N 500UI FA + Diluente 20mL <sup>1</sup>Octaplex 500UI FA <sup>1</sup>Prothromplex T 600UI FA <sup>1</sup>**POSOLOGIA****Adultos e crianças:***Hemorragias neonatos causadas por deficiência de vitamina K:*

Dose usual: 60 UI/Kg, IV, até que a administração de vitamina k seja efetiva.

Dose de manutenção: 60 UI/Kg, IV, cada 12 ou 8h, caso não se obtenha sucesso.

*Dano hepático e doença hepática severa:*

Dose inicial: 25 a 30 UI/Kg, IV.

Dose de manutenção: 20 a 25 UI/Kg, IV, cada 12 ou 6 horas, se necessário continuar o tratamento.

*Pacientes com atividade de protrombina anormal, antes da biópsia hepática:*

Dose usual: 20 a 25 UI/Kg, IV.

▶ **ADMINISTRAÇÃO**

Reconstituição: 250UI em 10mL diluente próprio, 500UI/600UI em 20mL diluente próprio.

IV direta: sim.

▶ **ARMAZENAMENTO**

Conservar entre 2°C e 8°C.

- ▶ **Atenção:**  
Alto Custo.

## CONDROITINA+ HIALURONATO <sup>1</sup>

Outros – Dermatológico, Otológico e Oftalmológico

Nome comercial:  
Discovisc Ser 1mL <sup>1</sup>  
Viscoat Large Ser 0,75mL <sup>1</sup>

### POSOLOGIA

#### Adultos:

A critério médico.

### ▶ ARMAZENAMENTO

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

## CONDROITINA SULFATO + GLICOSAMINA <sup>1</sup>

Antirreumático

Nome comercial:  
Condroflex Cap <sup>1</sup>  
Artrolive Cap <sup>1</sup>

### POSOLOGIA

#### Adultos:

Dose usual: 1 cápsula, oral, a cada 8 horas, antes das refeições ou segundo indicação médica.

### ▶ armazenamento

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

## CORDIA VERBENACEA DC <sup>1</sup>

Anti-inflamatório não Esteroidal Tópico

Nome comercial:  
Acheflam Creme 5mg/g 30g <sup>1</sup>

### POSOLOGIA

#### Adultos:

Dose usual: Aplicar sobre a pele íntegra, TOP, 3 vezes/dia.

### ▶ ARMAZENAMENTO

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

## CUMARINA + TROXERRUTINA <sup>1</sup>

Outros – Aparelho Cardiovascular

Nome comercial:  
Venalot 15mg + 90mg Drg <sup>1</sup>

### POSOLOGIA

#### Adultos:

Dose usual: 1 Drg, oral, a cada 8h ou a critério médico.

### ▶ ARMAZENAMENTO

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

**DABIGATRANA** <sup>1,2</sup>

Anticoagulante

Nome comercial:  
 Pradaxa 110mg Cap <sup>1,2</sup>  
 Pradaxa 150mg Cap <sup>1</sup>

**POSOLOGIA****Adulto:**

|                                   |                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dose padrão TEV                   | 220mg uma vez ao dia                                                                                                                                                       |
| TEV após cirurgia de artroplastia | 110mg, 1 a 4 horas após cirurgia<br>220mg, uma vez ao dia por:<br>10 dias no caso de artroplastia total do joelho<br>28 a 35 dias no caso de artroplastia total do quadril |
| TVP e/ou EP                       | 300mg, por 5 dias:<br>Agudo: tratamento por no mínimo 6 meses<br>Recorrente: tratamento deve ser mantido dependendo do risco individual do paciente                        |
| Prevenção de AVC                  | 150mg, duas vezes ao dia                                                                                                                                                   |
| Prevenção de AVC em Idoso         | 220mg, uma vez ao dia                                                                                                                                                      |

▶ **Ajuste de dose:**

Insuficiência renal:

|                                   |                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TEV                               | 150mg, uma vez ao dia                                                                                                                                                     |
| TEV após cirurgia de artroplastia | 75mg, 1 a 4 horas após cirurgia<br>150mg, uma vez ao dia por:<br>10 dias no caso de artroplastia total do joelho<br>28 a 35 dias no caso de artroplastia total do quadril |

▶ **ADMINISTRAÇÃO**

Oral

▶ **Administração com alimentos:**

Pode ser ingerido com ou sem alimentos.

▶ **ARMAZENAMENTO**

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

**DACARBAZINA** <sup>1</sup>

Antineoplásico Citotóxico

Nome comercial:  
 Dacarb 200mg FA <sup>1</sup>  
 Fauldacar 200mg FA <sup>1</sup>

**POSOLOGIA****Adulto:**

|                                     |                                                       |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Melanoma maligno                    | 2 a 4,5 mg/kg/dia, por 10 dias                        |
| Doença de Hodgkin                   | 150 mg/m <sup>2</sup> , por 5 dias                    |
| Doença de Hodgkin no uso pediátrico | 375 mg/m <sup>2</sup> , nos dias 1 e 15 do tratamento |
| Idosos                              | acima de 65 anos de idade, com observação             |



Ou conforme esquema quimioterápico.

▶ **ADMINISTRAÇÃO**

Preparo na quimioterapia.

▶ **ARMAZENAMENTO:**

Conservar em refrigeração entre 2°C e 8°C.

Após reconstituído: estabilidade de 8 horas em temperatura de 15 a 30°C e 36 horas em temperatura de 2 a 8°C.

Após diluído: estabilidade 8 horas em temperatura de 15 a 30°C e 24 horas em temperatura de 2 a 8°C.

**DANTROLENO SÓDICO** <sup>1,2</sup>

Relaxante Muscular

Nome comercial:

Dantrolen 20mg FA <sup>1,2</sup> \*

**POSOLOGIA**

**Adulto e criança:**

|                |                                                                                                            |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pré-operatório | 2,5 mg/kg, aproximadamente de 1 hora a 15 minutos antes da anestesia. Infundir por aproximadamente 1 hora. |
| Pós-operatório | De 1 a 10 mg/kg, a critério médico                                                                         |

▶ **Ajuste de dose:**

Não é necessário ajuste de dose.

▶ **ADMINISTRAÇÃO**

Intravenosa

Reconstituir o conteúdo com 60 mL de água para injetáveis.

SF/SG 5% e outras soluções ácidas não são compatíveis com dantroleno IV e não deve ser utilizada.

▶ **Administração com Alimentos:**

Evitar o consumo de bebidas alcoólicas ou outros depressores do sistema nervoso central.

▶ **ARMAZENAMENTO**

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

▶ **Atenção:**

\* Este medicamento é livre de látex

**DAPAGLIFLOZINA** <sup>1</sup>

Hipoglicemiante

Nome comercial:

Forxiga 10mg Cp Rev <sup>1</sup>

**POSOLOGIA**

**Adulto:**

|             |                      |
|-------------|----------------------|
| Dose padrão | 10mg, uma vez ao dia |
|-------------|----------------------|

▶ **Ajuste de dose:**

Pacientes com risco de depleção de volume

|              |                     |
|--------------|---------------------|
| Dose inicial | 5mg, uma vez ao dia |
|--------------|---------------------|

▶ **ADMINISTRAÇÃO**

Oral

► **ARMAZENAMENTO**

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

**DAPTOMICINA** <sup>1,2</sup>

Antimicrobiano Lipopeptídeo

Nome comercial:

Cubicin 500mg FA <sup>1,2</sup>

**POSOLOGIA**

**Adulto:**

|                                                                               |                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Infecções complicadas da pele e partes moles                                  | 4 mg/kg, a cada 24 horas por 7 a 14 dias   |
| Infecções da corrente sanguínea por <i>Staphylococcus aureus</i> (bacteremia) | 6 mg/kg, a cada 24 horas por 2 a 6 semanas |

► **Ajuste de dose:**

Insuficiência renal:

|                                                                               |                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Infecções complicadas da pele e partes moles                                  | 4 mg/kg, a cada 48 horas por 7 a 14 dias   |
| Infecções da corrente sanguínea por <i>Staphylococcus aureus</i> (bacteremia) | 6 mg/kg, a cada 48 horas por 2 a 6 semanas |

► **ADMINISTRAÇÃO**

Intravenosa

Injeção com duração de 2 minutos.

Infusão com duração de 30 minutos.

Reconstituir o conteúdo com 10 mL de SF. Diluir a dose recomendada em 50 mL de SF.

► **ARMAZENAMENTO**

Conservar em refrigeração entre 2°C e 8°C.

► **Atenção:**

Receita Branca (2 vias).

\* Este medicamento é livre de látex.

**DARATUMUMAB** <sup>1</sup>

Antineoplásico Anticorpo Monoclonal

Nome comercial:

Dalinví 100mg (20mg/mL) FA <sup>1</sup>

Dalinví 400mg (20mg/mL) FA <sup>1</sup>

**POSOLOGIA**

**Adulto:**

16 mg/kg conforme o esquema quimioterápico.

► **Ajuste de dose:**

Não é necessário ajuste de dose.

► **ADMINISTRAÇÃO**

Preparo na quimioterapia.

► **ARMAZENAMENTO**

Conservar em refrigeração entre 2°C e 8°C.

Após diluição: armazenar em refrigeração entre 2°C e 8°C por até 24 horas.

- ▶ **Atenção:**  
Receita Médica Branca.  
Este medicamento contém látex.

DAUNORRUBICINA <sup>1</sup>

Antineoplásico Citotóxico

Nome comercial:  
Daunorrubicina 20mg FA <sup>1</sup>  
Evoclass 20mg FA <sup>1</sup> \*

**POSOLOGIA**

**Adulto:**  
Conforme o esquema quimioterápico.

- ▶ **Ajuste de dose:**  
Insuficiência hepática:

|                            |                 |                  |                  |
|----------------------------|-----------------|------------------|------------------|
| Bilirrubina sérica (mg/dL) | Grave           | 1,2 a 3          | > 3              |
| Regime terapêutico         | Não recomendado | 50% dose inicial | 25% dose inicial |

- Insuficiência renal:  
Para insuficiência renal moderada (ClCr 10-20mL/min), a dose deve ser reduzida pela metade.
- ▶ **ADMINISTRAÇÃO**  
Preparo na quimioterapia.
  - ▶ **ARMAZENAMENTO**  
Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.  
Após reconstituição: estabilidade de 48 horas em refrigeração entre 2°C e 8°C.  
Após diluição: estabilidade de 48 horas em temperatura de 25°C.
  - ▶ **Atenção:**  
\* Este medicamento é livre de látex.

DECITABINA <sup>1</sup>

Antineoplásico Citotóxico

Nome comercial:  
Dacogen 50mg FA <sup>1</sup> \*

**POSOLOGIA**

**Adulto:**  
Conforme esquema quimioterápico.

- ▶ **Ajuste de dose:**  
Não é necessário ajuste de dose.
- ▶ **ARMAZENAMENTO**  
Conservar em refrigeração entre 2°C e 8°C.  
Após reconstituição: se não usada dentro de 15 minutos, preparar a solução usando fluidos de infusão frios (2°C e 8°C) e armazenar sob refrigeração entre 2°C e 8°C por, no máximo, 4 horas.  
Após diluição: armazenar em refrigeração entre 2°C e 8°C.
- ▶ **Atenção:**  
\* Este medicamento é livre de látex.

**DEFERASIROX<sup>1</sup>**

Quelante

Nome comercial:

Exjade 250mg Cp Dispersível<sup>1</sup>**POSOLOGIA****Adulto:**

|                                                                    |                                                           |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Dose padrão (pacientes recebendo mais de 14 mL/kg/mês de hemácias) | 30mg/kg, uma vez ao dia                                   |
| Pacientes recebendo menos que 7 mL/kg/mês de hemácias              | 10mg/kg, uma vez ao dia                                   |
| Pacientes controlados                                              | Metade da dose de desferroxamina recebida, uma vez ao dia |

▶ **Ajuste de dose:**

Insuficiência renal:

Pode ser necessário reduzir a dose, monitorar.

Insuficiência hepática:

Pode ser necessário reduzir a dose, monitorar.

▶ **ADMINISTRAÇÃO**

Oral

Agitar o comprimido em um copo de água, suco de laranja ou maçã (100 a 200 mL) e ingerir com o estômago vazio pelo menos 30 minutos antes da refeição (mesmo horário todos os dias).

▶ **ARMAZENAMENTO**

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

**DEFIBROTIDE<sup>1</sup>**

Outros Medicamentos

Nome comercial:

Defitêlio 200mg FA<sup>1</sup>**POSOLOGIA****Adulto:**

|             |                            |
|-------------|----------------------------|
| Dose padrão | 6,25 mg/kg, a cada 6 horas |
|-------------|----------------------------|

▶ **Ajuste de dose:**

Não é necessário ajuste de dose.

▶ **ADMINISTRAÇÃO**

Intravenosa

Diluir em SF/Dextrose 5% a uma concentração de 4 mg/mL a 20 mg/mL e infundir por 2 horas.

▶ **ARMAZENAMENTO**

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

Após diluído: Conservar em refrigeração entre 2°C e 8°C, por até 24 horas.

▶ **Atenção:**

Este medicamento é livre de látex.

**DEFLAZACORTE<sup>1</sup>**

Anti-inflamatório Esteroidal Sistêmico

Nome comercial:

Calcort 30mg Cp <sup>1</sup>

**POSOLOGIA**

**Adulto:**

|             |                                    |
|-------------|------------------------------------|
| Dose padrão | 6 a 9 mg/dia (avaliar a gravidade) |
|-------------|------------------------------------|

**Criança:**

|             |                                             |
|-------------|---------------------------------------------|
| Dose padrão | 0,22 a 1,65 mg/kg/dia ou em dias alternados |
|-------------|---------------------------------------------|

- ▶ **Ajuste de dose:**  
Não é necessário ajuste de dose.
- ▶ **ADMINISTRAÇÃO**  
Oral
- ▶ **Administração via sonda:**  
Pode ser administrado via sonda. Triturar e dispersar em 15mL de água, após dissolução administrar imediatamente.
- ▶ **ARMAZENAMENTO**  
Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

**DENOSUMABE <sup>1</sup>**

Outros – Sistema Músculo Esquelético

Nome comercial:  
Prolia 60mg Ser 1mL <sup>1</sup>

**POSOLOGIA**

**Adulto:**

|             |                                            |
|-------------|--------------------------------------------|
| Dose padrão | Injeção SC de 60mg, uma vez a cada 6 meses |
|-------------|--------------------------------------------|

**Crianças:**  
Não é recomenda-se o uso do medicamento em pacientes pediátricos.

- ▶ **Ajuste de dose:**  
Não é necessário ajuste de dose.
- ▶ **ADMINISTRAÇÃO**  
Subcutânea  
Aplicar a injeção na área externa dos braços ou na parte superior das coxas e do abdômen.
- ▶ **ARMAZENAMENTO**  
Conservar em refrigeração entre 2°C e 8°C.

**DENOSUMABE <sup>1</sup>**

Outros – Sistema Músculo Esquelético

Nome comercial:  
Xgeva 120mg FA 1,7mL <sup>1</sup> \*

**POSOLOGIA**

**Adulto:**

|                                   |                                               |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------|
| Eventos relacionados ao esqueleto | Injeção SC de 120mg, uma vez a cada 4 semanas |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------|

|                                       |                                                                                                           |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hipercalcemia associada à malignidade | Injeção SC de 120mg, uma vez a cada 4 semanas (doses adicionais de 120mg nos dias 8 e 15 do primeiro mês) |
| Tumor de células gigantes do osso     | Injeção SC de 120mg, uma vez a cada 4 semanas (reforço de 120mg nos dias 8 e 15 do tratamento)            |

► **Ajuste de dose:**

Não é necessário ajuste de dose.

► **ADMINISTRAÇÃO**

Intravenosa

► **ARMAZENAMENTO**

Conservar em refrigeração entre 2°C e 8°C.

► **Atenção:**

\* Este medicamento é livre de látex.

## DESFERROXAMINA MESILATO <sup>1</sup>

Antídoto

Nome comercial:

Desferal 500mg FA <sup>1</sup>

Desferroxamina 500mg FA (Cristália) <sup>1</sup> \*

### POSOLOGIA

Adulto (administrar conforme o nível de Ferritina):

|                                |                                                         |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Ferritina < 1000mg/mL          | Injeção IV/IM/SC de 20 a 60mg/kg, a cada 12 ou 24 horas |
| Ferritina > 1000mg/mL          | Injeção IV/IM/SC de 25mg/kg, a cada 4 ou 12 horas       |
| Ferritina > 2000 e < 3000mg/mL | Injeção IV/IM/SC de 35mg/kg, a cada 12 Ou 24 horas      |

► **Ajuste de dose:**

|                               |                                                                  |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Dose com Função Renal Normal  | Dose com Insuficiência Renal<br>clearance de creatinina (mL/min) |
| Depende do nível de Ferritina | <10                                                              |
|                               | 50% da dose                                                      |

► **ADMINISTRAÇÃO**

Subcutânea, Intravenosa e Intramuscular

Subcutânea e Intravenosa: reconstituir 500mg/5,3 mL em 5 mL de água para injetáveis, diluir em SF/SG 5%.

Intramuscular: reconstituir 500mg/2,35 mL em 2 mL de água para injetáveis, volume com concentração máxima de 25%.

**Diluição:** 210mg/mL.

► **ARMAZENAMENTO**

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

Após preparo: conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C, por até 24 horas.

► **Atenção:**

\* Este medicamento é livre de látex.

DESFLURANO <sup>1</sup>

Anestésicos Gerais

Nome comercial:  
Desforane 1ml/ml Fr 240ml <sup>1</sup>

POSOLOGIA

Adulto:

Dose usual de acordo com o esquema posológico e necessidade individual do paciente.

- ▶ **Ajuste de dose:**  
Não é necessário ajuste de dose.
- ▶ **ADMINISTRAÇÃO**  
Inalatório  
A administração é individualizada com base na resposta do paciente.
- ▶ **ARMAZENAMENTO**  
Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.
- ▶ **Atenção:**  
Receita Médica Branca (2 vias).

DESLANOSÍDEO <sup>1,2</sup>

Cardiotônico

Nome comercial:  
Deslanol 0,4mg Amp 2mL <sup>1,2</sup>

POSOLOGIA

Adulto:

|                                                |                                                                            |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Dose padrão (digitalização rápida 24 horas)    | Injeção IV/IM de 0,8 a 1,6mg, fracionados a cada 6 horas ou uma vez ao dia |
| Dose padrão (digitalização lenta – 3 a 5 dias) | Injeção IV/IM de 0,6 a 0,8mg, uma vez ao dia (pode ser fracionado)         |

Criança:

|                                             |                                                                      |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Dose padrão (digitalização rápida 24 horas) | Injeção IV/IM de 0,02 a 0,04mg/kg, a cada 8 horas ou uma vez ao dia. |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|

- ▶ **Ajuste de dose:**  
Não é necessário ajuste de dose.
- ▶ **ADMINISTRAÇÃO**  
Intramuscular e Intravenosa  
Intravenosa: diluir 0,4mg em 10 mL de água destilada e infundir lentamente.
- ▶ **ARMAZENAMENTO**  
Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

DESLORATADINA <sup>1</sup>

Descongestionante Nasal

Nome comercial:  
Desalex 5mg Cp Rev <sup>1</sup>

POSOLOGIA

Adulto e Adolescente (maior ou igual a 12 anos):

|             |                                  |
|-------------|----------------------------------|
| Dose padrão | 5mg/1 comprimido, uma vez ao dia |
|-------------|----------------------------------|

- ▶ **Ajuste de dose:**  
Não é necessário ajuste de dose.
- ▶ **ADMINISTRAÇÃO**  
Oral
- ▶ **ARMAZENAMENTO**  
Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

**DESMOPRESSINA <sup>1</sup>**

Hormônio Antidiurético

Nome comercial:  
DDAVP 0,1mg Cp <sup>1</sup>

**POSOLOGIA****Adulto:**

|                            |                                                                                                                         |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Diabetes insipidus central | 0,1mg, a cada 8 horas                                                                                                   |
| Enurese noturna primária   | 0,2mg, uma vez ao dia antes ao deitar-se                                                                                |
| Noctúria                   | 0,1mg, uma vez ao dia ao deitar-se, podendo ser aumentado para 0,2mg e subsequente 0,4mg em doses progressivas semanais |

- ▶ **Ajuste de dose:**  
Insuficiência renal: CrCl < 50 mL/min o uso é contraindicado.
- ▶ **ADMINISTRAÇÃO**  
Oral
- ▶ **Administração com alimentos:**  
Evitar o consumo de bebidas alcoólicas.
- ▶ **ARMAZENAMENTO**  
Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

**DESMOPRESSINA <sup>1,2</sup>**

Hormônio Antidiurético

Nome comercial:  
DDAVP 4mcg Amp 1mL<sup>1,2</sup>

**POSOLOGIA****Adulto:**

|                           |                                              |
|---------------------------|----------------------------------------------|
| Diabetes insípido central | Injeção de 1 a 4mcg, uma a duas vezes ao dia |
|---------------------------|----------------------------------------------|

**Criança:**

|                                                       |                                                    |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Diabetes insípido central (acima de 1 ano de idade)   | Injeção de 0,025 a 0,25mL, uma a duas vezes ao dia |
| Diabetes insípido central (menores de 1 ano de idade) | Injeção de 0,0125mL, uma a duas vezes ao dia       |

- ▶ **Ajuste de dose:**  
Insuficiência renal: CrCl < 50 mL/min o uso é contraindicado.



- ▶ **ADMINISTRAÇÃO**  
Intravenosa, Subcutânea e Intramuscular  
Intravenosa: Diluir em 10 a 50mL de SF e infundir em 15 a 30 minutos.
- ▶ **Administração com alimentos:**  
Evitar o uso de bebidas alcoólicas.
- ▶ **ARMAZENAMENTO**  
Conservar em refrigeração entre 2°C e 8°C.

DESONIDA <sup>1</sup>

Terapêutica das Afecções Dermatológicas

Nome comercial:  
Desonol 0,5mg/g Creme Tubo 30g <sup>1</sup>

**POSOLOGIA**  
**Adulto:**

|             |                                                               |
|-------------|---------------------------------------------------------------|
| Dose padrão | Aplicar uma fina camada na área afetada, a cada 6 ou 24 horas |
|-------------|---------------------------------------------------------------|

**Criança:**

|             |                                                         |
|-------------|---------------------------------------------------------|
| Dose padrão | Aplicar uma fina camada na área afetada, uma vez ao dia |
|-------------|---------------------------------------------------------|

- ▶ **Ajuste de dose:**  
Não é necessário ajuste de dose.
- ▶ **ADMINISTRAÇÃO**  
Tópico
- ▶ **ARMAZENAMENTO:**  
Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

DEXAMETASONA <sup>1,2</sup>

Anti-inflamatório Oftálmico

Nome comercial:  
Maxidex 1mg/mL Susp Oft Fr 5mL <sup>1,2</sup>

**POSOLOGIA**  
**Adulto:**

|             |                                                      |
|-------------|------------------------------------------------------|
| Dose padrão | Instilar 1 a 2 gotas via ocular, a cada 4 ou 6 horas |
|-------------|------------------------------------------------------|

- ▶ **Ajuste de dose:**  
Não é necessário ajuste de dose.
- ▶ **ADMINISTRAÇÃO**  
Via ocular
- ▶ **ARMAZENAMENTO**  
Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

DEXAMETASONA <sup>1,2</sup>

Anti-inflamatório Esteroidal Sistêmico

Nome comercial:  
Decadron 2mg Amp 1mL <sup>1,2</sup>  
Decadron 10mg FA 2,5mL <sup>1,2</sup>

**POSOLOGIA****Adulto:**

|                |                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dose padrão    | Injeção de 0,5 a 20mg, uma vez ao dia, de acordo com a patologia                                                                                                                                                          |
| Edema cerebral | Injeção de 8mg, a cada 2 horas nos três primeiros dias de tratamento. No quarto dia, diminuir para 4mg a cada 2 horas e do quinto ao oitavo dia, utilizar 4mg a cada 4 horas. Após esse período, reduzir 4mg diariamente. |

**Criança:**

|                                              |                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dose padrão                                  | Injeção de 0,5 a 20mg, uma vez ao dia, de acordo com a patologia                                                                                                                                                          |
| Edema cerebral (crianças com menos de 35 kg) | Injeção de 4mg, a cada 3 horas nos três primeiros dias de tratamento. No quarto dia, diminuir para 4mg a cada 6 horas e do quinto ao oitavo dia, utilizar 2mg a cada 6 horas. Após esse período reduzir 1mg diariamente.  |
| Edema cerebral (crianças com 35kg ou mais)   | Injeção de 4mg, a cada 2 horas nos três primeiros dias de tratamento. No quarto dia, diminuir para 4mg a cada 4 horas e do quinto ao oitavo dia, utilizar 4mg a cada 6 horas. Após esse período, reduzir 2mg diariamente. |

▶ **Ajuste de dose:**

Não é necessário ajuste de dose.

▶ **ADMINISTRAÇÃO**

Intravenosa, Intramuscular, Intra-articular, Intralesional e em tecidos moles.

Intravenosa direta: dose menor que 10mg, administrar de 5 a 10 minutos.

Intravenosa intermitente: diluir em 50 a 100mL SF/SG 5%, infundir de 15 a 30 minutos.

▶ **Administração via sonda:**

Pode ser administrado via sonda. Diluir o elixir em 15mL de água e administrar imediatamente.

▶ **ARMAZENAMENTO**

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

Estável por 24 horas em ambiente entre 15°C e 30°C e 48 horas sob refrigeração entre 2°C e 8°C.

**DEXAMETASONA**<sup>1,2</sup>

Anti-inflamatório Esteroidal Sistêmico

Nome comercial:

Decadron 4mg Cp<sup>1,2</sup>

Decadron 0,5mg Cp<sup>1</sup>

Dexametasona 4mg Cp (EMS)<sup>1</sup>

**POSOLOGIA****Adulto:**

|                                         |                                                       |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Dose padrão                             | 0,75 a 15mg, uma vez ao dia (dependendo da patologia) |
| Doenças crônicas, usualmente não fatais | 0,5 a 1mg, a cada 12, 8 ou 6 horas                    |
| Hiperplasia suprarrenal aguda           | 2 a 3mg, uma vez ao dia                               |

|                         |                                |
|-------------------------|--------------------------------|
| Doenças crônicas fatais | 2 a 4,5mg, uma vez ao dia      |
| Edema cerebral          | 2mg, duas ou três vezes ao dia |
| Leucemia aguda          | 10 a 15mg, uma vez ao dia      |

- ▶ **Ajuste de dose:**  
Não é necessário ajuste de dose.
- ▶ **ADMINISTRAÇÃO**  
Oral
- ▶ **Administração via sonda:**  
Pode ser administrado via sonda. Triturar o comprimido, misturar em 15mL de água e administrar imediatamente, separando-a da dieta enteral.
- ▶ **ARMAZENAMENTO**  
Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.  
Estável por 24 horas em ambiente entre 15°C e 30°C e 48 horas sob em refrigeração entre 2°C e 8°C.

**DEXAMETASONA+MOXIFLOXACINO<sup>1</sup>** Antimicrobiano Oftálmico e Corticoide

Nome comercial:  
Vigadexa Sol Oft Fr 5mL <sup>1</sup>

**POSOLOGIA**

**Adulto:**

|                                            |                                                                                   |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Prevenção de infecção ocular pós-cirúrgica | Instilar 1 gota, a cada 6 horas desde o primeiro dia da cirurgia até 15 dias após |
| Cirurgia de catarata                       | Instilar a medicação imediatamente após a cirurgia                                |
| Cirurgia refrativa (técnica LASIK)         | Instilar a medicação no dia da cirurgia, no mínimo 15 minutos após                |
| Infecções oculares                         | Instilar 1 gota, a cada 6 horas por até 7 dias                                    |

- ▶ **Ajuste de dose:**  
Não é necessário ajuste de dose.
- ▶ **ADMINISTRAÇÃO**  
Via ocular
- ▶ **ARMAZENAMENTO**  
Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.
- ▶ **Atenção:**  
Receita Médica Branca (2 vias).

**DEXAMETASONA + NEOMICINA SULFATO <sup>1</sup>** Antimicrobiano Oftálmico e Corticóide

Nome comercial:  
Decadron Colírio Fr 5mL (20gts/mL) <sup>1</sup>

**POSOLOGIA**

**Adulto:**

|                      |                                                                                      |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Olho (dose padrão)   | Instilar 1 ou 2 gotas, a cada hora durante o dia e a cada duas horas durante a noite |
| Ouvido (dose padrão) | Instilar 3 a 4 gotas, a cada 12 ou 8 horas                                           |

- ▶ **Ajuste de dose:**  
Não é necessário ajuste de dose.
- ▶ **ADMINISTRAÇÃO**  
Via ocular
- ▶ **ARMAZENAMENTO**  
Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.
- ▶ **Atenção:**  
Receita Médica Branca (2 vias).

## DEXAMETASONA + NEOMICINA SULFATO + POLIMIXINA B SULFATO + HIPROMELOSE <sup>1</sup>

Antimicrobiano Oftálmico e Corticoide

Nome comercial:

Maxitrol Susp Oft Fr 5mL (20gts/mL) <sup>1</sup>

### POSOLOGIA

#### Adulto:

|              |                                           |
|--------------|-------------------------------------------|
| Dose padrão  | Instilar 1 a 2 gotas no saco conjuntival  |
| Casos graves | Instilar 1 a 2 gotas, a cada 1 hora       |
| Casos leves  | Instilar 1 a 2 gotas, a cada 6 ou 4 horas |

- ▶ **Ajuste de dose:**  
Não é necessário ajuste de dose.
- ▶ **ADMINISTRAÇÃO**  
Via ocular
- ▶ **ARMAZENAMENTO**  
Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.
- ▶ **Atenção:**  
Receita Médica Branca (2 vias).

## DEXAMETASONA + NEOMICINA SULFATO + POLIMIXINA B <sup>1</sup>

Antimicrobiano Oftálmico e Corticoide

Nome comercial:

Maxinom Pomada Oft Bis 3,5g <sup>1</sup>Maxitrol Pomada Oft Bis 3,5g <sup>1</sup>

### POSOLOGIA

#### Adulto:

|             |                                        |
|-------------|----------------------------------------|
| Dose padrão | 1 ou 2 aplicações, a cada 6 ou 4 horas |
|-------------|----------------------------------------|

- ▶ **Ajuste de dose:**  
Não é necessário ajuste de dose.
- ▶ **ADMINISTRAÇÃO**  
Tópico
- ▶ **ARMAZENAMENTO**  
Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.  
Após aberto, válido por 28 dias.
- ▶ **Atenção:**  
Receita Médica Branca (2 vias).

DEXCLORFENIRAMINA <sup>1</sup>

Anti-histamínico H1

Nome comercial:  
Polaramine 2mg Cp <sup>1</sup>

POSOLOGIA

Adulto e Criança:

|             |                                   |
|-------------|-----------------------------------|
| Dose padrão | 1 comprimido, a cada 8 ou 6 horas |
|-------------|-----------------------------------|

Idoso:

Administrar com cautela, pode causar hipotensão arterial e vertigem.

- ▶ **Ajuste de dose:**  
Não é necessário ajuste de dose.
- ▶ **ADMINISTRAÇÃO**  
Oral
- ▶ **Administração com alimentos:**  
Evitar o consumo de bebidas alcoólicas.
- ▶ **ARMAZENAMENTO**  
Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

DEXLANSOPRAZOL <sup>1</sup>

Antiulceroso

Nome comercial:  
Dexilant 30mg Cap de Liberação Prolongada <sup>1</sup>

POSOLOGIA

|                                                                         |                              |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Cicatrização da esofagite erosiva                                       | 60mg 1xdia por 8 semanas     |
| Manutenção da cicatrização da esofagite erosiva curada e alívio da azia | 30mg ou 60mg 1xdia           |
| Doença do refluxo gastroesofágico (DRGE) não-erosiva sintomática        | 30mg 1xdia por até 4 semanas |

- ▶ **ADMINISTRAÇÃO**  
Via oral
- ▶ **ARMAZENAMENTO**  
Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

DEXMEDETOMIDINA <sup>1,2</sup>

Hipnóticos

Nome comercial:  
Precedex 200mcg FA 2mL <sup>1,2</sup>  
Extodin 200mcg FA 2mL <sup>1,2</sup>  
Simbilex 200mcg FA 2mL <sup>1,2</sup>  
Dexmedetomidina 200mcg FA 2ml (União Química) <sup>1</sup> \*

POSOLOGIA

Adulto:

|                 |                        |
|-----------------|------------------------|
| Dose padrão     | 1mcg/kg por 10 minutos |
| Dose manutenção | 0,2 a 0,7 mcg/kg       |

- ▶ **Ajuste de dose:**  
Não é necessário ajuste de dose.
- ▶ **ADMINISTRAÇÃO**  
Intravenosa e Intramuscular  
Intravenosa: utilizar uma bomba de infusão precisa. Diluir 200mcg em 48mL de SF/SG 5%, infundir em 10 minutos.  
Intramuscular: administrar 60 minutos antes de procedimentos cirúrgicos.
- ▶ **ARMAZENAMENTO**  
Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.  
Após diluído, utilizar dentro de 24 horas em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.
- ▶ **Atenção:**  
Receita Médica Branca (2 vias).  
\* Este medicamento é livre de látex.

**DEXPANTENOL <sup>1</sup>**

Hidratante, Protetor Epidérmico

Nome comercial:  
Bepantol Derma Creme Bisnaga 20g <sup>1</sup>

**POSOLOGIA****Adulto:**

|                                         |                                              |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------|
| Lesões dos mamilos ou fissuras mamárias | Após cada mamada, aplicar uma camada         |
| Demais lesões de pele                   | Aplicar uma camada, uma ou mais vezes ao dia |

- ▶ **Ajuste de dose:**  
Não é necessário ajuste de dose.
- ▶ **ADMINISTRAÇÃO**  
Tópico
- ▶ **ARMAZENAMENTO**  
Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C

**DEXRAZOXANO <sup>1</sup>**

Antídoto

Nome comercial:  
Cardioxane 500mg FA <sup>1</sup>

**POSOLOGIA****Adulto:**

|             |                                                                           |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Dose padrão | Infundir uma dose 10 vezes superior à dose de dexorubicina ou epirubicina |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------|

- ▶ **Ajuste de dose:**  
Insuficiência renal: dose diminuída em 50%.  
Insuficiência hepática: ajuste de dose de acordo com a dose de antraciclina.
- ▶ **ADMINISTRAÇÃO**  
Intravenosa  
Reconstituir sob condições assépticas com 25mL de água estéril, diluir com solução de Ringer lactato ou solução de lactato de sódio 0,16M e infundir rapidamente durante 15 minutos.

▶ **ARMAZENAMENTO**

- Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.  
 Após reconstituído e diluído: estabilidade de 4 horas conservando em refrigeração entre 2°C e 8°C.
- ▶ **Atenção:**  
 Alto custo.  
 Este medicamento é livre de látex.

**DEXTRANO + HIPROMELOSE + POLIQUAD <sup>1,2</sup>**

Lubrificante Oftálmico

Nome comercial:  
 Lacrima Plus Sol Oft Fr 15mL (15gts/mL) <sup>1,2</sup>

**POSOLOGIA**

**Adulto:**

Dose padrão

Instilar 1 a 2 gotas sempre que necessário

- ▶ **Ajuste de dose:**  
 Não é necessário ajuste de dose.
- ▶ **ADMINISTRAÇÃO**  
 Tópico
- ▶ **ARMAZENAMENTO**  
 Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

**DIAZEPAM <sup>1,2</sup>**

Ansiolítico

Nome comercial:  
 Uni-diazepax 10mg Amp 2mL <sup>1,2</sup>  
 Compaz 10mg Amp 2mL <sup>1,2</sup>

**POSOLOGIA**

**Adulto:**

|                                                                                 |                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dose padrão                                                                     | Injeção de 2 a 20mg (IM ou IV)                                                           |
| Anestesiologia pré-medicação                                                    | Injeção de 10 a 20mg (IM)                                                                |
| Indução anestésica                                                              | Injeção de 0,2 a 0,5mg/kg (IV)                                                           |
| Sedação basal antes de procedimentos terapêuticos, diagnósticos ou intervenções | Injeção de 10 a 30mg (IV)                                                                |
| Eclampsia                                                                       | Injeção de 10 a 20mg (IV)                                                                |
| Tétano                                                                          | Injeção de 0,1 a 0,3 mg/kg, a cada uma ou 4 horas (IV)                                   |
| Estados de mal epiléptico                                                       | Injeção de 0,15 a 0,25mg/kg, repetir se necessário, após 10 a 15 minutos (IV)            |
| Estados de excitação, ansiedade aguda ou agitação motora                        | Injeção de 0,1 a 0,2mg/kg, a cada 8 horas até o desaparecimento dos sintomas agudos (IV) |

**Criança:**

|                                                                                 |                                |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Anestesiologia pré-medicação                                                    | Injeção de 0,1 a 0,2mg/kg (IM) |
| Sedação basal antes de procedimentos terapêuticos, diagnósticos ou intervenções | Injeção de 0,1 a 0,2mg/kg (IV) |

▶ **Ajuste de dose:**

Não é necessário ajuste de dose.

▶ **ADMINISTRAÇÃO**

Intravenosa e Intramuscular

Intravenosa: no caso de infusão direta, não necessita de diluição, infundir 0,5 a 1mL por minuto. No caso de infusão intermitente, diluir 10mg em 50 a 100mL de SF/SG 5%.

▶ **Administração com alimentos:**

Evitar o consumo de álcool

▶ **ARMAZENAMENTO**

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

▶ **Atenção:**

Receita Azul.

Risco de queda.

**DIAZEPAM** <sup>1,2</sup>

Ansiolítico

Nome comercial:

Valium 5mg Cp <sup>1,2</sup>

**POSOLOGIA****Adulto:**

|             |                                                                |
|-------------|----------------------------------------------------------------|
| Dose padrão | 5 a 10mg ou 5 a 20mg (dependendo da gravidade), uma vez ao dia |
|-------------|----------------------------------------------------------------|

▶ **Ajuste de dose:**

Idosos: utilizar a dose mais baixa possível

Insuficiência hepática grave: não devem utilizar Valium

Insuficiência hepática leve ou moderada: utilizar a dose mais baixa possível

▶ **ADMINISTRAÇÃO**

Oral

▶ **Administração com alimentos:**

Evitar o consumo de álcool.

▶ **Administração via sonda:**

Pode ser administrado via sonda. Triturar e diluir em 15mL de água, irrigar o tubo antes e após a administração e administrar separadamente da dieta enteral.

▶ **ARMAZENAMENTO**

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

▶ **Atenção:**

Receita Azul.

Risco de queda.

**DICLOFENACO DIETILAMÔNIO** <sup>1,2</sup>

Anti-inflamatório não Esteroidal Tópico

Nome comercial:

Cataflam Emulgel 11,6mg/g Tubo 60g <sup>1,2</sup>

**POSOLOGIA**



Adulto:

|             |                                                    |
|-------------|----------------------------------------------------|
| Dose padrão | Aplicar 3 a 4 vezes durante o dia na área dolorida |
|-------------|----------------------------------------------------|

- ▶ **Ajuste de dose:**  
Não é necessário ajuste de dose.
- ▶ **ADMINISTRAÇÃO**  
Tópico
- ▶ **ARMAZENAMENTO**  
Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

DICLOFENACO SÓDICO <sup>1</sup>

Anti-inflamatório não Esteroidal Sistêmico

Nome comercial:  
Diclofenaco Sódico 50mg Cp (EMS) <sup>1</sup>  
Voltaren 50mg Cp Rev <sup>1</sup>

POSOLOGIA

Adulto:

|             |                                     |
|-------------|-------------------------------------|
| Dose padrão | 100mg a 150mg, a cada 8 ou 12 horas |
|-------------|-------------------------------------|

- ▶ **Ajuste de dose:**  
Não é necessário ajuste de dose.
- ▶ **ADMINISTRAÇÃO**  
Oral
- ▶ **Administração com alimentos:**  
Evitar o consumo de álcool.
- ▶ **Administração via sonda:**  
Pode ser administrado via sonda. Triturar e diluir em 15mL de água, utilizar em sonda pós-pilórica e administrar imediatamente. A utilização de outros AINES ou a opção supositório VR, é mais recomendada.
- ▶ **ARMAZENAMENTO**  
Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

DICLOFENACO SÓDICO <sup>1,2</sup>

Anti-inflamatório não Esteroidal Sistêmico

Nome comercial:  
Voltaren 75mg Amp 3mL <sup>1,2</sup>

POSOLOGIA

Adultos:

|              |                                                          |
|--------------|----------------------------------------------------------|
| Dose padrão  | Injeção de 75mg, uma vez ao dia                          |
| Casos graves | Injeção de 2 ampolas de 75mg, intervalo de algumas horas |

- ▶ **Ajuste de dose:**  
Não é necessário ajuste de dose.
- ▶ **ADMINISTRAÇÃO**  
Intramuscular  
Aplicar exclusivamente no glúteo.
- ▶ **Administração com alimentos:**  
Evitar o consumo de álcool.

► **ARMAZENAMENTO**

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

## DIFENIDRAMINA <sup>1,2</sup>

Anti-histamínico H1

Nome comercial:

Difenidrin 50mg Amp 1mL <sup>1,2</sup>

### POSOLOGIA

#### Adulto:

Dose padrão

Injeção de 10 a 50mg ou, se necessário, 100mg

#### Crianças:

Dose padrão

Injeção de 5mg/kg, a cada 8 ou 6 horas

► **Ajuste de dose:**

Não é necessário ajuste de dose.

► **ADMINISTRAÇÃO**

Intravenosa e Intramuscular

Intravenosa: diluir 50mg em 50mL de SF/SG5% e infundir por 15 minutos.

► **Administração com alimentos:**

Evitar o consumo de álcool.

► **ARMAZENAMENTO**

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

► **Atenção:**

Risco de queda.

## DIFENIDRAMINA CLORIDRATO + SÓDIO CITRATO + AMÔNIO CLORETO <sup>1,2</sup>

Anti-histamínico H1

Nome comercial:

Benalet Pastilha <sup>1,2</sup>

### POSOLOGIA

#### Adultos e Crianças maiores de 12 anos:

Dose padrão

2 pastilhas, a cada hora (de acordo com a necessidade)

Dose máxima

8 pastilhas ao dia

► **Ajuste de dose:**

Não é necessário ajuste de dose.

► **ADMINISTRAÇÃO**

Oral

► **ARMAZENAMENTO**

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

► **Atenção:**

Risco de queda.

DIGOXINA <sup>1,2</sup>

Cardiotônico

Nome comercial:  
Digoxina 0,25mg Cp (Aspen Pharma) <sup>1,2</sup>  
Digoxina 0,25mg Cp (Pharlab) <sup>1,2</sup>  
Digoxina 0,25mg Cp (Teuto) <sup>1,2</sup>  
Neo Digoxin 0,25mg Cp <sup>1,2</sup>

POSOLOGIA

Adulto:

|                 |                                                   |
|-----------------|---------------------------------------------------|
| Dose padrão     | 0,25mg, a cada 12 horas                           |
| Dose manutenção | 0,125 a 0,25mg, uma vez ao dia ou a cada 12 horas |

► **Ajuste de dose:**

Insuficiência renal:

| Dose com Função Renal Normal | Dose Insuficiência Renal<br>clearance de creatinina (mL/min) |                          |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 0,25mg 24/24h                | 10-50                                                        | < 10                     |
|                              | 25-75% da dose<br>ou 36/36h                                  | 10-25% da dose ou 48/48h |

► **ADMINISTRAÇÃO**

Oral  
Administrar após as refeições.

► **Administração via sonda:**

Pode ser administrado via sonda. Triturar e diluir em 15mL de água, administrando imediatamente.

► **ARMAZENAMENTO**

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

DILTIAZEM <sup>1,2</sup>

Antiarrítmico

Nome comercial:  
Cardizem 30mg Cp <sup>1,2</sup>  
Cardizem 60mg Cp <sup>1</sup>  
Diltiazem 30mg Cp (EMS) <sup>1,2</sup>  
Diltiazem 60mg Cp (EMS) <sup>1</sup>  
Diltiazem 30mg Cp (Germed) <sup>1,2</sup>

POSOLOGIA

Adulto:

|             |                                                                                  |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Dose padrão | 30mg, a cada 6 horas (antes das três principais refeições do dia e ao deitar-se) |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|

► **Ajuste de dose:**

Não é necessário ajuste de dose.

► **ADMINISTRAÇÃO**

Oral

► **Administração via sonda:**

Pode ser administrado via sonda. Triturar e diluir em 15mL de água, administrando imediatamente.

► **ARMAZENAMENTO**

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

► **Atenção:**

Risco de queda.

## **DIMENIDRINATO + B6 <sup>1,2</sup>**

Antiemético, Antivertiginoso

Nome comercial:

Dramin B6 10mg Cp Rev <sup>1,2</sup>

### **POSOLOGIA**

**Adulto:**

Dose padrão

50 a 100mg, a cada 4 ou 6 horas

► **Ajuste de dose:**

Insuficiência hepática: deve ser considerada a redução de dose.

► **ADMINISTRAÇÃO**

Oral

► **Administração com alimentos:**

Evitar o consumo de álcool.

► **Administração via sonda:**

Pode ser administrado via sonda. Triturar e diluir em 15mL de água, administrando imediatamente.

► **ARMAZENAMENTO**

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

## **DIMENIDRINATO+B6+GLICOSE+FRUTOSE <sup>1,2</sup>** Antiemético,Antivertiginoso

Nome comercial:

Dramin B6 DL Amp 10mL <sup>1,2</sup>

### **POSOLOGIA**

**Adulto:**

Dose padrão

10mL, a cada 4 ou 6 horas de acordo com a necessidade

**Crianças (acima de 2 anos):**

Dose padrão

1,25mg/kg, a cada 6 horas

► **Ajuste de dose:**

Insuficiência hepática: deve ser considerada a redução de dose.

► **ADMINISTRAÇÃO**

Intravenosa

Adulto: Diluir 10mL em 10mL de SF e infundir lentamente por 2 minutos.

Criança: Diluir 1,25mg em 10mL de SF e infundir lentamente por 2 minutos.

► **Administração com alimentos:**

Evitar o consumo de álcool.

► **ARMAZENAMENTO**

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

Nome comercial:  
Daflon 500mg Cp Rev 1

POSOLOGIA

Adulto:

|                                    |                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Doença venosa crônica              | 2 comprimidos ao dia, um pela manhã e outro à noite                                                                                                                       |
| Crise hemorroidária aguda          | Subsequentemente:<br>- 6 comprimidos ao dia durante os quatro primeiros dias<br>- 4 comprimidos ao dia durante três dias<br>- 2 comprimidos ao dia por pelo menos 3 meses |
| Pré-operatório de safenectomia     | 2 comprimidos ao dia, durante 4 a 6 semanas                                                                                                                               |
| Pós-operatório de safenectomia     | 2 comprimidos ao dia, por pelo menos 4 semanas                                                                                                                            |
| Pós-operatório de hemorroidectomia | Subsequentemente:<br>- 6 comprimidos ao dia, durante três dias<br>- 4 comprimidos ao dia, durante quatro dias.                                                            |
| Dor pélvica crônica                | 2 comprimidos ao dia, por pelo menos 4 a 6 meses                                                                                                                          |

- ▶ **Ajuste de dose:**  
Não é necessário ajuste de dose.
- ▶ **ADMINISTRAÇÃO**  
Oral
- ▶ **Administração com alimentos:**  
Administrar preferencialmente junto das refeições.
- ▶ **ARMAZENAMENTO**  
Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

DIPIRIDAMOL 1,2

Nome comercial:  
Persantin 10mg Amp 2mL 1,2

POSOLOGIA

Adulto:

|             |                                       |
|-------------|---------------------------------------|
| Dose padrão | 0,142mg/kg/minuto                     |
| Dose máxima | 0,84mg/kg (6 a 10 minutos de infusão) |

- ▶ **Ajuste de dose:**  
Não é necessário ajuste de dose.
- ▶ **ADMINISTRAÇÃO**  
Intravenosa  
Diluir em ClNa 0,45% ou 0,9% ou em SG 5% (proporção de 1:2) e infundir por 4 minutos.
- ▶ **ARMAZENAMENTO**  
Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

**DIPIRONA + ISOMETEPTENO + CAFEÍNA <sup>1</sup>**

Antienxaquecoso

Nome comercial:

Neosaldina Drg <sup>1</sup>**POSOLOGIA****Adulto:**

|             |                               |
|-------------|-------------------------------|
| Dose padrão | 1 a 2 drágeas, a cada 6 horas |
| Dose máxima | 8 drágeas ao dia              |

▶ **Ajuste de dose:**

Não é necessário ajuste de dose.

▶ **ADMINISTRAÇÃO**

Oral

▶ **Administração com alimentos:**

Evitar o consumo de álcool

▶ **Administração via sonda:**

Pode ser administrado via sonda. Triturar e diluir em 30mL de água, administrando imediatamente.

▶ **ARMAZENAMENTO**

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

**DIPIRONA + ORFENADRINA + CAFEÍNA <sup>1,2</sup>**

Relaxante Muscular

Nome comercial:

Dorflex Cp <sup>1,2</sup>**POSOLOGIA****População:**

|             |                                        |
|-------------|----------------------------------------|
| Dose padrão | 1 a 2 comprimidos, a cada 8 ou 6 horas |
|-------------|----------------------------------------|

▶ **Ajuste de dose:**

Não é necessário ajuste de dose.

▶ **ADMINISTRAÇÃO**

Oral

▶ **Administração com alimentos:**

Evitar o consumo de álcool.

▶ **Administração via sonda:**

Pode ser administrado via sonda. Triturar e diluir em 20mL de água, administrando imediatamente.

▶ **ARMAZENAMENTO**

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

**DIPIRONA SÓDICA <sup>1,2</sup>**

Analgésico, Antipirético

Nome comercial:

Novalgina Gts 500mg/mL/20gts Fr 10mL <sup>1,2</sup>**POSOLOGIA****Adulto:**

|             |                               |
|-------------|-------------------------------|
| Dose padrão | 20 a 40 gotas, a cada 6 horas |
|-------------|-------------------------------|

**Criança:**

Conforme o peso.

| Peso (média de idade)    | Gotas                         |
|--------------------------|-------------------------------|
| 5 a 8kg (3 a 11 meses)   | 2 a 5 gotas, a cada 6 horas   |
| 9 a 15kg (1 a 3 anos)    | 3 a 10 gotas, a cada 6 horas  |
| 16 a 23kg (4 a 6 anos)   | 5 a 15 gotas, a cada 6 horas  |
| 24 a 30kg (7 a 9 anos)   | 8 a 20 gotas, a cada 6 horas  |
| 31 a 45kg (10 a 12 anos) | 10 a 30 gotas, a cada 6 horas |
| 46 a 53kg (13 a 14 anos) | 15 a 35 gotas, a cada 6 horas |

- ▶ **Ajuste de dose:**  
Não é necessário ajuste de dose.
- ▶ **ADMINISTRAÇÃO**  
Oral
- ▶ **Administração via sonda:**  
Pode ser administrado via sonda. Diluir em 10 a 20mL de água para cada 20 gotas.
- ▶ **ARMAZENAMENTO**  
Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

**DIPIRONA SÓDICA <sup>1,2</sup>**

Analgésico, Antipirético

Nome comercial:  
 Novalgina 500mg Cp <sup>1,2</sup>  
 Dipirona Sódica Cp 500mg (Medley) <sup>1,2</sup>  
 Dipirona Sódica Cp 500mg (EMS) <sup>1,2</sup>  
 Dipirona Sódica 500 mg Cp (Prati Donaduzzi) <sup>1,2</sup>

**POSOLOGIA**

**Adulto:**

|             |                                   |
|-------------|-----------------------------------|
| Dose padrão | 1 a 2 comprimidos, a cada 6 horas |
|-------------|-----------------------------------|

- ▶ **Ajuste de dose:**  
Não é necessário ajuste de dose.
- ▶ **ADMINISTRAÇÃO**  
Oral
- ▶ **Administração via sonda:**  
Pode ser administrado via sonda. Triturar e diluir em 15mL de água, administrando imediatamente.
- ▶ **ARMAZENAMENTO**  
Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

**DIPIRONA SÓDICA <sup>1,2</sup>**

Analgésico, Antipirético

Nome comercial:  
 Novalgina 1g Amp 2mL <sup>1,2</sup>  
 Dipirona Sódica 1g Amp 2mL (Teuto) <sup>1,2</sup>  
 Dipirona Sódica 1g Amp 2mL (Hipolabor) <sup>1,2</sup>

**POSOLOGIA**

**Adulto:**

|             |                         |
|-------------|-------------------------|
| Dose padrão | 2 a 5mL, uma vez ao dia |
|-------------|-------------------------|

**Criança:**

| Peso                  | IV          | IM          |
|-----------------------|-------------|-------------|
| Lactentes de 5 a 8kg  | ---         | 0,1 a 0,2mL |
| Crianças de 9 a 15kg  | 0,2 a 0,5mL | 0,2 a 0,5mL |
| Crianças de 16 a 23kg | 0,3 a 0,8mL | 0,3 a 0,8mL |
| Crianças de 24 a 30kg | 0,4 a 1mL   | 0,4 a 1mL   |
| Crianças de 31 a 45kg | 0,5 a 1,5mL | 0,5 a 1,5mL |
| Crianças de 46 a 53kg | 0,8 a 1,8mL | 0,8 a 1,8mL |

- ▶ **Ajuste de dose:**  
Não é necessário ajuste de dose.
- ▶ **ADMINISTRAÇÃO**  
Intravenosa e Intramuscular.  
Intravenosa: Diluir a dose em 10 a 20mL de SF/SG 5% e administrar imediatamente.
- ▶ **ARMAZENAMENTO**  
Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

**DIVALPROATO DE SÓDIO <sup>1,2</sup>**

Anticonvulsivante

Nome comercial:  
Depakote 250mg Cp Rev <sup>1</sup>  
Depakote 500mg Cp Rev <sup>1</sup>  
Depakote Er 500mg Cp Rev Liberação Prolongada <sup>1,2</sup>  
Depakote Er 250mg Cp Rev Liberação Prolongada <sup>1</sup>

**POSOLOGIA**

**Adulto e Criança (maior de 10 anos):**

|                        |                                                                                |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Mania                  | 750mg, uma vez ao dia em doses divididas                                       |
| Epilepsia              | 10 a 15mg/kg/dia. Aumentar, caso necessário, em 5 a 10mg/kg/dia, a cada semana |
| Profilaxia da Migrânea | 250mg, a cada 12 horas                                                         |

- ▶ **Ajuste de dose:**  
Não é necessário ajuste de dose.
- ▶ **ADMINISTRAÇÃO**  
Oral
- ▶ **Administração com alimentos:**  
Evitar o consumo de álcool.
- ▶ **ARMAZENAMENTO**  
Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.
- ▶ **Atenção:**  
Receita Médica Branca (2 vias).



Nome comercial:  
DMSO 99% Gel Bis 10g Manip <sup>1,2</sup>

POSOLOGIA

População:

Dose padrão | Aplicar um camada, duas a três vezes ao dia

- ▶ **Ajuste de dose:**  
Não é necessário ajuste de dose.
- ▶ **ADMINISTRAÇÃO**  
Tópico.  
Recomenda-se uso de luvas para a aplicação.
- ▶ **ARMAZENAMENTO**  
Conservar em entre 20 e 22°C.

DOBUTAMINA <sup>1,2</sup>

Nome comercial:  
Dobutamina 250mg Amp 20ml (Novafarma) <sup>1,2</sup>  
Dobutrex 250mg Amp 20mL <sup>1,2</sup>  
Dobtan 250mg Amp 20ml <sup>1,2</sup>

POSOLOGIA

Adulto:

Dose padrão | 2,5 a 10mcg/kg/minuto

Criança:

Dose padrão | 5 a 20mcg/kg/minuto

- ▶ **Ajuste de dose:**  
Não é necessário ajuste de dose.
- ▶ **ADMINISTRAÇÃO**  
Intravenosa  
Intravenosa contínua: até 250mg em 210 a 230mL de SF/SG 5%  
Intravenosa intermitente: até 250mg em 30mL de SF/SG 5%
- ▶ **ARMAZENAMENTO**  
Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.  
Estabilidade de 24 horas após diluição em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.
- ▶ **Atenção:**  
Alta vigilância.

DOCETAXEL <sup>1</sup>

Nome comercial:  
Docelibbs 20mg FA <sup>1 \*</sup>  
Docelibbs 80mg FA <sup>1 \*</sup>  
Docelibbs 120mg FA <sup>1 \*</sup>  
Taxotere 20mg FA 1mL <sup>1</sup>  
Taxotere 80mg FA 4mL <sup>1</sup>

**POSOLOGIA****Adulto:**

Conforme esquema quimioterápico.

▶ **ARMAZENAMENTO**

Conservar em temperatura ambiente inferior a 25°C.

▶ **Atenção:**

Alto custo.

\* Estas apresentações são livres de látex.

**DOLUTEGRAVIR <sup>1</sup>**

Antivirais

Nome comercial:

Tivicay 50mg Cp Rev <sup>1</sup>

**POSOLOGIA****Adulto:**

|                                                 |                         |
|-------------------------------------------------|-------------------------|
| HIV-1 sem resistência a inibidores da integrase | 50mg, uma vez ao dia    |
| HIV-1 com resistência a inibidores da integrase | 50mg, duas vezes ao dia |

Adolescentes nunca tratados com inibidores da integrase (12 a 18 anos com peso mínimo de 40kg):

|             |                      |
|-------------|----------------------|
| Dose padrão | 50mg, uma vez ao dia |
|-------------|----------------------|

▶ **Ajuste de dose:**

Não é necessário ajuste de dose.

▶ **ADMINISTRAÇÃO**

Oral

▶ **ARMAZENAMENTO**

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

**DOMPERIDONA <sup>1,2</sup>**

Antiemético, Procinético

Nome comercial:

Motilium 10mg Cp <sup>1,2</sup>

Peridal 10mg Cp <sup>1,2</sup>

**POSOLOGIA****Adulto:**

|                                           |                           |
|-------------------------------------------|---------------------------|
| Náuseas e vômitos                         | 20mg, a cada 8 ou 6 horas |
| Distúrbios de motilidade gastrintestinais | 10mg, a cada 8 ou 6 horas |

▶ **Ajuste de dose:**

Insuficiência renal: administração reduzida para 1 ou 2 vezes ao dia, podendo ser necessário reduzir a dose.

▶ **ADMINISTRAÇÃO**

Oral

▶ **Administração com alimentos:**

Recomendado utilizar antes das refeições.

- Administração via sonda:**  
Pode ser administrado via sonda. Triturar e diluir em 15mL de água e administrar via sonda nasogástrica preferencialmente.
- ARMAZENAMENTO**  
Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.  
Estabilidade de 30 dias sob refrigeração em recipiente âmbar de vidro.

DONEPEZILA <sup>1,2</sup>

Anticolinesterásico

Nome comercial:  
Erantz 5mg Cp Rev <sup>1,2</sup>

**POSOLOGIA**

**Adulto:**

|                                      |                          |
|--------------------------------------|--------------------------|
| Doença leve a moderadamente grave    | 5 a 10mg, uma vez ao dia |
| Doenças moderadamente graves a grave | 10mg, uma vez ao dia     |

- Ajuste de dose:**  
Não é necessário ajuste de dose.
- ADMINISTRAÇÃO**  
Oral
- Administração via sonda:**  
Pode ser administrado via sonda. Diluir em 15mL de água e administrar imediatamente.
- ARMAZENAMENTO**  
Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.
- Atenção:**  
Receita Médica Branca (2 vias).

DOPAMINA <sup>1,2</sup>

Estimulante Adrenérgico

Nome comercial:  
Dopacris 50mg (5mg/mL) Amp 10mL<sup>1,2</sup>  
Dopamina Cloridrato 50mg Amp 10mL (Teuto) <sup>1,2</sup>  
Dopamina Cloridrato 50mg Amp 10mL (União Química) <sup>1,2</sup>

**POSOLOGIA**

**Adulto:**

|             |                    |
|-------------|--------------------|
| Dose padrão | 1 a 5mcg/kg/minuto |
| Dose máxima | 50mcg/kg/min       |

**Criança:**

|             |               |
|-------------|---------------|
| Dose máxima | >15mcg/kg/min |
|-------------|---------------|

- Ajuste de dose:**  
Não é necessário ajuste de dose.
- ADMINISTRAÇÃO**  
Intravenosa  
Diluir a dose na concentração máxima de 3,2mg/mL em SF/SG 5% e infundir de 20 a 100mL por hora.  
Adulto sem restrição hídrica: diluir a dose em 250 a 500mL de SF.

► **ARMAZENAMENTO**

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.  
Estabilidade de 24 horas em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

► **Atenção:**

Alta Vigilância.  
Risco de queda.

**DORZOLAMIDA + TIMOLOL <sup>1</sup>**

Antiglaucomatoso, Indutor da Miose

Nome comercial:

Cosopt Sol Oft Fr 5ml <sup>1</sup>

**POSOLOGIA**

Uma gota no(s) olho(s) afetado(s) pela manhã e à noite.

► **ADMINISTRAÇÃO**

Via oftálmica

► **ARMAZENAMENTO**

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C

**DOXAZOSINA <sup>1</sup>**

Terapêutica Prostática

Nome comercial:

Carduran XL 4mg Cp de Liberação Controlada <sup>1</sup>

**POSOLOGIA**

**Adulto:**

|                                |                                        |
|--------------------------------|----------------------------------------|
| Hiperplasia Prostática Benigna | 4mg, uma vez ao dia, durante 4 semanas |
| Hipertensão                    | 1 a 4mg, uma vez ao dia                |

► **Ajuste de dose:**

Não é necessário ajuste de dose.

► **ADMINISTRAÇÃO**

Oral

► **ARMAZENAMENTO**

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

**DOXAZOSINA <sup>1</sup>**

Terapêutica Prostática

Nome comercial:

Unoprost 2mg Cp <sup>1</sup>

**POSOLOGIA**

**Adulto:**

|                                |                                                                                                                    |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hiperplasia prostática benigna | - Dose padrão: 1mg, uma vez ao dia<br>- Dose manutenção: 2mg, após 1 a 2 semanas, 4 a 8mg, após 1 a 2 semanas      |
| Hipertensão                    | - Dose padrão: 1 a 16mg, uma vez ao dia<br>- Dose manutenção: 2mg, após 1 a 2 semanas, 4 a 8mg, após 1 a 2 semanas |

- ▶ **Ajuste de dose:**  
Não é necessário ajuste de dose.
- ▶ **ADMINISTRAÇÃO**  
Oral
- ▶ **Administração via sonda:**  
Pode ser administrado via sonda. Triturar e diluir em 10ml de água, após dissolução administrar imediatamente.
- ▶ **ARMAZENAMENTO**  
Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

**DOXICICLINA <sup>1</sup>** Antimicrobiano Tetraciclina

Nome comercial:  
 Vibramicina 100mg Cp Rev <sup>1</sup>  
 Vibramicina 100mg Cp Solúvel <sup>1</sup>  
 Doxiciclina 100mg Cp Rev (EMS) <sup>1</sup>  
 Doxiciclina Cloridrato 100mg Cp Solúvel (Sandoz) <sup>1</sup>  
 Doxiciclina 100mg Cp Rev (Sigma Pharma) <sup>1</sup>  
 Neo Doxicilin 100mg Cp Rev <sup>1</sup>

**POSOLOGIA**

**Adulto:**

|                                                                                       |                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Dose padrão                                                                           | 200mg, uma vez ao dia ou 100mg, a cada 12 horas           |
| Dose manutenção                                                                       | 100mg/dia, em dose única                                  |
| Febres recorrentes transmitidas por piolho ou carrapato e Tifo transmitido por piolho | 100mg, a cada 12 horas por 7 dias                         |
| Estágios iniciais da doença de Lyme (estágio 1 e 2)                                   | 100mg, a cada 12 horas por 14 a 60 dias                   |
| Infecções uretrais, endocervicites ou retais não complicadas                          | 100mg, a cada 12 horas por 7 dias                         |
| Orquiepididimite aguda                                                                | 250mg, uma vez ao dia + 100mg, a cada 12 horas por 7 dias |
| Uretrite não gonocócica                                                               | 100mg, a cada 12 horas por 7 dias                         |
| Linfogranuloma venéreo                                                                | 100mg, a cada 12 horas por no mínimo 21 dias              |
| Sífilis primária e secundária                                                         | 100mg, a cada 12 horas por 2 semanas                      |
| Sífilis no estágio terciário ou latente                                               | 100mg, a cada 12 horas por 4 semanas                      |

**Criança (acima de 8 anos – 45kg ou menos):**

|                 |                                                       |
|-----------------|-------------------------------------------------------|
| Dose padrão     | 4,4mg/kg, uma vez ao dia ou 2,2mg/kg, a cada 12 horas |
| Dose manutenção | 2,2mg/kg, uma vez ao dia ou 1,1mg/kg, a cada 12 horas |

- ▶ **Ajuste de dose:**  
Não é necessário ajuste de dose.

► **ADMINISTRAÇÃO**

Oral

► **Administração com alimentos:**

Evitar o consumo de álcool.

► **Administração via sonda:**

Pode ser administrado via sonda. Não triturar e diluir em 50mL de água, administrando imediatamente.

► **ARMAZENAMENTO**

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

► **Atenção:**

Receita Médica Branca (2 vias).

## DOXORRUBICINA <sup>1</sup>

Antineoplásico Citotóxico

Nome comercial:

Adriblastina RD 10mg FA <sup>1</sup>

Adriblastina RD 50mg FA <sup>1</sup>

Doxorrubicina Cloridrato 50mg FA <sup>1</sup>

Fauldoxo 10mg FA <sup>1</sup> \*

Fauldoxo 50mg FA <sup>1</sup> \*

Rubidox 50mg FA <sup>1</sup>

Doxopeg 20mg FA 10mL <sup>1</sup>

Caelyx 20mg FA 10mL <sup>1</sup>

### POSOLOGIA

**Adulto:**

Conforme esquema quimioterápico.

► **ADMINISTRAÇÃO**

Preparo na quimioterapia.

► **Administração com alimentos:**

Evitar ingestão de Erva-de-São-João, cimicífuga e angélica chinesa (em tumores dependentes de estrogênio).

► **ARMAZENAMENTO**

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

Após diluído, possui estabilidade após reconstituída de 48 horas em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

► **Atenção:**

\* Estas apresentações são livres de látex.

## DOXORRUBICINA LIPOSSOMAL <sup>1</sup>

Antineoplásico Citotóxico

Nome comercial:

Caelyx 20mg (2mg/mL) FA 10mL <sup>1</sup>

Doxopeg 20mg (2mg/mL) FA 10mL <sup>1</sup> \*

### POSOLOGIA

**Adulto:**

Conforme esquema quimioterápico.

► **ADMINISTRAÇÃO**

Intravenosa, preparo na quimioterapia.

► **Administração com alimentos:**

Evitar ingestão de Erva-de-São-João, cimicífuga e angélica chinesa (em tumores dependentes de estrogênio).

- ▶ **ARMAZENAMENTO**  
Conservar em refrigeração entre 2°C e 8°C.
- ▶ **Atenção:**  
Alto Custo.  
\* Este medicamento é livre de látex

**DROPERIDOL <sup>1,2</sup>**
Antipsicótico, Neuroléptico

Nome comercial:  
Droperdal 2,5mg/mL Amp 1mL <sup>1,2</sup>

**POSOLOGIA**

**Adulto:**

|             |                                              |
|-------------|----------------------------------------------|
| Dose padrão | Injeção de 0,625 a 1,25mg ao fim da cirurgia |
|-------------|----------------------------------------------|

**Criança:**

|             |                                            |
|-------------|--------------------------------------------|
| Dose padrão | Injeção de 0,02 a 0,75mg no pós-operatório |
|-------------|--------------------------------------------|

- ▶ **Ajuste de dose:**  
Não é necessário ajuste de dose.
- ▶ **ADMINISTRAÇÃO**  
Intravenosa e Intramuscular  
Intravenosa: Diluir a dose em 50 a 250mL de SF/SG 5% e infundir de 30 a 60 minutos.  
Intravenosa crianças: Diluir a dose na concentração máxima de 2,5mg/mL em SF/SG 5% e infundir de 30 a 60 minutos.
- ▶ **ARMAZENAMENTO**  
Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.  
Após diluído, possui estabilidade de 7 dias em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.
- ▶ **Atenção:**  
Receita Médica Branca (2 vias).

**DROPERIDOL+ FENTANILA <sup>1</sup>**
Antipsicótico, Neuroléptico

Nome comercial:  
Nilperidol Amp 2mL <sup>1</sup>

**POSOLOGIA**

**Adulto:**

|                                                        |                                                      |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Pré-medicação                                          | Injeção de 0,5 a 2mL                                 |
| Complemento da anestesia geral                         | Injeção 1 a 2mL para cada 10 a 12kg de peso corpóreo |
| Uso sem anestésico geral em procedimentos diagnósticos | Injeção de 0,5 a 2mL                                 |
| Complemento da anestesia regional                      | Injeção de 1 a 2mL                                   |

**Criança:**

|                                |                                                   |
|--------------------------------|---------------------------------------------------|
| Pré-medicação                  | Injeção de 0,25mL para cada 10kg de peso corpóreo |
| Complemento da anestesia geral | Injeção 0,5mL para cada 10kg de peso corpóreo     |

- ▶ **Ajuste de dose:**  
Não é necessário ajuste de dose.
- ▶ **ADMINISTRAÇÃO**  
Intravenosa e Intramuscular  
Intravenosa: diluir até 2mL em 50mL de SG 5% e infundir lentamente.
- ▶ **ARMAZENAMENTO**  
Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.
- ▶ **Atenção:**  
Receita Amarela.

**DULOXETINA** <sup>1,2</sup>

Antidepressivo

Nome comercial:

Cymbalta 60mg Cap Lib Retard <sup>1</sup>Cymbalta 30mg Cap Lib Retard <sup>1,2</sup>Velija 30mg Cáp de Lib Retard <sup>1,2</sup>**POSOLOGIA****Adulto:**

|                                              |                                               |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Transtorno depressivo maior                  | 60mg, uma vez ao dia ou 30mg, a cada 12 horas |
| Dor neuropática periférica diabética         | 60mg, uma vez ao dia                          |
| Fibromialgia                                 | 60mg, uma vez ao dia ou 30mg, a cada 12 horas |
| Dor crônica lombar ou osteoartrite de joelho | 60mg, uma vez ao dia ou 30mg, a cada 12 horas |
| Transtorno de ansiedade generalizada         | 60mg, uma vez ao dia ou 30mg, a cada 12 horas |

- ▶ **Ajuste de dose:**  
Insuficiência renal: Clcr < 30mL/min não é recomendado.
- ▶ **ADMINISTRAÇÃO**  
Oral
- ▶ **Administração com alimentos:**  
Evitar o consumo de álcool e Erva-de-São-João.
- ▶ **ARMAZENAMENTO**  
Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.
- ▶ **Atenção:**  
Receita Médica Branca (2 vias).

**DURVALUMABE** <sup>1</sup>

Antineoplásico Anticorpo Monoclonal

Nome comercial:

Imfinzi 120mg/2,4mL FA 2,4mL <sup>1</sup>Imfinzi 500mg/10mL FA 10mL <sup>1</sup>**POSOLOGIA****Adulto:**

Conforme esquema posológico.

- ▶ **ADMINISTRAÇÃO**  
Intravenosa



Diluir em Cloreto de sódio 0,9% para injeção ou Dextrose 5% para injeção. Infundir por 60 minutos. Preparo na quimioterapia.

► **ARMAZENAMENTO**

Conservar em refrigeração entre 2°C e 8°C.

Após diluído, estabilidade de 24 horas sob refrigeração entre 2°C e 8°C ou 4 horas em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

**DUTASTERIDA** <sup>1,2</sup>

Terapêutica Prostática

Nome comercial:

Avodart 0,5mg Cap Gelatinosa Mole <sup>1,2</sup>

Combodart Cap <sup>1</sup>

Dastene 0,5mg Cap Gelatinosa Mole <sup>1,2</sup>

**POSOLOGIA**

**Adulto:**

|             |  |                       |
|-------------|--|-----------------------|
| Dose padrão |  | 0,5mg, uma vez ao dia |
|-------------|--|-----------------------|

► **Ajuste de dose:**

Não é necessário ajuste de dose.

► **ADMINISTRAÇÃO**

Oral

► **ARMAZENAMENTO**

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

A  
B  
C  
D  
E  
F  
G  
H  
I  
J  
K  
L  
M  
N  
O  
P  
Q  
R  
S  
T  
U  
V  
W  
X  
Y  
Z

**EDOXABANA <sup>1</sup>**

Anticoagulante

Nome comercial:

Lixiana 30mg Cp Rev <sup>1</sup>**POSOLOGIA****População:**

|                                                 |                                             |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Fibrilação Atrial Não-Valvar                    | 60mg, uma vez ao dia                        |
| Tratamento de TEV e prevenção de TEV recorrente | 60mg, uma vez ao dia após o uso da heparina |

▶ **Ajuste de dose:**

Insuficiência renal leve: 60mg, uma vez ao dia.

Insuficiência renal moderada a grave: 30mg, uma vez ao dia.

Pacientes com peso corpóreo &lt; ou igual a 60kg: 30mg, uma vez ao dia.

Pacientes em uso concomitante de inibidores da P-gp (exceto amiodarona): 30mg, uma vez ao dia.

▶ **ADMINISTRAÇÃO**

Oral

▶ **ARMAZENAMENTO**

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

**EFEDRINA <sup>1,2</sup>**

Estimulante Adrenérgico

Nome comercial:

Efedrin Sulfato 50mg/mL Amp 1mL <sup>1,2</sup>Unifedrine 50mg/mL Amp 1mL <sup>1,2</sup>**POSOLOGIA****Adulto:**

|                                                                |                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Tratamento dos estados hipotensivos                            | Injeção de 5 a 25mg, pode ser repetida em 5 a 10 minutos se necessário             |
| Prevenção dos estados hipotensivos (anestesia durante o parto) | - Injeção IM de 30mg<br>- Injeção IV de 3 a 6mg/mL, repetida a cada 3 a 4 minutos. |

**Criança:**

|                                     |                                                       |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Tratamento dos estados hipotensivos | Injeção de 2 a 3mg/kg, divididas em 4 a 6 doses em IV |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|

▶ **Ajuste de dose:**

Não é necessário ajuste de dose.

▶ **ADMINISTRAÇÃO**

Intravenosa, Intramuscular ou Subcutânea.

Intravenosa: não é necessário diluição, infundir lentamente 10mg/min.

▶ **ARMAZENAMENTO**

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

Nome comercial:  
Revolade 25mg Cp <sup>1</sup>

POSOLOGIA

Adulto e Criança (acima de 6 anos):

|                                           |                      |
|-------------------------------------------|----------------------|
| Púrpura trombocitopênica idiopática (PTI) | 50mg, uma vez ao dia |
| Anemia Aplástica Severa (AAS)             | 50mg, uma vez ao dia |

► **Ajuste de dose:**

Pacientes com PTI:

|                                                      |                                  |
|------------------------------------------------------|----------------------------------|
| < 50.000/microL (pelo menos 2 semanas de tratamento) | 75mg, uma vez ao dia             |
| >200.000/microL à 40.000/microL                      | Reduzir a dose diária para 25 mg |
| > 400.000/microL                                     | Descontinuar o tratamento        |

Pacientes com AAS:

|                                                                  |                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| < 50.000/microL (pelo menos 2 semanas de tratamento)             | 150mg, uma vez ao dia. Pacientes com insuficiência hepática, utilizar 50mg, uma vez ao dia.               |
| >200.000/microL à 40.000/microL                                  | Reduzir a dose diária de 50mg                                                                             |
| > 400.000/microL                                                 | Interromper o tratamento por pelo menos uma semana até atingir < 150.000/microL e reiniciar o tratamento. |
| > 400.000 microL após 2 semanas de tratamento na dose mais baixa | Descontinuar o tratamento                                                                                 |

► **ADMINISTRAÇÃO**

Oral

► **Administração com alimentos:**

Ingerir pelo menos duas horas antes ou quatro horas depois de produtos que contêm cátions polivalentes. Ingerir com alimentos que contém pouco ou nenhum cálcio.

► **ARMAZENAMENTO**

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

EMPAGLIFLOZINA <sup>1</sup>

Hipoglicemiante

Nome comercial:  
Jardiance 10mg Cp Rev <sup>1</sup>  
Jardiance 25mg Cp Rev <sup>1</sup>

POSOLOGIA

Adulto:

|             |                      |
|-------------|----------------------|
| Dose padrão | 10mg, uma vez ao dia |
|-------------|----------------------|

▶ **Ajuste de dose:**

O tratamento da hiperglicemia em pacientes com diabetes *mellitus* tipo 2, deve ser individualizado de acordo com a tolerância e eficácia.

▶ **ADMINISTRAÇÃO**

Oral

▶ **ARMAZENAMENTO**

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

**ENALAPRIL** <sup>1,2</sup>

Agente Anti-hipertensivo

Nome comercial:

Renitec 10mg Cp <sup>1,2</sup>

Renitec 5mg Cp <sup>1,2</sup>

**POSOLOGIA****Adulto:**

|                                                                     |                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Hipertensão essencial                                               | 10 a 20mg, uma vez ao dia                                               |
| Hipertensão renovascular                                            | Recomenda-se 5mg ao dia e deve ser ajustada de acordo com a necessidade |
| Terapia diurética concomitante na hipertensão                       | 5mg, uma vez ao dia                                                     |
| Insuficiência cardíaca/disfunção ventricular esquerda assintomática | 2,5mg, uma vez ao dia                                                   |

▶ **Ajuste de dose:**

Insuficiência renal:

|          |                               |
|----------|-------------------------------|
| Leve     | 5 a 10mg, uma vez ao dia      |
| Moderada | 2,5 a 5mg, uma vez ao dia     |
| Grave    | 2,5mg nos dias de hemodiálise |

▶ **ADMINISTRAÇÃO**

Oral

▶ **Administração via sonda:**

Pode ser administrado via sonda. Triturar e diluir em 15mL de água, administrando imediatamente.

▶ **ARMAZENAMENTO**

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

Após diluído, possui estabilidade de 30 dias sob refrigeração entre 2°C e 8°C ou em temperatura ambiente de 25°C.

**ENOXAPARINA** <sup>1,2</sup>

Anticoagulante

Nome comercial:

Clexane 20mg Ser 0,2mL <sup>1,2</sup>

Clexane 40mg Ser 0,4mL <sup>1,2</sup>

Versa 40mg Ser 0,4mL <sup>1,2</sup>

Versa 20mg Ser 0,2mL <sup>1,2</sup>

Clexane 60mg Ser 0,6mL <sup>1,2</sup>

Clexane 80mg Ser 0,8mL <sup>1,2</sup>

Clexane 100mg Ser 1,0mL <sup>1</sup>

**POSOLOGIA**

**Adulto:**

|                                                                                 |                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Profilaxia do tromboembolismo venoso em pacientes cirúrgicos                    | Injeção de 20 ou 40mg, uma vez ao dia                                                                                    |
| Profilaxia do tromboembolismo venoso em pacientes clínicos                      | Injeção 40mg, uma vez ao dia ou 1mg/kg, duas vezes ao dia                                                                |
| Tratamento da trombose venosa profunda com ou sem embolismo pulmonar            | Injeção de 1,5mg/kg, uma vez ao dia ou 1mg/kg, duas vezes ao dia                                                         |
| Prevenção da formação de trombo no circuito extracorpóreo durante a hemodiálise | Injeção de 1mg/kg                                                                                                        |
| Tratamento de angina instável e infarto do miocárdio                            | Injeção de 1mg/kg, a cada 12 horas                                                                                       |
| Tratamento do infarto agudo do miocárdio com elevação do segmento ST            | Injeção de 30mg acompanhado de uma dose de 1mg/kg via subcutânea, seguido por 1mg/kg por via subcutânea a cada 12 horas. |

- ▶ **Ajuste de dose:**  
Insuficiência renal: ClCr 30-50mL/min e ClCr 50-80 mL/min: aconselhável que se faça monitorização clínica cuidadosa.
- ▶ **ADMINISTRAÇÃO**  
Intravenosa e Subcutânea.  
Intravenosa: direto ou diluído em SF/SG 5%.  
Subcutânea: recomenda-se aplicação no abdome, alternando os lados direito e esquerdo. Na dificuldade de administração, pode ser administrado na coxa ou braço.
- ▶ **ARMAZENAMENTO**  
Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

**ENTACAPONA <sup>1</sup>**

Antiparkinsonianos

Nome comercial:  
Comtan 200mg Cp Rev <sup>1</sup>  
Entarkin 200mg Cp Rev <sup>1</sup>

**POSOLOGIA**

**Adulto:**

|             |                                |
|-------------|--------------------------------|
| Dose padrão | 200mg, a cada dose de levodopa |
| Dose máxima | 1600mg/dia                     |

- ▶ **Ajuste de dose:**  
Não é necessário ajuste de dose.
- ▶ **ADMINISTRAÇÃO**  
Oral
- ▶ **Administração com alimentos:**  
Evitar o consumo de álcool.

► **Administração via sonda:**

Pode ser administrado via sonda. Triturar e diluir em 15mL de água, administrando imediatamente.

► **ARMAZENAMENTO**

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

## ENXAGUANTE BUCAL ENZIMÁTICO SEM ÁLCOOL E SEM CLOREXIDINA <sup>1</sup>

Antissépticos Bucal

Nome comercial:

Bioxtra Enxaguatório Bucal Fr 250mL <sup>1</sup>

### POSOLOGIA

#### Adulto e Criança:

Dose padrão

Utilizar 10mL e bochechar por 30 segundos após a escovação. Não há necessidade de enxaguar com água.

► **Ajuste de dose:**

Não é necessário ajuste de dose.

► **ADMINISTRAÇÃO**

Enxaguante bucal.

► **ARMAZENAMENTO**

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

## EPIRRUBICINA <sup>1</sup>

Antineoplásico Citotóxico

Nome comercial:

Farmorubicina CS 50mg FA <sup>1</sup>

Farmorubicina CS 10mg FA <sup>1</sup>

Cloridrato de Epirrubicina 10mg FA 5mL (Accord) <sup>1</sup> \*

Cloridrato de Epirrubicina 50mg FA 25mL (Accord) <sup>1</sup> \*

### POSOLOGIA

#### Adulto:

Conforme esquema quimioterápico.

► **ADMINISTRAÇÃO**

Intravenosa e Intravesical.

Preparo na quimioterapia.

► **ARMAZENAMENTO**

Conservar em refrigeração entre 2°C e 8°C.

► **Atenção:**

\* Estas apresentações são livres de látex.

## ERIBULINA MESILATO <sup>1</sup>

Antineoplásico Citotóxico

Nome comercial:

Halaven 1mg (0,5mg/mL) FA 2mL <sup>1</sup> \*

### POSOLOGIA

#### Adulto:

Conforme esquema quimioterápico.

- ▶ **ADMINISTRAÇÃO**  
Intravenosa, preparo na quimioterapia.
- ▶ **ARMAZENAMENTO**  
Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.
- ▶ **Atenção:**  
\* Este medicamento é livre de látex.

**ERITROMICINA LACTOBINATO <sup>1</sup>**
Antimicrobiano Macrolídeo

Nome comercial:  
Tromaxil 1000mg FA <sup>1</sup>

**POSOLOGIA**  
**Adulto e Adolescente (acima de 12 anos):**

|                            |                                               |
|----------------------------|-----------------------------------------------|
| Dose padrão                | Injeção de 15 a 20mg/kg, a cada 12 ou 8 horas |
| Infecção gonocócica aguda  | Injeção de 4,5g, a cada 8 horas               |
| Sífilis em estágio inicial | Injeção de 4,5g, a cada 8 horas               |
| Uretrite                   | Injeção de 3,7 a 4,5g, a cada 8 horas         |

**Recém-nascidos e Crianças (até 12 anos):**

|             |                                         |
|-------------|-----------------------------------------|
| Dose padrão | Injeção de 15 a 20mg/kg, a cada 6 horas |
|-------------|-----------------------------------------|

- ▶ **Ajuste de dose:**  
Insuficiência renal:

| Dose com Função Renal Normal | Dose Insuficiência Renal<br>clearance de creatinina (mL/min) |       |        |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------|--------|
|                              | >50-90                                                       | 10-50 | <10    |
| 250-500 mg 6/6h              | 100%                                                         | 100%  | 50-75% |

- ▶ **ADMINISTRAÇÃO**  
Intravenosa.  
Reconstituir em 20mL de água destilada e diluir em até 1g em 250mL de SF.
- ▶ **ARMAZENAMENTO**  
Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.
- ▶ **Atenção:**  
Receita Médica Branca (2 vias).

**ERITROMICINA ESTOLATO <sup>1</sup>**
Antimicrobiano Macrolídeo

Nome comercial:  
Ilosone 500mg Drg <sup>1</sup>  
Eritromicina 500mg Cp (Prati Donaduzzi) <sup>1</sup>

**POSOLOGIA**  
**Adulto:**

|             |                                                |
|-------------|------------------------------------------------|
| Dose padrão | 500mg, a cada 12 horas ou 250mg a cada 6 horas |
|-------------|------------------------------------------------|

► **Ajuste de dose:**

Insuficiência renal:

| Dose com Função Renal Normal | Dose Insuficiência Renal<br>clearance de creatinina (mL/min) |       |        |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------|--------|
|                              | >50-90                                                       | 10-50 | <10    |
| 250-500 mg 6/6h              | 100%                                                         | 100%  | 50-75% |

► **ADMINISTRAÇÃO**

Oral

► **ARMAZENAMENTO**

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

► **Atenção:**

Receita Médica Branca (2 vias).

**ERITROPOETINA HUMANA RECOMBINANTE <sup>1,2</sup>**

Antianêmico

Nome comercial:

Eprex 4.000UI/0,4mL Ser 0,4mL <sup>1,2</sup>Eprex 10.000UI/ml Ser 1mL <sup>1,2</sup>Eprex 40.000UI/mL Ser 1mL <sup>1,2</sup>**POSOLOGIA****Adulto:**

|                              |                                                                                                                                                                           |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hemodiálise                  | - Dose de correção: 50 UI/kg, três vezes por semana<br>- Dose manutenção: 75 a 300 UI/kg, uma vez na semana                                                               |
| Diálise peritoneal           | - Dose de correção: 50 UI/kg, duas vezes por semana<br>- Dose manutenção: 25 a 50 UI/kg, duas vezes por semana                                                            |
| Pré-diálise                  | - Dose de correção: 50 UI/kg, três vezes na semana<br>- Dose manutenção: 17 a 33 UI/kg, três vezes na semana                                                              |
| Anemia do câncer             | - Dose inicial: 150 UI/kg, três vezes na semana<br>- Dose manutenção: deve ser diminuída em torno de 25 a 50% quando a hemoglobina tiver um aumento > 1g/dL por 2 semanas |
| AIDS tratados com zidovudina | 100 UI/kg, três vezes por semana, durante oito semanas                                                                                                                    |
| Pré-operatório               | 600 UI/kg, uma vez na semana antes da cirurgia                                                                                                                            |

► **Ajuste de dose:**

Insuficiência renal: Administrar a concentração de hemoglobina ideal 10 a 12 g/dl em adultos e 9,5 a 11g/dL em crianças.

Na fase de correção, aumentar a dose se a hemoglobina não aumentar 1 g/dL/mês. Uma vez atingida à concentração ideal de hemoglobina, diminuir a dose em 25 UI/Kg/dose.

► **ADMINISTRAÇÃO**

Intravenosa e Subcutânea.

Intravenosa: direto ou diluído em SF/SG 5% e infundir de 1 a 3 minutos.

► **Administração com alimentos:**

Orientação extra sobre administração com alimentos.

► **ARMAZENAMENTO**

Conservar em refrigeração entre 2°C e 8°C.



- ▶ **Atenção:**  
Alto Custo.

ERTAPENEM SÓDICO <sup>1,2</sup>

Antimicrobiano Carbapenêmico

Nome comercial:  
Invanz 1g FA <sup>1,2</sup>

**POSOLOGIA**

**Adulto:**

|                 |                          |
|-----------------|--------------------------|
| Dose padrão     | 1g, uma vez ao dia       |
| <b>Criança:</b> |                          |
| Dose padrão     | 15mg/kg, a cada 12 horas |

- ▶ **Ajuste de dose:**  
Insuficiência renal:

| Dose com Função Renal Normal | Dose Insuficiência Renal<br>clearance de creatinina (mL/min) |                          |             |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|
|                              | >50-90                                                       | 10-50                    | <10         |
| 1g 24/24h                    | 1g 24/24h                                                    | DCr < 30,<br>0,5g 24/24h | 0,5g 24/24h |

- ▶ **ADMINISTRAÇÃO**  
Intravenosa e Intramuscular.  
Intravenosa: diluir a dose em 50 a 100mL de SF e infundir por 30 minutos.  
Intramuscular; glúteo.
- ▶ **ARMAZENAMENTO**  
Conservar em temperatura ambiente menor que 25°C.
- ▶ **Atenção:**  
Receita Médica Branca (2 vias).  
Alto Custo.

ESCITALOPRAM <sup>1,2</sup>

Antidepressivo

Nome comercial:  
Exodus 10mg Cp <sup>1,2</sup>  
Lexapro 10mg Cp <sup>1,2</sup>

**POSOLOGIA**

**Adulto:**

|                                            |                                                                                             |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Depressão e prevenção de recaídas          | 10mg/dia                                                                                    |
| Transtorno do Pânico com ou sem Agorafobia | 5mg na primeira semana, aumentando a dose para 10mg por dia (aumentar até, no máximo, 20mg) |
| Transtorno de Ansiedade Social             | 10mg/ dia (2 a 4 semanas de tratamento)                                                     |
| Transtorno de Ansiedade Generalizada       | 10mg/ dia (a dose pode ser aumentada para, no máximo, 20mg)                                 |
| Transtorno Obsessivo Compulsivo            | 10mg/ dia, podendo decrescer ou aumentar a dose                                             |

- ▶ **Ajuste de dose:**  
Insuficiência renal: Ter cuidado com pacientes com ClCr < 20 mL/min.  
Insuficiência hepática: Pode ser necessário reduzir a dose.
- ▶ **ADMINISTRAÇÃO**  
Oral
- ▶ **Administração com alimentos:**  
Evitar o consumo de álcool.
- ▶ **Administração via sonda:**  
Pode ser administrado via sonda. Triturar e diluir em 15mL de água, administrando imediatamente.
- ▶ **ARMAZENAMENTO**  
Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.
- ▶ **Atenção:**  
Receita Médica Branca (2 vias).

## ESCITALOPRAM GOTAS <sup>1</sup>

Antidepressivo

Nome comercial:

Exodus Gotas 20mg/mL Fr 15mL <sup>1</sup>Lexapro Gotas 20mg/mL Fr 15mL <sup>1</sup>

### POSOLOGIA

#### Adulto:

|                                            |                                                                     |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Depressão e prevenção de recaídas          | 10 gotas, uma vez ao dia (tratamento de 2 a 4 semanas)              |
| Transtorno do Pânico com ou sem Agorafobia | 5 gotas, na primeira semana. Aumentar para 10 gotas, uma vez ao dia |
| Transtorno de Ansiedade Social             | 10 gotas, uma vez ao dia (tratamento de 2 a 4 semanas)              |
| Transtorno de Ansiedade Generalizada       | 10 gota, uma vez ao dia. Pode ser aumentada para 20 gotas/dia       |
| Transtorno Obsessivo Compulsivo            | 10 gotas, uma vez ao dia. A dose pode ser diminuída ou aumentada.   |

#### Idoso (> 65 anos de idade):

|             |                         |
|-------------|-------------------------|
| Dose padrão | 5 gotas, uma vez ao dia |
|-------------|-------------------------|

- ▶ **Ajuste de dose:**  
Insuficiência renal: Ter cuidado com pacientes com ClCr < 20 mL/min.  
Insuficiência hepática: Pode ser necessário reduzir a dose.
- ▶ **ADMINISTRAÇÃO**  
Oral
- ▶ **Administração com alimentos:**  
Evitar o consumo de álcool.
- ▶ **ARMAZENAMENTO**  
Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.
- ▶ **Atenção:**  
Receita Médica Branca (2 vias).

# ESCOPOLAMINA <sup>1</sup>

Antiespasmódico

Nome comercial:  
Buscopan Simples Gts (10mg/mL/20gts) Fr 20mL <sup>1</sup>

## POSOLOGIA

### Adulto e Criança (acima de 6 anos de idade):

|             |                                          |
|-------------|------------------------------------------|
| Dose padrão | 20 a 40 gotas, três a cinco vezes ao dia |
|-------------|------------------------------------------|

### Criança (entre 1 a 6 anos de idade):

|             |                                  |
|-------------|----------------------------------|
| Dose padrão | 10 a 20 gotas, três vezes ao dia |
|-------------|----------------------------------|

### Lactentes:

|             |                             |
|-------------|-----------------------------|
| Dose padrão | 10 gotas, três vezes ao dia |
|-------------|-----------------------------|

- ▶ **Ajuste de dose:**  
Não é necessário ajuste de dose.
- ▶ **ADMINISTRAÇÃO**  
Oral  
Pode ser dissolvido em água.
- ▶ **Administração via sonda:**  
Pode ser administrado via sonda. Diluir em 15mL de água e administrar imediatamente.
- ▶ **ARMAZENAMENTO**  
Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

# ESCOPOLAMINA <sup>1</sup>

Antiespasmódico

Nome comercial:  
Buscopan Simples 20mg Amp 1mL <sup>1</sup>  
Butilbrometo de Escopolamina 20mg Amp 1mL (União Química) <sup>1</sup>

## POSOLOGIA

### Adulto e adolescente (acima de 12 anos de idade):

|             |                                                         |
|-------------|---------------------------------------------------------|
| Dose padrão | 20 a 40mg, podendo ser administrado várias vezes ao dia |
|-------------|---------------------------------------------------------|

### Lactentes e crianças menores de 12 anos:

|             |                                                              |
|-------------|--------------------------------------------------------------|
| Dose padrão | 0,3 a 0,6mg/kg, podendo ser administrado várias vezes ao dia |
|-------------|--------------------------------------------------------------|

- ▶ **Ajuste de dose:**  
Não é necessário ajuste de dose.
- ▶ **ADMINISTRAÇÃO**  
Intravenosa, Intramuscular e Subcutânea.  
Intravenosa: diluir a dose em volume igual de SF e infundir de 2 a 3 minutos.
- ▶ **ARMAZENAMENTO**  
Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

**ESCOPOLAMINA <sup>1</sup>**

Antiespasmódico

Nome comercial:  
Buscopan 10mg Drg <sup>1</sup>

**POSOLOGIA****Adulto e Criança (acima de 6 anos de idade):**

|             |                                          |
|-------------|------------------------------------------|
| Dose padrão | 1 a 2 drágeas, três a cinco vezes ao dia |
|-------------|------------------------------------------|

- ▶ **Ajuste de dose:**  
Não é necessário ajuste de dose.
- ▶ **ADMINISTRAÇÃO**  
Oral
- ▶ **Administração via sonda:**  
Pode ser administrado via sonda. Triturar e diluir em 20 a 40mL de água e administrar imediatamente.
- ▶ **ARMAZENAMENTO**  
Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

**ESCOPOLAMINA <sup>1</sup>**

Antiespasmódico

Nome comercial:  
Escopolamina Gel Sachê 20mg <sup>1</sup>

**POSOLOGIA****Adulto:**

|             |                           |
|-------------|---------------------------|
| Dose padrão | Aplicar três vezes ao dia |
|-------------|---------------------------|

- ▶ **Ajuste de dose:**  
Não é necessário ajuste de dose.
- ▶ **ADMINISTRAÇÃO**  
Tópico.
- ▶ **ARMAZENAMENTO**  
Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

**ESCOPOLAMINA BROMETO + DIPIRONA <sup>1</sup>**

Antiespasmódico, Analgésico

Nome comercial:  
Buscopan Composto (Escopolamina 4 mg/ml + Dipirona 500 mg/ml) Amp 5mL <sup>1</sup>  
Hypocina Composto (Escopolamina 4 mg/ml + Dipirona 500 mg/ml) Amp 5mL <sup>1</sup>

**POSOLOGIA****Adulto:**

|             |                           |
|-------------|---------------------------|
| Dose padrão | 5mL, a cada 12 ou 8 horas |
|-------------|---------------------------|

- ▶ **Ajuste de dose:**  
Não é necessário ajuste dose.
- ▶ **ADMINISTRAÇÃO**  
Intravenosa e Intramuscular  
Intravenosa: diluir em 20mL de SF e infundir por, no mínimo, 5 minutos.
- ▶ **ARMAZENAMENTO**  
Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

ESCOPOLAMINA BROMETO + DIPIRONA<sup>1</sup>

Antiespasmódico, Analgésico

Nome comercial:  
Buscopan Composto Cp Rev<sup>1</sup>

POSOLOGIA

Adulto:

Dose padrão

1 a 2 comprimidos, a cada 8 ou 6 horas

- ▶ **Ajuste de dose:**  
Não é necessário ajuste dose.
- ▶ **ADMINISTRAÇÃO**  
Oral
- ▶ **Administração via sonda:**  
Pode ser administrado via sonda. Triturar e diluir em 10mL de água e administrar imediatamente.
- ▶ **ARMAZENAMENTO**  
Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

ESCOPOLAMINA BROMETO + DIPIRONA<sup>1</sup>

Antiespasmódico, Analgésico

Nome comercial:  
Buscopan Composto Gts Fr 20mL(20gts/mL)<sup>1</sup>

POSOLOGIA

Adulto:

Dose padrão

20 a 40 gotas, a cada 8 ou 6 horas

Criança acima de 6 anos:

Dose padrão

10 a 20 gotas, a cada 8 ou 6 horas

Criança de 1 a 6 anos:

Dose padrão

5 a 10 gotas, a cada 8 ou 6 horas

- ▶ **Ajuste de dose:**  
Não é necessário ajuste dose.
- ▶ **ADMINISTRAÇÃO**  
Oral
- ▶ **Administração via sonda:**  
Pode ser administrado via sonda. Triturar e diluir em 15mL de água e administrar imediatamente.
- ▶ **ARMAZENAMENTO**  
Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

ESMOLOL<sup>1,2</sup>

Antiarrítmicos

Nome comercial:  
Brevibloc 100mg FA 10mL<sup>1,2</sup> \*  
Brevibloc 250mg Amp 10mL<sup>1</sup>

**POSOLOGIA****Adulto:**

|                                                     |                                                      |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Taquicardia Supraventricular                        | 500mcg/kg, e a seguir 50mcg/kg/min durante 4 minutos |
| Taquicardia e/ou Hipertensão Intra e Pós-operatória | 1mg/kg, e a seguir 150mcg/kg/min (se necessário)     |
| Dose máxima                                         | 300mcg/kg/min                                        |

▶ **Ajuste de dose:**

Não é necessário ajuste de dose.

▶ **ADMINISTRAÇÃO**

Intravenosa

**Brevibloc 250 mg/mL:** Diluir 250mg/mL em 250mL de uma solução intravenosa compatível. Concentração máxima de 10 mg/mL.

**Brevibloc 10mg/mL:** Apresentação pré-diluída. Recomenda-se administrar via intravenosa.

▶ **ARMAZENAMENTO**

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

Após diluída, estabilidade de 24 horas em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

▶ **Atenção:**

\* Este medicamento é livre de látex.

**ESOMEPRAZOL MAGNÉSIO <sup>1,2</sup>**

Antiulceroso

Nome comercial:

Nexium 20mg Cp Rev Lib Retardada <sup>1,2</sup>

**POSOLOGIA****Adulto:**

|                                                          |                                                                  |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Esofagite de refluxo erosiva                             | 40mg, uma vez ao dia, por quatro semanas                         |
| Prevenir a recidiva em pacientes com esofagite           | 20mg, uma vez ao dia                                             |
| Sintomas da DRGE                                         | 20mg, uma vez ao dia para pacientes que não apresentam esofagite |
| Sintomas gastrointestinais altos (AINE)                  | 20mg, uma vez ao dia                                             |
| Cicatrização de úlceras gástricas                        | 20mg, uma vez ao dia, por quatro a oito semanas                  |
| Prevenção de úlceras gástricas                           | 20mg, uma vez ao dia                                             |
| Síndrome de Zollinger-Ellison e hipersecreção idiopática | 40mg, a cada 12 horas                                            |
| Hemostasia e prevenção de ressangramento de úlceras      | 40mg, uma vez ao dia, por quatro semanas                         |

**Crianças (12 a 18 anos):**

|                              |                                                                  |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Esofagite de refluxo erosiva | 40mg, uma vez ao dia, por quatro semanas                         |
| Sintomas da DRGE             | 20mg, uma vez ao dia para pacientes que não apresentam esofagite |

- ▶ **Ajuste de dose:**  
Insuficiência hepática grave: dose máxima diária de 20mg.
- ▶ **ADMINISTRAÇÃO**  
Oral
- ▶ **Administração via sonda:**  
Pode ser administrado via sonda. Diluir em 20mL e administrar imediatamente.
- ▶ **ARMAZENAMENTO**  
Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

**ESOMEPRAZOL SÓDICO <sup>1</sup>**
Antiulceroso

Nome comercial:  
Ésio 40mg FA <sup>1</sup> \*  
Nexium 40mg FA <sup>1</sup>

**POSOLOGIA**

**Adulto:**

|                                                                            |                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Doenças do Refluxo Gastroesofágico                                         | 20 a 40mg, uma vez ao dia                               |
| Prevenção de úlceras gástricas e duodenais                                 | 20mg, uma vez ao dia                                    |
| Hemostasia e prevenção de ressangramento de úlceras gástricas ou duodenais | 80mg, por infusão em bolus ou 8mg/h em infusão contínua |

- ▶ **Ajuste de dose:**  
Insuficiência hepática grave: 80mg em bolus ou 4mg/h por infusão contínua.
- ▶ **ADMINISTRAÇÃO**  
Injeção ou infusão Intravenosa  
Injeção: Reconstituir em 5mL de NaCl 0,9% e aplicar a injeção intravenosa por aproximadamente 3 minutos.  
Infusão: Reconstituir em 100mL de NaCl 0,9% e infundir em um período de 10 a 30 minutos.
- ▶ **ARMAZENAMENTO**  
Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.
- ▶ **Atenção:**  
\* Este medicamento é livre de látex.

**ESPIRONOLACTONA <sup>1,2</sup>**
Diurético

Nome comercial:  
Aldactone 25mg Cp <sup>1,2</sup>  
Aldactone 100mg Cp <sup>1,2</sup>  
Espironolactona 100mg Cp <sup>1,2</sup>

**POSOLOGIA****Adulto:**

|                                   |                                                                                                                                  |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hipertensão Essencial             | 50mg/dia a 100mg/dia                                                                                                             |
| Insuficiência cardíaca congestiva | 100mg, uma vez ao dia (podendo variar entre 25mg e 200mg)                                                                        |
| Cirrose Hepática                  | - Relação sódio urinário/potássio maior que 1: 100mg/dia<br>- Relação sódio urinário/potássio menor que 1: 200mg/dia a 400mg/dia |
| Síndrome Nefrótica                | 100mg/dia a 200mg/dia                                                                                                            |
| Edema idiopático                  | 100mg por dia                                                                                                                    |
| Hipotassemia/<br>hipomagnesemia   | 25mg/dia a 100mg/dia                                                                                                             |

**Criança:**

|       |                             |
|-------|-----------------------------|
| Edema | 3,3mg/kg em dose fracionada |
|-------|-----------------------------|

▶ **Ajuste de dose:**

Insuficiência renal aguda: contraindicado.

▶ **ADMINISTRAÇÃO**

Oral

▶ **Administração com alimentos:**

A presença de alimentos favorece a absorção do medicamento.

▶ **Administração via sonda:**

Pode ser administrado via sonda. Triturar e diluir em 15 a 20mL de água, administrando imediatamente.

▶ **ARMAZENAMENTO**

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

**ETOMIDATO** <sup>1,2</sup>

Anestésico Geral

Nome comercial:

Hypnomidate 2mg/mL Amp 10mL<sup>1,2</sup>

Etomidato 2mg/ml Amp 10ml (Cristália) <sup>1,2</sup>

**POSOLOGIA****Adulto:**

|             |                |
|-------------|----------------|
| Dose padrão | 0,2 a 0,3mg/kg |
|-------------|----------------|

**Criança (menores de 15 anos):**

|                  |                               |
|------------------|-------------------------------|
| Dose suplementar | 30% da dose normal em adultos |
|------------------|-------------------------------|

**Idoso:**

|             |                  |
|-------------|------------------|
| Dose padrão | 0,15 a 0,20mg/kg |
|-------------|------------------|

▶ **Ajuste de dose:**

Não é necessário ajuste de dose.

▶ **ADMINISTRAÇÃO**

Intravenosa

Administrar lentamente.



- ▶ **ARMAZENAMENTO**  
Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.
- ▶ **Atenção:**  
Receita Médica Branca (2 vias).

**ETOPOSÍDEO <sup>1</sup>**
Antineoplásico Citotóxico

Nome comercial:  
Eunades CS 100mg FA 5mL <sup>1</sup> \*  
Tevaetopo 100mg FA 5mL <sup>1</sup>  
Epósido 100mg FA 5mL <sup>1</sup>  
Evoposdo 100mg Amp 5mL <sup>1</sup>

**POSOLOGIA**

**Adulto:**  
Conforme esquema quimioterápico.

- ▶ **ADMINISTRAÇÃO**  
Intravenosa, preparo na quimioterapia.
- ▶ **ARMAZENAMENTO**  
Conservar em temperatura abaixo de 25°C.
- ▶ **Atenção:**  
\* Esta apresentação contém látex.

**ETORICOXIBE <sup>1</sup>**
Anti-inflamatório não Esteroidal Seletivo da COX2

Nome comercial:  
Arcoxia 60mg Cp Rev <sup>1</sup>

**POSOLOGIA**

|                               |                                         |
|-------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Adulto:</b>                |                                         |
| Osteoartrite                  | 60mg, uma vez ao dia                    |
| Artrite reumatoide            | 60 a 9mg, uma vez ao dia                |
| Dor crônica                   | 60mg, uma vez ao dia                    |
| Dor aguda                     | 90mg, uma vez ao dia (no máximo 3 dias) |
| Dor pós-cirurgia odontológica | 90mg, uma vez ao dia (no máximo 3 dias) |
| Dor pós-cirurgia ginecológica | 90mg, uma vez ao dia (no máximo 5 dias) |

- ▶ **Ajuste de dose:**  
Não é necessário ajuste de dose.
- ▶ **ADMINISTRAÇÃO**  
Oral
- ▶ **Administração com alimentos:**  
Evitar o consumo de álcool.
- ▶ **Administração via sonda:**  
Pode ser administrado via sonda. Triturar e diluir e 20mL de água, administrando imediatamente.
- ▶ **ARMAZENAMENTO**  
Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.
- ▶ **Atenção:**  
Receita Médica Branca (2 vias).

**EVEROLIMO <sup>1</sup>**

Imunossupressor

Nome comercial:

Certican 0,50mg Cp <sup>1</sup>Certican 0,75mg Cp <sup>1</sup>**POSOLOGIA****Adulto:**

|                              |                                                                  |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Transplante de coração e rim | 0,75mg, a cada 12 horas                                          |
| Transplante de fígado        | 1mg, a cada 12 horas (aproximadamente 4 semanas após o implante) |

▶ **Ajuste de dose:**

Insuficiência hepática leve: reduzir a dose para aproximadamente 2 terços da dose normal.

Insuficiência hepática moderada: reduzir a dose para a metade da dose normal.

Insuficiência hepática grave: reduzir a dose para, pelo menos, metade da dose normal.

▶ **ADMINISTRAÇÃO**

Oral

▶ **Administração com alimentos:**

Evitar o consumo da Erva-de-São-João.

▶ **ARMAZENAMENTO**

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

**EXTRATO DE COMPONENTES <sup>1</sup>**

Outros Medicamentos

Nome comercial:

Bioxtra Gel Oral Bis 40mL <sup>1</sup>**POSOLOGIA****Adultos e Crianças:**

Dose padrão: De acordo com a necessidade do paciente.

▶ **ADMINISTRAÇÃO**

Tópico.

▶ **ARMAZENAMENTO**

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

**EZETIMIBA <sup>1,2</sup>**

Hipolipêmico

Nome comercial:

Ezetrol 10mg Cp <sup>1,2</sup>Zetia 10mg Cp <sup>1,2</sup>**POSOLOGIA****Adulto:**

|             |                      |
|-------------|----------------------|
| Dose padrão | 10mg, uma vez ao dia |
|-------------|----------------------|

▶ **Ajuste de dose:**

Insuficiência hepática moderada ou grave: não é recomendado.

▶ **ADMINISTRAÇÃO**

Oral

▶ **Administração via sonda:**

Pode ser administrado via sonda. Triturar e diluir em 15mL de água, administrando imediatamente.

▶ **ARMAZENAMENTO**

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

**FATOR DE VON WILLEBRAND + FATOR VIII<sup>1</sup>**

Fator de Coagulação

Nome comercial:

Haemate P 500UI FA 20mL <sup>1</sup> \***POSOLOGIA****Adulto e Criança:**

|                          |                                                                                 |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Doença de Von Willebrand | 20 a 40 UI de fator VIII/Kg, a cada 12 ou 8 horas                               |
| Hemofilia A              | Dose individualizada baseada na gravidade da deficiência e extensão hemorrágica |

▶ **Ajuste de dose:**

Não é necessário ajuste de dose.

▶ **ADMINISTRAÇÃO**

Intravenosa

▶ **ARMAZENAMENTO**

Conservar em refrigeração entre 2°C e 8°C.

▶ **Atenção:**

\* Este medicamento é livre de látex.

**FATOR RECOMBINANTE DE COAGULAÇÃO VII A<sup>1</sup>**

Fator de Coagulação

Nome comercial:

Novoseven 50kui (1,0mg) FA <sup>1</sup>**POSOLOGIA****Adulto e Criança:**

|                                            |                                                                          |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Hemofilia A ou B                           | - Injeção de 90mcg/kg, 2 a 3 horas até hemostasia                        |
| Sangramento leve a moderado                | Injeção de 90mcg/kg, com intervalo de 3 horas ou dose única de 270mcg/kg |
| Sangramento grave                          | Injeção de 90mcg/kg, a cada 2 horas                                      |
| Hemofilia adquirida                        | Injeção de 90mcg/kg com intervalo de 2 a 3 horas                         |
| Pacientes submetidos a cirurgias invasivas | 15 a 30mcg/kg, a cada 6 ou 4 horas                                       |
| Trombastenia de Glanzmann                  | 80 a 120mcg/kg, com intervalo de 2 horas                                 |

▶ **Ajuste de dose:**

Não é necessário ajuste de dose.

▶ **ADMINISTRAÇÃO**

Intravenosa

Em bolus de 2 a 5 minutos.

▶ **ARMAZENAMENTO**

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

▶ **Atenção:**

Alto Custo.

FENAZOPIRIDINA 1,2

Antisséptico, Analgésico Urinário

Nome comercial:  
Pyridium 100mg Drg 1,2  
Urovit 100mg Drg 1,2

POSOLOGIA

Adulto:

Dose padrão | 200mg, a cada 8 horas

► Ajuste de dose:

Insuficiência renal:

| Dose com Função Renal Normal | Dose Insuficiência Renal<br>clearance de creatinina (mL/min) |            |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------|
| 100-200mg 8/8h               | 50-80                                                        | < 50       |
|                              | 100-200mg 8/8h ou 16/16h                                     | Evitar uso |

► ADMINISTRAÇÃO

VO

► Administração com alimentos:

Administrar após refeições para reduzir desconforto estomacal.

► Administração via sonda:

Pode ser administrado via sonda. Triturar e diluir em 20mL de água, administrando imediatamente.

► ARMAZENAMENTO

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

FENILEFRINA 1,2

Estimulante Adrenérgico

Nome comercial:

Fenilefrin 1% 10mg (10mg/ml) Amp 1ml 1,2

POSOLOGIA

Adulto:

Dose padrão | 0,1 a 0,5 mg/dose em *bolus* ou 100 a 180 mcg/min

Criança:

Dose padrão | 5 a 20mcg/kg por dose em *bolus*

► Ajuste de dose:

Não é necessário ajuste de dose.

► ADMINISTRAÇÃO

Intravenosa, Intramuscular ou Subcutânea

Intravenosa: Diluir 1mL em 9mL de água e infundir lentamente em 10 a 15 minutos.

► ARMAZENAMENTO

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

## FENILEFRINA <sup>1</sup>

Midriático

Nome comercial:

Fenilefrina 10% Sol Oft Fr 5mL (18gts/mL) <sup>1</sup>

### POSOLOGIA

#### Adultos:

|             |                             |
|-------------|-----------------------------|
| Dose padrão | 1 a 2 gotas, a cada 8 horas |
|-------------|-----------------------------|

#### ▶ ARMAZENAMENTO

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C

## FENITOÍNA <sup>1,2</sup>

Anticonvulsivante

Nome comercial:

Hidantal 250mg Amp 5mL <sup>1,2</sup>

Fenital 250mg Amp 5mL <sup>1,2</sup>

### POSOLOGIA

#### Adulto:

|                                                             |                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Crises convulsivas durante ou pós-cirurgia                  | 100 a 200mg, a cada 4 horas durante a cirurgia e no período pré-operatório      |
| Convulsões, crises tônico-clônicas e crise parcial complexa | 100mg, a cada 8 horas                                                           |
| Estado de mal epilético                                     | - Dose de ataque: 10 a 15mg/kg<br>- Dose manutenção: 100mg, a cada 8 ou 6 horas |

#### Criança:

|                                                             |                                                           |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Convulsões durante ou pós-cirurgia                          | 5mg/kg/dia, divididos igualmente em 2 ou 3 administrações |
| Convulsões, crises tônico-clônicas e crise parcial complexa | 5mg/kg/dia, divididos igualmente em 2 ou 3 administrações |
| Estado de mal epilético                                     | Dose de ataque: 10 a 15mg/kg                              |

#### ▶ Ajuste de dose:

Insuficiência hepática: Pode ser necessário ajuste de dose, monitorar.

Insuficiência renal: Pode ser necessário ajuste de dose, monitorar.

#### ▶ ADMINISTRAÇÃO

Intravenosa

Intravenosa direta: não diluir.

Intravenosa intermitente: Diluir a dose em 50 a 100mL de SF e administrar em adultos de 20 a 25mg/mi, em neonatos de 0,5mg/kg/min e em crianças em 1 a 3mg/kg/minuto.

#### ▶ Administração com alimentos:

Evitar o consumo de álcool e Erva-de-São-João.

#### ▶ ARMAZENAMENTO

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

#### ▶ Atenção:

Receita Médica Branca (2 vias).

FENITOÍNA 1,2

Anticonvulsivante

Nome comercial:  
Hidantal 100mg Cp 1,2

POSOLOGIA

Adulto:

|                                                             |                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Crises convulsivas durante ou pós-cirurgia                  | 100mg, a cada 8 horas                                                           |
| Convulsões, crises tônico-clônicas e crise parcial complexa | 100mg, a cada 8 horas                                                           |
| Estado de mal epilético                                     | - Dose de ataque: 10 a 15mg/kg<br>- Dose manutenção: 100mg, a cada 8 ou 6 horas |

Criança:

|                                                             |                                                           |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Convulsões durante ou pós-cirurgia                          | 5mg/kg/dia, divididos igualmente em 2 ou 3 administrações |
| Convulsões, crises tônico-clônicas e crise parcial complexa | 5mg/kg/dia, divididos igualmente em 2 ou 3 administrações |

- ▶ **Ajuste de dose:**  
Insuficiência hepática: Pode ser necessário ajuste de dose, monitorar.  
Insuficiência renal: Pode ser necessário ajuste de dose, monitorar.
- ▶ **ADMINISTRAÇÃO**  
VO
- ▶ **Administração com alimentos:**  
Administrar preferencialmente em jejum. Evitar o consumo de álcool e Erva-de-São-João.
- ▶ **Administração via sonda:**  
Pode ser administrado via sonda. Triturar e diluir em 15mL de água, administrando imediatamente.
- ▶ **ARMAZENAMENTO**  
Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.
- ▶ **Atenção:**  
Receita Médica Branca (2 vias).

FENOBARBITAL 1

Anticonvulsivante

Nome comercial:  
Gardenal 100mg Cp 1

POSOLOGIA

Adulto:

|              |                                                                            |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Dose padrão  | 2 a 3mg/kg/dia, em dose única ou fracionada                                |
| Epilepsia    | - Dose de ataque: 15 a 18mg/kg/dose<br>- Dose manutenção: 100 a 200 mg/dia |
| Sedação oral | 30 a 120mg/dia, a cada 12 ou 8 horas                                       |

▶ **Ajuste de dose:**

Insuficiência renal:

| Dose com Função Renal Normal | Dose com Insuficiência Renal<br>clearance de creatinina (mL/min) |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 3-5mg/Kg 24/24h              | < 10                                                             |
|                              | 3-5mg/Kg 12/12h ou 16/16h                                        |

Insuficiência hepática: Pode ser necessário ajuste de dose, monitorar.

▶ **ADMINISTRAÇÃO**

VO

▶ **Administração com alimentos:**

Evitar o consumo de álcool.

▶ **Administração via sonda:**

Pode ser administrado via sonda. Diluir em 10 a 20mL de água e administrar imediatamente.

▶ **ARMAZENAMENTO**

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

▶ **Atenção:**

Receita Médica Branca (2 vias).

Risco de queda.

**FENOBARBITAL** <sup>1,2</sup>

Anticonvulsivante

Nome comercial:

Fenocris 200mg Amp 2mL <sup>1,2</sup>**POSOLOGIA****Adulto:**

|                              |                                                |
|------------------------------|------------------------------------------------|
| Medicação pré-anestésica     | 100 a 200mg, 60 a 90 minutos antes da cirurgia |
| Episódios convulsivos agudos | 3 a 120mg                                      |
| Estado epilético             | 200 a 20mg, a cada 6 horas se necessário       |

**Criança:**

|                              |                                                              |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Medicação pré-anestésica     | 16 a 100mg, 60 a 90 minutos antes da cirurgia                |
| Episódios convulsivos agudos | 3 a 5mg/kg/dia                                               |
| Estado epilético             | 15 a 20mg/kg, administrados em um período de 10 a 15 minutos |

**Ajuste de dose:**

Insuficiência renal:

| Dose com Função Renal Normal | Dose com Insuficiência Renal<br>clearance de creatinina (mL/min) |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 3-5mg/Kg 24/24h              | < 10                                                             |
|                              | 3-5mg/Kg 12/12h ou 16/16h                                        |

Insuficiência hepática: Pode ser necessário ajuste de dose, monitorar.



► **ADMINISTRAÇÃO**

Intramuscular e Intravenosa

Intramuscular: aplicar em local de massa muscular larga, injetando menos que 5mL de cada lado.

Intravenosa direta: diluir a dose e proporção de soro 1:1 e administrar em 3 a 5 minutos.

Intravenosa intermitente: diluir a dose em SF na concentração máxima entre 30 a 130mg/mL e infundir por, no máximo, 60mg/min em adultos e 30mg/min em crianças.

► **Administração com alimentos:**

Evitar o consumo de álcool.

► **ARMAZENAMENTO**

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

► **Atenção:**

Receita Médica Branca (2 vias).

Risco de queda.

## FENOL <sup>1,2</sup>

Outros Medicamentos

Nome comercial:

Fenol 5% (50mg/mL) Amp 5mL <sup>1,2</sup>

### POSOLOGIA

**Adultos:**

A critério médico.

► **ARMAZENAMENTO**

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

## FENOTEROL <sup>1</sup>

Broncodilatador

Nome comercial:

Berotec Gts 0,5% Fr 20mL (5mg/20gts/mL) <sup>1</sup>

Bromidrato de Fenoterol Gotas 0,5% Fr 20ml (Prati Donaduzzi) <sup>1</sup>

### POSOLOGIA

**Adulto e Adolescente (acima de 12 anos de idade):**

|                       |                               |
|-----------------------|-------------------------------|
| Dose padrão           | 10 a 20 gotas, a cada 8 horas |
| Crises agudas de asma | 2 gotas via inalatória        |

**Criança de 6 a 12 anos:**

|             |                          |
|-------------|--------------------------|
| Dose padrão | 10 gotas, a cada 8 horas |
|-------------|--------------------------|

**Criança de 1 a 6 anos:**

|             |                              |
|-------------|------------------------------|
| Dose padrão | 5 a 10 gotas, a cada 8 horas |
|-------------|------------------------------|

**Criança de até 1 ano;**

|             |                                   |
|-------------|-----------------------------------|
| Dose padrão | 3 a 7 gotas, a cada 8 ou 12 horas |
|-------------|-----------------------------------|

► **Ajuste de dose:**

Não é necessário ajuste de dose.

► **ADMINISTRAÇÃO**

VO para nebulização.

► **Administração com alimentos:**

Administrar preferencialmente antes das refeições.

► **ARMAZENAMENTO**

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

## FENTANILA <sup>1,2</sup>

Analgésico Narcótico

Nome comercial:

Durogesic D-Trans 2,1mg Adv Transdérmico 12mcg/h <sup>1,2</sup>

Durogesic D-Trans 4,2mg Adv Transdérmico 25mcg/h <sup>1,2</sup>

Durogesic D-Trans 8,4mg Adv Transdérmico 50mcg/h <sup>1</sup>

### POSOLOGIA

**Adulto:**

|             |                                                                             |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Dose padrão | 25mcg/h para pacientes virgens de opioides.                                 |
| Titulação   | Deve ser substituído a cada 72 horas, ajuste podendo ocorrer a cada 3 dias. |

► **Ajuste de dose:**

Não é necessário ajuste de dose.

► **ADMINISTRAÇÃO**

Adesivo terapêutico.

Aplicar em pele não irritada e não irradiada no dorso, braços ou costas (superfícies planas)

► **Administração com alimentos:**

Evitar o consumo de álcool.

► **ARMAZENAMENTO**

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

► **Atenção:**

Receita Amarela.

## FENTANILA <sup>1,2</sup>

Analgésico Narcótico

Nome comercial:

Fentanest 100mcg Amp 2mL <sup>1,2</sup>

Fentanest 250mcg Amp 5mL <sup>1,2</sup>

Fentanest 500mcg Amp 10mL <sup>1,2</sup>

Fentanil 100mcg Amp 2mL <sup>1,2</sup>

Fentanil 250mcg Amp 5mL <sup>1,2</sup>

Fentanil 500mcg Amp 10mL <sup>1,2</sup>

Unifental 250mcg Amp 5mL <sup>1,2</sup>

Unifental 100mcg Amp 2mL <sup>1,2</sup>

### POSOLOGIA

**Adulto:**

|                             |                                                     |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------|
| Pré-medicação               | 50 a 100mcg, 30 a 60 minutos antes da cirurgia      |
| Dor de baixa intensidade    | 2mcg/kg                                             |
| Dor de intensidade moderada | 2 a 20mcg/kg, com dose manutenção de 25 a 100mcg/kg |



► **ARMAZENAMENTO**

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

## FERRO III POLIMALTOSADO HIDRÓXIDO <sup>1</sup>

Antianêmico

Nome comercial:

Noripurum 100mg Amp 2mL <sup>1</sup>

Noripurum 100mg Amp 5mL <sup>1</sup>

### POSOLOGIA

#### Adulto e Idoso:

|             |                                                                            |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Dose padrão | 5 a 10mL, uma a três vezes por semana (dependendo do nível de hemoglobina) |
| Dose máxima | Injeção de 10mL administrado em no mínimo 10 minutos                       |

#### Criança:

|             |                                 |
|-------------|---------------------------------|
| Dose padrão | Não exceder a dose de 0,15mL/kg |
|-------------|---------------------------------|

► **Ajuste de dose:**

Não é necessário ajuste de dose.

► **ADMINISTRAÇÃO**

Infusão e Injeção Intravenosa

Infusão: Diluir 1mL em 20mL de NaCl estéril 0,9% e infundir de acordo com a tabela:

| Concentração de ferro  | 100mg  | 200mg  | 300mg | 400mg | 500mg |
|------------------------|--------|--------|-------|-------|-------|
| Vel. Mínima de infusão | 15 min | 30 min | 1,5 h | 2,5 h | 3,5 h |

Injeção: não diluído, a uma velocidade máxima de 1mL/min.

► **ARMAZENAMENTO**

Conservar em temperatura superior a 25°C.

## FERRO QUELATO GLICINATO <sup>1</sup>

Antianêmico

Nome comercial:

Neutrofer 300mg Cp <sup>1</sup>

### POSOLOGIA

#### Adulto e Adolescente:

|             |                       |
|-------------|-----------------------|
| Dose padrão | 300mg, uma vez ao dia |
|-------------|-----------------------|

#### Criança; (4 a 12 anos de idade):

|             |                       |
|-------------|-----------------------|
| Dose padrão | 300mg, uma vez ao dia |
|-------------|-----------------------|

► **Ajuste de dose:**

Não é necessário ajuste de dose.

- ▶ **ADMINISTRAÇÃO**  
VO
- ▶ **Administração com alimentos:**  
Recomenda-se a administração pouco antes ou durante as refeições.
- ▶ **Administração via sonda:**  
Pode ser administrado via sonda. Não triturar. Dispersar em 10ml de água, após dissolução administrar imediatamente.
- ▶ **ARMAZENAMENTO**  
Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

**FEXOFENADINA 1,2**
Anti-histamínico H1

Nome comercial:  
 Allegra 120mg Cp Rev 1,2  
 Allegra 180mg Cp Rev 1,2

**Posologia**  
 Adulto e Criança (> 12 anos de idade):

|                 |                                |
|-----------------|--------------------------------|
| Rinite alérgica | 120mg ou 180mg, uma vez ao dia |
| Urticária       | 180mg, uma vez ao dia          |

- ▶ **Ajuste de dose:**  
Não é necessário ajuste de dose.
- ▶ **ADMINISTRAÇÃO**  
VO
- ▶ **Administração via sonda:**  
Pode ser administrado via sonda. Triturar e dispersar em 15mL de água, administrando imediatamente.
- ▶ **ARMAZENAMENTO**  
Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

**FEXOFENADINA + PSEUDOEFE****DRINA 1**
Anti-histamínico H1

Nome comercial:  
 Allegra D 60mg/120mg Cp Rev 1,2

**POSOLOGIA**  
 Adulto e Criança (> 12 anos de idade):

|             |                               |
|-------------|-------------------------------|
| Dose padrão | 1 comprimido, a cada 12 horas |
|-------------|-------------------------------|

- ▶ **Ajuste de dose:**  
Insuficiência renal: dose recomendada de 1 comprimido, uma vez ao dia.
- ▶ **ADMINISTRAÇÃO**  
VO
- ▶ **ARMAZENAMENTO**  
Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

**FIBRINO****GÊNIO HUMANO 1,2**
Hemostático

Nome comercial:  
 Haemocomplettan P 1g FA 1,2 \*

**POSOLOGIA****Adulto:**

|                           |                                             |
|---------------------------|---------------------------------------------|
| Tratamento de sangramento | 2g, com infusões subsequentes se necessário |
| Hemorragia intensa        | 4 a 8g                                      |

**Criança:**

|             |              |
|-------------|--------------|
| Dose padrão | 20 a 30mg/kg |
|-------------|--------------|

▶ **Ajuste de dose:**

Não é necessário ajuste de dose.

▶ **ADMINISTRAÇÃO**

Intravenosa

Reconstituir em 50mL de água para injetáveis por 15 minutos e administrar imediatamente em injeção separada ou em infusão.

▶ **ARMAZENAMENTO**

Conservar em refrigeração entre 2°C e 8°C.

▶ **Atenção:**

\* Este medicamento é livre de látex

**FIBRINOGENÍO HUMANO +  
APROTIMINA BOVINA + TROMBINA HUMANA <sup>1,2</sup>**

Hemostático

Nome comercial:

Tissucol Tissel Duo – Kit 2mL <sup>1,2</sup>

**POSOLOGIA****Adulto:**

Conforme esquema posológico. A critério médico, de acordo com a necessidade do paciente.

▶ **Ajuste de dose:**

Não é necessário ajuste de dose.

▶ **ADMINISTRAÇÃO**

Tópico.

▶ **ARMAZENAMENTO**

Conservar em refrigeração entre 2°C e 8°C.

**FIBRINOGENÍO HUMANO + APROTIMINA SINTÉTICA  
+ TROMBINA HUMANA <sup>1</sup>**

Hemostático

Nome comercial:

Tissel Duo – Kit 2mL <sup>1</sup>

Tissel Duo – Kit 4mL <sup>1</sup>

Tissel Duo – Kit 10mL <sup>1</sup>

**POSOLOGIA****Adulto:**

A critério médico, de acordo com a necessidade do paciente.

▶ **Ajuste de dose:**

Não é necessário ajuste de dose.

▶ **ADMINISTRAÇÃO**

Tópico.

▶ **ARMAZENAMENTO**

Conservar em refrigeração entre 2°C e 8°C.

Nome comercial:  
Evicel Selante de Fibrina 1mL 1  
Evicel Selante de Fibrina 2mL 1  
Evicel Selante de Fibrina 5mL 1  
Tachosil Esponja Medicamentosa 1

POSOLOGIA

Adulto:

A critério médico, de acordo com a necessidade do paciente.  
Dose máxima: 20mL

- ▶ **Ajuste de dose:**  
Não é necessário ajuste de dose.
- ▶ **ADMINISTRAÇÃO**  
Tópico.
- ▶ **ARMAZENAMENTO**  
Conservar abaixo de -20°C durante o prazo de validade. É permitida a exposição do produto a temperaturas de 2°C a 8°C, protegido da luz, durante 30 dias antes do uso.

FILGRASTIM 1,2

Estimulante da Formação de Células Sanguíneas

Nome comercial:  
Filgrastim 300mcg FA 1mL 1  
Filgrastine 300mcg FA1mL 1\*  
Filgrastine 300mcg Ser 0,5mL 1,2  
Granulokine 300mcg Ser 0,5mL 1,2 \*  
Granulokine 300mcg FA 1mL 1\*

POSOLOGIA

Adulto:

|                                      |                                                                                                   |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Quimioterapia mielossupressora       | 5mcg/kg/dia, 24 horas após a última dose de quimioterapia                                         |
| Transplante autólogo de medula óssea | 10mcg/kg/dia, por até 21 dias, 24 horas após a última dose de quimioterapia                       |
| Neutropenia congênita                | 12mcg/kg/dia, em uma única dose ou doses divididas                                                |
| Neutropenia cíclica ou idiopática    | 5mcg/kg/dia, com a necessidade de ajustes periódicos de dose                                      |
| Neutropenia associada a AIDS         | 1mcg/kg/dia, aumentando, se necessário, até que a contagem de neutrófilos alcance valores normais |

- ▶ **Ajuste de dose:**  
Não é necessário ajuste de dose.
- ▶ **ADMINISTRAÇÃO**  
Intravenosa e Subcutânea  
Intravenosa: diluir a dose em 50 a 100mL de SG 5%, administrando em 15 a 60 minutos ou continuamente.  
Subcutânea: Sem diluição e alternando sítios de aplicação.
- ▶ **ARMAZENAMENTO**  
Conservar em refrigeração entre 2°C e 8°C. Não congelar.

► **Atenção:**

Alto Custo.

\* Granulokine 300mcg Ser 0,5mL \* contém látex.

\* Granulokine 300mcg/ml (30 Milhões de Unidades/ml) Frasco-ampola 1ml não contém látex

\* Filgrastine 300mcg/ml (30 Milhões de Unidades/ml) Frasco-ampola 1ml não contém látex

**FINASTERIDA** <sup>1,2</sup>

Terapêutica Prostática

Nome comercial:

Finasterida 5mg Cp (Eurofarma) <sup>1,2</sup>

Finasterida 5mg Cp Rev (Medley) <sup>1,2</sup>

Finasterida 5mg Cp (Biosintética) <sup>1,2</sup>

Finasterida 5mg Cp (EMS) <sup>1,2</sup>

Finasterida 5mg Cp (Merck) <sup>1,2</sup>

Proscar 5mg Cp <sup>1,2</sup>

**POSOLOGIA****Adulto:**

Dose padrão

5mg, uma vez ao dia

► **Ajuste de dose:**

Não é necessário ajuste de dose.

► **ADMINISTRAÇÃO**

VO

► **Administração com alimentos:**

Pode ser administrado com ou sem alimentos.

► **Administração via sonda:**

Pode ser administrado via sonda. Triturar e diluir o pó em 10mL de água, administrando imediatamente.

► **ARMAZENAMENTO**

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

**FLUCONAZOL** <sup>1,2</sup>

Antifúngico Sistêmico

Nome comercial:

Zoltec 50mg Cap <sup>1</sup>

Zoltec 100mg Cap <sup>1,2</sup>

Fluconazol 50mg Cap Manip <sup>1</sup>

**POSOLOGIA****Adulto:**

|                                                                              |                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Meningite criptocócica ou infecções por criptococos                          | 400mg, no primeiro dia, seguida de 200mg a 40mg, uma vez ao dia       |
| Candidemia, Candidíase disseminada ou infecções invasivas por <i>Candida</i> | 400mg no primeiro dia, seguida de 200mg, uma vez ao dia               |
| Candidíase orofaríngea                                                       | 50 a 100mg, uma vez ao dia, durante 7 a 14 dias                       |
| Prevenção de candidíase orofaríngea em portadores de HIV                     | 150mg, uma vez na semana, após o paciente terminar a terapia primária |



|                                                           |                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Prevenção da candidíase                                   | 50 a 400mg, uma vez ao dia                                                               |
| <b>Criança:</b>                                           |                                                                                          |
| Candidíase de mucosa                                      | 3mg/kg, uma vez ao dia. Uma dose de ataque de 6mg/kg pode ser utilizada no primeiro dia. |
| Candidíase sistêmica e infecções criptocócicas            | 6 a 12mg/kg, uma vez ao dia                                                              |
| Supressão de meningite meningocócica em portadores do HIV | 6mg/kg, uma vez ao dia                                                                   |

► **Ajuste de dose:**

Insuficiência renal:

| Dose com Função Renal Normal | Dose Insuficiência Renal<br>clearance de creatinina (mL/min) |       |     |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------|-----|
|                              | >50-90                                                       | 10-50 | <10 |
| 100 a 400mg 24/24h           | 100%                                                         | 50%   | 50% |

► **ADMINISTRAÇÃO**

VO

► **Administração via sonda:**

Pode ser administrado via sonda. Não triturar. Dispersar em 50ml de água, após dissolução administrar imediatamente.

► **ARMAZENAMENTO**

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

**FLUCONAZOL** <sup>1,2</sup>

Antifúngico Sistêmico

Nome comercial:

Zoltec 200mg Bolsa 100mL <sup>1,2</sup>

Hiconazol 200mg Bolsa 100mL <sup>1,2</sup>

**POSOLOGIA**

**População:**

|                                                                       |                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Meningite criptocócica e infecções por criptococos                    | 400mg no primeiro dia, seguida de 200 a 400mg, uma vez ao dia (no mínimo de 6 a 8 semanas) |
| Candidemia, Candidíase disseminada ou infecções invasivas por Candida | 400mg no primeiro dia, seguida de 200mg diariamente                                        |
| Candidíase orofaríngea                                                | 50 a 100mg, uma vez ao dia, durante 7 a 14 dias                                            |
| Candidíase oral atrófica                                              | 50mg, uma vez ao dia, durante 14 dias                                                      |
| Candidíase na mucosa (exceto candidíase vaginal)                      | 50 a 100mg, uma vez ao dia, durante 14 a 30 dias                                           |
| Prevenção de candidíase orofaríngea em portadores de HIV              | 150mg, uma vez na semana                                                                   |
| Prevenção de candidíase                                               | 50 a 400mg, uma vez ao dia                                                                 |

**Criança:**

|                                                           |                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Candidíase de mucosa                                      | 3mg/kg, uma vez ao dia. Uma dose de ataque de 6mg/kg pode ser utilizada no primeiro dia. |
| Candidíase sistêmica e infecções criptocócicas            | 6 a 12mg/kg, uma vez ao dia                                                              |
| Supressão de meningite meningocócica em portadores do HIV | 6mg/kg, uma vez ao dia                                                                   |

▶ **Ajuste de dose:**

Insuficiência renal:

| Dose com Função Renal Normal | Dose Insuficiência Renal<br>clearance de creatinina (mL/min) |       |     |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------|-----|
|                              | >50-90                                                       | 10-50 | <10 |
| 100 a 400mg 24/24h           | 100%                                                         | 50%   | 50% |

▶ **ADMINISTRAÇÃO**

Intravenosa

Reconstituir em NaCl 0,9% e administrar em uma velocidade que não ultrapasse 10mL/min.

▶ **ARMAZENAMENTO**

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

**FLUDARABINA <sup>1</sup>**

Antineoplásico Citotóxico

Nome comercial:

Fludalibbs 50mg FA <sup>1\*</sup>Fludara 50mg FA <sup>1</sup>**POSOLOGIA****Adulto:** Conforme esquema quimioterápico.▶ **ADMINISTRAÇÃO**

Intravenosa

Reconstituir em 2mL de água estéril e utilizar por no máximo 8 horas. Preparo na quimioterapia.

▶ **ARMAZENAMENTO**

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

▶ **Atenção:**

Alto Custo.

\* Esta apresentação é livre de látex.

**FLUDROCORTISONA <sup>1,2</sup>**

Anti-inflamatório Esteroidal Sistêmico

Nome comercial:

Florinefe 100mcg Cp <sup>1,2</sup>Fludrocortisona 100mcg Cp Manip <sup>1,2</sup>Fludrocortisona 100mcg Cp Manip (Buenos Aires) <sup>1,2</sup>

POSOLOGIA

Adulto:

|                                          |                                                       |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Insuficiência adrenocorticoide (crônica) | 100mcg, três vezes na semana a 200mcg, uma vez ao dia |
| Síndrome Adrenogenital com perda de sal  | 100 a 200mcg, uma vez ao dia                          |

- ▶ **Ajuste de dose:**  
Não é necessário ajuste de dose.
- ▶ **ADMINISTRAÇÃO**  
VO
- ▶ **Administração via sonda:**  
Pode ser administrado via sonda. Triturar e diluir em 15mL de água, administrando imediatamente.
- ▶ **ARMAZENAMENTO**  
Conservar em refrigeração entre 2°C e 8°C.

FLUMAZENIL <sup>1,2</sup>

Antídoto

Nome comercial:  
Flumazil 0,5mg Amp 5mL <sup>1,2</sup>  
Lanexat 0,5mg Amp 5mL <sup>1,2</sup>  
Flumazenil 0,5mg Amp 5mL (União Química) <sup>1,2</sup>

POSOLOGIA

Adulto:

|                                                  |                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anestesiologia                                   | Injeção de 0,2mg. Doses subsequentes de 0,1mg podem ser repetidas a cada 60 segundos                                           |
| Abordagem de inconsciência de causa desconhecida | Injeção de 0,3mg. Se o grau de consciência não é obtido em 60 segundos, doses subsequentes podem ser repetidas até o despertar |

Criança (> 1 ano de idade):

|             |                                                                                                                                                |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dose padrão | Injeção de 0,01mg/kg. Se o grau de consciência não for atingido em 45 segundos, 0,01mg/kg devem ser administrados em intervalos de 60 segundos |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

- ▶ **Ajuste de dose:**  
Não é necessário ajuste de dose.
- ▶ **ADMINISTRAÇÃO**  
Intravenosa  
Diluir em SG 5%, Ringer Lactato ou NaCl 0,9% e infundir por 15 a 30 segundos.
- ▶ **ARMAZENAMENTO**  
Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.
- ▶ **Atenção:**  
Receita Médica Branca (2 vias).

**FLUNARIZINA <sup>1</sup>**

Antivertiginoso

Nome comercial:

Flunarin 10mg Cap <sup>1</sup>Sibelium 10mg Cap <sup>1</sup>Vertex 10mg Cap <sup>1</sup>**POSOLOGIA****Adulto:**

|                         |                           |
|-------------------------|---------------------------|
| Vertigem                | 10 a 30mg, uma vez ao dia |
| Profilaxia da enxaqueca | 5 a 10mg, uma vez ao dia  |

▶ **Ajuste de dose:**

Não é necessário ajuste de dose.

▶ **ADMINISTRAÇÃO**

VO

▶ **Administração com alimentos:**

Evitar o consumo de álcool.

▶ **ARMAZENAMENTO**

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

**FLUNITRAZEPAM <sup>1</sup>**

Hipnótico

Nome comercial:

Rohypnol 1mg Cp <sup>1</sup>**POSOLOGIA****Adulto:**

|             |                                                                         |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Dose padrão | 0,5 a 1mg/dia. Em casos excepcionais, a dose pode ser aumentada até 2mg |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------|

**Idoso:**

|             |                                                                       |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Dose padrão | 0,5mg. Em circunstâncias especiais, a dose pode ser aumentada até 1mg |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------|

▶ **Ajuste de dose:**

Não é necessário ajuste de dose.

▶ **ADMINISTRAÇÃO**

VO

Administrar antes do paciente deitar-se.

▶ **Administração com alimentos:**

Evitar o consumo de álcool.

▶ **Administração via sonda:**

Pode ser administrado via sonda. Triturar e diluir em 15mL de água, administrando imediatamente.

▶ **ARMAZENAMENTO**

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

▶ **Atenção:**

Receita Azul.

FLUORESCEINA <sup>1</sup>

Agente diagnóstico

Nome comercial:  
Fluoresceína 1% (10mg/ml) Solução Oftálmica Fr 5ml Manip <sup>1</sup>

POSOLOGIA

Aplicar 1 gota no olho a critério médico

- ▶ **ADMINISTRAÇÃO**  
Via oftálmica
- ▶ **ARMAZENAMENTO**  
Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

FLUORURACILA <sup>1</sup>

Antineoplásico Citotóxico

Nome comercial:  
Fauldfluor 500mg FA 10mL <sup>1\*</sup>  
Fauldfluor 2,5g FA 50mL <sup>1\*</sup>

POSOLOGIA

**Adulto:** Conforme esquema quimioterápico.

- ▶ **ADMINISTRAÇÃO**  
Injeção ou infusão Intravenosa  
Infusão intravenosa: Diluir em 300 a 500mL de SF/SG 5%. Preparo na quimioterapia.
- ▶ **ARMAZENAMENTO**  
Conservar em temperatura abaixo de 25°C.
- ▶ **Atenção:**  
\* Este medicamento é livre de látex.

FLUOXETINA <sup>1,2</sup>

Antidepressivo

Nome comercial:  
Fluoxetina 20mg Cap (Medley) <sup>1,2</sup>  
Fluoxetina 20mg Cap (EMS) <sup>1,2</sup>  
Fluoxetina 20mg Cap (Teuto) <sup>1,2</sup>  
Fluoxetina 20mg Cap (Biosintética) <sup>1,2</sup>  
Fluoxetina 20mg Cap (Eurofarma) <sup>1,2</sup>  
Fluxene 20mg Cap <sup>1,2</sup>  
Prozac 20mg Cap <sup>1,2</sup>

POSOLOGIA

**Adulto:**

|                                    |                                                          |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Depressão                          | 20mg/dia                                                 |
| Bulimia Nervosa                    | 60mg/dia                                                 |
| Transtorno Obsessivo-Compulsivo    | 20 a 60mg/dia                                            |
| Transtorno Disfórico Pré-Menstrual | 20mg/dia administrada continuamente ou intermitentemente |

- ▶ **Ajuste de dose:**  
Não é necessário ajuste de dose.
- ▶ **ADMINISTRAÇÃO**  
VO

- ▶ **Administração com alimentos:**  
Evitar o consumo de álcool.
- ▶ **Administração via sonda:**  
Pode ser administrado via sonda. Abrir a cápsula e diluir em 20mL de água, administrando imediatamente.
- ▶ **ARMAZENAMENTO**  
Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.
- ▶ **Atenção:**  
Receita Médica Branca (2 vias).

**FLUOXETINA** <sup>1,2</sup>

Antidepressivo

Nome comercial:

Daforin 20mg/20gts/mL Gts Fr 20mL <sup>1,2</sup>Fluoxetina 20mg/mL Gts Fr 20mL (Medley) <sup>1,2</sup>**POSOLOGIA****Adulto:**

|                                    |                                                                   |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Depressão                          | 20 gotas por dia                                                  |
| Bulimia nervosa                    | 60 gotas por dia                                                  |
| Transtorno Obsessivo-Compulsivo    | 20 a 60 gotas por dia                                             |
| Transtorno Disfórico Pré-Menstrual | 20 gotas por dia, administrada continuamente ou intermitentemente |

- ▶ **Ajuste de dose:**  
Não é necessário ajuste de dose.
- ▶ **ADMINISTRAÇÃO**  
VO
- ▶ **Administração com alimentos:**  
Diluir as gotas em água para administração. Evitar consumo de álcool.
- ▶ **ARMAZENAMENTO**  
Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.
- ▶ **Atenção:**  
Receita Médica Branca (2 vias).

**FLURAZEPAM** <sup>1</sup>

Hipnótico

Nome comercial:

Dalmadorm 30mg Cp Rev <sup>1,2</sup>**POSOLOGIA****Adulto:**

|             |                           |
|-------------|---------------------------|
| Dose padrão | 15 a 30mg, uma vez ao dia |
|-------------|---------------------------|

**Idoso (> 65 anos de idade) ou Debilitado:**

|             |                      |
|-------------|----------------------|
| Dose padrão | 15mg, uma vez ao dia |
|-------------|----------------------|

- ▶ **Ajuste de dose:**  
Não é necessário ajuste de dose.

- ▶ **ADMINISTRAÇÃO**  
VO
- ▶ **Administração com alimentos:**  
Evitar o consumo de álcool
- ▶ **ARMAZENAMENTO**  
Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.
- ▶ **Atenção:**  
Receita Azul.

FLURBIPROFENO <sup>1</sup>

Anti-inflamatório não Esteroidal Sistêmico

Nome comercial:  
Strepsils Pastilha 8,75mg <sup>1</sup>

**POSOLOGIA**  
**Adulto e Criança (> 12 anos de idade):**

|             |                                                               |
|-------------|---------------------------------------------------------------|
| Dose padrão | Dissolver uma pastilha lentamente na boca, a cada 3 a 6 horas |
| Dose máxima | 5 pastilhas em um período de 24 horas                         |

- ▶ **Ajuste de dose:**  
Não é necessário ajuste de dose.
- ▶ **ADMINISTRAÇÃO**  
VO
- ▶ **Administração com alimentos:**  
Evitar o consumo de álcool
- ▶ **ARMAZENAMENTO**  
Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

FLURBIPROFENO <sup>1</sup>

Anti-inflamatório não Esteroidal Sistêmico

Nome comercial:  
Targus Adv Transdérmico 40mg <sup>1</sup>

**POSOLOGIA**  
**Adulto:**

|             |                                                                     |
|-------------|---------------------------------------------------------------------|
| Dose padrão | 1 adesivo transdérmico, em um único local, trocando a cada 12 horas |
|-------------|---------------------------------------------------------------------|

- ▶ **Ajuste de dose:**  
Não é necessário ajuste de dose.
- ▶ **ADMINISTRAÇÃO**  
Tópico
- ▶ **ARMAZENAMENTO**  
Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

FLUTICASONA <sup>1</sup>

Anti-inflamatório Esteroidal Sistêmico

Nome comercial:  
Flixonase Spray 50mcg/dose Fr 120 Doses <sup>1</sup>  
Plurair Spray 50mcg/dose Fr 120 Doses <sup>1</sup>

## POSOLOGIA

### Adulto e Criança (> 12 anos de idade):

|             |                                           |
|-------------|-------------------------------------------|
| Dose padrão | Duas doses em cada narina, uma vez ao dia |
|-------------|-------------------------------------------|

### Criança (4 a 11 anos de idade):

|             |                                         |
|-------------|-----------------------------------------|
| Dose padrão | Uma dose em cada narina, uma vez ao dia |
|-------------|-----------------------------------------|

#### ► Ajuste de dose:

Não é necessário ajuste de dose.

#### ► ADMINISTRAÇÃO

Intranasal

Aplicar preferencialmente pela manhã.

#### ► ARMAZENAMENTO

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

## FLUTICASONA + SALMETEROL <sup>1</sup>

Broncodilatador

Nome comercial:

Seretide 50/250mcg Disco 60 Doses <sup>1</sup>

## POSOLOGIA

### Adulto e Adolescente (a partir de 12 anos):

|             |                                        |
|-------------|----------------------------------------|
| Dose padrão | Inalação de 50/250mcg, a cada 12 horas |
|-------------|----------------------------------------|

#### ► Ajuste de dose:

Não é necessário ajuste de dose.

#### ► ADMINISTRAÇÃO

Via inalatória

#### ► ARMAZENAMENTO

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

## FLUTICASONA + SALMETEROL <sup>1</sup>

Broncodilatador

Nome comercial:

Seretide Spray 25/250mcg Fr 120 Doses <sup>1</sup>

## POSOLOGIA

### Adulto e Adolescente (a partir de 12 anos):

|             |                                                 |
|-------------|-------------------------------------------------|
| Dose padrão | Duas inalações de de 25/250mcg, a cada 12 horas |
|-------------|-------------------------------------------------|

#### ► Ajuste de dose:

Não é necessário ajuste de dose.

#### ► ADMINISTRAÇÃO

Via inalatória

#### ► ARMAZENAMENTO

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.



FOLINATO CÁLCICO <sup>1</sup>

Antídoto

Nome comercial:  
Folinato Cálcico 15mg Cp Manip <sup>1</sup>

POSOLOGIA

Adulto e Criança:

|             |                          |
|-------------|--------------------------|
| Dose padrão | 5 a 15mg, a cada 6 horas |
| Antianêmico | 1mg, uma vez ao dia      |

- ▶ **Ajuste de dose:**  
Não é necessário ajuste de dose.
- ▶ **ADMINISTRAÇÃO**  
VO
- ▶ **Administração com alimentos:**  
Evitar o consumo de álcool.
- ▶ **Administração via sonda:**  
Pode ser administrado via sonda. Não triturar e diluir em 10mL de água, administrando imediatamente.
- ▶ **ARMAZENAMENTO**  
Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

FOLINATO CÁLCICO <sup>1,2</sup>

Antídoto

Nome comercial:  
Fauldleuco 10mg/mL FA 30mL <sup>1,2</sup> \*  
Fauldleuco 10mg/mL FA 5mL <sup>1,2</sup>  
Folinato Cálcico 10mg/mL FA 30mL (Eurofarma) <sup>1,2</sup>  
Legifol Cs 10mg/mL FA 5mL <sup>1,2</sup>  
Tevafofin 10mg/mL FA 5mL <sup>1,2</sup>  
Tevafofin 10mg/mL FA 30mL <sup>1,2</sup>

POSOLOGIA

Adulto e Criança:

|                                                                                  |                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Eliminação normal de metotrexato                                                 | 15mg, a cada 6 horas, por 60 horas                                                                                                         |
| Eliminação diminuída tardia de metotrexato                                       | 15mg, a cada 6 horas, até o nível de metotrexato estar menos que 0,5µM                                                                     |
| Eliminação precoce diminuída de metotrexato e/ou evidência de doença renal aguda | 150mg, a cada 3 horas, até o nível de metotrexato ser menor do que 1µM. Em seguida 15mg, a cada 3 horas até o nível ser menor do que 0,5µM |

- ▶ **Ajuste de dose:**  
Não é necessário ajuste de dose.
- ▶ **ADMINISTRAÇÃO**  
Intravenosa ou Intramuscular  
Intravenosa: Diluir em SF/SG 5%.
- ▶ **ARMAZENAMENTO**  
Conservar em refrigeração entre 2°C e 8°C.  
Após diluído, estabilidade de 24 horas sob refrigeração entre 2°C e 8°C.
- ▶ **Atenção:**  
\* Esta apresentação é livre de látex.

**FONDAPARINUX SÓDICO** <sup>1,2</sup>

Anticoagulante

Nome comercial:

Arixtra 2,5mg Ser 0,5mL <sup>1,2</sup>Arixtra 7,5mg Ser 0,6mL <sup>2</sup>**POSOLOGIA****Adulto:**

|                                                                                |                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Profilaxia de eventos tromboembólicos venosos                                  | 2,5mg, uma vez ao dia                                                                                 |
| Tratamento de TVP e TEP                                                        | - 5mg para peso menor que 50kg<br>- 7,5mg para peso de 50 a 100kg<br>- 10mg para peso maior que 100kg |
| Tratamento de angina instável/infarto do miocárdio sem elevação do segmento ST | 2,5mg, uma vez ao dia                                                                                 |
| Tratamento de infarto do miocárdio com elevação do segmento ST                 | 2,5mg, uma vez ao dia                                                                                 |

▶ **Ajuste de dose:**

Insuficiência renal:

| Dose com Função Renal Normal | Dose Insuficiência Renal<br>clearance de creatinina (mL/min) |                 |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|
| 2,5mg 24/24h                 | 30-50                                                        | < 30            |
|                              | Ter cuidado                                                  | Não recomendado |

▶ **ADMINISTRAÇÃO**

Subcutânea ou Intravenosa (primeira dose em pacientes com infarto do miocárdio com elevação do segmento ST)

Intravenosa: através de cateter intravenoso, diretamente ou de um volume de solução salina 0,9%.

▶ **ARMAZENAMENTO**

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

**FOSAPREPITANTO DIMEGLUMINA** <sup>1,2</sup>

Antiemético, Antivertiginoso

Nome comercial:

Emend 150mg FA <sup>1,2</sup>**POSOLOGIA****Adulto:**

Conforme esquema posológico. Administrar 150mg, no primeiro dia de quimioterapia.

▶ **Ajuste de dose:**

Não é necessário ajuste de dose

▶ **ADMINISTRAÇÃO**

Intravenosa

Reconstituir em 5mL de SF.

▶ **ARMAZENAMENTO**

Conservar em refrigeração entre 2°C e 8°C.

FOSCARNET SÓDICO <sup>1</sup>

Antivirais Citotóxicos

Nome comercial:  
Foscavir 24mg/mL Fr 250mL <sup>1</sup>

POSOLOGIA

Adulto:

|                                                                           |                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Terapêutica de indução da retinite por CMV                                | 60mg/kg, a cada 8 horas ou 90mg/kg, a cada 12 horas |
| Terapêutica d manutenção da retinite por CMV                              | 90 a 120mg/kg, uma vez ao dia                       |
| Tratamento de infecções CMV no trato gastrointestinal superior e inferior | 90mg/kg, a cada 12 horas                            |
| Tratamento de infecções mucocutâneas por HSV resistentes ao aciclovir     | 40mg/kg, a cada 8 horas                             |

- ▶ **Ajuste de dose:**  
Não é necessário ajuste de dose.
- ▶ **ADMINISTRAÇÃO**  
Intravenosa

FOSFATO DE POTÁSSIO <sup>1,2</sup>

Eletrólito, Diluente

Nome comercial:  
Fosfato de Potássio 2mEq/mL Amp 10mL (Fosfato = 2,0mEq/mL; Potássio = 2,0mEq/mL; Fósforo = 1,1mmol/mL) <sup>1,2</sup>  
Fosfato de Potássio (2meq/mL) Amp 10mL Manip <sup>1,2</sup>

POSOLOGIA

Adulto:

|                                  |                                      |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| Correção de hipofosfatemia grave | Infusão de 9 mmoles, a cada 12 horas |
|----------------------------------|--------------------------------------|

Criança:

|                                  |                                                                                                                           |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Correção de hipofosfatemia grave | Infusão de 0,15 a 0,33 mmoles/kg/dose. Repetir a dose até que as concentrações séricas de fósforo estejam acima de 2mg/dL |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

- ▶ **Ajuste de dose:**  
Não é necessário ajuste de dose.
- ▶ **ADMINISTRAÇÃO**  
Intravenosa  
Diluir e homogeneizar 3mMol de fosfato por mL a um grande volume líquido. Infundir em adultos por 12 horas. Infundir em criança por 6 horas.
- ▶ **ARMAZENAMENTO**  
Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.
- ▶ **Atenção:**  
Alta Vigilância.

## FOSFATO DE SÓDIO MONOBÁSICO + FOSFATO DE SÓDIO DIBÁSICO <sup>1</sup>

Laxante

Nome comercial:

Sol de Fosfato para Preparo Intestinal Fr 45mL Manip <sup>1</sup>

### POSOLOGIA

#### Adultos e Crianças:

|             |                      |
|-------------|----------------------|
| Dose padrão | 90mL, uma vez ao dia |
|-------------|----------------------|

► **Ajuste de dose:**

Não é necessário ajuste de dose.

► **ADMINISTRAÇÃO**

VO

Diluir 45mL em 45mL de água. Administrar à noite, 19 horas anterior à colonoscopia e às 6 horas da manhã seguinte.

► **ARMAZENAMENTO**

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

## FOSFATO DE SÓDIO MONOBÁSICO + FOSFATO DE SÓDIO DIBÁSICO <sup>1,2</sup>

Laxante

Nome comercial:

Enemaplex Fosfatado Fr 130mL <sup>1,2</sup>

Fleet Enema Fr 133mL <sup>1</sup>

Phosfoenema Fr 130mL <sup>1,2</sup>

### POSOLOGIA

#### Adulto:

|             |                       |
|-------------|-----------------------|
| Dose padrão | 130mL, uma vez ao dia |
|-------------|-----------------------|

► **Ajuste de dose:**

Não é necessário ajuste de dose.

► **ADMINISTRAÇÃO**

Via retal

► **ARMAZENAMENTO**

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

## FOSFOMICINA <sup>1</sup>

Antimicrobiano Lincosamida

Nome comercial:

Monuril 8g Env <sup>1</sup>

### POSOLOGIA

#### Adulto:

|                                                                            |                             |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Infecções agudas                                                           | 1 envelope, uma vez ao dia  |
| Infecções por <i>Pseudomonas</i> ,<br><i>Proteus</i> e <i>Enterobacter</i> | 2 envelopes, uma vez ao dia |

|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Profilaxia das infecções urinárias, após intervenções cirúrgicas e manobras instrumentais</p>                                                                                                       | <p>2 envelopes. A primeira dose 3 horas antes da cirurgia e a segunda dose, 24 horas depois</p> |
| <p>► <b>Ajuste de dose:</b><br/>Insuficiência renal: ClCr &lt; 10mL/min o uso é contraindicado.</p>                                                                                                    |                                                                                                 |
| <p>► <b>ADMINISTRAÇÃO</b><br/>VO<br/>Dissolver o conteúdo em um copo com 50 a 75mL de água.</p>                                                                                                        |                                                                                                 |
| <p>► <b>Administração com alimentos:</b><br/>A solução deve ser ingerida de estômago vazio imediatamente após o preparo. Ingerir preferencialmente à noite, antes de deitar-se e depois de urinar.</p> |                                                                                                 |
| <p>► <b>ARMAZENAMENTO</b><br/>Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.</p>                                                                                                                 |                                                                                                 |
| <p>► <b>Atenção:</b><br/>Receita Branca (2 vias).</p>                                                                                                                                                  |                                                                                                 |

**FULVESTRANTO <sup>1</sup>**

Hormônio Antiestrogênico

Nome comercial:  
Faslodex 250mg Ser 5mL <sup>1</sup>  
Poemmy 250mg Ser 5mL <sup>1</sup>

**POSOLOGIA**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Adulto:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                   |
| Monoterapia (mulheres adultas e idosas)                                                                                                                                                                                                                                                        | <p>- 500mg em duas injeções de 5mL, no intervalo de 1 mês.</p> <p>- Dose adicional: 500mg, dada 2 semanas após a dose inicial</p> |
| <p>► <b>Ajuste de dose:</b><br/>Insuficiência renal: não é recomendado ajuste de dose para pacientes com depuração de creatinina maior que 30mL/min.<br/>Insuficiência hepática: não é recomendado ajuste de dose para pacientes com insuficiência hepática categoria A e B de Child-Pugh.</p> |                                                                                                                                   |
| <p>► <b>ADMINISTRAÇÃO</b><br/>Intramuscular<br/>Aplicar somente nas nádegas.</p>                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |
| <p>► <b>ARMAZENAMENTO</b><br/>Conservar em refrigeração entre 2°C e 8°C.</p>                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |
| <p>► <b>Atenção:</b><br/>Alto Custo.</p>                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |

**FUROSEMIDA <sup>1,2</sup>**

Diurético

Nome comercial:  
Lasix 40mg Cp <sup>1,2</sup>

**POSOLOGIA**

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| <b>Adulto:</b>  |                   |
| Dose padrão     | 20 a 80mg por dia |
| Dose manutenção | 20 a 40mg por dia |

**Criança (< 15 anos de idade):**

|             |              |
|-------------|--------------|
| Dose padrão | 2mg/kg       |
| Dose máxima | 40mg por dia |

▶ **Ajuste de dose:**

Insuficiência hepática: pode ser necessário ajuste de dose, monitorar.

▶ **ADMINISTRAÇÃO**

VO

Ingerir com o estômago vazio.

▶ **Administração via sonda:**

Pode ser administrado via sonda. Triturar e diluir em 15mL de água, administrando imediatamente.

▶ **ARMAZENAMENTO**

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

**FUROSEMIDA <sup>1,2</sup>**

Diurético

Nome comercial:

Furosemida 10mg/mL Amp 2mL (Teuto) <sup>1,2</sup>

Lasix 10mg/mL Amp 2mL <sup>1,2</sup>

**POSOLOGIA****Adulto e Adolescente (> 15 anos de idade):**

|             |                                                                                                            |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dose padrão | Injeção de 20 a 40mg. A dose pode ser gradualmente aumentada em intervalos de 2 horas, com 20mg a cada vez |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Lactentes e Crianças (<15 anos de idade):

|             |                   |
|-------------|-------------------|
| Dose padrão | Injeção de 1mg/kg |
| Dose máxima | 20mg              |

▶ **Ajuste de dose:**

Insuficiência hepática: pode ser necessário ajuste de dose, monitorar.

▶ **ADMINISTRAÇÃO**

Intravenosa e Intramuscular

Intravenosa direta: não diluir e infundir de 1 a 2 minutos.

Intravenosa intermitente: Diluir em 50mL de SF/SG 5% e infundir com uma velocidade de 4 mg/min ou 0,5 mg/kg/min (doses < 120mg).

▶ **ARMAZENAMENTO**

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

**FUROSEMIDA + POTÁSSIO <sup>1</sup>**

Diurético

Nome comercial:

Hidrion 40/100mg Cp <sup>1</sup>

**POSOLOGIA****Adulto:**

|             |                          |
|-------------|--------------------------|
| Dose padrão | 1 a 2 comprimidos ao dia |
|-------------|--------------------------|

- ▶ **Ajuste de dose:**  
Não é necessário ajuste de dose.
- ▶ **ADMINISTRAÇÃO**  
VO  
Ingerir preferencialmente antes da primeira refeição do dia.
- ▶ **ARMAZENAMENTO**  
Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

**GABAPENTINA <sup>1,2</sup>**

Anticonvulsivante

Nome comercial:

Gabapentina 300mg Cap (Biosintética) <sup>1,2</sup>Gabapentina 300mg Cap (Biolab) <sup>1,2</sup>Gabapentina 300mg Cap (Germed) <sup>1,2</sup>Gabapentina 400mg Cap (Germed) <sup>1</sup>Gabapentina 400mg Cap (EMS) <sup>1</sup>Gabapentina 400mg Cap (Biolab) <sup>1</sup>Neurontin 300mg Cap <sup>1,2</sup>Neurontin 400mg Cap <sup>1</sup>**POSOLOGIA****Adulto e Criança (> 12 anos de idade):**

|                 |                                                                                                                                     |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Epilepsia       | - Dia 1: 300mg à noite<br>- Dia 2: 300mg, a cada 12 horas (preferencialmente de manhã e à noite)<br>- Dia 3: 300 mg, a cada 8 horas |
| Dor Neuropática | 300mg, a cada 8 horas                                                                                                               |

**Pacientes em hemodiálise:**

|                 |                                               |
|-----------------|-----------------------------------------------|
| Dose de ataque  | 300 a 400mg                                   |
| Dose manutenção | 200 a 300mg, após cada 4 horas de hemodiálise |

► **Ajuste de dose:**

Insuficiência renal:

| Dose com Função Renal Normal | Dose Insuficiência Renal<br>clearance de creatinina (mL/min) |                     |                     |                     |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                              | >60                                                          | >30-59              | >15-29              | <15                 |
| 900-1800mg<br>24/24h         | 300-1200mg<br>8/8h                                           | 200-700mg<br>12/12h | 200-700mg<br>24/24h | 100-300mg<br>24/24h |

► **ADMINISTRAÇÃO**

Oral

► **Administração com alimentos:**

Ingerir com ou sem alimento. Evitar o consumo de álcool.

► **Administração via sonda:**

Pode ser administrado via sonda. Abrir a cápsula e diluir em 15mL de água, administrando imediatamente.

► **ARMAZENAMENTO:**

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

► **Atenção:**

Receita Médica Branca (2 vias).

Risco de Queda.

**GADOBUTROL <sup>1</sup>**

Contraste

Nome comercial:

Gadovist 604,72mg/mL FA 15mL <sup>1 \*</sup>



POSOLOGIA

A critério médico.

- ▶ **ARMAZENAMENTO:**  
Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.
- ▶ **Atenção:**  
\* Este medicamento é livre de látex.

GADOPENTETATO DE DIMEGLUMINA <sup>1</sup>

Contraste

Nome comercial:  
Magnevistan 469mg/mL FA 10mL <sup>1</sup> \*  
Magnevistan 469mg/mL FA 15mL <sup>1</sup> \*

POSOLOGIA

A critério médico.

- ▶ **ARMAZENAMENTO:**  
Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.
- ▶ **Atenção:**  
\* Este medicamento é livre de látex.

GADOXETATO <sup>1,2</sup>

Contraste

Nome comercial:  
Primovist 181,43mg/0,25mmL/mL Ser 10mL <sup>1,2</sup>

POSOLOGIA

Adulto:

|             |          |
|-------------|----------|
| Dose padrão | 0,1mL/kg |
|-------------|----------|

- ▶ **Ajuste de dose:**  
Não é necessário ajuste de dose.
- ▶ **ADMINISTRAÇÃO**  
Intravenosa em bolus.
- ▶ **ARMAZENAMENTO:**  
Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

GALANTAMINA <sup>1</sup>

Anticolinesterásicos

Nome comercial:  
Reminyl ER 8mg Cap Liberação Prolongada <sup>1</sup>  
Coglive 8mg Cap Liberação Prolongada <sup>1</sup>  
Galantamina 8mg Cap Liberação Prolongada (Nova Química) <sup>1</sup>  
Galantamina 8mg Cap Liberação Prolongada (Prati Donaduzzi) <sup>1</sup>

POSOLOGIA

Adulto:

|                 |                                                         |
|-----------------|---------------------------------------------------------|
| Dose padrão     | 8mg, uma vez ao dia                                     |
| Dose manutenção | 16mg, uma vez ao dia, mantendo por pelo menos 4 semanas |
| Dose máxima     | 24mg/dia                                                |

- ▶ **Ajuste de dose:**  
Insuficiência renal: Pacientes com insuficiência renal grave (depuração de creatinina < 3mL/min), o uso é contraindicado.  
Insuficiência hepática: Pacientes com insuficiência hepática grave, o uso é contraindicado.
- ▶ **ADMINISTRAÇÃO**  
Oral  
Administrar preferencialmente pela manhã.
- ▶ **Administração com alimentos:**  
Ingerir preferencialmente com alimentos.
- ▶ **ARMAZENAMENTO:**  
Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.
- ▶ **Atenção:**  
Contém açúcar (sucrose e amido), portanto, deve ser usado com cautela em portadores de Diabetes.

**GANCICLOVIR <sup>1,2</sup>**

Antiviral Citotóxico

Nome comercial:  
Cymevene 500mg FA <sup>1,2</sup>  
Ganciclovir Sódico 500mg FA (Eurofarma) <sup>1,2</sup>  
Ganciclotrat 500mg FA <sup>1,2</sup> \*

**POSOLOGIA**  
**Adulto:**

|                                        |                                                                                                                                  |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Retinite por CMV                       | - Terapia de indução: 5mg/kg, a cada 12 horas por 14 a 21 dias<br>- Tratamento manutenção: 5mg/kg, uma vez ao dia por 1 semana   |
| Prevenção em receptores de transplante | - Tratamento de indução: 5mg/kg, a cada 12 horas por 7 a 14 dias<br>- Tratamento manutenção: 5mg/kg, uma vez ao dia por 1 semana |

**Idoso:**  
Cautela na administração.

- ▶ **Ajuste de dose:**  
Insuficiência renal:

| Dose com Função Renal Normal    | Dose Insuficiência Renal<br>clearance de creatinina (mL/min) |                     |                      |                           |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------------|
|                                 | >50-69                                                       | 25-49               | 10-24                | <10                       |
| Indução<br>5mg/Kg IV 12/12h     | 2,5mg/Kg<br>12/12h                                           | 2,5mg/Kg<br>24/24h  | 1,25mg/Kg<br>24/24h  | 1,25mg/Kg<br>3 vezes/sem  |
| Manutenção 5mg/<br>Kg IV 24/24h | 2,5mg/Kg<br>24/24h                                           | 1,25mg/Kg<br>24/24h | 0,625mg/Kg<br>24/24h | 0,625mg/Kg<br>3 vezes/sem |

- ▶ **ADMINISTRAÇÃO**  
Intravenosa  
Reconstituir em 10mL de água estéril e diluir com base no peso do paciente em SF/SG 5%. Infundir por 1 hora. Preparo na quimioterapia.
- ▶ **ARMAZENAMENTO:**  
Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.  
Após diluição, possui estabilidade de 24 horas em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C ou sob refrigeração.

- ▶ **Atenção:**  
\* Esta apresentação é livre de látex.

**GELATINA + CLORETO SÓDIO +  
HIDROXIDO DE SÓDIO <sup>1</sup>**

Expansor de Volume Sanguíneo

Nome comercial:  
Gelafundin 4% Fr 500mL <sup>1</sup>

**POSOLOGIA**

**Adulto:**

|                                                                                                                                       |                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div> <div>                     Profilaxia da hipovolemia e hipotensão e tratamento de hipovolemia leve                 </div> </div> | <div>                     500 a 1000mL                 </div>                                                                 |
| <div> <div>                     Tratamento da hipovolemia grave                 </div> </div>                                         | <div>                     500mL                 </div>                                                                        |
| <div> <div>                     Hemodiluição                 </div> </div>                                                            | <div>                     Dose deve corresponder ao volume de sangue extraído. Não exceder 20mL/kg/dia                 </div> |
| <div> <div>                     Circulação extracorpórea                 </div> </div>                                                | <div>                     500 a 1500mL                 </div>                                                                 |
| <div> <div>                     Leucoferese (aumento do número de leucócitos)                 </div> </div>                           | <div>                     500 a 1000mL                 </div>                                                                 |

- ▶ **Ajuste de dose:**  
Não é necessário ajuste de dose.
- ▶ **ADMINISTRAÇÃO**  
Intravenosa  
Aquecer a solução à temperatura corporal antes da infusão.
- ▶ **ARMAZENAMENTO:**  
Conservar abaixo de 25°C. Não congelar.

**GELATINA + TROMBINA <sup>1</sup>**

Fator de Coagulação

Nome comercial:  
Floseal FA 5ml <sup>1</sup>

**POSOLOGIA**

**Adulto e Criança:**

|                                                                           |                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div> <div>                     Dose padrão                 </div> </div> | <div>                     Depende da dimensão da superfície a ser vedada ou recoberta ou da dimensão da lesão                 </div> |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

- ▶ **Ajuste de dose:**  
Não é necessário ajuste de dose.
- ▶ **ADMINISTRAÇÃO**  
Tópico.  
Reconstituir a trombina de cloreto de cálcio e adicionar a trombina à matriz de gelatina antes do uso.
- ▶ **ARMAZENAMENTO:**  
Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

## GELATINA + PECTINA + CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA + ASSOCIAÇÕES <sup>1,2</sup>

Hidratante, Protetor Epidérmico

Nome comercial:

Stomahesive Pasta Protetora de Pele Tubo 56,7g <sup>1,2</sup>

### POSOLOGIA

#### Adulto:

Dose padrão

A critério médico

#### ► Ajuste de dose:

Não é necessário ajuste de dose.

#### ► ADMINISTRAÇÃO

Tópico.

#### ► ARMAZENAMENTO

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

## GENCITABINA <sup>1</sup>

Antineoplásico Citotóxico

Nome comercial:

Gemzar 200mg FA <sup>1</sup> \*

Gemzar 1g FA <sup>1</sup> \*

Gemzar 100mg FA <sup>1</sup>

Genlibbs 1000mg FA <sup>1</sup>

Genlibbs 200mg FA <sup>1</sup>

### POSOLOGIA

#### Adulto:

A depender da indicação e esquema quimioterápico.

#### ► ADMINISTRAÇÃO

Preparo na quimioterapia

#### ► ARMAZENAMENTO

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

#### ► Atenção:

Alto Custo.

\* Esta apresentação é livre de látex.

## GENTAMICINA <sup>1,2</sup>

Antimicrobiano Aminoglicosídeo

Nome comercial:

Gentamicin 80mg Amp 2ml <sup>1,2</sup>

### POSOLOGIA

#### Adulto:

Dose padrão

1 a 2,5mg/kg, a cada 12 ou 8 horas, durante 7 a 10 dias.

#### Criança:

Dose padrão

2 a 2,5mg/kg, a cada 8 horas

- **Ajuste de dose:**  
Insuficiência renal:

| Dose com Função Renal Normal | Dose Insuficiência Renal<br>clearance de creatinina (mL/min) |             |             |             |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
|                              | >60                                                          | 40-60       | 20-40       | <20         |
| 1,0 - 2,5mg/Kg 8/8h          | 100% 8/8h                                                    | 100% 12/12h | 100% 24/24h | 100% 48/48h |

Insuficiência hepática: Pode ser necessário ajuste de dose, monitorar.

- **ADMINISTRAÇÃO**  
Intramuscular, Intravenosa, Subconjutival ou Nebulização  
Infusão intermitente: até 40mg em 2mL SF/SG 5%, 30 minutos a 2 horas.  
até 120mg em 100mL SF/SG 5%, 30 minutos a 2 horas.  
até 300mg em 250mL SF/SG 5%, 30 minutos a 2 horas.
- **ARMAZENAMENTO**  
Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.
- **Atenção:**  
Receita Médica Branca (2 vias).

GENTAMICINA <sup>1</sup>

Antimicrobiano Tópico

Nome comercial:  
Sulfato de Gentamicina 0,1% Creme Bis 30g <sup>1</sup>  
Diprogenta Creme Bis 30g <sup>1</sup>  
Duotrat Creme Bis 30g <sup>1</sup>  
Quadridem Creme Bis 20g <sup>1</sup>  
Trok-G Creme Bis 30g <sup>1</sup>

**POSOLOGIA**  
**Adulto e Criança (> 1 ano de idade):**

|             |                                                                                                      |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dose padrão | Aplicar uma fina camada de modo a cobrir toda a área afetada, a cada 12 horas (pela manhã e à noite) |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|

- **Ajuste de dose:**  
Não é necessário ajuste de dose.
- **ADMINISTRAÇÃO**  
Tópico.
- **ARMAZENAMENTO**  
Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.
- **Atenção:**  
Receita Médica Branca (2 vias).

GLICERINA <sup>1,2</sup>

Laxante

Nome comercial:  
Glicerín Adult Sup (EMS) <sup>1,2</sup>  
Glicerina Adulto Sup (Pfizer) <sup>1,2</sup>  
Glicerina Adulto Sup (Pharmascience) <sup>1,2</sup>  
Glicerina Adulto Sup (Granado) <sup>1,2</sup>

**POSOLOGIA**

**Adulto:**

Dose padrão

1 supositório ao dia ou a critério médico

► **Ajuste de dose:**

Não é necessário ajuste de dose.

► **ADMINISTRAÇÃO**

Via retal

Introduzir o supositório até que advenha a vontade de evacuar.

► **ARMAZENAMENTO**

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

## GLICERINA <sup>1,2</sup>

Laxante

Nome comercial:

Clisterol 12% Fr 500mL <sup>1,2</sup>

Glicenax 12% Fr 500mL <sup>1,2</sup>

Glicerina 12% Fr 500mL (Halex Istar) <sup>1,2</sup>

Glicerina 12% Fr 500mL (Sanobiol) <sup>1,2</sup>

### POSOLOGIA

**Adulto e Criança:**

Dose padrão

Usar um frasco com o auxílio de sonda ou a critério médico

► **Ajuste de dose:**

Não é necessário ajuste de dose.

► **ARMAZENAMENTO**

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

## GLICERINA PURA <sup>1</sup>

Hidratante, Protetor Epidérmico

Nome comercial:

Glicerina Pura FA 50mL <sup>1</sup>

### POSOLOGIA

**Adulto e Criança:**

Dose padrão

A critério médico

► **Ajuste de dose:**

Não é necessário ajuste de dose.

► **ARMAZENAMENTO**

Conservar em temperatura ambiente menor que 25°C.

## GLICEROFOSFATO DE SÓDIO ANIDRO <sup>1,2</sup>

Eletrólito, Diluente

Nome comercial:

Glycophos Amp 20mL <sup>1,2</sup>

Glicerofosfato de Sódio 10% Amp 20mL Manip <sup>1,2</sup>

### POSOLOGIA

**Adulto:**

Dose padrão | 10 a 20 mmol, uma vez ao dia

► **Criança:**

Dose padrão | 1 a 1,5 mmol/kg, uma vez ao dia

► **Ajuste de dose:**

Insuficiência renal: pode ser necessário ajuste de dose, monitorar.

► **ADMINISTRAÇÃO**

Intravenosa

Diluir em pelo menos 6 vezes com SF/SG 5%.

► **ARMAZENAMENTO**

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

**GLICINA** <sup>1,2</sup>

Irrigação Vesical

Nome comercial:

Glicina 1,5% Sol Bolsa 3000mL <sup>1,2</sup>

**POSOLOGIA**

**Adultos:**

A critério médico.

► **ARMAZENAMENTO**

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

**GLICLAZIDA** <sup>1,2</sup>

Hipoglicemiante

Nome comercial:

Azukon MR 30mg Cp <sup>1,2</sup>

Diamicron MR 30mg Cp <sup>1,2</sup>

**POSOLOGIA**

**Adulto:**

Dose padrão | 30 a 120mg, uma vez ao dia

► **Ajuste de dose:**

Insuficiência hepática: Em casos graves, o uso é contraindicado.

► **ADMINISTRAÇÃO**

Oral

► **Administração com alimentos:**

Ingerir preferencialmente junto das refeições. Evitar o consumo de álcool.

► **ARMAZENAMENTO**

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

**GLICOSE** <sup>1,2</sup>

Eletrólito, Diluente

Nome comercial:

Glicose 25% Amp 10mL (Isotarma) <sup>1,2</sup>

Glicose 50% Amp 10mL (Isotarma) <sup>1,2</sup>

Glicose 75% Amp 10mL Manip <sup>1,2</sup>

Soro Glicosado 5% Trilaminado Bolsa 250mL (Halex Istar) <sup>1,2</sup>

Soro Glicosado 5% Trilaminado Bolsa 250mL (Eurofarma) <sup>1,2</sup>

Soro Glicosado 5% Trilaminado Bolsa 500mL (Eurofarma) <sup>1,2</sup>

Soro Glicosado 5% Trilaminado Bolsa 500mL (Halex Istar) <sup>1,2</sup>

Glicose 10% Bolsa 1000ml (Fresenius) <sup>1,2</sup>

Glicose 10% Bolsa 1000ml (Halex Istar) <sup>1,2</sup>

Soro Glicosado 10% Bolsa 500mL (Baxter) <sup>1,2</sup>

Soro Glicosado 5% Bolsa 1000mL (Baxter) <sup>1,2</sup>

Soro Glicosado 5% Bolsa 100mL (Baxter) <sup>1,2</sup>

Soro Glicosado 5% Bolsa 250mL (Halex Istar) <sup>1,2</sup>

Soro Glicosado 5% Bolsa 250mL (Baxter) <sup>1,2</sup>

Soro Glicosado 5% Bolsa 500mL (Baxter) <sup>1,2</sup>

Glicose 5% Bolsa 50ml (Halex Istar) <sup>1</sup>

Glicose 5% Bolsa 50ml (Kabi Pack) <sup>1</sup>

Glicose 50% Bolsa 500mL <sup>1,2</sup>

## POSOLOGIA

### Adultos:

A critério médico.

### ▶ ARMAZENAMENTO

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

## GLICOSE + CLORETO DE SÓDIO <sup>1</sup>

Eletrólito, Diluente

Nome comercial:

Soro Glico-Fisiológico Bolsa 500mL <sup>1</sup>

## POSOLOGIA

### Adultos e Criança:

A critério médico.

### ▶ ARMAZENAMENTO

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

## GLIMEPIRIDA <sup>1</sup>

Hipoglicemiante

Nome comercial:

Amaryl 1mg Cp <sup>1</sup>

Glimepirida Cp Sulcado 1mg (Biosintética) <sup>1</sup>

Glimeperida Cp 1mg (Medley) <sup>1</sup>

## POSOLOGIA

### Adulto:

|                                       |                         |
|---------------------------------------|-------------------------|
| Pacientes com diabetes bem controlado | 1 a 4mg, uma vez ao dia |
| Dose máxima                           | 8mg/dia                 |

### Criança (> 10 anos de idade):

|                 |                         |
|-----------------|-------------------------|
| Dose padrão     | 1mg, uma vez ao dia     |
| Dose manutenção | 1 a 4mg, uma vez ao dia |



- ▶ **Ajuste de dose:**  
Insuficiência renal: ClCr < 22mL/min: a dose inicial deve ser 1mg e o aumento da dose deve ser baseado na glicemia de jejum.
- ▶ **ADMINISTRAÇÃO**  
Oral
- ▶ **Administração com alimentos:**  
Ingerir junto à primeira refeição do dia. Evitar o consumo de álcool.
- ▶ **Administração via sonda:**  
Pode ser administrado via sonda. Triturar e diluir em 15mL de água, administrando imediatamente.
- ▶ **ARMAZENAMENTO**  
Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

**GLUCAGON <sup>1</sup>** Outros – Hormônios e Metabolismo

Nome comercial:  
Glucagen 1mg FA + Diluente Ser <sup>1</sup>

**POSOLOGIA**

**Adulto:**

|             |     |
|-------------|-----|
| Dose padrão | 1mg |
|-------------|-----|

**Criança:**

|             |                                                                                              |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dose padrão | 1mg (acima de 25kg ou acima de 6 a 8 anos) ou 0,5mg (abaixo de 25kg ou abaixo de 6 a 8 anos) |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|

- ▶ **Ajuste de dose:**  
Não é necessário ajuste de dose.
- ▶ **ADMINISTRAÇÃO**  
Intramuscular ou Subcutânea
- ▶ **ARMAZENAMENTO**  
Conservar em refrigeração entre 2°C e 8°C.

**GLUCONATO DE CÁLCIO <sup>1,2</sup>** Eletrólito, Diluente

Nome comercial:  
Gluconato de Cálcio 10% Amp 10mL Manip <sup>1,2</sup>  
Gluconato de Cálcio 10% Amp 10mL (Halex Istar) <sup>1,2</sup>  
Gluconato de Cálcio 10% Amp 10mL (Isofarma) <sup>1,2</sup>  
Gluconato de Cálcio 10% Amp 10mL (Fresenius) <sup>1,2</sup>

**POSOLOGIA**

**Adulto:**

|                                            |                                               |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Hipocalcemia ou restauração de eletrólitos | 970mg, podendo ser repetida se for necessário |
| Hiperpotassemia e hipermagnesemia          | 1 a 2g                                        |

**Criança:**

|              |                             |
|--------------|-----------------------------|
| Hipocalcemia | 200 a 500mg como dose única |
|--------------|-----------------------------|

- ▶ **Ajuste de dose:**  
Não é necessário ajuste de dose.
- ▶ **ADMINISTRAÇÃO**  
Intravenosa  
Intermitente: até 2000mg em 50mL SF/SG 5%.
- ▶ **ARMAZENAMENTO**  
Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.
- ▶ **Atenção:**  
Alta Vigilância.

**GOLIMUMAB <sup>1</sup>**

Antirreumático

Nome comercial:

Simponi 25mg Caneta 0,5mL <sup>1</sup>**POSOLOGIA****Adulto:**

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artrite reumatoide                      | 50mg, uma vez no mês, sempre no mesmo dia do mês                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Artrite psoriásica                      | 50mg, uma vez ao mês, sempre no mesmo dia do mês                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Espondilite anquilosante                | 50mg, uma vez ao mês, sempre no mesmo dia do mês                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Espondiloartrite axial não radiográfica | 50mg, uma vez ao dia, sempre no mesmo dia do mês                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Colite ulcerativa                       | - Peso > ou igual a 80kg: 200mg na semana 0, seguidos de 100mg na semana 2 e então, 100mg a cada 4 semanas<br>- Peso < 80kg: 200mg na semana 0, seguidos de 100mg na semana 2. Pacientes que tiveram melhoras, devem receber 50mg na semana 6 e a cada 4 semanas. Pacientes que tiveram resposta inadequada, continua-se com 100mg na semana 6 e a cada 4 semanas. |

- ▶ **Ajuste de dose:**  
Não é necessário ajuste de dose.
- ▶ **ADMINISTRAÇÃO**  
Subcutânea  
Aplicar na região da coxa.
- ▶ **ARMAZENAMENTO**  
Conservar em refrigeração entre 2°C e 8°C. Não congelar e proteger da luz.

**GOSSERRELINA <sup>1</sup>**

Outros – Hormônios e Metabolismo

Nome comercial:

Zoladex 3,6mg Ser <sup>1</sup>**POSOLOGIA****Adulto:**

Câncer de próstata, controle de endometriose e leiomioma uterino

1 depot de 3,6mg, a cada 28 dias

- ▶ **Ajuste de dose:**  
Não é necessário ajuste de dose.
- ▶ **ADMINISTRAÇÃO**  
Subcutânea  
Inserir na parede abdominal inferior.
- ▶ **ARMAZENAMENTO**  
Conservar em temperatura inferior a 25°C.
- ▶ **Atenção:**  
Alto Custo.

## GOSSERRELINA <sup>1</sup>

Outros – Hormônios e Metabolismo

Nome comercial:  
Zoladex La 10,8mg Ser <sup>1</sup>

### POSOLOGIA

#### Adulto:

Câncer de próstata, controle de endometriose e leiomioma uterino

1 depot de 10,8mg, a cada 12 semanas

- ▶ **Ajuste de dose:**  
Não é necessário ajuste de dose.
- ▶ **ADMINISTRAÇÃO**  
Subcutânea  
Inserir na parede abdominal inferior.
- ▶ **ARMAZENAMENTO**  
Conservar em temperatura inferior a 25°C.
- ▶ **Atenção:**  
Alto Custo.

## GRAMICIDINA + NEOMICINA + NISTATINA + TRIANCINOLONA <sup>1</sup>

Antimicrobiano Tópico e Corticóide

Nome comercial:  
Gramicidina 0,25mg/g + Neomicina 2,5mg + Nistatina 100000u + Triancinolona 1mg Creme Tubo 30g (Eurofarma) <sup>1</sup>  
Gramicidina 0,25mg/g + Neomicina 2,5mg + Nistatina 100000u + Triancinolona 1mg Creme Tubo 30g (Germed) <sup>1</sup>  
Gramicidina 0,25mg/G + Neomicina 2,5mg + Nistatina 100000u + Triancinolona 1mg Creme Tubo 30g (Medley) <sup>1</sup>  
Omcilon A M Creme Tubo 30g <sup>1</sup>  
Oncileg Creme Tubo 30g <sup>1</sup>  
Mud Creme Tubo 30g <sup>1</sup>  
Mud Creme Bis 10g <sup>1</sup>

### POSOLOGIA

#### Adulto:

Dose padrão

1 aplicação, a cada 2 ou 8 horas

- ▶ **Ajuste de dose:**  
Não é necessário ajuste de dose.
- ▶ **ADMINISTRAÇÃO**  
Tópico.

► **ARMAZENAMENTO**

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C. Proteger da luz e umidade.

**GRANISETRONA** <sup>1,2</sup>

Antiemético, Procinético

Nome comercial:

Kytril 1mg Amp 1mL <sup>1</sup>

Kytril 3mg Amp 3mL <sup>1,2</sup>

Neosetron 3mg Amp 3mL <sup>1,2</sup>

Granisetrona 1mg Amp 1mL (Eurofarma) <sup>1</sup>

Granisetrona 3mg Amp 3mL (Eurofarma) <sup>1,2</sup>

**POSOLOGIA**

**Adulto:**

Náuseas e vômitos induzidos por  
terapia citostática

1 a 3mg antes de iniciar a quimioterapia  
citotóxica

**Criança:**

Náuseas e vômitos induzidos  
por terapia citostática

10 a 40mcg/kg antes do início da terapia  
citostática. Uma dose adicional de 10 a 40mcg/kg  
pode ser administrada num período de 24 horas.

► **Ajuste de dose:**

Insuficiência hepática: administrar com cautela.

► **ADMINISTRAÇÃO**

Intravenosa

Direta: até 3mg em 15mL de SF e infundir por 30 segundos a 5 minutos (crianças).

Infusão intermitente: até 3mg em 50mL de SF/SG 5% e infundir por 5 a 10 minutos.

► **ARMAZENAMENTO**

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

A  
B  
C  
D  
E  
F  
G  
H  
I  
J  
K  
L  
M  
N  
O  
P  
Q  
R  
S  
T  
U  
V  
W  
X  
Y  
Z

G

**HALOPERIDOL** <sup>1,2</sup>

Antipsicótico, Neuroléptico

Nome comercial:

Haldol 1mg Cp <sup>1</sup>Haldol 5mg Cp <sup>1,2</sup>Halo 1mg Cp <sup>1</sup>Halo 5mg Cp <sup>1,2</sup>Haldol Gts 2mg/20gts/mL Fr 30mL<sup>1,2</sup>Haloperidol Gts 2mg/ml Fr 20ml (União Química) <sup>1</sup>**POSOLOGIA****Adulto:**

|                 |                                 |
|-----------------|---------------------------------|
| Dose inicial    | 0,5 a 2mg, a cada 12 ou 8 horas |
| Dose manutenção | 1 e 15mg ao dia                 |

**Criança:**

|             |                                     |
|-------------|-------------------------------------|
| Dose padrão | 0,1mg (1 gota)/3kg, a cada 12 horas |
|-------------|-------------------------------------|

▶ **Ajuste de dose:**

Não é necessário ajuste de dose.

▶ **ADMINISTRAÇÃO**

Oral

▶ **Administração com alimentos:**

Ingerir preferencialmente com alimento. Evitar o consumo de álcool.

▶ **Administração via sonda:**

Pode ser administrado via sonda. Triturar e diluir em 15mL de água, administrando imediatamente.

▶ **ARMAZENAMENTO**

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

▶ **Atenção:**

Receita Médica Branca (2 vias).

**HALOPERIDOL** <sup>1,2</sup>

Antipsicótico, Neuroléptico

Nome comercial:

Haldol 5mg Amp 1mL <sup>1,2</sup>Halo 5mg Amp 1mL <sup>1,2</sup>Uni Haloper 5mg Amp 1mL (União Química) <sup>1,2</sup>**POSOLOGIA****Adulto:**

|             |                                                                         |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Dose padrão | 2,5 a 5mg, repetindo a cada hora ou de 4 a 8 horas, conforme necessário |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------|

▶ **Ajuste de dose:**

Não é necessário ajuste de dose.

▶ **ADMINISTRAÇÃO**

Intramuscular

▶ **Administração com alimentos:**

Evitar o consumo de álcool.

▶ **ARMAZENAMENTO**

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

- ▶ **Atenção:**  
Receita Médica Branca (2 vias).  
Risco de queda

**HEPARINA <sup>1,2</sup>**
Anticoagulante

Nome comercial:  
Hemofol 5000UI/0,25mL Amp <sup>1,2</sup>

**POSOLOGIA**

**Adulto:**

|                                          |                                                                                                                                      |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Profilaxia pela heparina em doses baixas | 5000UI/0,25mL duas horas antes da intervenção cirúrgica. Em seguida, repetir a dose a intervalos de 8 a 12 horas durante 7 a 10 dias |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

- ▶ **Criança:**  
Segurança e eficácia não estabelecidas.
- ▶ **Ajuste de dose:**  
Idosos: pode ser necessário ajuste de dose, monitorar.
- ▶ **ADMINISTRAÇÃO**  
Subcutânea  
Injetar na região abdominal subdiafragmática e revezar locais de aplicação.
- ▶ **ARMAZENAMENTO**  
Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

**HEPARINA <sup>1,2</sup>**
Anticoagulante

Nome comercial:  
Hemofol 5000UI/mL FA 5mL <sup>1,2</sup> \*  
Hepamax S 5000UI/mL FA 5mL <sup>1,2</sup> \*  
Heptar 5000UI/mL FA 5ml <sup>1,2</sup>

**POSOLOGIA**

**Adulto:**

|                    |                                                                                                                                                                          |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Trombose e embolia | - Injeção de 5000 a 10000 UI, seguida de infusão de 20000 a 30000 UI/dia.<br>- Injeções intravenosas repetidas de 40000 a 50000 UI/dia, fracionadas a cada 6 ou 4 horas. |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

- ▶ **Ajuste de dose:**  
Idosos: pode ser necessário ajuste de dose, monitorar.
- ▶ **ADMINISTRAÇÃO**  
Intravenosa  
Diluir em 100mL de SF/SG 5% e administrar.
- ▶ **ARMAZENAMENTO**  
Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.  
Após diluição, possui estabilidade de 24 horas em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.
- ▶ **Atenção:**  
\* Esta apresentação é livre de látex.

**HEPARINA <sup>1</sup>**

Anticoagulante

Nome comercial:

Heparina 300UI Ser 3mL <sup>1</sup>Heparina 300UI Ser 10mL <sup>1</sup>**POSOLOGIA****Adulto:**

Uso para heparinização em cateteres.

▶ **Ajuste de dose:**

Não é necessário ajuste de dose.

▶ **ADMINISTRAÇÃO**

Intravenosa

IV direta: até 300UI em 20mL de SF (uso em cateter).

▶ **ARMAZENAMENTO**

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

**HEXAMIDINA + TETRACAÍNA <sup>1,2</sup>**

Antimicrobiano Tópico

Nome comercial:

Hexomedine Colutório Spray Fr 50mL <sup>1,2</sup>**POSOLOGIA****Adulto e Criança (> 3 anos de idade):**

Dose padrão

Aplicar 3 nebulizações, a cada 4 horas

▶ **Ajuste de dose:**

Não é necessário ajuste de dose.

▶ **ADMINISTRAÇÃO**

Uso oral

Aplicar na cavidade bucal, direcionando o aplicador para a orofaringe.

▶ **ARMAZENAMENTO**

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

**HIALURONATO DE SÓDIO <sup>1</sup>**

Lubrificante Oftálmico

Nome comercial:

Hyabak 0,15% Fr 10ml Colírio <sup>1</sup>**POSOLOGIA**

1 gota em cada olho durante o dia, sempre que necessário.

▶ **ADMINISTRAÇÃO**

Via oftálmica

▶ **ARMAZENAMENTO**

Conservar em temperatura ambiente até 25°C

**HIALURONATO DE SÓDIO <sup>1,2</sup>**

Antirreumático

Nome comercial:

Polireumin 20mg (10mg/mL) FA 2mL <sup>1,2</sup>



POSOLOGIA

Adulto:

Dose padrão | 2mL/dia durante 5 semanas

- ▶ **Ajuste de dose:**  
Não é necessário ajuste de dose.
- ▶ **ADMINISTRAÇÃO**  
Intra-articular
- ▶ **ARMAZENAMENTO**  
Conservar em refrigeração entre 2°C e 8°C e ao abrigo da luz.

HIALURONATO DE SÓDIO <sup>1</sup> Antirreumático

Nome comercial:  
Synovium 75mg (25mg/mL) Ser 3mL <sup>1</sup>

POSOLOGIA

Adulto:

Dose padrão | 75mg/dia

- ▶ **Ajuste de dose:**  
Não é necessário ajuste de dose.
- ▶ **ADMINISTRAÇÃO**  
Intra-articular
- ▶ **ARMAZENAMENTO**  
Conservar em refrigeração entre 2°C e 8°C e ao abrigo da luz.

HIALURONATO + SORBITOL <sup>1</sup> Antirreumático

Nome comercial:  
Synolis Va 40mg + Sorbitol 40mg/mL Ser 2mL <sup>1</sup>  
Synolis Va 80mg/160mg Seringa 4ml <sup>1</sup>

POSOLOGIA

Adulto:

Dose padrão | 40mg/dia ou 80mg/dia durante 6 meses

- ▶ **Ajuste de dose:**  
Não é necessário ajuste de dose.
- ▶ **ADMINISTRAÇÃO**  
Intra-articular
- ▶ **ARMAZENAMENTO**  
Conservar em refrigeração entre 2°C e 25°C. Proteger da luz e frio extremo. Não congelar.

HIALURONIDASE <sup>1,2</sup> Outros – Sangue e Órgãos Hematopoiéticos

Nome comercial:  
Hialuronidase 200UI Amp 1mL <sup>1,2</sup>

**POSOLOGIA****Adulto:**

Dose padrão de acordo com a necessidade do paciente. A critério médico.

▶ **Ajuste de dose:**

Não é necessário ajuste de dose.

▶ **ADMINISTRAÇÃO**

Subcutânea

Diluir em SF e administrar imediatamente.

▶ **ARMAZENAMENTO**

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C. Proteger da umidade.

**HIDRALAZINA <sup>1,2</sup>**

Agente Anti-hipertensivo

Nome comercial:

Apresolina 25mg Drg <sup>1,2</sup>

Hidralazina 25mg Cap Manip <sup>1</sup>

**POSOLOGIA****Adulto:**

|                                           |                                                          |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Hipertensão                               | 25mg, a cada 12 horas                                    |
| Insuficiência cardíaca congestiva crônica | 50 a 75mg, a cada 6 horas ou 100mg, a cada 12 ou 8 horas |

▶ **Ajuste de dose:**

Insuficiência renal:

| Dose com Função Renal Normal | Dose Insuficiência Renal<br>clearance de creatinina (mL/min) |                                                                                                 |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 25mg 12/12h                  | 10-50                                                        | < 10                                                                                            |
|                              | 25mg 8/8h                                                    | 25mg 8/8h ou 16/16h em pacientes acetiladores rápidos e 12/12h ou 24/24h em acetiladores lentos |

▶ **ADMINISTRAÇÃO**

Oral

Ingerir com ou sem alimentos junto às refeições.

▶ **Administração com alimentos:**

Evitar o consumo de álcool.

▶ **Administração via sonda:**

Pode ser administrado via sonda. Triturar e diluir em 15mL de água, administrando imediatamente.

▶ **ARMAZENAMENTO**

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

**HIDRALAZINA <sup>1,2</sup>**

Agente Anti-hipertensivo

Nome comercial:

Nepresol 20mg Amp 1mL <sup>1,2</sup>

**POSOLOGIA**

**Adulto:**

|                                                       |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Dose padrão                                           | 1 a 10mg, podendo ser repetida, se necessário, após um intervalo de 20 a 30 minutos |
| Crises hipertensivas (exceto pré-eclampsia/eclampsia) | Até 40mg                                                                            |

**Criança:**

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Emergência hipertensiva | <p>- Injeção intravenosa lenta: 0,1 a 0,5mg/kg, a cada 6 ou 4 horas.</p> <p>Pacientes com 12 anos ou mais, doses de 1 a 10mg, a cada 6 ou 4 horas</p> <p>- Infusão intravenosa contínua: 0,0125 a 0,05mg/kg/hora. Pacientes com 12 anos ou mais, doses de 3 a 9mg/hora</p> |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

► **Ajuste de dose:**

Insuficiência renal:

| Dose com Função Renal Normal | Dose Insuficiência Renal<br>clearance de creatinina (mL/min) |                                                                                                 |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 25mg 12/12h                  | 10-50                                                        | < 10                                                                                            |
|                              | 25mg 8/8h                                                    | 25mg 8/8h ou 16/16h em pacientes acetiladores rápidos e 12/12h ou 24/24h em acetiladores lentos |

► **ADMINISTRAÇÃO**

Intramuscular, Intravenoso lento e Infusão intravenosa.

Diluir em 9mL de SF para concentração de 2mg/mL e administrar.

► **Administração com alimentos:**

Evitar o consumo de álcool.

► **ARMAZENAMENTO**

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 25°C. Proteger da luz.

**HIDROCLOROTIAZIDA** <sup>1,2</sup>

Diurético

Nome comercial:

Clorana 25mg Cp <sup>1,2</sup>

**POSOLOGIA**

**Adulto:**

|             |                                                                                                                              |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hipertensão | 50 a 100mg/dia, em dose única ou fracionada                                                                                  |
| Edema       | <p>- Dose inicial: 50 a 100mg, a cada 24 ou 12 horas.</p> <p>- Dose manutenção: 25 a 200mg por dia ou em dias alternados</p> |

**Criança:**

|                         |                                                                |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Até 2 anos de idade     | Dose total diária de 12,5 a 25mg, administrada em duas tomadas |
| De 2 a 12 anos de idade | Doses de 25 a 100mg, administrada em duas tomadas              |

▶ **Ajuste de dose:**

Insuficiência renal:

| Dose com Função Renal Normal | Dose Insuficiência Renal<br>clearance de creatinina (mL/min) |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 50 a 100mg                   | < 10                                                         |
|                              | Evitar o uso.                                                |

▶ **ADMINISTRAÇÃO**

Oral

Administrar no início do dia para evitar noctúria.

▶ **Administração com alimentos:**

Evitar fitoterápicos com propriedades hipertensivas.

▶ **Administração via sonda:**

Pode ser administrar via sonda. Triturar e diluir em 15mL de água, administrando imediatamente.

▶ **ARMAZENAMENTO**

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

**HIDROCORTISONA + ALUMÍNIO SUBACETATO****+ LIDOCAÍNA + ZINCO ÓXIDO**<sup>1</sup> Anti-inflamatório Esteroidal (Corticoide) Tópico

Nome comercial:

Xyloproct Pomada Bis 25g<sup>1</sup>**POSOLOGIA****Adulto e Criança:**

Duração do tratamento varia de 10 dias a 3 semanas.

|                 |                                                                                         |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Uso externo     | Aplicar uma fina camada várias vezes ao dia na área afetada                             |
| Uso intrarretal | Aplicar a pomada utilizando o aplicador especial, o qual deve ser descartado após o uso |

▶ **Idosos e pacientes debilitados:**

Devem receber doses proporcionais a sua idade e condição física.

▶ **Ajuste de dose:**

Não é necessário ajuste de dose.

▶ **ADMINISTRAÇÃO**

Tópico e intrarretal

▶ **ARMAZENAMENTO**

Conservar em refrigeração entre 2°C e 8°C.

**HIDROCORTISONA SUCCINATO**<sup>1,2</sup>

Anti-inflamatório Esteroidal Sistêmico

Nome comercial:

Cortisonal 100mg FA<sup>1,2</sup> \*Cortisonal 500mg FA<sup>1,2</sup> \*Gliocort 100mg FA<sup>1,2</sup>Gliocort 500mg FA<sup>1,2</sup>Hidrocortisona 100mg FA (Eurofarma)<sup>1,2</sup>Ariscorten 100mg FA<sup>1,2</sup>

**POSOLOGIA**

**Adulto:**

|             |                                                                  |
|-------------|------------------------------------------------------------------|
| Dose padrão | 100 a 500mg, a cada 6, 4 ou 2 horas IM/IV (preferencialmente IV) |
|-------------|------------------------------------------------------------------|

**Criança:**

|                              |                                                                                              |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Insuficiência adrenocortical | 186 a 280/kg ou 10 a 12mg/m <sup>2</sup> de superfície corporal ao dia IM/IV                 |
| Outras indicações            | 666mcg a 4mg/kg ou 20 a 120mg/m <sup>2</sup> de superfície corporal a cada 24 ou 12 horas IM |

- ▶ **Ajuste de dose:**  
Não é necessário ajuste de dose.
- ▶ **ADMINISTRAÇÃO**  
Intravenosa ou Intramuscular  
Intravenosa em *bolus*: Diluir a dose em SF na concentração máxima de 50mg/mL ou administrar direto (sem diluir em soro) em 3 a 5 minutos.  
Intravenosa intermitente; diluir em 100 a 250mL de SF/SG 5% e administrar em 30 a 60 minutos.  
Intramuscular: reconstituir 100mg em 2mL de diluente.
- ▶ **ARMAZENAMENTO**  
Conservar em temperatura menor que 40°C.  
Após reconstituição, possui estabilidade de 24 horas em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C e por 3 dias sob refrigeração entre 2°C e 8°C.
- ▶ **Atenção:**  
\* Esta apresentação é livre de látex.

**HIDROGÊNIO PERÓXIDO <sup>1</sup>**

Antisséptico Tópico

Nome comercial:  
Água Oxigenada 10 Vol. Almotolia 100ml <sup>1</sup>  
Água Oxigenada Estéril 10 Vol. Fr 100ml Manip <sup>1</sup>  
Água Oxigenada Estéril 10 Vol. (3%) Fr 50ml Manip <sup>1</sup>

**POSOLOGIA**

**Adulto:**

- A critério médico.
- ▶ **Ajuste de dose:**  
Não é necessário ajuste de dose.
  - ▶ **ARMAZENAMENTO**  
Conservar em temperatura ambiente.

**HIDROXICLOROQUINA <sup>1</sup>**

Antiparasitário, Anti-helmíntico

Nome comercial:  
Plaquinol 400mg Cp Rev <sup>1</sup>  
Reuquinol 400mg Cp Rev <sup>1</sup>

**POSOLOGIA****Adulto:**

|                                        |                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lúpus eritematoso sistêmico e discoide | - Dose inicial: 400 a 800mg diários<br>- Dose manutenção: 200 a 400mg diários                                                                                                         |
| Artrite reumatoide                     | - Dose inicial: 400 a 600mg diários<br>- Dose manutenção: 200 a 400mg diários                                                                                                         |
| Artrite crônica juvenil                | Não exceder 6,5mg/kg de peso/dia<br>- Dose máxima diária: 400mg                                                                                                                       |
| Doenças fotossensíveis                 | 400mg/dia e depois reduzido para 200mg/dia.                                                                                                                                           |
| Malária                                | - Tratamento supressivo: 400mg, em intervalos semanais<br>- Tratamento da crise aguda: dose inicial de 800mg seguida de 400mg após 6 a 8 horas e 400mg diários em 2 dias consecutivos |

**Criança:**

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Malária                 | - Tratamento supressivo: 6,5mg/kg semanalmente<br>- Tratamento da crise aguda: primeira dose de 12,9mg/kg; segunda dose de 6,5mg/kg, 6 horas após a primeira dose; terceira dose de 6,5mg/kg, 18 horas após a segunda dose; quarta dose de 6,5mg/kg, 24 horas após a terceira dose |
| Artrite crônica juvenil | 6,5mg/kg, a cada 24 horas                                                                                                                                                                                                                                                          |

▶ **Ajuste de dose:**

Não é necessário ajuste de dose.

▶ **ADMINISTRAÇÃO**

Oral

Ingerir durante uma refeição ou com um copo de leite.

▶ **Administração com alimentos:**

Evitar o consumo de álcool.

▶ **ARMAZENAMENTO**

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

**HIDROXIQUINOLINA + TRIETANOLAMINA <sup>1,2</sup>**

Otológico Tópico

Nome comercial:

Cerumin Fr 8mL <sup>1,2</sup>

**POSOLOGIA****Adulto e Criança:**

|             |                                          |
|-------------|------------------------------------------|
| Dose padrão | Pingar 5 gotas no ouvido, a cada 8 horas |
|-------------|------------------------------------------|

▶ **Ajuste de dose:**

Não é necessário ajuste de dose.

▶ **ADMINISTRAÇÃO**

Tópico

Aplicar na posição deitada com o ouvido afetado para cima. Esta posição deve ser mantida por 5 minutos para facilitar a penetração do produto.

▶ **ARMAZENAMENTO**

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

**HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO +  
SIMETICONA + HIDRÓXIDO DE MAGNÉSIO <sup>1,2</sup>**

Antiácido

Nome comercial:  
Maalox Plus Susp Oral Fr 240mL <sup>1,2</sup>  
Mylanta Plus Suspensão Oral Fr 240mL <sup>1,2</sup>

**POSOLOGIA**

**Adulto e Criança (> 12 anos de idade):**

|             |                           |
|-------------|---------------------------|
| Dose padrão | 10 a 20mL, a cada 6 horas |
|-------------|---------------------------|

- ▶ **Ajuste de dose:**  
Não é necessário ajuste de dose.
- ▶ **ADMINISTRAÇÃO**  
Oral  
Ingerir de preferência entre as refeições e ao deitar-se.
- ▶ **ARMAZENAMENTO**  
Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

**HIDROXIETILAMIDO <sup>1,2</sup>**

Expansor de Volume Sanguíneo

Nome comercial:  
Plasmin 6% Bolsa 500ml Soluflex <sup>1,2</sup>  
Venofundin 6% Ecoflac Bolsa 500mL <sup>1,2</sup>  
Voluven 6% Bolsa 500mL <sup>1,2</sup>

**POSOLOGIA**

**Adulto:**

A critério médico.

- ▶ **Ajuste de dose:**  
Não é necessário ajuste de dose.
- ▶ **ARMAZENAMENTO**  
Conservar em temperatura ambiente menor que 25°C.

**HIDROXIPROPILMETILCELULOSE <sup>1</sup>**

Lubrificante Oftálmico

Nome comercial:  
Vistagel Ser 2,5mL <sup>1</sup>

**POSOLOGIA**

A dosagem será determinada pelo tipo de intervenção cirúrgica.

- ▶ **ARMAZENAMENTO**  
Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

**HIDROXIUREIA <sup>1</sup>**

Antineoplásico Oral

Nome comercial:  
Hydrea 500mg Cap <sup>1</sup>

A  
B  
C  
D  
E  
F  
G  
H  
I  
J  
K  
L  
M  
N  
O  
P  
Q  
R  
S  
T  
U  
V  
W  
X  
Y  
Z

**POSOLOGIA****Adulto:**

Conforme esquema quimioterápico.

▶ **ADMINISTRAÇÃO**

Oral

Ingerir com bastante líquido.

▶ **Administração via sonda:**

Pode ser administrado via sonda. Dispersar em 10mL de água, administrando imediatamente.

Preparo deve ser feito na quimioterapia.

▶ **ARMAZENAMENTO**

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

**HIDROXIZINA** <sup>1,2</sup>

Anti-histamínicos H1

Nome comercial:

Hixizine 25mg Cp <sup>1,2</sup>

Prurizin 25mg Cp <sup>1,2</sup>

**POSOLOGIA****Adulto:**

Dose padrão

25mg, a cada 8 ou 6 horas

**Criança:**

Dose padrão

0,7mg/kg, a cada 8 horas

▶ **Ajuste de dose:**

Idosos: administrar com cautela. Pode resultar em ações colinérgicas (boca seca, constipação, retenção urinária).

▶ **ADMINISTRAÇÃO**

Oral

▶ **Administração com alimentos:**

Evitar o consumo de álcool e Erva-de-São-João.

▶ **Administração via sonda:**

Pode ser administrado via sonda. Triturar e diluir em 15mL de água, administrando imediatamente.

▶ **ARMAZENAMENTO**

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

**HILANO G-F 20** <sup>1,2</sup>

Outros - Sistema Músculo Esquelético

Nome comercial:

Synvisc One 8mg/mL Ser 6mL <sup>1,2</sup>

Synvisc Classic 8mg/mL Ser 2mL <sup>1,2</sup>

**POSOLOGIA****Adulto:**

A critério médico.

▶ **ARMAZENAMENTO**

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.



Nome comercial:  
Hipossulfito de Sódio 25% Amp 10mL Manip <sup>1</sup>

**POSOLOGIA**

**Adulto:**  
A critério médico.

- ▶ **ARMAZENAMENTO**  
Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

A

B

C

D

E

F

G

**H**

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

**IBUPROFENO** <sup>1,2</sup>

Anti-inflamatório não Esteroidal Sistêmico

Nome comercial:  
Advil 200mg Cp Rev <sup>1,2</sup>

**POSOLOGIA**

**Adulto:**

|             |                                  |
|-------------|----------------------------------|
| Dose padrão | 200 a 400mg, a cada 6 ou 4 horas |
| Dose máxima | 6 (1200mg) comprimidos ao dia    |

- ▶ **Ajuste de dose:**  
Não é necessário ajuste de dose.
- ▶ **ADMINISTRAÇÃO**  
Oral
- ▶ **Administração com alimentos:**  
Ingerir preferencialmente com alimentos. Evitar o consumo de álcool.
- ▶ **ARMAZENAMENTO**  
Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

**IBUPROFENO** <sup>1,2</sup>

Anti-inflamatório não Esteroidal Sistêmico

Nome comercial:  
Alivium Fr 30mL (50mg/10gts/mL) Gts <sup>1,2</sup>

**POSOLOGIA**

**Adulto:**

|             |                                |
|-------------|--------------------------------|
| Dose padrão | 40 a 160 gotas, a cada 6 horas |
|-------------|--------------------------------|

**Criança:**

| Peso (kg) | Febre baixa (< 39°C) | Febre alta (> ou igual a 39°C) |
|-----------|----------------------|--------------------------------|
| 5 a 7 kg  | 1mL                  | 2mL                            |
| 8kg       | 1mL                  | 3mL                            |
| 9 e 10kg  | 2mL                  | 3mL                            |
| 11 a 13kg | 2mL                  | 4mL                            |
| 14kg      | 2mL                  | 5mL                            |
| 15 e 16kg | 3mL                  | 5mL                            |
| 17 a 19kg | 3mL                  | 6mL                            |
| 20kg      | 3mL                  | 7mL                            |
| 21 a 26kg | 4mL                  | 7mL                            |
| 27 a 32kg | 5mL                  | 7mL                            |
| 33 a 38kg | 6mL                  | 7mL                            |
| 39 e 40kg | 7mL                  | 7mL                            |

- ▶ **Ajuste de dose:**  
Não é necessário ajuste de dose.
- ▶ **ADMINISTRAÇÃO**  
Oral
- ▶ **Administração com alimentos:**  
Evitar o consumo de álcool.
- ▶ **ARMAZENAMENTO**  
Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

**ICATIBANTO <sup>1</sup>**
Outros – Sangue e Órgãos Hematopoiéticos

Nome comercial:  
Firazyr 10mg/ml Ser 3mL <sup>1</sup>

**POSOLOGIA**

**Adulto:**

Dose padrão
Injeção de 30mg. Caso necessário, administrar outra injeção após 6 horas.

**Criança:**

| Peso Corporal | Dose (Volume de Injeção) |
|---------------|--------------------------|
| 12 a 25kg     | 10mg                     |
| 26 a 40kg     | 15mg                     |
| 41 a 50kg     | 20mg                     |
| 51 a 65kg     | 25mg                     |
| > 65kg        | 30mg                     |

- ▶ **Ajuste de dose:**  
Não é necessário ajuste de dose.
- ▶ **ADMINISTRAÇÃO**  
Subcutânea  
Administrar preferencialmente na área abdominal.
- ▶ **ARMAZENAMENTO**  
Conservar em refrigeração entre 2°C e 8°C. Não congelar.

**IDARRUBICINA <sup>1</sup>**
Antineoplásico Citotóxico

Nome comercial:  
Zavedos 5mg FA <sup>1</sup>  
Zavedos 10mg FA <sup>1</sup>  
IDA 10mg FA <sup>1</sup>  
IDA 5mg FA <sup>1</sup>

**POSOLOGIA**

**Adulto:**

|                                                          |                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Leucemia não linfocítica aguda/ Leucemia mioeloide aguda | - Associada com citarabina: 12mg/m <sup>2</sup> , uma vez ao dia, durante 3 dias<br>- Agente isolado e associado: 8mg/m <sup>2</sup> , uma vez ao dia, durante 5 dias |
| Leucemia linfocítica aguda                               | Como agente isolado, 12mg/m <sup>2</sup> , durante 3 dias                                                                                                             |

Ou conforme esquema quimioterápico.

**Criança:**

Leucemia linfocítica aguda | Como agente único: 10mg/m<sup>2</sup>, uma vez ao dia, durante 3 dias

Ou conforme esquema quimioterápico.

► **Ajuste de dose:**

Conforme esquema quimioterápico.

► **ADMINISTRAÇÃO**

Preparo na quimioterapia.

► **ARMAZENAMENTO**

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

Após reconstituição, possui estabilidade de 48 horas em refrigeração entre 2°C e 8°C ou até 24 horas em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

**IFOSFAMIDA <sup>1</sup>**

Antineoplásico Citotóxico

Nome comercial:

Holoxane 0,5g FA <sup>1</sup>

Holoxane 1g FA <sup>1</sup>

**POSOLOGIA**

**Adulto:**

A depender da indicação e esquema quimioterápico.

► **ADMINISTRAÇÃO**

Preparo na quimioterapia.

► **ARMAZENAMENTO**

Conservar em temperatura ambiente menor que 25°C.

**IMIPENEM + CILASTATINA <sup>1,2</sup>**

Antimicrobiano Carbapenêmicos

Nome comercial:

Tienam 500mg/500mg FA <sup>1,2</sup>

Imipenem 500mg + Cilastatina Sódica 500mg FA (Abl) <sup>1,2 \*</sup>

Imipenem 500mg + Cilastatina Sódica 500mg FA (Novafarma) <sup>1,2</sup>

**POSOLOGIA**

**Adulto (> ou igual a 70kg):**

|                                         |                                                |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------|
| Infecção leve                           | 250mg, a cada 6 horas                          |
| Infecção moderada                       | 500mg, a cada 8 horas<br>1000, a cada 12 horas |
| Infecção grave – sensibilidade completa | 500mg, a cada 6 horas                          |
| Infecção grave e/ou com risco de vida   | 1000mg, a cada 8 ou 6 horas                    |

► **Ajuste de dose:**  
Insuficiência renal:

|                   | Depuração plasmática de creatinina (mL/min/1,73m2) |                  |                  |
|-------------------|----------------------------------------------------|------------------|------------------|
| Dose diária total | 41 - 70                                            | 21 - 40          | 6 - 20           |
| 1,0g/dia          | 250mg a cada 8h                                    | 250mg a cada 12h | 250mg a cada 12h |
| 1,5g/dia          | 250mg a cada 6h                                    | 250mg a cada 8h  | 250mg a cada 12h |
| 2,0g/dia          | 500mg a cada 8h                                    | 250mg a cada 6h  | 250mg a cada 12h |
| 3,0g/dia          | 500mg a cada 8h                                    | 500mg a cada 8h  | 500mg a cada 12h |
| 4,0g/dia          | 750 mg a cada 8h                                   | 500mg a cada 6h  | 500mg a cada 12h |

► **ADMINISTRAÇÃO**

Intravenosa  
Reconstituir em 100mL de solução apropriada para infusão e diluir em 10mL de solução para infusão. Infundir de 40 a 60 minutos.

► **ARMAZENAMENTO**

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.  
Após reconstituição, possui estabilidade de 24 horas em refrigeração entre 2°C e 8°C e de 4 horas em temperatura ambiente de 25°C.

► **Atenção:**

\* Esta apresentação é livre de látex.

**IMIPRAMINA <sup>1</sup>**
Antidepressivo

Nome comercial:  
Imipra 25mg Drg <sup>1</sup>  
Tofranil 25mg Cp <sup>1</sup>

**POSOLOGIA**

**Adulto:**

|                                   |                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Depressão e síndromes depressivas | - Ambulatoriais: 25mg, a cada 24 a 8 horas. Aumentar gradualmente até 150 a 200mg<br>- Hospitalizados: 25mg, a cada 8 horas. Aumentar a dosagem em 25mg diários até atingir 200mg. |
| Pânico                            | 10mg, uma vez ao dia. Aumentar conforme necessário.<br>- Dose máxima: 200mg                                                                                                        |
| Condições dolorosas crônicas      | 25 a 75mg, uma vez ao dia. Aumentar conforme necessário.<br>- Dose máxima: 300mg                                                                                                   |

**Idoso:**

|             |                                                                                                         |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dose padrão | 10mg ao dia. Aumentar gradualmente para 30 a 50mg diários, que deve ser atingida após cerca de 10 dias. |
| Dose máxima | 50mg ao dia                                                                                             |

**Criança (> ou igual a 5 anos de idade):**

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Dose diária padrão | 1,7mg/kg ao dia       |
| 5 a 8 anos         | 2 a 3 drágeas de 10mg |
| 9 a 12 anos        | 1 a 2 drágeas de 25mg |
| Acima de 12 anos   | 1 a 3 drágeas de 25mg |

**Adolescente:**

|             |                                |
|-------------|--------------------------------|
| Dose padrão | 30 a 40mg, a cada 8 ou 6 horas |
|-------------|--------------------------------|

▶ **Ajuste de dose:**

Não é necessário ajuste de dose.

▶ **ADMINISTRAÇÃO**

Oral

▶ **Administração com alimentos:**

Evitar o consumo de álcool.

▶ **Administração via sonda:**

Pode ser administrado via sonda. Triturar e diluir em 15mL de água, administrando imediatamente.

▶ **ARMAZENAMENTO**

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

▶ **Atenção:**

Receita Médica Branca (2 vias).

**IMUNOGLOBULINA HUMANA <sup>1,2</sup>**

Imunoglobulina

Nome comercial:

Flebogamma Dif 5g Fr 50mL (10%) <sup>1,2</sup>

**POSOLOGIA****Adulto e Criança:**

|                                          |                                                                                                                        |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reposição em imunodeficiência primária   | 0,4 a 0,8 g/kg e doses posteriores de 0,2 a 0,8 g/kg, a cada 2 a 4 semanas                                             |
| Reposição em imunodeficiência secundária | 0,2 a 0,4 g/kg, a cada 3 a 4 semanas                                                                                   |
| Crianças com SIDA                        | 0,2 a 0,4 g/kg, a cada 3 a 4 semanas                                                                                   |
| Púrpura trombocitopênica idiopática      | - 0,8 a 1 g/kg no primeiro dia, com possibilidade de repetir ao final de 3 dias.<br>- 0,4 g/kg/dia, durante 2 a 5 dias |
| Síndrome de Guillain Barré               | 0,4 g/kg/dia, durante 3 a 7 dias                                                                                       |
| Enfermidade de Kawasaki                  | - 1,6 a 2 g/kg em várias doses, durante 2 a 5 dias<br>- 2 g/kg em uma dose em associação com ácido acetilsalicílico    |

▶ **Ajuste de dose:**

Não é necessário ajuste de dose.

▶ **ADMINISTRAÇÃO**

Intravenosa

- Infundir em uma velocidade de 0,01 a 0,02 mL/kg/min, durante os primeiros 30 minutos.  
 Velocidade máxima: 0,1 mL/kg/min.
- ▶ **ARMAZENAMENTO**  
 Conservar em refrigeração entre 2°C e 8°C.
  - ▶ **Atenção:**  
 Alto Custo.

IMUNOGLOBULINA ANTITETÂNICA <sup>1</sup>

Imunoglobulina

Nome comercial:  
 Tetanogamma 250UI Amp 1mL <sup>1</sup>

**POSOLOGIA**

**Adulto e Criança:**

|                                                  |                                                           |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Profilaxia em ferimentos que podem causar tétano | 250UI. Pode ser aumentada para 500UI dependendo dos casos |
| Tétano clinicamente manifesto                    | 3000 a 6000UI em dose única                               |

- ▶ **Ajuste de dose:**  
 Não é necessário ajuste de dose.
- ▶ **ADMINISTRAÇÃO**  
 Intramuscular  
 Administrar em temperatura corporal.
- ▶ **ARMAZENAMENTO**  
 Conservar em refrigeração entre 2°C e 8°C. Não congelar.

IMUNOGLOBULINA ANTITIMÓCITOS HUMANOS (COELHO) <sup>1,2</sup>

Imunossupressor

Nome comercial:  
 Thymoglobuline 25mg FA <sup>1,2</sup>

**POSOLOGIA**

**Adulto e Criança:**

|                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Imunossupressão em transplante                                             | - Prevenção da rejeição aguda do enxerto: 1 a 1,5 mg/kg/dia, durante 2 a 9 dias após transplante renal ou hepático e durante 2 a 5 dias após transplante cardíaco<br>- Tratamento da rejeição aguda de enxerto: 1,5 mg/kg/dia, durante 3 a 14 dias |
| Prevenção da doença do enxerto versus hospedeiro, aguda córtico-resistente | 2 a 5 mg/kg/dia, durante 5 dias                                                                                                                                                                                                                    |
| Anemia aplástica                                                           | 2,5 a 3,5 mg/kg/dia, durante 5 dias consecutivos                                                                                                                                                                                                   |

- ▶ **Ajuste de dose:**  
 Não é necessário ajuste de dose.
- ▶ **ADMINISTRAÇÃO**  
 Intravenosa  
 Diluir em SF/SG 5% para obter um volume total de 50 para 500mL.
- ▶ **ARMAZENAMENTO**  
 Conservar em refrigeração entre 2°C e 8°C.  
 Após reconstituição, possui estabilidade de 24 horas em temperatura de 25°C.

- **Atenção:**  
Alto Custo.

**INDAPAMIDA <sup>1</sup>**

Agente Anti-hipertensivo

Nome comercial:

Indapen SR 1,5mg Cp Lib Prolongada <sup>1</sup>NatriliX SR 1,5mg Cp Lib Prolongada <sup>1</sup>**POSOLOGIA****Adulto:**

|             |                       |
|-------------|-----------------------|
| Dose padrão | 1,5mg, uma vez ao dia |
|-------------|-----------------------|

► **Ajuste de dose:**

Insuficiência renal:

| Dose com Função Renal Normal | Dose com Insuficiência Renal<br>clearance de creatinina (mL/min) |                 |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1,5mg 24/24h                 | >30                                                              | <30             |
|                              | Sem ajuste                                                       | Não recomendado |

► **ADMINISTRAÇÃO**

Oral

Administrar preferencialmente pela manhã.

► **Administração com alimentos:**

Evitar o consumo de álcool.

► **ARMAZENAMENTO**

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

**ÍNDIGO CARMIM <sup>1,2</sup>**

Agente Diagnóstico

Nome comercial:

Índigo Carmin 2% (20mg/mL) Corante Fr 30mL <sup>1,2</sup>Índigo Carmin 0,8% Corante Fr 30mL <sup>1</sup>Índigo Carmin 0,8% Corante Amp 5mL <sup>1</sup>**POSOLOGIA****Adulto:**

A critério médico.

► **ARMAZENAMENTO**

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

**INDOMETACINA <sup>1</sup>**

Anti-inflamatório não Esteroidal Sistêmico

Nome comercial:

Indocid 50mg Cap <sup>1</sup>



**POSOLOGIA**

**Adulto:**

|                                              |                                   |
|----------------------------------------------|-----------------------------------|
| Dose padrão                                  | 50mg a cada 12, 8 ou 6 horas      |
| Dor noturna persistente e/ou rigidez matinal | 10mg ao deitar-se                 |
| Artrite gotosa aguda                         | 150 a 200mg, em doses fracionadas |
| Dismenorreia primária                        | 75mg, em dose única ou dividida   |

**Criança (2 anos ou mais de idade):**

|                            |                                                                                           |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artrite reumatoide juvenil | 2 mg/kg/dia, a cada 12 ou 8 horas. Aumentar semanalmente, se necessário, até 4 mg/kg/dia. |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|

- ▶ **Ajuste de dose:**  
Não é necessário ajuste de dose.
- ▶ **ADMINISTRAÇÃO**  
Oral
- ▶ **Administração com alimentos:**  
Evitar o consumo de álcool.
- ▶ **Administração via sonda:**  
Pode ser administrado via sonda. Abrir a cápsula, diluir em 15mL de água e administrar imediatamente.
- ▶ **ARMAZENAMENTO**  
Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

**INDOMETACINA <sup>1,2</sup>**

Anti-inflamatório não Esteroidal Sistêmico

Nome comercial:  
 Indometacina 100mg Sup Manip <sup>1,2</sup>

**POSOLOGIA**

**Adulto:**

|             |                       |
|-------------|-----------------------|
| Dose padrão | 100mg, uma vez ao dia |
|-------------|-----------------------|

- ▶ **Ajuste de dose:**  
Não é necessário ajuste de dose.
- ▶ **ADMINISTRAÇÃO**  
Via retal.
- ▶ **ARMAZENAMENTO**  
Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

**INFLIXIMABE <sup>1</sup>**

Imunomodulador

Nome comercial:  
 Remicade 100mg FA <sup>1 \*</sup>

**POSOLOGIA****Adulto:**

|                                  |                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artrite reumatoide               | 3mg/kg, durante 2 horas, seguida por doses de 3mg/kg nas semanas 2 e 6 após primeira infusão. Após, a cada 8 semanas. Após 22 semanas, a dose pode ser aumentada para 10mg/kg, se necessário |
| Espondilite Anquilosante         | 5 mg/kg, durante 2 horas, seguida de doses de 5mg/kg nas semanas 2 e 6 e depois, a cada 8 semanas                                                                                            |
| Psoríase em placa                | 5mg/kg, durante 2 horas, seguidas de 5 mg/kg nas semanas 2 e 6 e depois, a cada 8 semanas.                                                                                                   |
| Doença de Crohn moderada a grave | 5 mg/kg, durante 2 horas nas semanas 0, 2 e 6 e depois, 5mg/kg a cada 8 semanas                                                                                                              |
| Doenç de Crohn fistulizante      | 5mg/kg, durante 2 horas, seguida por doses adicionais de 5 mg/kg nas semanas 2 e 6.                                                                                                          |
| Colite ou Retocolite Ulcerativa  | 5mg/kg, durante 2 horas, seguida de doses adicionais de 5 mg/kg nas semanas 2 e 6 e depois, a cada 8 semanas.                                                                                |

**Criança:**

|                                 |                                                                                                               |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Doença de Crohn                 | 5mg/kg, seguida por doses adicionais de 5mg/kg nas semanas 2 e 6 e depois, a cada 8 semanas                   |
| Colite ou Retocolite Ulcerativa | 5mg/kg, durante 2 horas, seguida de doses adicionais de 5 mg/kg nas semanas 2 e 6 e depois, a cada 8 semanas. |

▶ **Ajuste de dose:**

Não é necessário ajuste de dose.

▶ **ADMINISTRAÇÃO**

Intravenosa

Reconstituir em 10mL de água bidestilada e diluir em 250mL de SF, infundindo em 2 a 3 horas.

▶ **ARMAZENAMENTO**

Conservar em refrigeração entre 2°C e 8°C. Não congelar.

Após diluição, possui estabilidade de 24 horas sob refrigeração entre 2°C e 8°C.

▶ **Atenção:**

Alto Custo.

\* Este medicamento é livre de látex.

**INSULINA DEGLUDECA<sup>1</sup>**

Hipoglicemiante

Nome comercial:

Tresiba Flextouch 100UI/1ml Ser 3ml<sup>1</sup>

**POSOLOGIA**

Dose à critério médico, a cada 24 horas, no mesmo horário todos os dias.

▶ **ADMINISTRAÇÃO**

Subcutânea.

▶ **ARMAZENAMENTO**

Conservar sob refrigeração, em temperatura entre 2°C e 8°C.

INSULINA GLARGINA 1,2

Hipoglicemiante

Nome comercial:  
Insulina Lantus 100UI/mL FA 10mL 1,2

POSOLOGIA

Adultos e Crianças:

Dose individualizada, SC, dependente da concentração de glicose no sangue e na urina.

► Ajuste de dose:

Insuficiência renal:

| Função Renal | Dose com Insuficiência Renal<br>Clearance de creatinina (ml/min) |                  |
|--------------|------------------------------------------------------------------|------------------|
|              | CICr 10-50 ml/min                                                | CICr<10ml/min    |
| Normal       |                                                                  |                  |
| 100% da dose | 75% da dose                                                      | 25 a 50% da dose |

► ADMINISTRAÇÃO

Subcutânea

Aplicar no abdome, coxas ou deltoide. Revezar locais de aplicação.

► ARMAZENAMENTO

Conservar sob refrigeração, em temperatura entre 2°C e 8°C. Proteger da luz.

INSULINA GLULISINA 1

Hipoglicemiante

Nome comercial:  
Apidra 100UI/mL FA 10mL 1

POSOLOGIA

Adulto:

Dose individualizada de acordo com a necessidade do paciente.

► Ajuste de dose:

Insuficiência renal:

| Função Renal | Dose com Insuficiência Renal<br>Clearance de creatinina (ml/min) |                  |
|--------------|------------------------------------------------------------------|------------------|
|              | CICr 10-50 ml/min                                                | CICr<10ml/min    |
| Normal       |                                                                  |                  |
| 100% da dose | 75% da dose                                                      | 25 a 50% da dose |

► ADMINISTRAÇÃO

Subcutânea e Intravenosa

Intravenosa: 1 UI/mL em sistemas de infusão contendo SF 0,9% e utilizando bolsas de policloreto de vinila.

► ARMAZENAMENTO

Conservar sob refrigeração, em temperatura entre 2°C e 8°C. Proteger da luz e não congelar.

**INSULINA HUMANA NPH <sup>1,2</sup>**

Hipoglicemiante

Nome comercial:

Humulin N 100UI/mL FA 10mL <sup>1,2</sup>Insunorm N 100UI/mL FA 10mL <sup>1,2</sup>Novolin N 100UI/mL FA 10mL <sup>1,2</sup>**POSOLOGIA****Adulto:**

Dose individualizada de acordo com a necessidade do paciente.

▶ **Ajuste de dose:**

Insuficiência renal:

| Função Renal<br>Normal | Dose com Insuficiência Renal<br>Clearance de creatinina (ml/min) |                  |
|------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------|
|                        | ClCr 10-50 ml/min                                                | ClCr<10ml/min    |
| 100% da dose           | 75% da dose                                                      | 25 a 50% da dose |

▶ **ADMINISTRAÇÃO**

Subcutânea

Aplicar na parte superior dos braços, coxas, nádegas ou abdome. Revezar locais de aplicação.

▶ **ARMAZENAMENTO**

Conservar sob refrigeração, em temperatura entre 2°C e 8°C. Proteger da luz e não congelar.

**INSULINA HUMANA REGULAR <sup>1,2</sup>**

Hipoglicemiante

Nome comercial:

Humulin R 100UI/mL FA 10mL <sup>1,2</sup>Insunorm R 100UI/mL FA 10mL <sup>1,2</sup>Novolin R 100UI/mL FA 10mL <sup>1,2</sup>**POSOLOGIA****Adulto:**

Dose individualizada de acordo com a necessidade do paciente.

▶ **Ajuste de dose:**

Insuficiência renal:

| Função Renal Normal | Dose com Insuficiência Renal<br>Clearance de creatinina (ml/min) |                  |
|---------------------|------------------------------------------------------------------|------------------|
|                     | ClCr 10-50 ml/min                                                | ClCr<10ml/min    |
| 100% da dose        | 75% da dose                                                      | 25 a 50% da dose |

▶ **ADMINISTRAÇÃO**

Subcutânea, Intramuscular ou Intravenosa

Subcutânea: aplicar na parte superior dos braços, coxas, nádegas ou abdome. Revezar locais de aplicação.

Intravenosa contínua: diluir 0,05-1 UI/mL em SF, SG 5% ou SG 10%.

▶ **ARMAZENAMENTO**

Conservar sob refrigeração, em temperatura entre 2°C e 8°C. Proteger da luz e não congelar.

- ▶ **Atenção:**  
Alta Vigilância.

INSULINA LISPRO DNA RECOMBINANTE <sup>1,2</sup>

Hipoglicemiante

Nome comercial:  
Humalog 100UI/mL FA 10mL <sup>1,2</sup>

**POSOLOGIA**

**Adulto:**  
Dose individualizada de acordo com a necessidade do paciente.

- ▶ **Ajuste de dose:**  
Insuficiência renal:

| Função Renal<br>Normal | Dose com Insuficiência Renal<br>Clearance de creatinina (ml/min) |                  |
|------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------|
|                        | CICr 10-50 ml/min                                                | CICr<10ml/min    |
| 100% da dose           | 75% da dose                                                      | 25 a 50% da dose |

- ▶ **ADMINISTRAÇÃO**  
Subcutânea  
Aplicar na parte superior dos braços, coxas, nádegas ou abdome. Revezar locais de aplicação.
- ▶ **ARMAZENAMENTO**  
Conservar sob refrigeração, em temperatura entre 2°C e 8°C. Proteger da luz e não congelar.
- ▶ **Atenção:**  
Este medicamento contém látex.

IODIXANOL <sup>1</sup>

Contraste

Nome comercial:  
Visipaque 320 FA 50mL <sup>1 \*</sup>  
Visipaque 320 FA 100mL <sup>1 \*</sup>

**POSOLOGIA**

**Adulto:**  
A critério médico.

- ▶ **ADMINISTRAÇÃO**  
O produto deve ser coletado dentro de uma seringa imediatamente antes do uso. Visipaque deve ser aquecido à temperatura corporal (37°C) antes de sua administração.
- ▶ **ARMAZENAMENTO**  
Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.
- ▶ **Atenção:**  
Alto Custo.  
\* Este medicamento é livre de látex.

## iodo + IODETO DE POTÁSSIO <sup>1</sup>

Outros-Dermatológicos, Otológicos e Oftalmológicos

Nome comercial:

Lugol 2% Fr 50mL com Bico Dosador Manip <sup>1</sup>

Lugol 2% Fr 100mL com Bico Dosador Manip <sup>1</sup>

### POSOLOGIA

#### Adulto:

Duas a três aplicações sobre a área afetada ou a critério médico.

#### ► ADMINISTRAÇÃO

Uso externo

#### ► ARMAZENAMENTO

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

## iodopovidona (sol aquosa) <sup>1,2</sup>

Antisséptico Tópico

Nome comercial:

Riodeine Dermo Suave Tópico 10% Almotolia 100mL <sup>1,2</sup>

Riodeine Tópico Almotolia Dermo Suave 30mL <sup>1</sup>

### POSOLOGIA

#### Adulto:

Espalhar sobre a pele.

#### ► ADMINISTRAÇÃO

Tópico

#### ► ARMAZENAMENTO

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

## iodopovidona (sol com tensoativos) <sup>1,2</sup>

Antisséptico Tópico

Nome comercial:

Riodeine Dermo Suave Degermante Almotolia 100mL <sup>1,2</sup>

Riodeine Dermo Suave Degermante Galão 100mL <sup>1</sup>

Riodeine Degermante Almotolia 30mL <sup>1</sup>

Riodeine Degermante Frasco 1000mL <sup>1</sup>

### POSOLOGIA

#### Adulto:

Espalhar sobre a pele.

#### ► ADMINISTRAÇÃO

Tópico

#### ► ARMAZENAMENTO

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

## iodopovidona (sol hidroalcoólica) <sup>1,2</sup>

Antisséptico Tópico

Nome comercial:

Riodeine Tintura Almotolia 100mL <sup>1,2</sup>

**POSOLOGIA**

**Adulto:**

Espalhar sobre a pele.

▶ **ADMINISTRAÇÃO**

Tópico

▶ **ARMAZENAMENTO**

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

**IOPAMIDOL <sup>1,2</sup>**

Contraste

Nome comercial:

Iopamiron 300 FA 50mL <sup>1,2</sup> \*

Iopamiron 300 FA 100mL <sup>1</sup> \*

**POSOLOGIA**

**Adulto:**

A critério médico.

▶ **ARMAZENAMENTO**

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C. Proteger da luz e raios X.

▶ **Atenção:**

Alto Custo.

\* Este medicamento é livre de látex.

**IOPROMIDA <sup>1</sup>**

Contraste

Nome comercial:

Ultravist 370mg FA 50mL <sup>1</sup> \*

**POSOLOGIA**

**Adulto:**

A critério médico.

▶ **ARMAZENAMENTO**

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C. Proteger da luz e raios X.

▶ **Atenção:**

Alto Custo.

\* Este medicamento é livre de látex.

**IOVERSOL <sup>1,2</sup>**

Contraste

Nome comercial:

Optiray 320 - 68% Ser 100ml <sup>1,2</sup>

Optiray 320 - 68% Ser 125ml <sup>1,2</sup>

Optiray 320 - 68% Ser 75ml <sup>1</sup>

Optiray 350 - 74% Ser 100ml <sup>1,2</sup>

Optiray 350 - 74% Ser 125ml <sup>1,2</sup>

Optiray 350 - 74% Ser 75ml <sup>1</sup>

**POSOLOGIA**

**Adulto:**

A critério médico. O paciente deve estar bem hidratado antes da administração.

## ▶ **ARMAZENAMENTO**

Conservar em temperatura inferior a 30°C. Proteger da luz.

## **IPRATRÓPIO BROMETO** <sup>1,2</sup>

Broncodilatador

Nome comercial:

Atrovent 250mcg/mL Fr 20mL <sup>1,2</sup>

Brometo de Ipratrópio 0,025% Fr 20mL (Biosintética) <sup>1,2</sup>

Brometo de Ipratrópio 0,025% Fr 20mL (Prati Donaduzzi) <sup>1,2</sup>

Brometo de Ipratrópio 0,025% Fr 20mL (EMS) <sup>1,2</sup>

Ipratrópio 0,025% (250mcg/mL) Fr 20mL (Germed) <sup>1,2</sup>

## **POSOLOGIA**

### **Adulto e adolescente (> 12 anos de idade):**

|             |                                             |
|-------------|---------------------------------------------|
| Dose padrão | 2mL (40 gotas = 0,5mg), a cada 8 ou 6 horas |
|-------------|---------------------------------------------|

### **Criança (entre 6 e 12 anos de idade):**

|             |                                              |
|-------------|----------------------------------------------|
| Dose padrão | 1mL (20 gotas = 0,25mg), a cada 8 ou 6 horas |
|-------------|----------------------------------------------|

### **Criança (< 6 anos de idade):**

|             |                                                              |
|-------------|--------------------------------------------------------------|
| Dose padrão | 0,4 a 1mL (8 a 20 gotas = 0,1 a 0,25mg), a cada 8 ou 6 horas |
|-------------|--------------------------------------------------------------|

## ▶ **Ajuste de dose:**

Não é necessário ajuste de dose.

## ▶ **ADMINISTRAÇÃO**

Inalatório

Diluir a dose recomendada em SF até um volume final de 3 a 4mL.

## ▶ **ARMAZENAMENTO**

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

## **IRINOTECANO** <sup>1</sup>

Antineoplásico Citotóxico

Nome comercial:

Camptosar 40mg FA 2mL <sup>1</sup>

Camptosar 100mg FA 5mL <sup>1</sup>

Irinotecano Cloridrato 40mg FA 2mL (Eurofarma) <sup>1</sup>

Irinotecano Cloridrato 40mg FA 2ml (Glenmark) <sup>1</sup>

Irinotecano Cloridrato 100mg FA 5mL (Eurofarma) <sup>1</sup>

Irinotecano Cloridrato 100mg FA 5mL (Glenmark) <sup>1</sup>

Tecnotecan 40mg FA 2mL <sup>1 \*</sup>

Tecnotecan 100mg FA 5mL <sup>1 \*</sup>

Trebyxan 40mg FA 2mL <sup>1</sup>

Trebyxan 100mg FA 5mL <sup>1</sup>

## **POSOLOGIA**

### **Adulto:**

A depender da indicação e esquema quimioterápico.

## ▶ **ADMINISTRAÇÃO**

Preparo na quimioterapia.

## ▶ **ARMAZENAMENTO**



Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.  
 Após diluição, possui estabilidade de 24 horas em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C e em luz ambiente fluorescente.  
 As soluções diluídas em SG 5% possuem estabilidade de 48 horas mantidas em refrigeração entre 2°C e 8°C e protegidas da luz.

- ▶ **Atenção:**  
 Alto Custo.  
 \* Estas apresentações são livres de látex.

ISOCONAZOL <sup>1</sup>

Antifúngico Tópico

Nome comercial:  
 Icaden creme 20g <sup>1</sup>

**POSOLOGIA**

**Adulto:**

|             |                                                   |
|-------------|---------------------------------------------------|
| Dose padrão | 1 aplicação sobre a área afetada, a cada 24 horas |
|-------------|---------------------------------------------------|

- ▶ **Ajuste de dose:**  
 Não é necessário ajuste de dose.
- ▶ **ADMINISTRAÇÃO**  
 Tópico
- ▶ **ARMAZENAMENTO**  
 Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

ISOFLURANO <sup>1</sup>

Anestésico Geral

Nome comercial:  
 Isoforine 1mg Fr 100mL <sup>1</sup>  
 Isoflurano 5mL Dose <sup>1</sup>

**POSOLOGIA**

**Adulto e Criança:**

CAM (concentração alveolar mínima) diminui com a idade, caindo de uma média de 1,28% em O2 em adultos com cerca de 20 anos de idade, para 1,15% em adultos com cerca de 40 anos, e para 1,05% no grupo de pacientes na faixa etária dos 60 anos. A CAM de isoflurano em O2 é de 1,6% para neonatos; 1,87% para crianças entre 1 a 6 meses de vida; e 1,80% para aquelas entre 6 e 12 meses de vida.

- ▶ **Ajuste de dose:**  
 Não é necessário ajuste de dose.
- ▶ **ADMINISTRAÇÃO**  
 Inalatório.
- ▶ **ARMAZENAMENTO**  
 Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.
- ▶ **Atenção:**  
 Receita Branca (2 vias).

ISONIAZIDA <sup>1</sup>

Antimicrobiano Tuberculostático

Nome comercial:  
 Isoniazida 100mg Cap Manip <sup>1</sup>

**POSOLOGIA****Adulto:**

|                    |                                                        |
|--------------------|--------------------------------------------------------|
| Dose padrão        | 300mg, a cada 24 horas                                 |
| Doença disseminada | 10mg/kg, a cada 24 horas ou fracionado a cada 12 horas |

**Criança:**

|             |             |
|-------------|-------------|
| Dose máxima | 10mg/kg/dia |
|-------------|-------------|

▶ **Ajuste de dose:**

Não é necessário ajuste de dose.

▶ **ADMINISTRAÇÃO**

Oral

Ingerir com o estômago vazio pela manhã, em jejum ou 2 horas após as refeições.

▶ **Administração com alimentos:**

Evitar o consumo de álcool.

▶ **Administração via sonda:**

Pode ser administrado via sonda. Triturar e diluir em 10 a 20mL de água, administrando imediatamente.

▶ **ARMAZENAMENTO**

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

▶ **Atenção:**

Receita Branca (2 vias).

**ISOPRENALINA/ISOPROTERENOL <sup>1</sup>**

Estimulante Adrenérgico

Nome comercial:

Isoproterenol 0,2mg Amp 1mL Manip <sup>1</sup>

**POSOLOGIA****Adulto:**

|             |           |
|-------------|-----------|
| Dose padrão | 2mcg/min  |
| Dose máxima | 10mcg/min |

**Criança:**

|             |                                                                                        |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Dose padrão | 0,1 a 2mcg/kg/min (se necessário, aumentar 0,1 mcg/kg/min até obter o efeito desejado) |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|

▶ **Ajuste de dose:**

Não é necessário ajuste de dose.

▶ **ADMINISTRAÇÃO**

Intravenosa, Intramuscular e Subcutânea

IV direta: diluir em 10mL de SF

Infusão intermitente: 0,1mg em 50mL SG 5%.

0,2mg em 100mL SG 5%.

0,5mg em 250mL SG 5%.

Infusão contínua: 1mg em 500mL SG 5%.

2mg em 1000mL SG 5%.

▶ **ARMAZENAMENTO**

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

ISOSSORBIDA DINITRATO <sup>1,2</sup>

Antianginoso e Vasodilatador

Nome comercial:  
Isordil 5mg Cp Sublingual <sup>1,2</sup>

POSOLOGIA

Adulto:

|                                                |                                |
|------------------------------------------------|--------------------------------|
| Profilaxia das crises (angina estável crônica) | 5 a 10mg, a cada 8 ou 12 horas |
| Insuficiência Cardíaca Congestiva Aguda        | 5 a 10mg, a cada 2 horas       |
| Insuficiência Cardíaca Congestiva Crônica      | 5 a 10mg, a cada 2 horas       |

- ▶ **Ajuste de dose:**  
Não é necessário ajuste de dose.
- ▶ **ADMINISTRAÇÃO**  
Oral, Sublingual  
Colocar o comprimido sob a língua e manter até completa dissolução.  
Ingerir 1 hora antes ou 2 horas após as refeições.
- ▶ **ARMAZENAMENTO**  
Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C. Proteger da luz.

ISOSSORBIDA MONONITRATO <sup>1,2</sup>

Antianginoso

Nome comercial:  
Monocordil 40mg Cp <sup>1</sup>  
Monocordil 20mg Cp <sup>1,2</sup>  
Mononitrato de Isossorbida 20mg Cp (Biosintética) <sup>1,2</sup>

POSOLOGIA

Adulto:

|             |                                 |
|-------------|---------------------------------|
| Dose padrão | 20 a 40mg, a cada 8 ou 12 horas |
|-------------|---------------------------------|

- ▶ **Ajuste de dose:**  
Não é necessário ajuste de dose.
- ▶ **ADMINISTRAÇÃO**  
Oral
- ▶ **Administração com alimentos:**  
Evitar o consumo de álcool e não administrar com antiácidos.
- ▶ **Administração via sonda:**  
Pode ser administrado via sonda. Triturar e diluir em 15mL de água, administrando imediatamente.
- ▶ **ARMAZENAMENTO**  
Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C. Proteger da luz.

ISOSSORBIDA MONONITRATO <sup>1</sup>

Antianginoso

Nome comercial:  
Monocordil 5mg Cp Sublingual <sup>1</sup>

**POSOLOGIA****Adulto:**

|             |                         |
|-------------|-------------------------|
| Dose padrão | 5mg, a cada 2 a 3 horas |
|-------------|-------------------------|

▶ **Ajuste de dose:**

Não é necessário ajuste de dose.

▶ **ADMINISTRAÇÃO**

Oral, Sublingual

Colocar o comprimido sob a língua e manter até completa dissolução.

▶ **ARMAZENAMENTO**

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C. Proteger da luz.

**ISOSSORBIDA MONONITRATO <sup>1</sup>**

Antianginoso

Nome comercial:

Coronar 10mg Amp 1ml <sup>1</sup>

**POSOLOGIA****Adulto:**

|                  |                                 |
|------------------|---------------------------------|
| Intravenoso      | 20 a 80mg, a cada 8 ou 12 horas |
| Intracoronária   | 10 a 20mg                       |
| Infusão contínua | 0,8mg/kg                        |

▶ **Ajuste de dose:**

Não é necessário ajuste de dose.

▶ **ADMINISTRAÇÃO**

Intravenosa e Intracoronária

Infusão contínua: 100mL SF/SG 5 % em 2 a 3 horas, a cada 8 ou 12 horas.

▶ **ARMAZENAMENTO**

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

**ITRACONAZOL <sup>1</sup>**

Antifúngico Sistêmico

Nome comercial:

Itraspor 100mg Cap <sup>1</sup>

Sporanox 100mg Cap <sup>1</sup>

**POSOLOGIA****Adulto:**

|                                                   |                                        |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Candidíase vulvovaginal                           | 200mg, a cada 12 horas durante 1 dia   |
| Dermatomicose                                     | 200mg, a cada 24 horas durante 7 dias  |
| Dermatomicose em regiões altamente queratinizadas | 200mg, a cada 12 horas durante 7 dias  |
| Ptíriase versicolor                               | 100mg, a cada 12 horas durante 7 dias  |
| Candidíase oral                                   | 100mg, a cada 24 horas durante 15 dias |
| Ceratite fúngica                                  | 200mg, a cada 24 horas durante 21 dias |

|                                      |                                                                                                                    |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Onicomicose                          | 200mg, a cada 24 horas durante 3 meses                                                                             |
| Aspergilose sistêmica                | 200mg, a cada 24 horas durante 2 a 5 meses                                                                         |
| Candidíase sistêmica                 | 100 a 200mg, a cada 24 horas durante 2 semanas a 7 meses                                                           |
| Criptococose não meningeana          | 200mg, a cada 24 horas durante 2 meses a 1 ano                                                                     |
| Meningite criptocócica               | 200mg, a cada 12 horas durante 2 meses a 1 ano                                                                     |
| Histoplasmose                        | 200mg, a cada 24 horas durante 8 meses                                                                             |
| Blastomicose                         | 100mg, a cada 24 horas durante 6 meses                                                                             |
| Esporotricose linfocutânea e cutânea | 100 ou 200mg, a cada 24 horas (lesões localizadas) ou 200mg, a cada 12 horas (lesões extensas) durante 3 a 6 meses |
| Esporotricose extracutânea           | 200mg, a cada 12 horas durante 12 meses                                                                            |
| Paracoccidioidomicose                | 100mg, a cada 24 horas durante 6 meses                                                                             |
| Cromomicose                          | 200mg, a cada 24 horas durante 6 meses                                                                             |

► **Ajuste de dose:**

Insuficiência renal:

| Dose com Função Renal Normal | Dose Insuficiência Renal<br>clearance de creatinina (mL/min) |                 |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|
|                              | >30                                                          | <30             |
| 100 a 200mg 12/12h           | Sem ajuste                                                   | Não recomendada |

► **ADMINISTRAÇÃO**

Oral

Administrar imediatamente após uma refeição.

► **Administração com alimentos:**

Evitar o consumo de álcool e Erva-de-São-João.

► **Administração via sonda:**

Orientações sobre o uso por vias enterais.

► **ARMAZENAMENTO**

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

## IVABRADINA <sup>1,2</sup>

Outros - Aparelho Cardiovascular

Nome comercial:

Procoralan 5mg Cp Rev <sup>1,2</sup>

### POSOLOGIA

**Adulto:**

|                             |                                                                                   |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Doença arterial coronariana | - Dose inicial: 5mg, a cada 12 horas<br>- Dose manutenção: 7,5mg, a cada 12 horas |
| Insuficiência cardíaca      | - Dose inicial: 5mg, a cada 12 horas<br>- Dose manutenção 7,5mg, a cada 12 horas  |

▶ **Ajuste de dose:**

Não é necessário ajuste de dose.

▶ **ARMAZENAMENTO**

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

**IVERMECTINA** <sup>1,2</sup>

Antiparasitário, Anti-helmíntico

Nome comercial:

Ivermec 6mg Cp <sup>1,2</sup>

Revectina 6mg Cp <sup>1,2</sup>

Ivermectina 6mg Cp <sup>1,2</sup>

Leverctin 6mg Cp <sup>1,2</sup>

**POSOLOGIA****Adulto e Criança (> 5kg):**

|                                                                  |                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Estrongiloidíase, filariose, ascaridíase, escabiose e Pediculose | 15 a 24kg - 3mg<br>25 a 35kg - 6mg<br>36 a 50kg - 9mg<br>51 a 65kg - 12mg<br>66 a 79kg - 15mg<br>> Ou iguais a 80kg - 200mcg/kg |
| Oncocercose                                                      | 15 a 25kg - 3mg<br>26 a 44kg - 6mg<br>45 a 64kg - 9mg<br>65 a 84kg - 12mg<br>> Ou iguais a 85kg - 150mcg/kg                     |

▶ **Ajuste de dose:**

Não é necessário ajuste de dose.

▶ **ADMINISTRAÇÃO**

Oral

▶ **Administração com alimentos:**

Ingerir com água e estômago vazio.

▶ **Administração via sonda:**

Pode ser administrado via sonda. Triturar e diluir em 15mL de água, administrando imediatamente.

▶ **ARMAZENAMENTO**

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

A  
B  
C  
D  
E  
F  
G  
H  
I  
J  
K  
L  
M  
N  
O  
P  
Q  
R  
S  
T  
U  
V  
W  
X  
Y  
Z

I

**LACOSAMINA <sup>1</sup>**

Anticonvulsivante

Nome comercial:

Vimpat 200mg FA 20mL <sup>1</sup>**POSOLOGIA****Adulto:**

|                   |                                                                             |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Monoterapia       | 100mg, a cada 12 horas                                                      |
| Terapia adjuvante | 50mg, a cada 12 horas. Aumentar para 100mg, a cada 12 horas após uma semana |

▶ **Ajuste de dose:**

Insuficiência renal grave: dose máxima de 300mg/dia.

▶ **ADMINISTRAÇÃO**

Intravenosa

Pode ser utilizado sem diluição ou diluída em SF/SG 5% ou solução de Ringer. Administrar durante um período de 15 a 60 minutos.

▶ **ARMAZENAMENTO:**

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

Após diluído, possui estabilidade de 24 horas em temperatura abaixo de 25°C, armazenado em frascos de vidro ou bolsas de PVC.

**LACOSAMINA <sup>1</sup>**

Anticonvulsivante

Nome comercial:

Vimpat Solução Oral 10mg/ml 200ml <sup>1</sup>**POSOLOGIA****Adulto:**

|                           |                                                                                                                     |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Monoterapia               | 100mg, a cada 12 horas                                                                                              |
| Terapia adjuvante         | 50mg, a cada 12 horas. Aumentar para 100mg, a cada 12 horas após uma semana                                         |
| Utilizando dose de ataque | - Dose de ataque: 200mg, seguida por uma dose manutenção após 12 horas<br>- Dose manutenção: 100mg, a cada 12 horas |

▶ **Ajuste de dose:**

Insuficiência renal grave: dose máxima de 300mg/dia.

▶ **ADMINISTRAÇÃO**

VO

Administrar com ou sem alimento.

▶ **ARMAZENAMENTO:**

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

**LACOSAMINA <sup>1</sup>**

Anticonvulsivante

Nome comercial:

Vimpat 50mg Cp Rev <sup>1</sup>**POSOLOGIA****Adulto:**



|                           |                                                                                                                     |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Monoterapia               | 100mg, a cada 12 horas                                                                                              |
| Terapia adjuvante         | 50mg, a cada 12 horas. Aumentar para 100mg, a cada 12 horas após uma semana                                         |
| Utilizando dose de ataque | - Dose de ataque: 200mg, seguida por uma dose manutenção após 12 horas<br>- Dose manutenção: 100mg, a cada 12 horas |

- ▶ **Ajuste de dose:**  
Insuficiência renal grave: dose máxima de 300mg/dia.  
Insuficiência hepática leve a moderada: dose máxima de 300mg/dia.
- ▶ **ADMINISTRAÇÃO**  
VO  
Administrar com ou sem alimento.
- ▶ **ARMAZENAMENTO:**  
Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.
- ▶ **Atenção**  
Receita Branca (2 vias)  
Risco de Queda

LACTITOL <sup>1</sup>

Laxante

Nome comercial:  
Osmolac 10g Pó Sachê <sup>1</sup>

**POSOLOGIA**

**Adulto:**

|             |                      |
|-------------|----------------------|
| Dose padrão | 1 a 4 sachês por dia |
|-------------|----------------------|

- ▶ **Ajuste de dose:**  
Não é necessário ajuste de dose.
- ▶ **ADMINISTRAÇÃO**  
Uso oral  
Diluir o pó em água ou outras bebidas não alcoólicas.
- ▶ **ARMAZENAMENTO:**  
Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

LACTULOSE <sup>1,2</sup>

Laxante

Nome comercial:  
Lactulona 667mg/mL Fr 120mL <sup>1,2</sup>  
Farlac 667mg/mL Fr 120mL <sup>1,2</sup>

**POSOLOGIA**

**Adulto e Criança (> 12 anos de idade):**

|                                                  |                                              |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Constipação intestinal crônica                   | 15 a 30mL/dia                                |
| Encefalopatia hepática, Pré-coma e Coma hepático | 60mL ao dia, podendo chegar até 150mL ao dia |

**Criança:**

Constipação intestinal crônica

- Lactentes: 5mL/dia
- 1 a 5 anos: 5 a 10mL/dia
- 6 a 12 anos: 10 a 15mL/dia

► **Ajuste de dose:**

Não é necessário ajuste de dose.

► **ADMINISTRAÇÃO**

Uso oral

Ingerir pela manhã ou à noite, de forma independente ou com alimentos/bebidas.

► **ARMAZENAMENTO:**

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C. Proteger da luz.

**LAMIVUDINA <sup>1</sup>**

Antiviral

Nome comercial:

Epivir 150mg Cp <sup>1</sup>

Vudirax 150mg Cp Rev <sup>1</sup>

Lamivudina 150mg Cp (Secretaria da Saúde) <sup>1</sup>

**POSOLOGIA**

**Adulto e Criança (pelo menos 25kg):**

Dose padrão

150mg, a cada 12 horas

**Criança (> 3 meses e com peso inferior a 25kg)**

**Criança (pesando de 14 a 20kg):**

Dose padrão

75mg, a cada 12 horas ou 150mg, a cada 24 horas

**Criança (pesando de 20 a menos de 25kg):**

Dose padrão

75mg, pela manhã e 150mg à noite

► **Ajuste de dose:**

Insuficiência renal para pacientes com HIV:

| Dose com Função Renal Normal | Dose Insuficiência Renal |                 |                  |
|------------------------------|--------------------------|-----------------|------------------|
|                              | <5                       | 5-14            | 15-49            |
| 300mg 24/24h                 | 10-35mg 24/24h           | 50-100mg 24/24h | 100-150mg 24/24h |

Insuficiência renal para pacientes com hepatite B:

| Dose com Função Renal Normal | Dose Insuficiência Renal |                |                 |
|------------------------------|--------------------------|----------------|-----------------|
|                              | <5                       | 5-14           | 15-49           |
| 300mg 24/24h                 | 10-35mg 24/24h           | 15-35mg 24/24h | 25-100mg 24/24h |

► **ADMINISTRAÇÃO**

VO

► **Administração com alimentos:**

Ingerir com ou sem alimentos.

► **Administração via sonda:**

Pode ser administrado via sonda. Triturar e diluir em 20mL de água, administrando imediatamente.

- ▶ **ARMAZENAMENTO:**  
Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.
- ▶ **Atenção**  
Receita Branca (2 vias) ou receituário do Programa de DST/AIDS.

LAMOTRIGINA <sup>1,2</sup>

Anticonvulsivante

Nome comercial:  
 Lamictal 25mg Cp <sup>1,2</sup>  
 Lamictal 100mg Cp <sup>1,2</sup>  
 Lamitor 25mg Cp <sup>1,2</sup>  
 Lamotrigina Cp 25mg (Medley) <sup>1,2</sup>  
 Lamitrigina Cp 25mg (Eurofarma) <sup>1,2</sup>  
 Lamotrigina Cp 100mg (Eurofarma) <sup>1,2</sup>

**POSOLOGIA**  
**Adulto e Criança (> 12 anos de idade):**

|                                                     |                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Monoterapia Epilepsia                               | 25mg, a cada 24 horas por 2 semanas, seguida de 50mg, a cada 24 horas por 2 semanas. A partir disso, aumentar a dose para 50 a 100mg, a cada uma ou duas semanas.                  |
| Pacientes que estejam utilizando valproato de sódio | Dose inicial de 25mg em dias alternados, por 2 semanas, seguida por 25mg, a cada 24 horas por 2 semanas. Em seguida, aumentar até um máximo de 25 a 50mg, a cada uma ou 2 semanas. |

- ▶ **Ajuste de dose:**  
Não é necessário ajuste de dose.
- ▶ **ADMINISTRAÇÃO**  
VO
- ▶ **Administração com alimentos:**  
Evitar o consumo de álcool e prímula.
- ▶ **Administração via sonda:**  
Pode ser administrado via sonda. Triturar e diluir em 15mL de água, administrando imediatamente.
- ▶ **ARMAZENAMENTO:**  
Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.
- ▶ **Atenção**  
Receita Branca (2 vias).

L-ARGININA ASPARTATO <sup>1</sup>

Outros – Aparelho Digestivo, Metabolismo e Nutrição

Nome comercial:  
 Reforgan 250mg Cp <sup>1,2</sup>

**POSOLOGIA**  
**Adulto:**

|             |                                                  |
|-------------|--------------------------------------------------|
| Dose padrão | 250mg, a cada 12 horas em séries de 15 a 30 dias |
|-------------|--------------------------------------------------|

- ▶ **Ajuste de dose:**  
Não é necessário ajuste de dose.
- ▶ **ADMINISTRAÇÃO**  
VO

► **ARMAZENAMENTO:**

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

## LATANOPROST <sup>1</sup>

Antiglaucomatoso, Indutor da Miose

Nome comercial:

Xalatan Sol Oft Fr 2,5mL <sup>1</sup>

### POSOLOGIA

#### Adulto e Criança:

Dose padrão

1 gota no(s) olho(s) afetado(s), a cada 24 horas

► **Ajuste de dose:**

Não é necessário ajuste de dose.

► **ADMINISTRAÇÃO**

Tópico

► **ARMAZENAMENTO**

Conservar em refrigeração entre 2°C e 8°C, protegido da luz.

## LEFLUNOMIDA <sup>1</sup>

Antirreumático

Nome comercial:

Arava 20mg Cp <sup>1</sup>

Leflunomida 20mg Cp Rev (Cristália) <sup>1</sup>

### POSOLOGIA

#### Adulto:

Artrite reumatoide

- Dose inicial: 100mg, a cada 24 horas durante 3 dias  
- Dose manutenção: 20mg, a cada 24 horas

Artrite psoriática

- Dose inicial: 100mg, a cada 24 horas durante 3 dias  
- Dose manutenção: 20mg, a cada 24 horas

► **Ajuste de dose:**

Insuficiência renal e/ou hepática: recomenda-se cautela na administração.

► **ADMINISTRAÇÃO**

VO

Ingerir com líquido.

► **ARMAZENAMENTO**

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

## LEVANLODIPINO BENZILATO <sup>1</sup>

Agente Anti-hipertensivo

Nome comercial:

Novanlo 2,5mg Cp <sup>1</sup>

### POSOLOGIA

#### Adulto:

Dose padrão

2,5mg, a cada 24 horas.

Dose máxima

5mg/dia

- ▶ **Ajuste de dose:**  
Não é necessário ajuste de dose.
- ▶ **ADMINISTRAÇÃO**  
VO
- ▶ **ARMAZENAMENTO**  
Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C e protegido da umidade.

**LEVETIRACETAM <sup>1,2</sup>**
Anticonvulsivante

Nome comercial:  
Keppra 250mg Cp Rev <sup>1,2</sup>

**POSOLOGIA**

**Adulto:**

|             |                                                                               |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Dose padrão | 250mg, a cada 12 horas. A dose pode ser aumentada para 500mg, a cada 12 horas |
| Dose máxima | 1500mg, a cada 12 horas                                                       |

**Criança (> 6 anos e peso inferior a 50kg):**

|      |                                                                                |
|------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 20kg | - Dose padrão: 200mg, a cada 12 horas<br>- Dose máxima: 600mg, a cada 12 horas |
| 25kg | - Dose padrão: 250mg, a cada 12 horas<br>- Dose máxima: 750mg, a cada 12 horas |

- ▶ **Ajuste de dose:**  
Insuficiência renal:

| Dose com Função Renal Normal | Dose Insuficiência Renal clearance de creatinina (mL/min) |                            |                           |                           |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 500-1500mg a cada 12 horas   | >80                                                       | 50-80                      | 30-50                     | <30                       |
|                              | 500-1500mg a cada 12 horas                                | 500-1000mg a cada 12 horas | 250-750mg a cada 12 horas | 250-500mg a cada 12 horas |

- ▶ **ADMINISTRAÇÃO**  
VO  
Ingerir com ou sem alimento.
- ▶ **Administração com alimentos:**  
Evitar o consumo de álcool.
- ▶ **Administração via sonda:**  
Pode ser administrado via sonda. Triturar e diluir em 10mL de água, administrando imediatamente.
- ▶ **ARMAZENAMENTO**  
Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°.
- ▶ **Atenção**  
Receita Branca (2 vias).  
Risco de Queda.

**LEVOBUPIVACAÍNA <sup>1,2</sup>**

Anestésico Local

Nome comercial  
Novabupi 0,5% sem Vasoconstritor FA 20mL <sup>1,2</sup> \*

**POSOLOGIA**

**Adulto:**

|                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| Anestesia Epidural para cirurgia  | 10 a 20mL       |
| Anestesia Epidural para cesariana | 20 a 30mL       |
| Nervo Periférico                  | 30mL (0,4mL/kg) |
| Anestesia Oftálmica               | 5 a 15mL        |
| Infiltração Local                 | 60mL            |
| Analgesia de Parto                | 10 a 20mL       |
| Analgesia Pós-Operatória          | 4 a 10mL/h      |

- ▶ **Ajuste de dose:**  
Não é necessário ajuste de dose.
- ▶ **ARMAZENAMENTO**  
Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°. Proteger da luz.
- ▶ **Atenção:**  
\* Este medicamento é livre de látex.

**LEVOBUPIVACAÍNA + EPINEFRINA <sup>1,2</sup>**

Anestésico Local

Nome comercial:  
Novabupi 0,5% com Vasoconstritor FA 20mL <sup>1,2</sup> \*

**POSOLOGIA**

**Adulto:**

|                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| Anestesia Epidural para cirurgia  | 10 a 20mL       |
| Anestesia Epidural para cesariana | 20 a 30mL       |
| Nervo Periférico                  | 30mL (0,4mL/kg) |
| Anestesia Oftálmica               | 5 a 15mL        |
| Infiltração Local                 | 60mL            |
| Analgesia de Parto                | 10 a 20mL       |
| Analgesia Pós-Operatória          | 4 a 10mL/h      |

- ▶ **Ajuste de dose:**  
Não é necessário ajuste de dose.

- ▶ **ARMAZENAMENTO**  
Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°. Proteger da luz.
- ▶ **Atenção:**  
\* Este medicamento é livre de látex.

**LEVODOPA + BENSERAZIDA <sup>1,2</sup>**
Antiparkinsoniano

Nome comercial:  
 Prolopa 200mg/50mg Cp <sup>1</sup>  
 Prolopa Hbs 100/25mg Cap Lib Prolongada <sup>1,2</sup>  
 Prolopa Bd 100mg/25mg Cp Birranhurado <sup>1,2</sup>  
 Prolopa 100mg/25mg Cp Dispersível <sup>1</sup>

**POSOLOGIA**  
**Adulto:**

|                 |                                                                         |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Dose padrão     | ½ comprimido Bd ou ¼ de comprimido de Prolopa 250mg, a cada 6 a 8 horas |
| Dose manutenção | 1 comprimido Bd ou ½ comprimido de Prolopa 250mg, a cada 4 a 8 horas    |

- ▶ **Ajuste de dose:**  
Não é necessário ajuste de dose.
- ▶ **ADMINISTRAÇÃO**  
VO  
Administrar no mínimo 30 minutos antes ou 1 hora após as refeições.
- ▶ **Administração com alimentos:**  
Evitar refeições hiperproteicas.
- ▶ **Administração via sonda:**  
Pode ser administrado via sonda (apenas o comprimido dispersível). Dispersar em 25 a 50mL e administrar imediatamente.
- ▶ **ARMAZENAMENTO**  
Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°.
- ▶ **Atenção**  
Risco de Queda

**LEVOFLOXACINO <sup>1,2</sup>**
Antimicrobiano Quinolona

Nome comercial:  
 Levofloxacinó 500mg Cp Rev (EMS) <sup>1,2</sup>  
 Levofloxacinó 500mg Cp Ver (Medley) <sup>1,2</sup>  
 Levofloxacinó 500mg Cp Rev (Germed) <sup>1,2</sup>  
 Levaquin 500mg Cp Rev <sup>1,2</sup>  
 Levotac 500mg Bolsa 100ml <sup>1,2</sup>  
 Levaflox 750mg (5mg/ml) Bolsa 150ml <sup>1</sup>

**POSOLOGIA**  
**Adulto:**

|             |                                 |
|-------------|---------------------------------|
| Dose padrão | 500mg ou 750mg, a cada 24 horas |
|-------------|---------------------------------|

- ▶ **Ajuste de dose:**  
Insuficiência renal: Pode ser necessário ajuste de dose, monitorar.

► **ADMINISTRAÇÃO**

VO, Intravenoso

Ingerir com ou sem alimentos.

► **Administração via sonda:**

Apresentação oral pode ser administrado via sonda. Triturar e diluir em 15mL de água, administrando imediatamente.

► **ARMAZENAMENTO**

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°. Proteger da luz e umidade.

► **Atenção**

Receita Branca (2 vias).

## LEVOMEPRIMAZINA <sup>1,2</sup>

Antipsicótico, Neuroléptico

Nome comercial:

Neozine 4% Gts Fr 20mL (40mg/40gts/mL) <sup>1,2</sup>

### POSOLOGIA

#### Adulto:

|                                                 |                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Psiquiatria                                     | 25 a 50mg, a cada 12 ou 6 horas. Aumentar a dose de maneira lenta e progressiva até atingir 150 a 250mg.                     |
| Terapia adjuvante da dor em pacientes terminais | 50mg, a cada 12 ou 6 horas. Aumentar, se necessário, até 300 ou 500mg. Em seguida reduzir progressivamente até 50 a 75mg/dia |

#### Criança (2 a 15 anos de idade):

|             |                             |
|-------------|-----------------------------|
| Dose padrão | 0,1 a 0,2 mg/kg em 24 horas |
|-------------|-----------------------------|

► **Ajuste de dose:**

Não é necessário ajuste de dose.

► **ADMINISTRAÇÃO**

VO

Diluir em água açucarada e nunca administrar diretamente sobre a língua.

► **ARMAZENAMENTO**

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°. Proteger da luz.

► **Atenção**

Receita Branca (2 vias).

Risco de Queda.

## LEVORNOGESTREL <sup>1,2</sup>

Hormônio Estrogênico

Nome comercial:

Mirena 52mg – Endoceptivo (DIU) <sup>1,2</sup>

### POSOLOGIA

#### Mulheres adultas:

|             |                                                |
|-------------|------------------------------------------------|
| Dose padrão | Uma unidade na cavidade uterina, a cada 5 anos |
|-------------|------------------------------------------------|

► **Ajuste de dose:**

Não é necessário ajuste de dose.



- ▶ **ADMINISTRAÇÃO**  
Intrauterina  
Inserir na cavidade uterina no período de 7 dias após o início da menstruação.
- ▶ **ARMAZENAMENTO**  
Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°. Proteger da luz solar direta e umidade.

**LEVOSIMENDANA <sup>1</sup>**
Cardiotônicos

Nome comercial:  
Simdax 12,5mg (2,5mg/mL) FA 5mL <sup>1\*</sup>

**POSOLOGIA**

**Adulto:**

- |             |                                                                                      |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Dose padrão | 6 a 12mcg/kg infundida por 10 minutos, seguida de infusão contínua de 0,1 mcg/kg/min |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
- ▶ **Ajuste de dose:**  
Não é necessário ajuste de dose.
  - ▶ **ADMINISTRAÇÃO**  
Intravenosa  
Diluir: 2,5mg em 50mL SG 5%  
5mg em 100mL SG 5%  
11mg em 250mL SG 5%  
25mg em 500mL SG 5%
  - ▶ **ARMAZENAMENTO**  
Conservar em refrigeração entre 2°C e 8°C. Não congelar.
  - ▶ **Atenção**  
Alto Custo.  
\* Este medicamento é livre de látex.

**LEVOTIROXINA <sup>1,2</sup>**
Hormônio Tireoidiano

Nome comercial:  
Euthyrox 25mcg Cp <sup>1,2</sup>  
Euthyrox 88mcg Cp <sup>1,2</sup>  
Euthyrox 100mcg Cp <sup>1,2</sup>  
Euthyrox 175mcg Cp <sup>1</sup>  
Puran T4 12,5mcg Cp <sup>1</sup>  
Puran T4 25mcg Cp <sup>1,2</sup>  
Puran T4 88mcg Cp <sup>1,2</sup>  
Puran T4 100mcg Cp <sup>1,2</sup>  
Synthroid 25mcg Cp <sup>1,2</sup>  
Synthroid 88mcg Cp <sup>1,2</sup>  
Synthroid 100mcg Cp <sup>1</sup>  
Synthroid 112mcg Cp <sup>1</sup>  
Levotiroxina Cp 100mcg <sup>1,2</sup>  
Levotiroxina Cp 112mcg <sup>1</sup>

**POSOLOGIA**

**Adulto:**

|                  |                                                                                                             |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hipotireoidismo  | - Dose inicial: 50mcg/dia, aumentando 25mcg a cada 2 ou 3 semanas<br>- Dose manutenção: 75 a 125mcg diários |
| Supressão do TSH | 2,6mcg/kg/dia durante 7 a 10 dias                                                                           |

**Criança:**

|               |                                                                |
|---------------|----------------------------------------------------------------|
| Recém-nascido | 5 a 6 mcg/kg/dia em função da dosagem de hormônios circulantes |
| Criança       | 3 mcg/kg/dia                                                   |

▶ **Ajuste de dose:**

Não é necessário ajuste de dose.

▶ **ADMINISTRAÇÃO**

VO

Ingerir com líquido e preferencialmente em jejum.

▶ **Administração com alimentos:**

Evitar ingestão de farinha de soja, refeição com óleo de algodão, nozes e fibras dietéticas.

▶ **Administração via sonda:**

Pode ser administrado via sonda. Triturar e diluir em 15mL de água, administrando imediatamente.

▶ **ARMAZENAMENTO**

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°. Proteger da luz e umidade.

**LEVOTIROXINA <sup>1</sup>**

Hormônio Tireoidiano

Nome comercial:

Levotiroxina 100mcg FA <sup>1</sup>

**POSOLOGIA****Adulto:**

|                  |                                                                      |
|------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Dose padrão      | 50 a 100mcg/dia. Se necessário aumentar 25mcg a cada 2 ou 3 semanas. |
| Hipotireoidismos | < 25mcg/dia                                                          |
| Dose máxima      | 200mcg/dia                                                           |

▶ **Ajuste de dose:**

Não é necessário ajuste de dose.

▶ **ADMINISTRAÇÃO**

Intravenosa e Intramuscular

Intravenosa: administrar em 60 a 90 minutos.

▶ **ARMAZENAMENTO**

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°.

**LIDOCAÍNA <sup>1,2</sup>**

Anestésico Local

Nome comercial:

Cloridrato de Lidocaína 2% sem Vasoconstritor FA 20mL <sup>1,2</sup>

Xylestesin 1% sem Vasoconstritor FA 20mL <sup>1,2 \*</sup>

Xylestesin 2% sem Vasoconstritor FA 20mL <sup>1,2 \*</sup>

Xylestesin 2% Isobárica Amp 5mL <sup>1,2</sup>

Xylestesin 2% sem Vasoconstritor Carpule FA 1,8mL <sup>1,2</sup>

**POSOLOGIA****Adulto:**

|                              |                                                                                |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Injeção Intravenosa Direta   | 1 a 1,5 mg/kg, podendo repetir em intervalos de 8 a 10 minutos                 |
| Infusão Intravenosa Contínua | Após injeção direta, segue-se com infusão intravenosa contínua de 1 a 4 mg/min |
| Injeção Intramuscular        | 4 mg/kg                                                                        |

**Criança:**  
Dose individualizada.

- ▶ **Ajuste de dose:**  
Não é necessário ajuste de dose.
- ▶ **ADMINISTRAÇÃO**  
Intravenosa e Intramuscular  
Intravenosa contínua: diluir a dose em SF/SG 5%, na concentração máxima de 2mg/ mL e infundir em 1 a 4 mg/min para adultos, e 20 a 50mcg/kg/min para crianças.
- ▶ **ARMAZENAMENTO**  
Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°. Proteger da luz.
- ▶ **Atenção:**  
\* Esta apresentação é livre de látex.

LIDOCAÍNA <sup>1,2</sup>

Anestésico Tópico

Nome comercial:  
 Xylocaína 2% Geleia Bis 30g <sup>1</sup>  
 Xylestesin 2% Geleia Bis 30g <sup>1</sup>  
 Xylestesin 2% Geleia Ser 10g <sup>1,2</sup>  
 Dermomax 40mg/g Creme Bis 5g <sup>1,2</sup>  
 Xyloproct Pomada Bis 25g <sup>1</sup>  
 Lidocaína 40mg/g Creme Bis 5g Manip <sup>1,2</sup>

**POSOLOGIA**

Adulto:

|             |                                                                      |
|-------------|----------------------------------------------------------------------|
| Dose padrão | Aplicar uma camada espessa sobre a pele intacta ou ao redor do corte |
|-------------|----------------------------------------------------------------------|

**Criança:**

|                 |                                             |
|-----------------|---------------------------------------------|
| Menos de 10kg   | Não deverá cobrir uma área maior que 100cm² |
| Entre 10 a 20kg | Não deverá cobrir uma área maior que 200cm² |

- ▶ **Ajuste de dose:**  
Não é necessário ajuste de dose.
- ▶ **ADMINISTRAÇÃO**  
Tópico
- ▶ **ARMAZENAMENTO**  
Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°. Proteger da luz e umidade.

**LIDOCAÍNA** <sup>1,2</sup>

Anestésico Tópico

Nome comercial:

Xylestesin 10% Spray Fr 50mL <sup>1,2</sup>**POSOLOGIA****Adulto:**

|                        |                                              |
|------------------------|----------------------------------------------|
| Odontologia            | 1 a 5 aplicações                             |
| Otorrinolaringologia   | 3 aplicações para punção da cavidade maxilar |
| Durante o parto        | Até 20 aplicações                            |
| Durante instrumentação | Até 20 aplicações                            |

▶ **Ajuste de dose:**

Não é necessário ajuste de dose.

▶ **ADMINISTRAÇÃO**

Tópico

Secar o local antes da aplicação.

▶ **ARMAZENAMENTO**

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°.

**LIDOCAÍNA** <sup>1</sup>

Anestésico Tópico

Nome comercial:

Toperma 5% Patch Env 5 Adv Transdérmico 50mg/g <sup>1</sup>**POSOLOGIA****Adulto e Criança:**

Dose padrão

1 emplastro na área dolorida, a cada 24 horas

▶ **Ajuste de dose:**

Insuficiência renal: Pode ser necessário ajuste de dose, monitorar.

Insuficiência hepática: Pode ser necessário ajuste de dose, monitorar.

▶ **ADMINISTRAÇÃO**

Tópico

Aplicar na pele intacta, seca e não irritada. Deve ser utilizado por no máximo 12 horas.

▶ **ARMAZENAMENTO**

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°.

**LIDOCAÍNA + EPINEFRINA** <sup>1,2</sup>

Anestésico Local

Nome comercial:

Xylestesin 2% com Epinefrina FA 20mL <sup>1,2 \*</sup>**POSOLOGIA****Adulto e Criança:**

A critério médico.

**Criança:**

Dose padrão: utilizar nas concentrações de 0,5 a 1% para diminuir a possibilidade de toxicidade, não repetir em 2 horas.

- ▶ **ADMINISTRAÇÃO**  
Intravenosa e Peridural
- ▶ **ARMAZENAMENTO**  
Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°.
- ▶ **Atenção:**  
\* Este medicamento é livre de látex.

LIDOCAÍNA + NOREPINEFRINA <sup>1,2</sup>

Anestésico Local

Nome comercial:  
Xylestesin 2% com Norepinefrina Carpule FA 1,8mL <sup>1,2</sup>

**POSOLOGIA**

**Adulto:**  
Dose padrão: de acordo com a necessidade do paciente, via peridural, a critério médico.

- ▶ **ARMAZENAMENTO**  
Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

LINAGLIPTINA <sup>1</sup>

Hipoglicemiante

Nome comercial:  
Trayenta 5mg Cp Rev <sup>1</sup>

**POSOLOGIA**

**Adulto:**

|             |                      |
|-------------|----------------------|
| Dose padrão | 5mg, a cada 24 horas |
|-------------|----------------------|

- ▶ **Ajuste de dose:**  
Não é necessário ajuste de dose.
- ▶ **ADMINISTRAÇÃO**  
VO  
Ingerir com ou sem alimento. Ingerir a qualquer hora do dia.
- ▶ **ARMAZENAMENTO**  
Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

LINEZOLIDA <sup>1</sup>

Antimicrobiano Oxazolidinona

Nome comercial:  
Zyvox 600mg Cp Rev <sup>1</sup>  
Adiloz 600mg Cp Rev <sup>1</sup>

**POSOLOGIA**

**Adulto e Adolescente (12 anos ou mais):**

|                                               |                                             |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Infecções complicadas de pele e tecidos moles | 600mg, a cada 12 horas durante 10 a 14 dias |
| Pneumonia                                     | 600mg, a cada 12 horas durante 10 a 14 dias |

|                                                                                      |                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Infecções enterocócicas resistentes a vancomicina, incluindo bacteremia concomitante | 600mg, a cada 12 horas durante 14 a 28 dias |
| Infecções não complicadas de pele e tecidos moles                                    | 600mg, a cada 12 horas durante 10 a 14 dias |

**Criança:**

|                                                                                      |                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Infecções complicadas de pele e tecidos moles                                        | 10mg/kg, a cada 8 horas durante 10 a 14 dias                                                                             |
| Pneumonia                                                                            | 10mg/kg, a cada 8 horas durante 10 a 14 dias                                                                             |
| Infecções enterocócicas resistentes à vancomicina, incluindo bacteremia concomitante | 10mg/kg, a cada 8 horas durante 14 a 28 dias                                                                             |
| Infecções não complicadas de pele e tecidos moles                                    | - < 5 anos: 10mg/kg, a cada 8 horas durante 10 a 14 dias<br>- 5 a 11 anos: 10mg/kg, a cada 12 horas durante 10 a 14 dias |

▶ **Ajuste de dose:**

Não é necessário ajuste de dose.

▶ **ADMINISTRAÇÃO**

VO

▶ **Administração com alimentos:**

Evitar o consumo de álcool, cafeína, fenilalanina, tirosina ou triptofano.

▶ **Administração via sonda:**

Pode ser administrado via sonda. Triturar e diluir em 20mL de água, administrando imediatamente.

▶ **ARMAZENAMENTO**

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C. Proteger da luz.

▶ **Atenção**

Receita Branca (2 vias).

**LINEZOLIDA** <sup>1,2</sup>

Antimicrobiano Oxazolidinona

Nome comercial:

Zyvox 600mg Bolsa 300mL <sup>1,2</sup>

Linezolida 600mg Bolsa 300mL (Eurofarma) <sup>1,2</sup>

**POSOLOGIA****Adulto e Adolescente (12 anos ou mais):**

|                                                                                      |                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Infecções complicadas de pele e tecidos moles                                        | 600mg, a cada 12 horas durante 10 a 14 dias |
| Pneumonia                                                                            | 600mg, a cada 12 horas durante 10 a 14 dias |
| Infecções enterocócicas resistentes a vancomicina, incluindo bacteremia concomitante | 600mg, a cada 12 horas durante 14 a 28 dias |
| Infecções não complicadas de pele e tecidos moles                                    | 600mg, a cada 12 horas durante 10 a 14 dias |

**Criança:**

|                                                                                      |                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Infecções complicadas de pele e tecidos moles                                        | 10mg/kg, a cada 8 horas durante 10 a 14 dias                                                                             |
| Pneumonia                                                                            | 10mg/kg, a cada 8 horas durante 10 a 14 dias                                                                             |
| Infecções enterocócicas resistentes à vancomicina, incluindo bacteremia concomitante | 10mg/kg, a cada 8 horas durante 14 a 28 dias                                                                             |
| Infecções não complicadas de pele e tecidos moles                                    | - < 5 anos: 10mg/kg, a cada 8 horas durante 10 a 14 dias<br>- 5 a 11 anos: 10mg/kg, a cada 12 horas durante 10 a 14 dias |

- ▶ **Ajuste de dose:**  
Insuficiência hepática: administrar com cautela.
- ▶ **ADMINISTRAÇÃO**  
Intravenosa
- ▶ **ARMAZENAMENTO**  
Conservar em temperatura ambiente abaixo de 25°C.
- ▶ **Atenção**  
Alto Custo.  
Receita Branca (2 vias).

**LIPASE + PROTEASE + AMILASE <sup>1</sup>**

Digestivo

Nome comercial:  
Creon 10.000UI Cap <sup>1</sup>  
Creon 25.000UI Cap <sup>1</sup>

**POSOLOGIA**

**Adulto e Criança (> 4 anos de idade):**

|                 |                                    |
|-----------------|------------------------------------|
| Fibrose Cística | 500 unidades de lipase/kg/refeição |
|-----------------|------------------------------------|

**Criança (< 4 anos de idade):**

|                 |                                     |
|-----------------|-------------------------------------|
| Fibrose Cística | 1000 unidades de lipase/kg/refeição |
|-----------------|-------------------------------------|

- ▶ **Ajuste de dose:**  
Não é necessário ajuste de dose.
- ▶ **ADMINISTRAÇÃO**  
VO  
Administrar com alimentos.
- ▶ **Administração via sonda:**  
Pode ser administrado via sonda. Dispersar em 15mL de água e administrar imediatamente.
- ▶ **ARMAZENAMENTO**  
Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

**LIPEGFILGRASTIM <sup>1</sup>**

Estimulante da Formação de Células Sanguíneas

Nome comercial:

Lonquex 6mg Ser 0,6mL <sup>1</sup>**POSOLOGIA****Adulto:**

Dose padrão

6mg, uma vez por ciclo quimioterápico. Administrar 24 horas após a quimioterapia citotóxica.

▶ **Ajuste de dose:**

Não é necessário ajuste de dose.

▶ **ADMINISTRAÇÃO**

Subcutânea

▶ **ARMAZENAMENTO**

Conservar em refrigeração entre 2°C e 8°C. Não congelar.

▶ **Atenção**

Alto custo.

**LIRAGLUTIDA <sup>1</sup>**

Hipoglicemiantes

Nome comercial:

Victoza 6mg/mL Caneta injetora com cartucho 3mL <sup>1</sup>**POSOLOGIA****Adulto e Criança:**

Dose padrão

0,6mg/dia. Após pelo menos uma semana, a dose deve ser aumentada para 1,2mg.

▶ **Ajuste de dose:**

Não é necessário ajuste de dose.

▶ **ADMINISTRAÇÃO**

Subcutânea

Aplicar no abdome, coxa ou parte superior do braço. Injetar, preferencialmente, no mesmo horário.

▶ **ARMAZENAMENTO**

Conservar em refrigeração entre 2°C e 8°C.

**LIPÍDEOS <sup>1</sup>**

Alimentação e Reposição Hidroeletrólítica

Nome comercial:

Emulsão de Lipídeos 10% Fr 500mL <sup>1</sup>Smoflipid 20% Fr 100mL <sup>1</sup>Smoflipid 20% Fr 500mL <sup>1</sup>**POSOLOGIA****Adulto e Criança:**

A critério médico.

▶ **ARMAZENAMENTO**

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.



LISINOPRIL <sup>1</sup>

Agente Anti-hipertensivo

Nome comercial:  
Lisinopril 10mg Cp (EMS) <sup>1</sup>  
Lisinopril 10mg Cp (Medley) <sup>1</sup>  
Zestril 10mg Cp <sup>1</sup>

POSOLOGIA

Adulto:

|                                                  |                                                                      |            |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------|
| Hipertensão                                      | - Dose inicial: 10mg, a cada 24 horas<br>- Dose manutenção: 20mg/dia |            |
| ▶ <b>Ajuste de dose:</b><br>Insuficiência renal: |                                                                      |            |
| Dose com Função Renal Normal                     | Dose Insuficiência Renal<br>clearance de creatinina (mL/min)         |            |
|                                                  | >30                                                                  | 10-30      |
| 10mg 24/24h                                      | 10mg 24/24h                                                          | 5mg 24/24h |

- ▶ **ADMINISTRAÇÃO**  
VO  
Ingerir com ou sem alimentos.
- ▶ **Administração com alimentos:**  
Evitar ingestão de substitutos do sal que contém potássio, angélica chinesa e alho.
- ▶ **Administração via sonda:**  
Pode ser administrado via sonda. Triturar e diluir em 15mL de água, administrando imediatamente.
- ▶ **ARMAZENAMENTO**  
Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

LITIO CARBONATO <sup>1</sup>

Antidepressivo

Nome comercial:  
Carbolitium 300mg Cp Rev <sup>1</sup>

POSOLOGIA

Adulto:

|                                                                    |                                                                                                                                                                                           |  |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Dose padrão                                                        | 300 a 600mg, a cada 8 horas, variando a posologia com ajuste semanal, dependendo dos níveis plasmáticos.<br>A dose deve ser ajustada para manter a concentração sérica entre 0,5 a 1mEq/L |  |
| Potencializador de Antidepressivos em Episódio Depressivo Unipolar | 600 a 900mg, a cada 12 ou 8 horas                                                                                                                                                         |  |

- ▶ **Ajuste de dose:**  
Insuficiência renal:

| Dose com Função Renal Normal | Dose Insuficiência Renal<br>clearance de creatinina (mL/min) |                |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------|
|                              | 10-50                                                        | < 10           |
| 500mg                        | 50-75% da dose                                               | 25-50% da dose |

► **ADMINISTRAÇÃO**

VO

Ingerir após as refeições.

► **Administração com alimentos:**

Evitar o consumo de álcool e cafeína.

► **Administração via sonda:**

Pode ser administrado via sonda. Triturar e diluir em 20mL de água, administrando imediatamente.

► **ARMAZENAMENTO**

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

► **Atenção**

Receita Branca (2 vias).

## LOPERAMIDA <sup>1,2</sup>

Antidiarreico e Adsorvente

Nome comercial:

Imosec 2mg Cp <sup>1,2</sup>

### POSOLOGIA

#### Adulto:

|                  |                                                                                             |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Diarreia aguda   | 4mg, após os primeiros sintomas de diarreia, com doses de 2mg após cada espasmo subsequente |
| Diarreia crônica | 4mg, com dose ajustada até que 1 a 2 evacuações sólidas sejam obtidas ao dia                |

► **Ajuste de dose:**

Insuficiência hepática: Pode ser necessário ajuste de dose, monitorar.

► **ADMINISTRAÇÃO**

VO

Ingerir com líquido.

► **Administração via sonda:**

Pode ser administrado via sonda. Triturar e diluir em 20mL de água, administrando imediatamente.

► **ARMAZENAMENTO**

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

## LORATADINA <sup>1,2</sup>

Anti-histamínico H1

Nome comercial:

Claritin 10mg Cp <sup>1,2</sup>

Desalex 5mg Cp Rev <sup>1</sup>

Claritin 10mg Cp <sup>1,2</sup>

### POSOLOGIA

#### Adulto e Criança (>12 anos de idade):

|             |                       |
|-------------|-----------------------|
| Dose padrão | 10mg, a cada 24 horas |
|-------------|-----------------------|

- ▶ **Ajuste de dose:**  
Insuficiência renal:

| Dose com Função Renal Normal | Dose Insuficiência Renal<br>clearance de creatinina (mL/min) |             |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------|
|                              | >30                                                          | <30         |
| 10mg 24/24h                  | 10mg 24/24h                                                  | 10mg 48/48h |

Insuficiência hepática: Administrar com cautela.

- ▶ **ADMINISTRAÇÃO**  
VO
- ▶ **Administração com alimentos:**  
Evitar o consumo de álcool e Erva-de-São-João.
- ▶ **Administração via sonda:**  
Pode ser administrado via sonda. Triturar e dispersar em 15mL de água, após dissolução administrar imediatamente.
- ▶ **ARMAZENAMENTO**  
Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

LORAZEPAM<sup>1,2</sup>

Ansiolítico

Nome comercial:  
Lorax 1mg Cp<sup>1,2</sup>  
Lorazepam 1mg Cap Manip (Fórmula & Ação)<sup>1,2</sup>  
Lorazepam 1mg Cap Manip (Formularium)<sup>1,2</sup>

**POSOLOGIA**

**Adulto:**

|                                                     |                                                                            |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Ansiedade                                           | 2 a 3mg, em doses divididas                                                |
| Insônia devido à ansiedade ou distúrbio situacional | 1 a 2mg em uma única dose                                                  |
| Medicação pré-operatória                            | 2 a 4mg na noite anterior à cirurgia ou a duas horas antes do procedimento |

- ▶ **Ajuste de dose:**  
Não é necessário ajuste de dose.
- ▶ **ADMINISTRAÇÃO**  
VO
- ▶ **Administração com alimentos:**  
Evitar o consumo de álcool.
- ▶ **Administração via sonda:**  
Pode ser administrado via sonda. Triturar e dispersar em 15mL de água, após dissolução administrar imediatamente.
- ▶ **ARMAZENAMENTO**  
Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.
- ▶ **Atenção**  
Receita Azul.

**LOSARTANA** <sup>1,2</sup>

Agente Anti-hipertensivo

Nome comercial:

Aradois 25mg Cp Rev <sup>1,2</sup>Aradois 50mg Cp Rev <sup>1,2</sup>Cozaar Cp Rev 50mg <sup>1,2</sup>Corus 50mg Cp Rev <sup>1,2</sup>Losartana Potássica 50mg Cp Rev (Prati Donaduzzi) <sup>1,2</sup>Losartana Potássica 50mg Cp Rev (Medley) <sup>1,2</sup>Losartana Potássica 50mg Cp ver (EMS) <sup>1,2</sup>**POSOLOGIA****Adulto:**

|                                                               |                                           |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Hipertensão                                                   | 50 a 100mg (dose máxima), a cada 24 horas |
| Hipertensão com hipertrofia ventricular esquerda              | 50mg, a cada 24 horas                     |
| Insuficiência cardíaca                                        | 12,5mg, a cada 24 horas                   |
| Proteção renal em pacientes com diabetes tipo 2 e Proteinúria | 50mg, a cada 24 horas                     |

▶ **Ajuste de dose:**

Não é necessário ajuste de dose.

▶ **ADMINISTRAÇÃO**

VO

▶ **Administração com alimentos:**

Evitar o consumo de Erva-de-São-João.

▶ **Administração via sonda:**

Pode ser administrado via sonda. Triturar e dispersar em 15mL de água, após dissolução administrar imediatamente.

▶ **ARMAZENAMENTO**

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

A  
B  
C  
D  
E  
F  
G  
H  
I  
J  
K  
L  
M  
N  
O  
P  
Q  
R  
S  
T  
U  
V  
W  
X  
Y  
Z

L

## MACROGOL 3350 + CLORETO SÓDIO + BICARBONATO SÓDIO + POTÁSSIO CLORETO <sup>1,2</sup>

Laxante

Nome comercial:  
Muvinalax 14g Sachê <sup>1,2</sup>

### POSOLOGIA

#### Adulto:

|             |                               |
|-------------|-------------------------------|
| Dose padrão | 1 a 2 sachês, a cada 24 horas |
|-------------|-------------------------------|

#### Criança (acima de 2 anos):

|             |              |
|-------------|--------------|
| Dose padrão | 0,8 g/kg/dia |
|-------------|--------------|

#### ► Ajuste de dose:

Não é necessário ajuste de dose.

#### ► ADMINISTRAÇÃO

VO

Diluir em 125mL de água e ingerir preferencialmente pela manhã.

#### ► Administração via sonda:

Pode ser administrado via sonda. Diluir em 125mL de água e administrar imediatamente.

#### ► ARMAZENAMENTO

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

## MAGNÉSIO SULFATO <sup>1</sup>

Eletrólito, Diluente

Nome comercial:  
Magnoston 10% (100mg/mL) Amp 10mL <sup>1</sup>  
Sulfato de Magnésio 10% Amp Polietileno 10mL <sup>1</sup>  
Sulfato de Magnésio 10% Amp 10mL Manip <sup>1</sup>  
Sulfato de Magnésio 10% Amp 10mL (Samtec) <sup>1</sup>

### POSOLOGIA

#### Adulto e Criança:

|                                                 |                                                                                                    |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anticonvulsivante na<br>eclâmpsia/pré-eclâmpsia | 4g de sulfato de magnésio IV e, a seguir, dose<br>manutenção de 2g de sulfato de magnésio por hora |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Restaurador de eletrólitos |  |
|----------------------------|--|

|  |                                                                                                                                                                                      |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | - Deficiência leve: 1g de sulfato de magnésio IM, a<br>cada 6 horas em 4 doses diárias<br>- Deficiência severa: 250mg/kg/dia IM ou 5g de<br>sulfato de magnésio IV lento por 3 horas |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### ► Ajuste de dose:

Insuficiência renal: Administrar com extrema cautela. Em caso de ClCr < 25 mL/min, não deve ser administrado e os níveis de magnésio devem ser monitorados rigorosamente.

#### ► ADMINISTRAÇÃO

Intravenosa e Intramuscular

Intravenosa intermitente: até 1000mg em 100mL SF/SG 5%, 25 minutos.

até 2500mg em 500mL SF/SG 5%, 30 a 60 minutos.

até 5000mg em 500mL SF/SG 5%, 120 minutos.

#### ► ARMAZENAMENTO

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

# MAGNÉSIO SULFATO <sup>1</sup>

Eletrólito Oral

Nome comercial:  
Sulfato de Magnésio 650mg (130 mg de Magnésio Elementar) Flaconete Manip <sup>1</sup>

**POSOLOGIA**

**Adulto:**

|             |                |
|-------------|----------------|
| Dose padrão | 2 flac por dia |
|-------------|----------------|

**Criança:**

|             |                |
|-------------|----------------|
| Dose padrão | 1 flac por dia |
|-------------|----------------|

- ▶ **Ajuste de dose:**  
Não é necessário ajuste de dose.
- ▶ **ADMINISTRAÇÃO**  
VO
- ▶ **ARMAZENAMENTO**  
Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

# MAGNESIO SULFATO <sup>1</sup>

Eletrólito Oral

Nome comercial:  
Sulfato de Magnésio 500mg Cap. Manip <sup>1</sup>

**POSOLOGIA**

**Adulto:**  
A critério médico.

- ▶ **ARMAZENAMENTO**  
Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

# MANITOL <sup>1,2</sup>

Diurético

Nome comercial:  
Manitol 20% Fr 250mL(Baxter) <sup>1,2</sup>  
Manitol 20% Fr 250ml (Bbraun) <sup>1,2</sup>  
Manitol 20% Fr 250mL(Fresenius Kabi) <sup>1,2</sup>  
Manitol 20% Fr 250ml (Jp) <sup>1,2</sup>

**POSOLOGIA**

|                                       |                                                                 |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>Adulto:</b>                        |                                                                 |
| Dose padrão                           | 50 a 100g (5 a 25%) mantendo o fluxo urinário de 30 a 50mL/h    |
| Edema cerebral, pressão intracraniana | 1,5 A 2g/kg (15 a 25%), administrado de 30 a 60 minutos         |
| Adjuvante na desintoxicação           | 50 a 200g (5 a 25%), mantendo o fluxo urinário de 100 a 500mL/h |

**Criança:**

|                           |                                                       |
|---------------------------|-------------------------------------------------------|
| Dose padrão               | 200mg/kg administrado por 5 minutos                   |
| Edema cerebral, glaucomas | 1 a 2g/kg (15 a 25%), administrado de 30 a 60 minutos |

▶ **Ajuste de dose:**

Não é necessário ajuste de dose.

▶ **ADMINISTRAÇÃO**

Intravenosa

▶ **ARMAZENAMENTO**

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

**MATRIZ GELATINOSA DERIVADA BOVINA  
+ DERIVADO DE TROMBINA HUMANA <sup>1,2</sup>**

Fator de Coagulação

Nome comercial:

Floseal FA Ser 5mL <sup>1,2</sup>

**POSOLOGIA****Adulto:**

Dose padrão

De acordo com a superfície a ser vedada ou recoberta ou da dimensão da lesão

▶ **Ajuste de dose:**

Não é necessário ajuste de dose.

▶ **ADMINISTRAÇÃO**

Tópico

▶ **ARMAZENAMENTO**

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C e transportar a 2°C a 30°C.

**MEBEVERINA <sup>1</sup>**

Antiespasmódico

Nome comercial:

Duspatalin 200mg Cap Lib Prolongada <sup>1</sup>

**POSOLOGIA****Adulto:**

Dose padrão

200mg, a cada 12 horas

▶ **Ajuste de dose:**

Não é necessário ajuste de dose.

▶ **ADMINISTRAÇÃO**

VO

Ingerir com água e administrar 1 cápsula pela manhã e outra à noite.

▶ **ARMAZENAMENTO**

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C. Proteger da luz e umidade.



MECLIZINA <sup>1</sup>

Antiemético, Antivertiginoso

Nome comercial:

Meclin 25mg Cp <sup>1</sup>

POSOLOGIA

Adulto e Adolescente:

|                                                                 |                                             |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Cinetose                                                        | 25 a 50mg, a cada 24 horas                  |
| Vertigens associadas às doenças que afetam o sistema vestibular | 25 a 100mg por dia em doses divididas       |
| Náuseas e vômitos induzidos por radioterapia                    | 50mg, de 2 a 12 horas antes da radioterapia |
| Náuseas e vômitos durante a gravidez                            | 25 a 100mg por dia em doses divididas       |

- ▶ **Ajuste de dose:**  
Não é necessário ajuste de dose.
- ▶ **ADMINISTRAÇÃO**  
VO
- ▶ **Administração com alimentos:**  
Evitar o consumo de álcool.
- ▶ **ARMAZENAMENTO**  
Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

MEGLUMINA (IOXITALAMATO DE MEGLUMINA)  
+ IOXITALAMATO DE SÓDIO <sup>1</sup>

Contraste

Nome comercial:

Telebrix Coronar FA 100mL <sup>1</sup>

POSOLOGIA

Adulto:

A critério médico.

- ▶ **ARMAZENAMENTO**  
Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

MEGLUMINA (IOXITALAMATO DE MEGLUMINA)  
+ POLIVIDONA <sup>1</sup>

Contraste

Nome comercial:

Telebrix Hystero FA 20mL <sup>1</sup>

POSOLOGIA

Adulto:

A critério médico.

- ▶ **ARMAZENAMENTO**  
Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

**MEGLUTAMINA IOXITALAMATO <sup>1</sup>**

Contraste

Nome comercial:

Telebrix 30% FA 50mL <sup>1</sup>**POSOLOGIA****Adulto:**

A critério médico.

▶ **ARMAZENAMENTO**

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

**MELFALANO <sup>1</sup>**

Antineoplásico Citotóxico

Nome comercial:

Alkeran 50mg FA <sup>1\*</sup>**POSOLOGIA****Adulto:**

Conforme esquema quimioterápico.

▶ **Administração com alimentos:**

Evitar o consumo de álcool.

▶ **ARMAZENAMENTO**

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C. Proteger da luz.

▶ **Atenção:**

\* Este medicamento é livre de látex.

**MELFALANO <sup>1</sup>**

Antineoplásico Oral

Nome comercial:

Alkeran 2mg Cp <sup>1</sup>**POSOLOGIA****Adulto:**

Conforme esquema quimioterápico.

▶ **ADMINISTRAÇÃO**

VO

Administrar em jejum, 1 hora antes ou 2 horas depois das refeições.

▶ **Administração com alimentos:**

Evitar o consumo de álcool.

▶ **ARMAZENAMENTO**

Conservar em refrigeração entre 2°C e 8°C.

**MEMANTINA <sup>1,2</sup>**

Antiparkinsoniano

Nome comercial:

Alois 10mg Cp Rev <sup>1,2</sup>Ebix 10mg Cp Rev <sup>1,2</sup>Memantina 10mg Cp Rev (Eurofarma) <sup>1,2</sup>**POSOLOGIA**

Adulto:

|                 |                                                                        |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------|
| Dose padrão     | - 1ª semana: 5mg/dia<br>- 2ª semana: 10mg/dia<br>- 3ª semana: 15mg/dia |
| Dose manutenção | 20mg/dia                                                               |
| Dose máxima     | 20mg/dia                                                               |

► **Ajuste de dose:**

Insuficiência renal:

| Dose com Função Renal Normal | Dose com Insuficiência Renal<br>clearance de creatinina (mL/min) |  |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------|--|
|                              | 5-29                                                             |  |
| 5mg 24/24h                   | 5mg 12/12h                                                       |  |

► **ADMINISTRAÇÃO**

VO

Ingerir com ou sem alimento.

► **Administração via sonda:**

Pode ser administrado via sonda. Triturar e diluir em 15mL de água, administrando imediatamente.

► **ARMAZENAMENTO**

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

► **Atenção:**

Receita Branca (2 vias).

**MEPERIDINA CLORIDRATO (PETIDINA) <sup>1,2</sup>**

Analgésico Narcótico

Nome comercial:

Dolantina 50mg/mL Amp 2mL <sup>1,2</sup>

**POSOLOGIA**

**Adulto:**

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| Dose padrão IM e Subcutânea | 25 a 150mg |
| Dose padrão Intravenosa     | 25 a 100mg |

► **Ajuste de dose:**

Idosos: administrar com cautela. Pode resultar em confusão e apresenta desvantagens em relação aos outros opioides.

Insuficiência renal:

| Dose com Função Renal Normal | Dose Insuficiência Renal<br>clearance de creatinina (mL/min) |             |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------|
|                              | 10-50                                                        | < 10        |
| 25-150mg 3/3h ou 4/4h        | 100%                                                         | 50%         |
|                              | 75% da dose                                                  | 50% da dose |

## ► ADMINISTRAÇÃO

Intravenosa, Subcutânea e Intramuscular

Intravenosa direta: 100mg em 100mL de SF, durante 1 a 2 minutos.

Infusão intermitente: 100mg em 100mL de SF, durante 15 a 30 minutos.

## ► Administração com alimentos:

Evitar o consumo de álcool.

## ► ARMAZENAMENTO

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C. Proteger da luz.

## ► Atenção:

Receita Amarela.

## MERCAPTOPURINA <sup>1</sup>

Antineoplásico Oral

Nome comercial:

Purinethol 50mg Cp <sup>1</sup>

## POSOLOGIA

### Adulto e Criança:

Conforme esquema quimioterápico.

## ► ADMINISTRAÇÃO

VO

Administrar preferencialmente em jejum, 1 hora antes ou 2 horas depois das refeições.

## ► Administração via sonda:

Preparo deve ser na Quimioterapia.

## ► ARMAZENAMENTO

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

## MEROPENÉM <sup>1,2</sup>

Antimicrobiano Carbapenêmico

Nome comercial:

Meropenem 1g FA <sup>1,2</sup>

Meropenem 500mg FA <sup>1,2</sup>

MEROpenem 500mg FA (Abl) <sup>1,2</sup> \*

MEROpenem 1000mg FA (Eurofarma) <sup>1,2</sup>

Meropenem 1g FA (Abl) <sup>1,2</sup> \*

Zylpen 500mg FA <sup>1,2</sup>

## POSOLOGIA

### Adulto:

|                                               |                            |
|-----------------------------------------------|----------------------------|
| Dose padrão                                   | 500mg a 1g, a cada 8 horas |
| Episódios de febre em pacientes neutropênicos | 1g, a cada 8 horas         |
| Meningite/fibrose cística                     | 2g, a cada 8 horas         |

### Criança (> 3 meses até 12 anos de idade):

|                                               |                              |
|-----------------------------------------------|------------------------------|
| Dose padrão                                   | 10 a 40mg/kg, a cada 8 horas |
| Episódios de febre em pacientes neutropênicos | 20mg/kg, a cada 8 horas      |
| Meningite/fibrose cística                     | 40mg/kg, a cada 8 horas      |



▶ **Ajuste de dose:**

Não é necessário ajuste de dose.

▶ **ADMINISTRAÇÃO**

Via retal

▶ **ARMAZENAMENTO**

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

**MESALAZINA** <sup>1</sup>

Outros – Aparelho Digestivo, Metabolismo e Nutrição

Nome comercial:

Mesalazina Env 3g + Enema Fr 100mL (Germed) <sup>1</sup>

**POSOLOGIA****Adulto:**

Dose padrão

1 envelope ao dia

▶ **Ajuste de dose:**

Não é necessário ajuste de dose.

▶ **ADMINISTRAÇÃO**

Via retal

Reconstituir em 100mL de solução própria.

▶ **ARMAZENAMENTO**

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

**MESALAZINA** <sup>1</sup>

Outros – Aparelho Digestivo, Metabolismo e Nutrição

Nome comercial:

Pentasa 500mg Cp Liberação Lenta <sup>1</sup>

**POSOLOGIA****Adulto:**

Retocolite ulcerativa

- Dose inicial: 4g ao dia, em doses divididas  
- Dose manutenção: 2g, a cada 24 horas ou doses divididas

Doença de Crohn

4g ao dia, em doses divididas

▶ **Criança (> 2 anos de idade):**

Retocolite ulcerativa

20 a 30mg/kg ao dia, em doses divididas

Doença de Crohn

20 a 30mg/kg ao dia, em doses divididas

▶ **Ajuste de dose:**

Não é necessário ajuste de dose.

▶ **ADMINISTRAÇÃO**

VO

Pode-se dissolver em 50mL de água para facilitar a administração.

▶ **ARMAZENAMENTO**

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

Nome comercial:  
Mitexan 400mg Amp 4mL 1,2  
Mesna 400mg Amp 4mL (Blausiegel) 1,2

POSOLOGIA

Adulto e Criança:

|             |                                                                                                                                                                              |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dose padrão | 3 aplicações/dia, em intervalos de 4 horas. Cada uma delas correspondendo a 20% da dose de oxazafosforina (ciclofosfamida, ifosfamida, trofosfamida) empregada no tratamento |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

- ▶ **Ajuste de dose:**  
Não é necessário ajuste de dose.
- ▶ **ADMINISTRAÇÃO**  
Intravenosa  
Infusão intermitente: diluir até 400mg em 50mL de SF.
- ▶ **ARMAZENAMENTO**  
Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

METADONA 1,2

Nome comercial:  
Mytedom 5mg Cp 1,2

POSOLOGIA

Adulto:

|                           |                                                       |
|---------------------------|-------------------------------------------------------|
| Dor                       | 2,5 a 10mg, a cada 12, 8 ou 6 horas                   |
| Dependência de Narcóticos | 15 a 30mg, a cada 24 horas<br>- Dose máxima: 40mg/dia |

- ▶ **Ajuste de dose:**  
Insuficiência renal:

| Dose com Função Renal Normal | Dose com Insuficiência Renal<br>clearance de creatinina (mL/min) |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 2,5-10mg 3/3h ou 4/4h        | < 10                                                             |
|                              | 50-75% da dose                                                   |

Insuficiência hepática: Evitar o uso em casos graves. Administrar com cautela.

- ▶ **ADMINISTRAÇÃO**  
VO
- ▶ **Administração com alimentos:**  
Evitar o consumo de álcool e Erva-de-São-João
- ▶ **Administração via sonda:**  
Pode ser administrado via sonda. Triturar e diluir em 15mL de água, administrando imediatamente.
- ▶ **ARMAZENAMENTO**  
Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C. Proteger da luz e umidade.
- ▶ **Atenção:**  
Receita Amarela.

**METADONA** <sup>1,2</sup>

Analgésico Narcótico

Nome comercial:

Mytedom 10mg Amp 1mL <sup>1,2</sup>**POSOLOGIA****Adulto:**

|                           |                                                                                  |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Dor                       | 2,5 a 10mg IM ou SC, a cada 4 ou 3 horas se necessário                           |
| Dependência de Narcóticos | 15 a 40mg/dia. Diminuir a dose gradativamente até que não haja mais necessidade. |

**Criança:**

|                           |                                                                    |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Dor                       | A critério médico                                                  |
| Dependência de Narcóticos | - Menores de 18 anos: A critério médico considerando idade e peso. |

▶ **Ajuste de dose:**

Insuficiência renal:

| Dose com Função Renal Normal | Dose com Insuficiência Renal<br>clearance de creatinina (mL/min) |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 2,5-10mg 3/3h ou 4/4h        | < 10                                                             |
|                              | 50-75% da dose                                                   |

Insuficiência hepática: Evitar o uso em casos graves. Administrar com cautela.

▶ **ADMINISTRAÇÃO**

Intramuscular e Subcutânea

▶ **ARMAZENAMENTO**

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C. Proteger da luz.

▶ **Atenção:**

Receita Amarela.

**METARAMINOL** <sup>1,2</sup>

Estimulante Adrenérgico

Nome comercial:

Aramin 10mg Amp 1mL <sup>1,2</sup>**POSOLOGIA****Adulto:**

|              |                                                                                                                    |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dose padrão  | - Infusão Intravenosa: 1,5 a 10mL diluídos, ajustando a velocidade de infusão de acordo com a resposta pressórica. |
| Choque grave | - Intravenosa direta: 0,05 a 0,5mL seguida de uma infusão de 1,5 a 10mL diluídos.                                  |



- ▶ **Ajuste de dose:**  
Não é necessário ajuste de dose.
- ▶ **ADMINISTRAÇÃO**  
Intramuscular ou Intravenosa  
Diluir 1,5 a 10mL em 500mL de SF/SG 5% e administrar imediatamente.
- ▶ **ARMAZENAMENTO**  
Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C. Proteger da luz.

METENAMINA + METILTIONÍNIO <sup>1</sup>

Antisséptico e Analgésico Urinário

Nome comercial:  
Sepurin 120mg + 20mg Drg <sup>1</sup>

**POSOLOGIA**  
**Adulto:**

|                                                                   |                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Cistite                                                           | 2 drágeas, a cada 8 ou 6 horas                                  |
| Profilaxia de colonização/infecção vesical em cateterismo vesical | 2 drágeas, a cada 8 ou 6 horas durante a permanência do cateter |
| Profilaxia de infecções vesicais recorrentes                      | 2 drágeas, a cada 8 ou 6 horas                                  |

- ▶ **Ajuste de dose:**  
Não é necessário ajuste de dose.
- ▶ **ADMINISTRAÇÃO**  
VO
- ▶ **Administração com alimentos:**  
Evitar alimentos e dietas que alcalinizam a urina e reduzem a atividade da metenamina
- ▶ **ARMAZENAMENTO**  
Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

METFORMINA <sup>1,2</sup>

Hipoglicemiante

Nome comercial:  
Dimefor 850mg Cp Rev <sup>1</sup>  
Glifage XR 500mg Cp Ação Prolongada <sup>1</sup>  
Glifage XR 750mg Cp <sup>1</sup>  
Glifage 850mg Cp Rev <sup>1</sup>  
Glifage 500mg Cp Rev <sup>1,2</sup>  
Metformina 500mg Cp Lib Prolongada (Prati Donaduzzi) <sup>1</sup>  
Metformina 500mg Cp Rev (Prati Donaduzzi) <sup>1,2</sup>  
Metformina 750mg Cp de Lib Prolongada (Prati Donaduzzi) <sup>1</sup>  
Metformina 850mg Cp (Prati Donaduzzi) <sup>1,2</sup>  
Metformina 850mg Cp (Biosintética) <sup>1,2</sup>  
Metformina 850mg Cp (Medley) <sup>1,2</sup>  
Metformina 850mg Cp (Merck S/A) <sup>1,2</sup>  
Metformina Cloridrato 500mg Cp Rev (Biosintética) <sup>1,2</sup>  
Metformina Cloridrato 500mg Cp Rev (Medley) <sup>1,2</sup>  
Metformina Cloridrato 500mg Cp Rev (Merck) <sup>1,2</sup>

**POSOLOGIA****Adulto:**

|                 |                              |
|-----------------|------------------------------|
| Dose inicial    | 500 a 850mg, a cada 12 horas |
| Dose manutenção | 200mg, a cada 24 horas       |
| Dose máxima     | 2500mg, a cada 24 horas      |

**Criança (10 a 16 anos de idade):**

|             |                                                                      |
|-------------|----------------------------------------------------------------------|
| Dose padrão | 500, a cada 12 horas com incrementos de 500mg em intervalos semanais |
| Dose máxima | 2000mg por dia                                                       |

▶ **Ajuste de dose:**

Insuficiência renal: ClCr < 60-70mL/min evitar o uso.

Insuficiência hepática: Administrar com cautela, evitar o uso.

▶ **ADMINISTRAÇÃO**

VO

Ingerir preferencialmente com alimentos

▶ **Administração com alimentos:**

Evitar o consumo de álcool.

▶ **Administração via sonda:**

Pode ser administrado via sonda. Triturar e diluir em 20mL de água, administrando imediatamente.

▶ **ARMAZENAMENTO**

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

**METILDOPA <sup>1</sup>**

Agente Anti-hipertensivo

Nome comercial:

Aldomet 250mg Cp Rev <sup>1</sup>

Metildopa 250mg Cp Rev (Biosintética) <sup>1</sup>

Metildopa 250mg Cp Rev (EMS) <sup>1</sup>

**POSOLOGIA****Adulto:**

|             |                                                                                                       |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dose padrão | 250mg, a cada 12 ou 8 horas nas primeiras 48 horas. A seguir, a dose pode ser aumentada ou diminuída. |
| Dose máxima | 3g ao dia                                                                                             |

▶ **Ajuste de dose:**

Insuficiência renal:

| Dose com Função Renal Normal | Dose Insuficiência Renal clearance de creatinina (mL/min) |                         |                          |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
|                              | >50                                                       | 10-50                   | <10                      |
| 250mg<br>8/8h ou 12/12h      | 250mg<br>8/8h                                             | 250mg<br>8/8h ou 12/12h | 250mg<br>12/12 ou 24/24h |

Idosos: administrar com cautela. Pode causar bradicardia e exacerbar a depressão.

Obs: Administrar pela tarde para minimizar o efeito de sedação no paciente.

- ▶ **ADMINISTRAÇÃO**  
VO
- ▶ **Administração via sonda:**  
Pode ser administrado via sonda. Triturar e diluir em 20mL de água, administrando imediatamente.
- ▶ **ARMAZENAMENTO**  
Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

METILFENIDATO <sup>1</sup>

Psicoestimulante

Nome comercial:  
Ritalina 10mg Cp <sup>1</sup>

**POSOLOGIA**  
**Adulto:**

|             |                                                                         |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Dose padrão | Dose individualizada de acordo com a necessidade e resposta do paciente |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------|

**Criança (6 anos de idade ou mais):**

|             |                                                                   |
|-------------|-------------------------------------------------------------------|
| Dose padrão | 5mg, a cada 24 ou 12 horas, com incrementos semanais de 5 a 10mg. |
|-------------|-------------------------------------------------------------------|

- ▶ **Ajuste de dose:**  
Não é necessário ajuste de dose.
- ▶ **ADMINISTRAÇÃO**  
VO  
Administrar 30 a 45 minutos antes das refeições. Administrar até o meio-dia.
- ▶ **Administração com alimentos:**  
Evitar o consumo de álcool.
- ▶ **Administração via sonda:**  
Pode ser administrado via sonda. Triturar e diluir em 15mL de água, administrando imediatamente.
- ▶ **ARMAZENAMENTO**  
Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.
- ▶ **Atenção:**  
Receita Amarela.

METILPREDNISOLONA ACETATO <sup>1,2</sup>

Anti-inflamatório Esteroidal Sistêmico

Nome comercial:  
Depo-Medrol 80mg FA 2mL <sup>1,2</sup>  
Predi-Medrol 80mg FA 2mL <sup>1,2</sup> \*

**POSOLOGIA**  
**Adulto:**

|                                                       |                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artrite reumatoide e Osteoartrite                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Articulação grande: 0,5 a 2mL, a cada 24 horas</li> <li>- Articulação mediana: 0,25 a 1mL, a cada 24 horas</li> <li>- Articulação pequena: 0,1 a 0,25mL, a cada 24 horas</li> </ul> |
| Injeções para efeito local em Afecções Dermatológicas | 20 a 60mg injetado sobre a lesão                                                                                                                                                                                             |

- ▶ **Ajuste de dose:**  
Não é necessário ajuste de dose.

► **ADMINISTRAÇÃO**

Intra-articular  
Esterilizar a área antes da aplicação.

► **Administração com alimentos:**

Evitar o consumo de álcool, Erva-de-São-João, unha de gato e equináceas.

► **ARMAZENAMENTO**

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

► **Atenção:**

\* Esta apresentação é livre de látex.

## METILPREDNISOLONA SUCCINATO <sup>1,2</sup> Anti-inflamatório Esteroidal Sistêmico

Nome comercial:

Metilprednisolona 125mg FA (Novafarma) <sup>1,2</sup> \*

Metilprednisolona 500mg FA (Novafarma) <sup>1,2</sup> \*

Solu-Medrol 125mg FA <sup>1,2</sup>

Solu-Medrol 500mg FA <sup>1,2</sup>

Unimedrol 125mg FA <sup>1,2</sup>

Unimedrol 500mg FA <sup>1,2</sup>

### POSOLOGIA

#### Adulto:

|                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Terapia adjuvante em condições de risco à vida                                          | 30mg/kg, a cada 4 a 6 horas por até 48 horas.                                                                                                                                                                          |
| Distúrbios reumáticos não responsivos à terapia padrão                                  | 1g/dia, por 1 a 4 dias ou 1g/mês, por 6 meses                                                                                                                                                                          |
| Lúpus eritematoso sistêmico não responsivo à terapia padrão                             | 1g/dia, por 3 dias                                                                                                                                                                                                     |
| Esclerose múltipla não responsivo à terapia padrão                                      | 1g/dia, por 3 ou 5 dias                                                                                                                                                                                                |
| Estados edematosos (glomerulonefrite ou nefrite lúpica) não responsivo à terapia padrão | 30mg/kg em dias alternados, por 4 dias ou 1g/dia, por 3, 5 ou 7 dias                                                                                                                                                   |
| Prevenção de náuseas e vômitos associados à quimioterapia                               | - Quimioterapia leve a moderada: 250mg, 1 hora antes do início<br>- Quimioterapia gravemente emetogênica: 250mg com doses adequadas de metoclopramida ou butirofenona, 1 hora antes do início. Repetir a dose no final |
| Terapia Adjuvante em outras indicações                                                  | 10 a 500mg                                                                                                                                                                                                             |

► **Ajuste de dose:**

Não é necessário ajuste de dose.

► **ADMINISTRAÇÃO**

Intravenosa

Reconstituir 125mg em 2mL de água destilada ou 500mg em 8mL de água destilada.

Intravenosa direta: diluir em 10mL de SF.

Infusão intermitente: até 3000mg em 50mL de SF/SG 5% por 20 a 30 minutos.

Infusão contínua: 500mL de SF/SG 5%.

- ▶ **ARMAZENAMENTO**  
Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.
- ▶ **Atenção:**  
\* Esta apresentação é livre de látex.

METOCLOPRAMIDA <sup>1,2</sup>

Antiemético, Procinético

Nome comercial:  
Plasil 10mg Cp <sup>1,2</sup>

**POSOLOGIA**

**Adulto:**

|             |                                               |
|-------------|-----------------------------------------------|
| Dose padrão | 10mg, a cada 8 horas durante no máximo 5 dias |
| Dose máxima | 30mg/dia                                      |

- ▶ **Ajuste de dose:**  
Insuficiência renal:

|                              |                                                                  |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Dose com Função Renal Normal | Dose com Insuficiência Renal<br>clearance de creatinina (mL/min) |
| 10mg 8/8h                    | < 40                                                             |
|                              | 50% dose                                                         |

- ▶ **ADMINISTRAÇÃO**  
VO  
Ingerir preferencialmente 30 minutos antes das refeições.
- ▶ **Administração com alimentos:**  
Evitar o consumo de álcool.
- ▶ **Administração via sonda:**  
Pode ser administrado via sonda. Triturar e diluir em 15mL de água, administrando imediatamente.
- ▶ **ARMAZENAMENTO**  
Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C. Proteger da luz.

METOCLOPRAMIDA <sup>1,2</sup>

Antiemético, Procinético

Nome comercial:  
Plasil 10mg Amp 2mL <sup>1,2</sup>  
Aristopramida 10mg Amp 2mL <sup>1,2</sup>  
Noprosil 10mg Amp 2mL <sup>1,2</sup>

**POSOLOGIA**

**Adulto:**

|             |                      |
|-------------|----------------------|
| Dose padrão | 10mg, a cada 8 horas |
|-------------|----------------------|

**Criança:**

|             |                          |
|-------------|--------------------------|
| Dose padrão | 0,1mg/kg, a cada 6 horas |
|-------------|--------------------------|

► **Ajuste de dose:**

Insuficiência renal:

| Dose com Função Renal Normal | Dose com Insuficiência Renal<br>clearance de creatinina (mL/min) |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 10mg 8/8h                    | < 40                                                             |
|                              | 50% dose                                                         |

► **ADMINISTRAÇÃO**

Intravenosa e Intramuscular

Infusão intermitente: até 10mg em 50mL SF por 15 minutos.

Intravenosa direta: até 10mg em 10mL de água destilada, durante 1 a 2 minutos.

► **ARMAZENAMENTO**

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C. Proteger da luz.

Após diluição, possui estabilidade de 48 horas em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C protegida da luz e por 24 horas em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C sem proteção contra a luz.

**METOPROLOL <sup>1</sup>**

Agente Anti-hipertensivo

Nome comercial:

Seloken 100mg Cp <sup>1</sup>**POSOLOGIA****Adulto:**

|                                                 |                                                        |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Angina/Hipertensão/Arritmias cardíacas          | 100 a 200mg, a cada 24 horas ou fracionado em 12 horas |
| Manutenção após infarto do miocárdio            | 200mg, a cada 12 horas (manhã e noite)                 |
| Hipertireoidismo                                | 150 a 200mg, a cada 8 ou 6 horas                       |
| Alterações cardíacas funcionais com palpitações | 100mg, a cada 24 horas pela manhã                      |
| Profilaxia da enxaqueca                         | 100 a 200mg, a cada 12 horas (manhã e noite)           |

► **Ajuste de dose:**

Insuficiência hepática: pode ser necessário ajuste de dose, monitorar.

► **ADMINISTRAÇÃO**

VO

Administrar preferencialmente com alimentos.

► **Administração com alimentos:**

Evitar ingestão de alcaçuz, *Caulophyllum*, *Centella asiática*, efedra, gengibre, ginseng, murta, pimenta de caiena, bolsa de pastor, cimicífuga, côleo, cratego, *Hydrastis*, papoula da califórnia, quinina, vinco e visco.

► **Administração via sonda:**

Pode ser administrado via sonda. Triturar e diluir em 15mL de água, administrando imediatamente.

► **ARMAZENAMENTO**

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

METOPROLOL 1,2

Agente Anti-hipertensivo

Nome comercial:  
Selozok 25mg Cp Lib Controlada 1,2

POSOLOGIA

Adulto:

|                                        |                       |
|----------------------------------------|-----------------------|
| Hipertensão/Angina/Arritmias cardíacas | 25mg, a cada 24 horas |
|----------------------------------------|-----------------------|

- ▶ **Ajuste de dose:**  
Insuficiência hepática: Pode ser necessário ajuste de dose, monitorar.
- ▶ **ADMINISTRAÇÃO**  
VO  
Administrar preferencialmente com alimentos.
- ▶ **Administração com alimentos:**  
Evitar ingestão de alcaçuz, *Caulophyllum*, *Centella asiática*, efedra, gengibre, ginseng, murta, pimenta de caiena, bolsa de pastor, cimicífuga, côleo, cratego, *hydrastis*, papoula da califórnia, quinina, vinco e visco.
- ▶ **ARMAZENAMENTO**  
Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

METOPROLOL 1,2

Agente Anti-hipertensivo

Nome comercial:  
Seloken 5mg Amp 5mL 1,2  
Betacris Amp 5mL 1,2

POSOLOGIA

Adulto:

|                      |                                                                           |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Arritmias cardíacas  | 5mg IV, durante 1-2 mg/min. Pode ser repetida em intervalos de 5 minutos. |
| Infarto do miocárdio | 3 injeções em bolus de 5mg, em intervalos de 2 minutos                    |

- ▶ **Ajuste de dose:**  
Insuficiência hepática: recomenda-se cautela. Pode ser necessário redução de dose.
- ▶ **ADMINISTRAÇÃO**  
Intravenosa  
Infusão: até 9,9mg em 50mL SF/SG 5%, 1-2mg/min.  
até 20mg em 100mL SF/SG 5%, 1-2mg/min.  
até 40mg em 1000mL SF/SG 5%, 1-2mg/min.
- ▶ **ARMAZENAMENTO**  
Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.
- ▶ **Atenção:**  
Alta Vigilância.

METOTREXATO 1

Antineoplásico Citotóxico

Nome comercial:  
Fauldmetro 50mg (25mg/mL) FA 2mL 1  
Fauldmetro 1g (100g/mL) FA 10mL 1,\*  
Miantrex CS 50mg FA 2mL 1\*  
Miantrex 1g (100mg/mL) FA 10mL 1

**POSOLOGIA****Adulto:**

Conforme esquema quimioterápico.

▶ **Administração com alimentos:**

Alimentos ricos em leite podem diminuir a absorção. Evitar o consumo de álcool e equináceas.

▶ **ARMAZENAMENTO**

Conservar em temperatura ambiente menor que 25°C.

▶ **Atenção:**

Não deve ser utilizado por mulheres grávidas ou que possam ficar grávidas durante o tratamento (classificado na categoria X).

\* Esta apresentação é livre de látex.

**METRONIDAZOL** <sup>1,2</sup>

Antimicrobiano Anaeróbico

Nome comercial:

Flagyl 250mg Cp <sup>1</sup>

Flagyl 400mg Cp <sup>1</sup>

Metronidazol 250mg Cp Rev (Prati Donaduzzi) <sup>1,2</sup>

Metronidazol 250mg Cap Manip (Formularium) <sup>1</sup>

Metronidazol 400mg Cap Manip (Formularium) <sup>1</sup>

Metronidazol 400mg Cap Manip (Fórmula & Ação) <sup>1</sup>

**POSOLOGIA****Adulto e Criança (> 12 anos de idade):**

|                                                           |                                                                                    |  |  |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Tricomoníase                                              | 250mg, a cada 12 horas durante 10 dias ou<br>400mg, a cada 12 horas durante 7 dias |  |  |
| Vaginites e uretrites por<br><i>Gardnerella vaginalis</i> | 400 a 500mg, a cada 12 horas durante 7 dias                                        |  |  |
| Giardíase                                                 | 250mg, a cada 8 horas durante 5 dias                                               |  |  |
| Amebíase hepática                                         | 500mg, a cada 6 horas durante 7 a 10 dias                                          |  |  |
| Amebíase intestinal                                       | 500mg, a cada 6 horas durante 5 a 7 dias                                           |  |  |
| Infecções por bactérias anaeróbias                        | 400mg, a cada 8 horas durante 7 dias                                               |  |  |

▶ **Ajuste de dose:**

Insuficiência renal:

| Dose com Função Renal Normal | Dose Insuficiência Renal<br>clearance de creatinina (mL/min) |       |      |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------|------|
|                              | >50-90                                                       | 10-50 | <10  |
| 7,5mg/Kg 6/6h                | 100%                                                         | 100%  | 100% |

▶ **ADMINISTRAÇÃO**

VO

Ingerir preferencialmente em jejum.

▶ **Administração com alimentos:**

Evitar o consumo de álcool.

▶ **Administração via sonda:**

Risco de obstrução de sonda. Preparo deve ser na Quimioterapia.

▶ **ARMAZENAMENTO**

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.



- ▶ **Atenção:**  
Receita Branca (2 vias).

METRONIDAZOL <sup>1,2</sup>

Antimicrobiano Anaeróbico

Nome comercial:  
 Flagyl 500mg Bolsa 100mL <sup>1,2</sup>  
 Metroniflex 500mg Bolsa 100mL <sup>1,2</sup>  
 Metronidazol 500mg Bolsa 100mL (Isofarma) <sup>1,2</sup>  
 Metronidazol 500mg bolsa 100mL (Abl) <sup>1,2</sup>  
 Metronack 500mg Bolsa 100mL <sup>1,2</sup>

**POSOLOGIA**

**Adulto:**

|             |                             |
|-------------|-----------------------------|
| Dose padrão | 250 a 500mg, a cada 8 horas |
|-------------|-----------------------------|

**Criança:**

|                      |                                                |
|----------------------|------------------------------------------------|
| Infecções anaeróbias | 30mg/kg/dia em doses divididas, a cada 6 horas |
|----------------------|------------------------------------------------|

- ▶ **Ajuste de dose:**  
Insuficiência renal:

| Dose com Função Renal Normal | Dose Insuficiência Renal<br>clearance de creatinina (mL/min) |       |      |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------|------|
|                              | >50-90                                                       | 10-50 | <10  |
| 7,5mg/Kg 6/6h                | 100%                                                         | 100%  | 100% |

- ▶ **ADMINISTRAÇÃO**  
Intravenosa intermitente durante 20 minutos.
- ▶ **ARMAZENAMENTO**  
Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.
- ▶ **Atenção:**  
Receita Branca (2 vias).

MICAFUNGINA <sup>1,2</sup>

Antifúngico Sistêmico

Nome comercial:  
 Mycamine 100mg FA <sup>1,2</sup>

**POSOLOGIA**

**Adulto:**

|                                     |                                                           |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Candidíase invasiva                 | - > 40kg: 100mg ao dia<br>- < ou igual a 40kg: 2mg/kg/dia |
| Candidíase esofágica                | - > 40kg: 150mg ao dia<br>- < ou igual a 40kg: 3mg/kg/dia |
| Profilaxia de infecções por Candida | - > 40kg: 50mg ao dia<br>- < ou igual a 40kg: 1mg/kg/dia  |

▶ **Ajuste de dose:**

Insuficiência hepática: Pode ser necessário ajuste de dose, monitorar.

▶ **ADMINISTRAÇÃO**

Intravenosa

Reconstituir em 5mL de SF.

Diluição: - Candidíase invasiva: 100mg reconstituído em 100mL de SF/SG 5%.

- Candidíase esofágica: 150mg reconstituído em 100mL de SF/SG 5%.

- Profilaxia de infecções por *Candida*: 50mg reconstituído em 100mL de SF/SG 5%.

▶ **ARMAZENAMENTO**

Conservar em temperatura ambiente abaixo de 25°C.

Após reconstituição, possui estabilidade de 24 horas em temperatura ambiente de 25°C. Após diluição, possui estabilidade de 24 horas em temperatura ambiente de 25°C protegida da luz.

**MICOFENOLATO MOFETILA <sup>1</sup>**

Imunossupressor

Nome comercial:

Cellcept 500mg Cp Rev <sup>1</sup>

**POSOLOGIA****Adulto:**

|                                                                |                                                             |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Profilaxia da rejeição renal                                   | 1g, a cada 12 horas, dentro de 72 horas após o transplante. |
| Profilaxia da rejeição cardíaca                                | 1,5g, a cada 12 horas                                       |
| Profilaxia da rejeição hepática                                | 1,5g, a cada 12 horas                                       |
| Tratamento da primeira rejeição e da rejeição refratária renal | 1,5g, a cada 12 horas                                       |

▶ **Ajuste de dose:**

Insuficiência renal:

|                              |                                                              |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Dose com Função Renal Normal | Dose Insuficiência Renal<br>clearance de creatinina (mL/min) |
|                              | <25                                                          |
| 1g<br>12-12h                 | Evitar doses maiores que 2g, a cada 24h.                     |

▶ **ADMINISTRAÇÃO**

VO

Administrar 1 hora antes ou 2 horas depois das refeições. Exceto transplante renal.

▶ **Administração com alimentos:**

Evitar unha de gato e equináceas.

▶ **Administração via sonda:**

Risco ocupacional para o manipulador.

▶ **ARMAZENAMENTO**

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

MICOFENOLATO SÓDICO 1,2

Imunossupressor

Nome comercial:  
Myfortic 180mg Cp Rev 1  
Myfortic 360mg Cp Rev 1,2

POSOLOGIA

Adulto:

|             |                                                              |
|-------------|--------------------------------------------------------------|
| Dose padrão | 720mg, a cada 12 horas. Iniciar 48 horas após o transplante. |
|-------------|--------------------------------------------------------------|

- ▶ **Ajuste de dose:**  
Idosos: recomenda-se cautela na administração.
- Insuficiência renal:

| Dose com Função Renal Normal | Dose Insuficiência Renal<br>clearance de creatinina (mL/min) |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|                              | <25                                                          |
| 720mg<br>12/12h              | Evitar doses maiores que 2g, a cada 24 horas                 |

- ▶ **ADMINISTRAÇÃO**  
VO  
Administrar 1 hora antes ou 2 horas depois das refeições.
- ▶ **ARMAZENAMENTO**  
Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

MICONAZOL 1,2

Antifúngico Tópico

Nome comercial:  
Vodol 20mg/g Pó Fr 30g 1,2

POSOLOGIA

Adulto e Criança:

|             |                                                                                                                   |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dose padrão | Aplicar uma quantidade suficiente para cobrir a área afetada, a cada 12 horas durante, aproximadamente 2 semanas. |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

- ▶ **Ajuste de dose:**  
Não é necessário ajuste de dose.
- ▶ **ADMINISTRAÇÃO**  
Tópico
- ▶ **ARMAZENAMENTO**  
Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

MIDAZOLAM 1

Hipnótico

Nome comercial:  
Dormire 2mg/mL Sol Oral Fr 10mL

POSOLOGIA

Criança:

|             |                                 |
|-------------|---------------------------------|
| Dose padrão | 0,25 a 0,50 mg/kg em dose única |
|-------------|---------------------------------|

OBS: A dose deve ser individualizada e titulada para o estado de sedação desejado.

► **Ajuste de dose:**

Não é necessário ajuste de dose.

► **ADMINISTRAÇÃO**

VO

► **Administração com alimentos:**

Evitar o consumo de álcool.

► **ARMAZENAMENTO**

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C. Proteger da luz.

► **Atenção:**

Receita Azul.

Risco de Queda

## MIDAZOLAM <sup>1,2</sup>

Hipnótico

Nome comercial:

Dormire 5mg Amp 5mL <sup>1,2</sup>

Dormire 15mg Amp 3mL <sup>1,2</sup>

Dormire 50mg Amp 10mL <sup>1,2</sup>

Dormium 5mg Amp 5mL <sup>1,2</sup>

Dormium 50mg Amp 10mL <sup>1,2</sup>

Dormonid 5mg Amp 5mL <sup>1,2</sup>

Dormonid 15mg Amp 3mL <sup>1,2</sup>

Dormonid 50mg Amp 10mL <sup>1,2</sup>

### POSOLOGIA

**Adulto (< ou iguais a 60 anos de idade):**

|                                                 |                                                                                             |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sedação consciente                              | - Dose inicial: 2 a 2,5mg IV<br>- Dose de titulação: 1mg IV<br>- Dose total: 3,5 a 7,5mg IV |
| Pré-medicação anestésica                        | - IV: 1 a 2mg repetida<br>- IM: 0,07 a 0,1mg/kg                                             |
| Indução anestésica                              | 0,2 mg/kg IV                                                                                |
| Componente sedativo em combinação com anestesia | 0,03 a 0,1 mg/kg como IV intermitente ou 0,03 a 0,1 mg/kg/h como IV contínua                |
| Sedação em unidades de terapia intensiva        | - 0,03 a 0,3 em incrementos de 1 a 2,5mg IV<br>- Dose manutenção: 0,03 a 0,2 mg/kg/h        |

**Adulto (> ou iguais a 60 anos e cronicamente doentes, pacientes de alto risco):**

|                          |                                                                                               |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sedação consciente       | - Dose inicial: 0,5 a 1mg IV<br>- Dose de titulação: 0,5 a 1mg IV<br>- Dose total: < 3,5mg IV |
| Pré-medicação anestésica | - IV: 0,5mg. Titulação lenta adicional conforme necessidade.<br>- IM: 0,025 a 0,05 mg/kg      |



POSOLOGIA

Adulto:

|         |                                                           |
|---------|-----------------------------------------------------------|
| Insônia | 7,5 a 15mg, antes de deitar durante, no máximo, 2 semanas |
|---------|-----------------------------------------------------------|

OBS: A dose deve ser individualizada e titulada para o estado de sedação desejado.

- ▶ **Ajuste de dose:**  
Não é necessário ajuste de dose.
- ▶ **ADMINISTRAÇÃO**  
VO
- ▶ **Administração com alimentos:**  
Evitar o consumo de álcool e Erva-de-São-João.
- ▶ **Administração via sonda:**  
Pode ser administrado via sonda. Triturar e diluir em 15mL de água, administrando imediatamente.
- ▶ **ARMAZENAMENTO**  
Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.
- ▶ **Atenção:**  
Receita Azul.  
Risco de Queda.

MILRINONA<sup>1,2</sup>

Cardiotônico

Nome comercial:  
Primacor 10mg Amp 10mL<sup>1,2</sup>

POSOLOGIA

Adulto:

|                 |                                           |
|-----------------|-------------------------------------------|
| Dose de ataque  | 0,5 µg/kg, durante 10 minutos, lentamente |
| Dose manutenção | 0,375 a 0,750 µg/kg/min                   |
| Dose máxima     | 1,13 mg/kg                                |

Criança:

|                 |                                                                        |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------|
| Dose de ataque  | 50 a 75 µg/kg administrados durante 30 a 60 minutos                    |
| Dose manutenção | 0,25 a 0,75 µg/kg/min em infusão intravenosa contínua por até 35 horas |

- ▶ **Ajuste de dose:**  
Insuficiência renal:

| Clearance de Creatinina (mL/min/1,73 m2) | Taxa de infusão (µg/kg/min) |
|------------------------------------------|-----------------------------|
| 5                                        | 0,20                        |
| 10                                       | 0,23                        |

|    |      |
|----|------|
| 20 | 0,28 |
| 30 | 0,33 |
| 40 | 0,38 |
| 50 | 0,43 |

- ▶ **ADMINISTRAÇÃO**  
Intravenosa
- ▶ **ARMAZENAMENTO**  
Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C. Proteger da luz.

**MINERAIS + HISTIDINA + TRIPTOFANO + MANITOL + ALFA-CETOGLUTARATO <sup>1,2</sup>** Solução para Conservação de Órgãos

Nome comercial:  
Custodiol Bolsa 1000mL <sup>1,2</sup>  
Custodiol Bolsa 2000mL <sup>1</sup>

**MODO DE USAR:**  
**Coração:**  
Volume de perfusão: 1mL de solução por minuto e por grama (g) de peso cardíaco.  
**Rins:**  
Volume de perfusão: 1,5mL de solução por minuto e por grama (g) de peso renal.  
**Fígado:**  
Volume de perfusão: 150 a 200mL de solução por quilograma (kg) de peso corporal.

**MIRTAZAPINA <sup>1,2</sup>** Antidepressivo

Nome comercial:  
Mirtazapina 30mg Cp Orodispersível (Medley) <sup>1</sup>  
Mirtazapina 15mg Cp Orodispersível (Sandoz) <sup>1,2</sup>  
Mirtazapina 30mg Cp Orodispersível (Sandoz) <sup>1</sup>  
Razapina Odt 15mg Cp <sup>1</sup>  
Remeron Soltab 15mg Cp Orodispersível <sup>1,2</sup>  
Remeron Soltab 30mg Cp Orodispersível <sup>1</sup>

**POSOLOGIA**

**Adulto:**

|             |                  |
|-------------|------------------|
| Dose padrão | 15 a 45mg ao dia |
|-------------|------------------|

- ▶ **Ajuste de dose:**  
Insuficiência renal:

| Dose com Função Renal Normal | Dose Insuficiência Renal<br>clearance de creatinina (mL/min) |             |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------|
| 500mg                        | 11-39                                                        | < 10        |
|                              | 70% da dose                                                  | 50% da dose |

Insuficiência hepática: Recomenda-se cutela, há redução de 30% da dose.

- ▶ **ADMINISTRAÇÃO**  
VO

- ▶ **Administração com alimentos:**  
Evitar o consumo de álcool e Erva-de-São-João
- ▶ **Administração via sonda:**  
Pode ser administrado via sonda. Triturar e diluir em 15mL de água, administrando imediatamente.
- ▶ **ARMAZENAMENTO**  
Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.
- ▶ **Atenção:**  
Receita Branca (2 vias).

## MITOXANTRONA <sup>1</sup>

Antineoplásico Citotóxico

Nome comercial:  
Evomixan 20mg FA 10mL <sup>1</sup>\*

### POSOLOGIA

**População:**  
Conforme esquema quimioterápico.

- ▶ **Administração com alimentos:**  
Evitar camicifuga e angélica chinesa em tumores estrogênio dependentes (possuem atividade estrogênica).
- ▶ **ARMAZENAMENTO**  
Conservar em refrigeração entre 2°C e 8°C, protegido da luz.
- ▶ **Atenção:**  
\* Este medicamento é livre de látex.

## MODAFINILA <sup>1</sup>

Psicoestimulantes

Nome comercial:  
Stavigile 200mg Cp <sup>1</sup>

### POSOLOGIA

**Adulto:**

|             |                                    |
|-------------|------------------------------------|
| Dose padrão | 200mg ao dia em uma tomada matinal |
|-------------|------------------------------------|

- ▶ **Ajuste de dose:**  
Insuficiência hepática grave: reduzir a dosagem à metade.
- ▶ **ADMINISTRAÇÃO**  
VO  
As doses podem ser divididas em duas tomadas, sendo uma pela manhã e outra ao meio-dia.
- ▶ **Administração com alimentos:**  
Evitar o consumo de álcool.
- ▶ **ARMAZENAMENTO**  
Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

## MOMETASONA <sup>1</sup>

Antimicrobiano Tópico e Corticóide

Nome comercial:  
Topison 1mg/g Creme Bis 20g <sup>1</sup>



**POSOLOGIA**

**Adulto:**

|             |                                                             |
|-------------|-------------------------------------------------------------|
| Dose padrão | Aplicar uma fina camada nas áreas afetadas, a cada 24 horas |
|-------------|-------------------------------------------------------------|

- ▶ **Ajuste de dose:**  
Não é necessário ajuste de dose.
- ▶ **ARMAZENAMENTO**  
Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.
- ▶ **Atenção:**  
Receita Branca (2 vias).

**MONOETANOLAMINA OLEATO <sup>1</sup>**

Outros – Aparelho Cardiovascular

Nome comercial:  
Ethamolin 50mg/mL Amp 2mL <sup>1</sup>

**POSOLOGIA**

**Adulto:**

|             |                                                              |
|-------------|--------------------------------------------------------------|
| Dose padrão | 2 a 5mL, a cada 8 ou 6 horas, injetadas em veias diferentes. |
|-------------|--------------------------------------------------------------|

- ▶ **Ajuste de dose:**  
Não é necessário ajuste de dose.
- ▶ **ADMINISTRAÇÃO**  
Intravenosa  
Intravenosa direta: 100mg em 10mL de água bidestilada.
- ▶ **ARMAZENAMENTO**  
Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C. Proteger da luz.

**MONOSSIALOGLANGLIOSÍDEO <sup>1</sup>**

Outros – Sistema Nervoso

Nome comercial:  
Sygen 100mg (20mg/ml) Amp 5ml <sup>1</sup>

**POSOLOGIA**

**Adulto:**

|                                                   |                                                                                |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Acidente Vascular Encefálico<br>(não hemorrágico) | 100mg IM ou IV                                                                 |
| Trauma Raquimedular<br>Agudo                      | - Dose de ataque: 300mg IV<br>- Dose manutenção: 100mg IV/IM durante 8 semanas |

- ▶ **Ajuste de dose:**  
Não é necessário ajuste de dose.
- ▶ **ADMINISTRAÇÃO**  
Intravenosa e Intramuscular
- ▶ **ARMAZENAMENTO**  
Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

**MONTELUCASTE SÓDIO<sup>1</sup>**

Outros - Aparelho Respiratório

Nome comercial:

Singulair 10mg Cp Rev<sup>1</sup>**POSOLOGIA****Adulto e Criança (> 15 anos de idade):**

Asma e/ou rinite alérgica

10mg diariamente

▶ **Ajuste de dose:**

Não é necessário ajuste de dose.

▶ **ADMINISTRAÇÃO**

VO

Administrar preferencialmente à noite.

▶ **Administração com alimentos:**

Evitar a erva de São-João.

▶ **Administração via sonda:**

Pode ser administrado via sonda. Triturar e diluir em 15mL de água, administrando imediatamente.

▶ **ARMAZENAMENTO**

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

**MORFINA<sup>1,2</sup>**

Analgésico Narcótico

Nome comercial:

Dimorf 10mg Cp<sup>1,2</sup>**POSOLOGIA****Adulto:**

Dose padrão

5 a 30mg, a cada 4 horas

**Criança:**

Dose padrão

0,2 a 0,5 mg/kg, a cada 4 horas

▶ **Ajuste de dose:**

Insuficiência renal:

Dose com Função Renal  
NormalDose Insuficiência Renal  
clearance de creatinina (mL/min)

5-30mg, 4/4h ou 24/24h

10-50

&lt; 10

75% da dose

50% da dose

▶ **ADMINISTRAÇÃO**

VO

Administrar preferencialmente com alimentos.

▶ **Administração com alimentos:**

Evitar o consumo de álcool.

▶ **Administração via sonda:**

Pode ser administrado via sonda. Triturar e diluir em 15mL de água, administrando imediatamente.

▶ **ARMAZENAMENTO**

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

- ▶ **Atenção:**  
 Receita Amarela.

**MORFINA** <sup>1,2</sup>

Analgésico Narcótico

Nome comercial:  
 Dimorf 2mg Amp 2mL <sup>1,2</sup>  
 Dimorf 10mg Amp 1mL <sup>1,2</sup>  
 Dimorf 0,1mg Amp 1mL <sup>1,2</sup>

**POSOLOGIA**

**Adulto:**

|             |                                                                                                                           |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dose padrão | - 5 a 20mg/70kg IM<br>- 2 a 10mg/70kg IV<br>- 2 a 4mg/24h infusão contínua<br>- 0,2 a 1mg, intratecal<br>- 5mg, peridural |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Criança:**

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Dose inicial     | 0,05mg/kg          |
| Dose máxima      | 15mg/dose          |
| Infusão contínua | 0,025 a 0,1mg/kg/h |

- ▶ **Ajuste de dose:**  
 Insuficiência renal:

| Dose com Função Renal Normal | Dose Insuficiência Renal<br>clearance de creatinina (mL/min) |             |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------|
| 5-30mg, 4/4h ou 24/24h       | 10-50                                                        | < 10        |
|                              | 75% da dose                                                  | 50% da dose |

- ▶ **ADMINISTRAÇÃO**  
 Intravenosa, Subcutânea, Peridural e Intramuscular  
 Intravenosa direta: diluir em 10mL de água destilada e infundir lentamente.  
 Infusão intermitente: até 30mg em 100mL de SF e infundir de 15 a 30 minutos.
- ▶ **ARMAZENAMENTO**  
 Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.  
 Após diluição, possui estabilidade de 24 horas em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.
- ▶ **Atenção:**  
 Receita Amarela (Amp 10mg/1mL), Receita Branca (2 vias) (Amp 2mg/2mL).

**MOXIFLOXACINO** <sup>1</sup>

Antimicrobiano Quinolona

Nome comercial:  
 Avalox 400mg Bolsa 250mL <sup>1</sup>

**POSOLOGIA**

**Adulto:**

|             |                                           |
|-------------|-------------------------------------------|
| Dose padrão | 400mg, a cada 24 horas durante 60 minutos |
|-------------|-------------------------------------------|

- ▶ **Ajuste de dose:**  
Não é necessário ajuste de dose.
- ▶ **ADMINISTRAÇÃO**  
Intravenosa
- ▶ **Administração com alimentos:**  
Administrar 4 horas antes ou 8 horas depois da ingestão de multivitamínicos ou outros produtos com alumínio, ferro, zinco ou magnésio.
- ▶ **ARMAZENAMENTO**  
Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.
- ▶ **Atenção:**  
Receita Branca (2 vias).

**MOXIFLOXACINO <sup>1</sup>**

Antimicrobiano Quinolona

Nome comercial:  
Avalox 400mg Cp Rev <sup>1</sup>

**POSOLOGIA****Adulto:**

Dose padrão

400mg, a cada 24 horas durante 60 minutos

- ▶ **Ajuste de dose:**  
Não é necessário ajuste de dose.
- ▶ **ADMINISTRAÇÃO**  
VO  
Pode ser administrado sem levar a alimentação em consideração.
- ▶ **Administração com alimentos:**  
Administrar 4 horas antes ou 8 horas depois da ingestão de multivitamínicos ou outros produtos com alumínio, ferro, zinco ou magnésio.
- ▶ **Administração via sonda:**  
Pode ser administrado via sonda. Triturar e diluir em 30mL de água, administrando imediatamente.
- ▶ **ARMAZENAMENTO**  
Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.
- ▶ **Atenção:**  
Receita Branca (2 vias).

**MUPIROCINA <sup>1,2</sup>**

Antimicrobiano Tópico

Nome comercial:  
Mupirocina 2% Tubo 15g <sup>1,2</sup>

**POSOLOGIA****Adulto e Criança:**

Dose padrão

Aplicar uma fina camada sobre a área afetada, a cada 8 horas durante 10 dias

- ▶ **Ajuste de dose:**  
Não é necessário ajuste de dose.

- ▶ **ADMINISTRAÇÃO**  
Tópico
- ▶ **ARMAZENAMENTO**  
Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.
- ▶ **Atenção:**  
Receita Branca (2 vias).

**NABPACLITAXEL <sup>1</sup>**

Antineoplásico Citotóxico

Nome comercial:

Abraxane 100mg FA <sup>1</sup> \***POSOLOGIA****Adulto:**

Conforme esquema quimioterápico.

▶ **ADMINISTRAÇÃO**

Preparo na quimioterapia.

▶ **ARMAZENAMENTO**

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

Após reconstituição do frasco-ampola, possui estabilidade de 24 horas a 25°C. Após reconstituição na bolsa de infusão, possui estabilidade por até 12 horas a 25°C.

▶ **Atenção:**

\* Este medicamento é livre de látex.

**NALBUFINA CLORIDRATO <sup>1,2</sup>**

Analgésico Narcótico

Nome comercial:

Nubain 10mg/mL Amp 1mL <sup>1,2</sup>**POSOLOGIA****Adulto (> ou igual a 70kg):**

|                          |                                                                                                     |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dose padrão              | 10mg IV/IM/SC, podendo ser repetida a cada 3 a 6 horas                                              |
| Dose máxima              | 20mg/dose                                                                                           |
| Complemento de anestesia | 0,3 a 3 mg/kg IV durante 10 a 15 minutos. A dose manutenção é de 0,25 a 0,5 mg/kg quando necessário |

▶ **Ajuste de dose:**

Insuficiência renal: Pode ser necessário ajuste de dose, monitorar.

Idosos: administrar com cautela.

▶ **ADMINISTRAÇÃO**

Intravenosa, intramuscular ou subcutânea

▶ **Administração com alimentos:**

Evitar o consumo de álcool.

▶ **ARMAZENAMENTO**

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C. Proteger da luz.

▶ **Atenção:**

Receita Branca (2 vias).

**NALOXONA CLORIDRATO <sup>1,2</sup>**

Antídoto

Nome comercial:

Narcan 0,4mg/mL Amp 1mL <sup>1,2</sup>**POSOLOGIA****Adulto:**

|                      |                                                                                                    |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Superdose de opioide | 0,4 a 2mg IV. Se não for obtido resultado, deve-se repetir a dose com 2 ou 3 minutos de intervalo. |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                           |                                               |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Depressão Pós-Operatória<br>(por opioide) | 0,1 a 0,2mg IV em 2 ou 3 minutos de intervalo |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|

**Criança:**

|                          |                                                                                                                                |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Superdose<br>por opioide | - 0,1 mg/kg/peso IV para crianças até 20kg ou menores que 5 anos<br>- 2mg para crianças com mais de 20kg ou maiores que 5 anos |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Recém-nascidos:**

|                                  |                                                                             |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Depressão induzida por opioide   | 0,1 mg/kg IV/IM/SC. Se necessário, repetir com 2 ou 3 minutos de intervalo. |
| Depressão Opioide Pós-Operatória | 0,005 a 0,01mg IV, com 2 ou 3 minutos de intervalo.                         |

- ▶ **Ajuste de dose:**  
Não é necessário ajuste de dose.
- ▶ **ADMINISTRAÇÃO**  
Intravenosa, Intramuscular ou Subcutânea  
Intravenosa: diluir 2mg em 500mL água para injetáveis, solução salina normal ou solução de dextrose a 5%.
- ▶ **ARMAZENAMENTO**  
Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C. Proteger da luz.  
Após diluição, possui estabilidade de 24 horas em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.
- ▶ **Atenção:**  
Receita Branca (2 vias).

**NALTREXONA <sup>1</sup>**
Antídoto

|                                               |
|-----------------------------------------------|
| Nome comercial:<br>Revia 50mg Cp <sup>1</sup> |
|-----------------------------------------------|

**POSOLOGIA**

**Adulto:**

|                         |                                                                                   |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Alcoolismo              | 50mg ao dia, durante até 12 semanas                                               |
| Dependência de Opioides | 25mg ao dia. Caso não ocorram sinais de abstinência, iniciar 50mg no dia seguinte |

- ▶ **Ajuste de dose:**  
Não é necessário ajuste de dose.
- ▶ **ADMINISTRAÇÃO**  
Oral  
Deve ser iniciado até que o paciente esteja detoxificado e tenha abstinência por no mínimo 7 a 10 dias.
- ▶ **ARMAZENAMENTO**  
Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.
- ▶ **Atenção:**  
Receita Branca (2 vias).

**NANDROLONA DECANOATO <sup>1</sup>**

Hormônio Androgênico

Nome comercial:

Deca-durabolin 25mg FA 1mL <sup>1</sup>**POSOLOGIA****Adulto e Idoso:**

|                                                                                                                                     |                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Osteoporose                                                                                                                         | 50mg IM, a cada 3 semanas                                                     |
| Adjuvante a tratamentos específicos e medidas dietéticas em condições patológicas caracterizadas por balanço negativo de nitrogênio | 25 a 50mg IM, a cada 2 semanas                                                |
| Anemia devido à Insuficiência Renal Crônica                                                                                         | 100 a 200mg IM, uma vez na semana                                             |
| Anemia devido à Anemia Plástica                                                                                                     | 50 a 150mg IM, uma vez na semana                                              |
| Anemia devido à Tratamento citotóxico                                                                                               | 200mg IM, uma vez na semana. Iniciar 2 semanas antes do tratamento citotóxico |

▶ **Ajuste de dose:**

Não é necessário ajuste de dose.

▶ **ADMINISTRAÇÃO**

Intramuscular

Injetar nas nádegas, parte superior das pernas ou do braço.

▶ **ARMAZENAMENTO**

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C. Proteger da luz.

**NANQUIM <sup>1,2</sup>**

Outros Medicamentos

Nome comercial:

Nanquim Estéril Amp 2mL Manip <sup>1,2</sup>**POSOLOGIA****Adulto:**

A critério médico.

▶ **Ajuste de dose:**

Não é necessário ajuste de dose.

▶ **ARMAZENAMENTO**

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

**NAPROXENO <sup>1,2</sup>**

Anti-inflamatório não Esteroidal Sistêmico

Nome comercial:

Flanax 275mg Cp <sup>1,2</sup>**POSOLOGIA****Adulto e Adolescente (> 12 anos de idade):**

|             |                              |
|-------------|------------------------------|
| Dose padrão | 275mg, a cada 24 ou 12 horas |
|-------------|------------------------------|



- ▶ **Ajuste de dose:**  
Insuficiência renal: Pode ser necessário ajuste de dose, monitorar.  
Idosos: Administrar com cautela.
- ▶ **ADMINISTRAÇÃO**  
Oral  
Ingerir com água e em jejum ou com alimentos.
- ▶ **Administração com alimentos:**  
Evitar o consumo de álcool.
- ▶ **Administração via sonda:**  
Pode ser administrado via sonda. Triturar e diluir em 20mL de água, administrando imediatamente.
- ▶ **ARMAZENAMENTO**  
Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

**NARATRIPTANA <sup>1,2</sup>**
Antienxaquecoso

Nome comercial:  
Naramig 2,5mg Cp Rev <sup>1,2</sup>  
Naratriptana 2,5mg Cp Rev (EMS) <sup>1,2</sup>

**POSOLOGIA**

**Adulto:**

|             |                        |
|-------------|------------------------|
| Dose padrão | 2,5mg, a cada 24 horas |
| Dose máxima | 5mg ao dia             |

- ▶ **Ajuste de dose:**  
Insuficiência renal:

| Dose com Função Renal Normal | Dose Insuficiência Renal<br>clearance de creatinina (mL/min) |              |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|
| 2,5 mg 24/24h                | 18-39                                                        | < 15         |
|                              | 1 mg 24/24h<br>Máximo: 2,5 mg 24/24h.                        | Não utilizar |

Insuficiência hepática:  
Utilizar 1mg, a cada 24 horas em pacientes com insuficiência leve à moderada.  
No caso de insuficiência hepática grave, o uso é contraindicado.

- ▶ **ADMINISTRAÇÃO**  
Oral  
Administrar logo ao iniciar uma crise de enxaqueca.
- ▶ **Administração via sonda:**  
Pode ser administrado via sonda. Triturar e diluir em 20mL de água, administrando imediatamente.
- ▶ **ARMAZENAMENTO**  
Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

**NATALIZUMAB <sup>1</sup>**
Imunomodulador

Nome comercial:  
Tysabri 300mg FA 15mL <sup>1 \*</sup>

## POSOLOGIA

### Adulto:

|                                         |  |                         |
|-----------------------------------------|--|-------------------------|
| Esclerose Múltipla recorrente-remitente |  | 300mg, a cada 4 semanas |
|-----------------------------------------|--|-------------------------|

► **Ajuste de dose:**

Não é necessário ajuste de dose.

► **ADMINISTRAÇÃO**

Intravenosa

Diluir 15mL em 100mL de SF e administrar por aproximadamente 1 hora.

► **ARMAZENAMENTO**

Conservar em refrigeração entre 2°C e 8°C. Não congelar.

► **Atenção:**

\* Este medicamento é livre de látex.

## N-BUTIL-2-CIANOACRILATO <sup>1,2</sup>

Outros Medicamentos

Nome comercial:

Histoacryl Cola Amp <sup>1,2</sup>

## POSOLOGIA

### Adulto:

|             |  |                                                                                                    |
|-------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dose padrão |  | Aplicar uma fina camada ao longo da junção das bordas da ferida. Não aplicar no interior do corte. |
|-------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------|

► **Ajuste de dose:**

Não é necessário ajuste de dose.

► **ADMINISTRAÇÃO**

Tópico

► **ARMAZENAMENTO**

Conservar em temperatura abaixo de 22°C.

## NEBIVOLOL <sup>1</sup>

Agente Anti-hipertensivo

Nome comercial:

Nebilet 5mg Cp <sup>1</sup>

## POSOLOGIA

### Adulto:

|             |  |                      |
|-------------|--|----------------------|
| Dose padrão |  | 5mg, a cada 24 horas |
|-------------|--|----------------------|

► **Idoso (> 65 anos de idade):**

|             |  |                        |
|-------------|--|------------------------|
| Dose padrão |  | 2,5mg, a cada 24 horas |
|-------------|--|------------------------|

► **Ajuste de dose:**

Insuficiência Renal:

|             |  |                        |
|-------------|--|------------------------|
| Dose padrão |  | 2,5mg, a cada 24 horas |
|-------------|--|------------------------|

Insuficiência hepática: uso contraindicado.

▶ **ADMINISTRAÇÃO**

Oral  
Podem ser ingeridos junto com as refeições.

▶ **ARMAZENAMENTO**

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

**NEOMICINA** <sup>1,2</sup>

Antimicrobiano Aminoglicosídeo

Nome comercial:  
Neomicina 500mg Cap <sup>1,2</sup>

**POSOLOGIA**

**Adulto:**

|             |                       |
|-------------|-----------------------|
| Dose padrão | 500mg, a cada 6 horas |
|-------------|-----------------------|

▶ **Ajuste de dose:**

Não é necessário ajuste de dose.

▶ **ADMINISTRAÇÃO**

Oral

▶ **Administração via sonda:**

Pode ser administrado via sonda. Diluir em 20mL de água, administrando imediatamente.

▶ **ARMAZENAMENTO**

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

▶ **Atenção:**

Receita Branca (2 vias).

**NEOSTIGMINA METILSULFATO** <sup>1,2</sup>

Anticolinesterásico

Nome comercial:  
Prostigmine 0,5mg/mL Amp 1mL <sup>1,2</sup>  
Normastig 0,5mg/ml Amp 1mL <sup>1,2</sup>

**POSOLOGIA**

**Adulto:**

|                                                      |                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Constipação atônica, meteorismo                      | 0,25 a 0,5mg IM/SC                                                                                                                                                             |
| Atonia intestinal pós-operatória e retenção urinária | - Profilaxia: 0,25mg SC/IM imediatamente após a cirurgia. Repetir a cada 4 a 6 horas, se necessário<br>- Tratamento: 0,5mg SC/IM/IV. Repetir a cada 4 a 5 horas, se necessário |

**Criança:**

|                                                      |                      |
|------------------------------------------------------|----------------------|
| Constipação atônica, meteorismo                      | 0,125 a 0,25mg IM/SC |
| Atonia intestinal pós-operatória e retenção urinária | 0,125 a 0,25mg SC/IM |

▶ **Ajuste de dose:**

Insuficiência renal:

| Dose com Função Renal Normal | Dose Insuficiência Renal<br>clearance de creatinina (mL/min) |             |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------|
| 0,5-2,5 mg 24/24h            | 10-50                                                        | < 10        |
|                              | 50% da dose                                                  | 25% da dose |

▶ **ADMINISTRAÇÃO**

Intravenosa, Intramuscular e Subcutânea

▶ **ARMAZENAMENTO**

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C. Proteger da luz.

**NETUPITANTO + PALONOSENTRONA** <sup>1,2</sup>

Antieméticos e Antinauseantes

Nome comercial:

Akynzeo 300mg/0,5mg Cap <sup>1,2</sup>**POSOLOGIA****Adulto:**

|                                                                                                             |                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Quimioterapia altamente emetogênica                                                                         | 1 cápsula, 1 hora antes do início da quimioterapia seguido do uso de dexametasona 12mg oral, 30 min antes da quimioterapia no dia 1 e 8mg oral uma vez ao dia nos dias 2 e 4 |
| Quimioterapia a base de antraciclina e ciclofosfamida e Quimioterapia não considerada altamente emetogênica | 1 cápsula, 1 hora antes do início da quimioterapia                                                                                                                           |

▶ **Ajuste de dose:**

Não é necessário ajuste de dose.

▶ **ADMINISTRAÇÃO**

Oral

▶ **ARMAZENAMENTO**

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

**NICOTINA** <sup>1</sup>

Antitabagismo

Nome comercial:

Nicorette 2mg Goma <sup>1</sup>**POSOLOGIA****Adulto:**

|              |                                          |
|--------------|------------------------------------------|
| Dose padrão  | 2mg toda vez que sentir vontade de fumar |
| Semana 1-6   | 2mg, a cada 1 ou 2 horas                 |
| Semana 7-9   | 2mg, a cada 2 a 4 horas                  |
| Semana 10-12 | 2mg, a cada 4 a 8 horas                  |
| Dose máxima  | 24 unidades ao dia                       |

- ▶ **Ajuste de dose:**  
Não é necessário ajuste de dose.
- ▶ **ADMINISTRAÇÃO**  
Oral  
Mascar por 30 minutos e evitar a ingestão de alimentos nesse período.
- ▶ **ARMAZENAMENTO**  
Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

**NICOTINA <sup>1,2</sup>**
Antitabagismo

Nome comercial:  
 Niquitin 7mg Adv Transdémico <sup>1,2</sup>  
 Niquitin 14mg Adv Transdémico <sup>1,2</sup>  
 Niquitin 21mg Adv Transdémico <sup>1</sup>  
 Nicotinell 14mg Adv Transdémico <sup>1,2</sup>

**POSOLOGIA**

|                                                         |                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Adulto:</b>                                          |                                                                                                                                                              |
| Indivíduos que fumam mais de 10 cigarros por dia        | - 1º Etapa: 1 adv 21mg/dia, nas 6 semanas iniciais<br>- 2º Etapa: 1 adv 14mg/dia, nas 2 semanas seguintes<br>- 3º Etapa: 1 adv 7mg/dia, nas 2 semanas finais |
| Indivíduos que fumam 10 ou menos de 10 cigarros por dia | - 1º Etapa: 1 adv 14mg/dia, nas 6 semanas iniciais<br>- 2º Etapa: 1 adv 7mg/dia, nas 2 semanas finais                                                        |

- ▶ **Ajuste de dose:**  
Não é necessário ajuste de dose.
- ▶ **ADMINISTRAÇÃO**  
Démico  
Aplicar sempre no mesmo horário em regiões sem pelos, seca, lima e quente. Os mesmos locais não devem ser reutilizados por 7 dias.
- ▶ **Administração com alimentos:**  
Evitar o consumo de alimentos e bebidas ácidas.
- ▶ **ARMAZENAMENTO**  
Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C. Proteger da luz.

**NIFEDIPINO <sup>1</sup>**
Antianginoso

Nome comercial:  
 Adalat Oros 30mg Cp <sup>1</sup>

**POSOLOGIA**

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| <b>Adulto:</b>                  |                       |
| Angina do peito crônica estável | 30mg, a cada 24 horas |
| Hipertensão                     | 30mg, a cada 24 horas |

- ▶ **Ajuste de dose:**  
Insuficiência hepática: Administrar com cautela, pode ser necessário ajuste de dose.
- ▶ **ADMINISTRAÇÃO**  
Oral
- ▶ **Administração com alimentos:**  
Evitar o consumo de álcool, suco de toranja (grapefruit).

## ▶ ARMAZENAMENTO

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

## NIMESULIDA <sup>1,2</sup>

Anti-inflamatório não Esteroidal Sistêmico

Nome comercial:

Nisulid 100mg Cp <sup>1,2</sup>

Scaflan 100mg Cp <sup>1,2</sup>

Nimesulida 100mg Cp (Biosintética) <sup>1,2</sup>

Nimesulida 100mg Cp (EMS) <sup>1,2</sup>

## POSOLOGIA

### Adulto e Criança (> 12 anos de idade):

Dose padrão

50 a 100mg, a cada 12 horas

### ▶ Ajuste de dose:

Insuficiência renal grave: O uso é contraindicado.

Insuficiência hepática: O uso é contraindicado.

### ▶ ADMINISTRAÇÃO

Oral

Administrar preferencialmente após as refeições.

### ▶ Administração com alimentos:

Evitar o consumo de alimentos que provoquem irritação gástrica.

### ▶ Administração via sonda:

Pode ser administrado via sonda. Triturar e diluir em 15mL de água, administrando imediatamente.

### ▶ ARMAZENAMENTO

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C. Proteger da luz e umidade.

## NIMODIPINO <sup>1,2</sup>

Bloqueador de Canal de Cálcio

Nome comercial:

Nimodipino 30mg Cp (EMS) <sup>1,2</sup>

Nimodipino 30mg Cp (Germed) <sup>1,2</sup>

Nimovas 30mg Cp Rev <sup>1</sup>

Vasodipina 30mg Cp Rev <sup>1</sup>

## POSOLOGIA

### Adulto:

Dose padrão

30mg, a cada 8 horas

### ▶ Ajuste de dose:

Não é necessário ajuste de dose.

### ▶ ADMINISTRAÇÃO

Oral

Administrar 1 hora antes ou 2 horas depois das refeições.

### ▶ Administração com alimentos:

Evitar o consumo de álcool.

### ▶ Administração via sonda:

Pode ser administrado via sonda. Triturar e diluir em 10mL de água, administrando imediatamente.

### ▶ ARMAZENAMENTO

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C. Proteger da luz.

- ▶ **Atenção:**  
Risco de Queda.

**NISTATINA <sup>1,2</sup>**
Antifúngico Sistêmico

Nome comercial:  
 Neo-mistatin Oral 100.000ui/ml Suspensão Oral Fr <sup>1,2</sup>  
 Nistatina 100.000ui/ml Suspensão Oral Frasco 50ml (Cristália) <sup>1,2</sup>  
 Nistatina 100.000ui/mL Suspensão Oral Frasco 50mL (EMS) <sup>1,2</sup>  
 Nistatina 100.000ui/mL Suspensão Oral Frasco 50mL (Prati Donaduzzi) <sup>1,2</sup>  
 Nistatina 100.000ui/mL Suspensão Oral Frasco 50mL (Teuto) <sup>1,2</sup>

**POSOLOGIA**

**Criança e Adulto:**

|             |                         |
|-------------|-------------------------|
| Dose padrão | 1 a 6mL, a cada 6 horas |
|-------------|-------------------------|

- ▶ **Ajuste de dose:**  
Não é necessário ajuste de dose.
- ▶ **ADMINISTRAÇÃO**  
Oral
- ▶ **ARMAZENAMENTO**  
Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

**NISTATINA <sup>1</sup>**
Anti-infeccioso Ginecológico Tópico

Nome comercial:  
 Micostatin Vaginal Creme Bis 60g <sup>1,2</sup>  
 Neo Mistatin Creme Vaginal 25.000ui/g Tubo 60g <sup>1,2</sup>  
 Nistatina Creme Vaginal 25.000UI/g Tubo 60g (EMS) <sup>1,2</sup>  
 Nistatina Creme Vaginal 25.000UI/g Tubo 60g (Medley) <sup>1,2</sup>  
 Nistatina Creme Vaginal 25.000UI/g Tubo 60g (Prati Donaduzzi) <sup>1,2</sup>  
 Nistatina Creme Vaginal 25.000UI/g Tubo 50g (Prati Donaduzzi) <sup>1,2</sup>  
 Nistatina Creme Vaginal 25.000UI/g Tubo 60g (Neo Química) <sup>1,2</sup>  
 Nistatina Creme Vaginal 25.000UI/g Tubo 60g (Teuto) <sup>1,2</sup>

**POSOLOGIA**

**Adulto:**

|             |                                                  |
|-------------|--------------------------------------------------|
| Dose padrão | 1 a 2 medidas, uma vez ao dia antes de deitar-se |
|-------------|--------------------------------------------------|

- ▶ **Ajuste de dose:**  
Não é necessário ajuste de dose.
- ▶ **ADMINISTRAÇÃO**  
Via Vaginal
- ▶ **ARMAZENAMENTO**  
Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.
- ▶ **Atenção:**  
Receita Branca (2 vias).

**NISTATINA + ÓXIDO ZINCO<sup>1,2</sup>**

Antifúngico Tópico

Nome comercial:

Dermodex Pomada Bis 60g 1,2

Nistatina + Óxido de Zinco (100.000UI/g + 200mg/g) Bis 60g (EMS)<sup>1,2</sup>Nistatina + Óxido de Zinco (100.000UI/g + 200mg/g) Bis 60g (Medley)<sup>1,2</sup>Nistatina + Óxido de Zinco (100.000UI/g + 200mg/g) Bis 60g (Germed)<sup>1,2</sup>**POSOLOGIA****Adulto:**

Dose padrão

Aplicar 2 ou mais vezes ao dia nas áreas afetadas

▶ **Ajuste de dose:**

Não é necessário ajuste de dose.

▶ **ADMINISTRAÇÃO**

Tópico

Limpar a área antes de aplicar.

▶ **ARMAZENAMENTO**

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

▶ **Atenção:**

Receita Branca (2 vias).

**NITAZOXANIDA<sup>1</sup>**

Antiparasitário, Anti-helmíntico

Nome comercial:

Annita 500mg Cp Rev<sup>1</sup>**POSOLOGIA****Adulto e Criança (> 12 anos de idade):**

|                                                                                                    |                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Gastroenterites virais causadas por rotavírus e norovírus                                          | 500mg, a cada 12 horas durante 3 dias                      |
| Helmintíase, amebíase, giardíase, isosporíase, balantidíase, blastocistose                         | 500mg, a cada 12 horas durante 3 dias                      |
| Criptosporidíase em pacientes sem imunodepressão                                                   | 500mg, a cada 12 horas durante 3 dias                      |
| Criptosporidíase em pacientes imunodeprimidos, se a contagem de CD4 for > a 50cels/mm <sup>3</sup> | 500 a 1000mg, a cada 12 horas durante 14 dias              |
| Criptosporidíase em pacientes imunodeprimidos, se a contagem de CD4 for < a 50cels/mm <sup>3</sup> | 500 a 1000mg, a cada 12 horas durante, no mínimo 8 semanas |

▶ **Ajuste de dose:**

Não é necessário ajuste de dose.

▶ **ADMINISTRAÇÃO**

Oral

Administrar preferencialmente junto com alimentos

▶ **ARMAZENAMENTO**

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.



NITROFURANTOÍNA 1

Antimicrobiano Nitrofurano

Nome comercial:  
Macrodantina 100mg Cap 1

POSOLOGIA

Adulto:

|             |                                           |
|-------------|-------------------------------------------|
| Dose padrão | 100mg, a cada 6 horas durante 7 a 10 dias |
|-------------|-------------------------------------------|

- ▶ **Ajuste de dose:**  
Insuficiência renal:

| Dose com Função Renal Normal | Dose Insuficiência Renal<br>clearance de creatinina (mL/min) |        |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------|
|                              | >60-90                                                       | <60    |
| 50-100mg                     | 100%                                                         | Evitar |

- ▶ **ADMINISTRAÇÃO**  
Oral  
Administrar preferencialmente junto às refeições.
- ▶ **Administração com alimentos:**  
Evitar o consumo de álcool.
- ▶ **Administração via sonda:**  
Pode ser administrado via sonda. Dispersar em 15mL de água e administrar imediatamente.
- ▶ **ARMAZENAMENTO**  
Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C. Proteger da luz.
- ▶ **Atenção:**  
Receita Branca (2 vias).

NITROFURAZONA 1

Antimicrobiano Tópico

Nome comercial:  
Furacin 0,2% (2mg/mL) Fr 30mL 1

POSOLOGIA

Adulto e Criança:

|             |                                                                                                             |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dose padrão | Aplicar a solução direta ou indiretamente (utilizando gaze) sobre a lesão, 1 vez ao dia, a cada 2 ou 3 dias |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

- ▶ **Ajuste de dose:**  
Insuficiência renal: Pode ser necessário ajuste de dose, monitorar.
- ▶ **ADMINISTRAÇÃO**  
Tópico
- ▶ **ARMAZENAMENTO**  
Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C. Proteger da luz.

NITROGLICERINA 1,2

Antianginoso

Nome comercial:  
Tridil 50mg Amp 10mL 1,2

**POSOLOGIA****Adulto:**

|             |                |
|-------------|----------------|
| Dose padrão | 5 a 20mcg/min  |
| Dose máxima | 0,5mg/h ao dia |

▶ **Ajuste de dose:**

Não é necessário ajuste de dose.

▶ **ADMINISTRAÇÃO**

Intravenosa

Diluir 100mg em 250mL de SF/SG 5%

Concentração máxima de administração: 400mcg/mL.

▶ **ARMAZENAMENTO**

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C. Proteger da luz.

**NITROPRUSSIATO DE SÓDIO** <sup>1,2</sup>

Agente Anti-hipertensivo

Nome comercial:

Nitroprus 50mg FA 2mL <sup>1,2</sup> \*

**POSOLOGIA****Adulto:**

|             |                   |
|-------------|-------------------|
| Dose padrão | 0,3 a 1mcg/kg/min |
| Dose máxima | 8mcg/kg/min       |

**Criança:**

|             |                   |
|-------------|-------------------|
| Dose padrão | 0,3 a 1mcg/kg/min |
| Dose máxima | 10mcg/kg/min      |

▶ **Ajuste de dose:**

Insuficiência renal, Insuficiência hepática e Idosos: Pode ser necessário ajuste de dose, monitorar.

▶ **ADMINISTRAÇÃO**

Intravenosa

Infusão intermitente: até 50mg em 250mL de SG 5%

Infusão contínua: até 50mg em 1000mL de SG 5%

Concentração máxima de diluição: 1mg/mL

▶ **ARMAZENAMENTO**

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

▶ **Atenção:**

Alta Vigilância.

\* Este medicamento é livre de látex.

**NIVOLUMAB** <sup>1</sup>

Antineoplásico Anticorpo Monoclonal

Nome comercial:

Opdivo 40mg FA 4mL <sup>1</sup> \*

Opdivo 100mg FA 10mL <sup>1</sup> \*

## POSOLOGIA

**Adulto:**

Conforme esquema posológico

► **Ajuste de dose:**

Não é necessário ajuste de dose.

## ► ADMINISTRAÇÃO

Intravenosa, preparo na quimioterapia.

## ▶ ARMAZENAMENTO

Conservar em refrigeração entre 2°C e 8°C, protegido da luz. Não congelar nem agitar.

Após preparo de infusão, possui estabilidade de 24 horas sob refrigeração entre 2°C e 8°C.

► **Atenção:**

\* Este medicamento é livre de látex.

## NOREPINEFRINA <sup>1,2</sup>

### Estimulante Adrenérgico

Nome comercial:

Norepinefrina 8mg Amp 4mL (Hipolabor) <sup>1,2</sup>

Norepinefrina 8mg Amp 4mL (Novafarma) <sup>1,2</sup>

Norepinefrina 8mg Amp 4mL (Hypofarma) <sup>1,2</sup>

## POSOLOGIA

**Adulto:**

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Dose inicial    | 8 a 12mcg/min |
| Dose manutenção | 2 a 4mcg/min  |
| Dose máxima     | 30mcg/min     |

► **Ajuste de dose:**

Não é necessário ajuste de dose.

## ► ADMINISTRAÇÃO

Intravenosa

Intravenosa direta: até 2mg em 10mL de SF.

Infusão: até 4mg em 500mL SG 5%, tempo de infusão 2 a 10mcg/min.

até 8mg em 1000mL SG5%, tempo de infusão 2 a 10mcg/min.

Concentração máxima de diluição: 0,016mg/mL.

## ► ARMAZENAMENTO

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 25°C.

► **Atenção:**

Alta Vigilância.

## NORFLOXACINO <sup>1,2</sup>

## Antimicrobiano Quinolona

Nome comercial:

Floxacin 400mg Cp Rev <sup>1,2</sup>

Norfloxacin 400mg Cp (EMS) <sup>1,2</sup>

Norfloxacino 400mg Cp Rev (Germed) <sup>1,2</sup>

Norfloxacin 400mg Cp Rev (Sandoz) <sup>1,2</sup>

Norfloxacin 400mg Cp (Medley) <sup>1,2</sup>

Norfloxacino 400mg Cp (União Química) <sup>1,2</sup>

**POSOLOGIA**

**Adulto:**

|                                                              |                                               |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Infecção do trato urinário                                   | 400mg, a cada 12 horas durante 7 a 10 dias    |
| Cistite aguda não complicada                                 | 400mg, a cada 12 horas durante 3 a 7 dias     |
| Infecção do trato urinário crônica recidivante               | 400mg, a cada 12 horas durante até 12 semanas |
| Gastroenterite bacteriana aguda                              | 400mg, a cada 12 horas durante 5 dias         |
| Uretrite, faringite, proctite ou cervicite gonocócica agudas | 800mg em dose única                           |
| Febre tifoide                                                | 400mg, a cada 8 horas durante 14 dias         |

► **Ajuste de dose:**

Insuficiência renal:

| Dose com Função Renal Normal | Dose Insuficiência Renal<br>clearance de creatinina (mL/min) |          |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------|
|                              | 10-30                                                        | <10      |
| 200-400mg 12/12h             | 200-400mg 24/24h                                             | Não usar |

► **ADMINISTRAÇÃO**

Oral

Administrar 1 hora antes ou 2 horas depois das refeições.

► **Administração com alimentos:**

Evitar o consumo de álcool.

► **Administração via sonda:**

Pode ser administrado via sonda. Triturar e diluir em 15mL de água, administrando imediatamente.

► **ARMAZENAMENTO**

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

► **Atenção:**

Receita Branca (2 vias).

**NORTRIPTILINA <sup>1,2</sup>**

Antidepressivo

Nome comercial:

Nortriptilina Cloridrato 25mg Cap (Eurofarma) <sup>1</sup>

Nortriptilina Cloridrato 25mg Cap Manip <sup>1</sup>

Pamelor 10mg Cap <sup>1,2</sup>

Pamelor 25mg Cap <sup>1</sup>

**POSOLOGIA**

**Adulto:**

|             |                           |
|-------------|---------------------------|
| Dose padrão | 25mg, a cada 8 ou 6 horas |
| Dose máxima | 150mg/dia                 |

**Idoso e Adolescente:**

|             |                                         |
|-------------|-----------------------------------------|
| Dose padrão | 30 a 50mg por dia, a cada 12 ou 8 horas |
|-------------|-----------------------------------------|

- ▶ **Ajuste de dose:**  
Não é necessário ajuste de dose.
- ▶ **ADMINISTRAÇÃO**  
Oral
- ▶ **Administração com alimentos:**  
Evitar o consumo de álcool e Erva-de-São-João.
- ▶ **Administração via sonda:**  
Pode ser administrado via sonda. Diluir em 15mL de água e administrar imediatamente.
- ▶ **ARMAZENAMENTO**  
Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.
- ▶ **Atenção:**  
Receita Branca (2 vias).

**OCTIL CIANOACRILATO** <sup>1,2</sup>

Debridante

Nome comercial:

Dermabond Adv Líquido <sup>1,2</sup>**POSOLOGIA**

A critério médico.

▶ **Ajuste de dose:**

Não é necessário ajuste de dose.

▶ **ARMAZENAMENTO:**

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

**OCTREOTIDA** <sup>1,2</sup>

Hemostático

Nome comercial:

Sandostatin 0,1mg/mL Amp 1mL <sup>1,2</sup>Sandostatin 0,5mg/mL Amp 1mL <sup>1</sup>**POSOLOGIA****Adulto:**

|                                             |                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acromegalia                                 | 0,05 a 0,1mg SC, a cada 12 ou 8 horas                                                                                                 |
| Tumores endócrinos gastroenteropancreáticos | 0,05mg SC, a cada 24 ou 12 horas. Pode ser aumentada para 0,1 a 0,2mg SC, a cada 8 horas, se necessário                               |
| Diarreia refratária relacionada à AIDS      | 0,1mg, a cada 8 horas SC. Se a diarreia não for controlada após uma semana, a dose deve ser aumentada até 0,25mg oral, a cada 8 horas |
| Complicações após cirurgia pancreática      | 0,1mg, a cada 8 horas SC, durante 7 dias, a começar no dia da cirurgia, pelo menos 1 hora antes                                       |
| Varizes gastroesofágicas sangrantes         | 25mcg/h durante 5 dias por IV contínua                                                                                                |

▶ **Ajuste de dose:**

Não é necessário ajuste de dose.

▶ **ADMINISTRAÇÃO**

Intravenosa e Subcutânea

Intravenosa infusão intermitente: 0,5mg em 60mL de SF por 15 a 30 minutos.

Infusão contínua: 0,5mg em 60mL de SF.

▶ **ARMAZENAMENTO**

Conservar em refrigeração entre 2°C e 8°C. Não congelar.

Após diluição, possui estabilidade de 24 horas em temperaturas abaixo de 25°C.

▶ **Atenção:**

Alto Custo.

**OLANZAPINA** <sup>1,2</sup>

Antipsicótico, Neuroléptico

Nome comercial:

Axonium 2,5mg Cp <sup>1,2</sup>

Olanzapina 5mg Cp Rev (Medley) <sup>1</sup>  
 Olanzapina 2,5mg Cp Rev (Medley) <sup>1</sup>  
 Olanzapina 5mg Cp Rev (Ache) <sup>1</sup>  
 Olanzapina 2,5mg Cp Rev (Ache) <sup>1</sup>  
 Olanzapina 5mg Cp Rev (Eurofarma) <sup>1</sup>  
 Olanzapina 2,5mg Cp (Eurofarma) <sup>1,2</sup>  
 Zyprexa 2,5mg Cp Rev <sup>1</sup>  
 Zyprexa 5mg Cp Rev <sup>1</sup>

**POSOLOGIA**

**Adulto:**

|                                                |                                                                                                    |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Esquizofrenia e transtornos relacionados       | 10mg, a cada 24 horas                                                                              |
| Mania aguda associada ao transtorno bipolar    | 15mg, a cada 24 horas em monoterapia ou 10mg, a cada 24 horas em combinação com lítio ou valproato |
| Prevenção de recorrência do transtorno bipolar | 10mg, a cada 24 horas                                                                              |

**Idoso:**

|             |                      |
|-------------|----------------------|
| Dose padrão | 5mg, a cada 24 horas |
|-------------|----------------------|

- ▶ **Ajuste de dose:**  
Insuficiência renal ou hepática: 5mg diários. Se necessário aumento de dose, administrar com cautela.
- ▶ **ADMINISTRAÇÃO**  
Oral  
Administrar independentemente das refeições.
- ▶ **Administração com alimentos:**  
Evitar o consumo de álcool e Erva-de-São-João.
- ▶ **Administração via sonda:**  
Risco de obstrução de sonda.
- ▶ **ARMAZENAMENTO**  
Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C. Proteger da luz.
- ▶ **Atenção:**  
Receita Branca (2 vias).

**ÓLEO DE AMÊNDOSAS <sup>1</sup>**

Hidratante, Protetor Epidérmico

Nome comercial:  
 Óleo de Amêndoas Fr 100mL <sup>1</sup>  
 Óleo de Amêndoas Fr 60mL <sup>1</sup>

**POSOLOGIA**

**Adulto e Criança:**

|             |                                                        |
|-------------|--------------------------------------------------------|
| Dose padrão | Aplicar sobre as áreas afetadas, a cada 24 ou 12 horas |
|-------------|--------------------------------------------------------|

- ▶ **Ajuste de dose:**  
Não é necessário ajuste de dose.
- ▶ **ADMINISTRAÇÃO**  
Tópico

► **ARMAZENAMENTO**

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

## ÓLEO IODADO DE PAPOULA + IODO <sup>1</sup>

Contraste

Nome comercial:

Lipiodol Ultrafluído Amp 10mL <sup>1</sup>

### POSOLOGIA

A critério médico.

► **Ajuste de dose:**

Não é necessário ajuste de dose.

► **ARMAZENAMENTO**

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

## ÓLEO MINERAL <sup>1,2</sup>

Laxante

Nome comercial:

Nujol Fr 120mL <sup>1,2</sup>

### POSOLOGIA

**Adulto:**

Dose padrão

15mL, a cada 12 horas ou 30mL, a cada 24 horas

**Criança (> 6 anos de idade):**

Dose padrão

1 a 2mL/kg à noite ou pela manhã

► **Ajuste de dose:**

Não é necessário ajuste de dose.

► **ADMINISTRAÇÃO**

Oral

► **ARMAZENAMENTO**

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

## OLMESARTANA MEDOXOMILA <sup>1,2</sup>

Agente Anti-hipertensivo

Nome comercial:

Benicar 20mg Cp Rev <sup>1,2</sup>

Olmetec 20mg Cp Rev <sup>1,2</sup>

Fluxocor 20mg Cp Rev <sup>1,2</sup>

### POSOLOGIA

**Adulto:**

Dose padrão

20mg, a cada 24 horas. Para pacientes que necessitam de redução adicional da pressão arterial, aumentar a dose para 40mg, a cada 24 horas

**Criança (> 6 anos de idade e > 35kg):**

Dose padrão

20mg, a cada 24 horas



- ▶ **Ajuste de dose:**  
Insuficiência renal: Pode ser necessário ajuste de dose, monitorar.
- ▶ **ADMINISTRAÇÃO**  
Oral
- ▶ **Administração com alimentos:**  
Evitar alcaçuz, *Calophyllum*, cola, gengibre, ginseng, murta, pimenta de caiena, bolsa de pastor, cimicífuga, côleo, cratego, *Hydrastis*, papoula da califórnia, quinino, vinca e viso.
- ▶ **ARMAZENAMENTO**  
Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

**OMEPRAZOL SÓDICO <sup>1,2</sup>**
Antiulceroso

Nome comercial:  
 Omeprazol sódico 40mg FA 10mL (Eurofarma) <sup>1,2</sup>  
 Omeprazol sódico 40mg FA 10mL (Cristália) <sup>1,2</sup> \*  
 Oprazon 40mg FA 10mL <sup>1,2</sup>

**POSOLOGIA**

**Adulto:**

|                                                                   |                                  |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Dose padrão                                                       | 40mg, a cada 24 horas            |
| Síndrome de Zollinger-Ellison                                     | 60mg, a cada 24 horas            |
| Portadores de úlcera gástrica ou duodenal (sem sangramento ativo) | 40mg, a cada 24 horas            |
| Profilaxia de aspiração                                           | 40mg, uma hora antes da cirurgia |

- ▶ **Ajuste de dose:**  
Insuficiência hepática: Pode ser necessário ajuste de dose, monitorar.
- ▶ **ADMINISTRAÇÃO**  
Intravenosa  
Reconstituir em 10mL de diluente próprio. Infundir de 3 a 5 minutos.
- ▶ **ARMAZENAMENTO**  
Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C. Proteger da luz.
- ▶ **Atenção:**  
\* Esta apresentação é livre de látex.

**OMEPRAZOL MAGNÉSICO <sup>1</sup>**
Antiulceroso

Nome comercial:  
 Losec Mups 20mg Cp Rev <sup>1</sup>

**POSOLOGIA**

**Adulto:**

|                                                                |                                                               |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Úlcera duodenal, Refluxo gastroesofágico, esofagite de refluxo | 20 a 40mg, a cada 24 horas durante 4 a 8 semanas              |
| Hipersecreção patológica                                       | 60mg, a cada 24 horas. Podendo chegar a 120mg, a cada 8 horas |
| Helicobacter pylori                                            | 20mg, a cada 12 horas em combinação com outros agentes        |
| Úlcera gástrica                                                | 40mg, a cada 24 horas durante 4 a 8 semanas                   |

- ▶ **Ajuste de dose:**  
Não é necessário ajuste de dose.
- ▶ **ADMINISTRAÇÃO**  
Oral  
Administrar, preferencialmente, em jejum.
- ▶ **Administração via sonda:**  
Pode ser administrado via sonda. Diluir em 20mL e administrar imediatamente.
- ▶ **ARMAZENAMENTO**  
Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

**ONDANSETRONA <sup>1,2</sup>**

Antiemético, Procinético

Nome comercial:

Ansentrón 8mg Amp 4mL <sup>1,2</sup>Nausebron 4mg (2mg/mL) Amp 2ml <sup>1,2</sup>Nausebron 8mg (2mg/mL) Amp 4mL <sup>1</sup>Zofran 2mg/mL Amp 2mL <sup>1</sup>Zofran 2mg/mL Amp 4mL <sup>1</sup>**POSOLOGIA****Adulto:**

|                                                              |                                                           |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Náuseas e vômitos induzidos por quimioterapia e radioterapia | 8mg IV/IM, administrada imediatamente antes do tratamento |
| Quimioterapia altamente emetogênica                          | Dose máxima de 16mg infundida durante 15 minutos          |

**Criança e Adolescente (6 meses a 17 anos de idade):**

|             |                                                       |
|-------------|-------------------------------------------------------|
| Dose padrão | Dose calculada baseada na área de superfície corporal |
|-------------|-------------------------------------------------------|

- ▶ **Ajuste de dose:**  
Insuficiência hepática: No caso de insuficiência hepática grave, a dose máxima diária deve ser 8mg.
- ▶ **ADMINISTRAÇÃO**  
Intravenosa ou Intramuscular  
Intravenosa direta: até 8mg em 20mL de água destilada e infundir por 1 a 2 minutos.  
Infusão intermitente: 16mg em 100mL de SF/SG 5% e infundir por 15 minutos.  
Infusão contínua: 1mg/hora por até 24 horas.
- ▶ **Administração com alimentos:**  
Evitar o consumo de Erva-de-São-João.
- ▶ **ARMAZENAMENTO**  
Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C. Proteger da luz.  
A solução diluída em soro possui estabilidade de 7 dias em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

**ONDANSETRONA <sup>1</sup>**

Antiemético, Procinético

Nome comercial:

Vonau Flash 4mg Cp Desintegração Oral <sup>1</sup>Listo 4mg Cp Desintegração Oral <sup>1</sup>**POSOLOGIA**

**Adulto:**

|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Prevenção de náusea e vômito em geral                 | 8mg, a cada 12 horas                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Prevenção de náusea e vômito no pós-operatório        | 16mg, uma hora antes da indução da anestesia                                                                                                                                                                                                                           |
| Quimioterapia altamente emetogênica                   | 24mg, 30 minutos antes do início da quimioterapia                                                                                                                                                                                                                      |
| Quimioterapia moderadamente emetogênica               | 8mg, a cada 12 horas. Administrar a primeira dose 30 minutos antes do início da quimioterapia durante 1 a 2 dias após término da quimioterapia.                                                                                                                        |
| Prevenção de náusea e vômito associado à radioterapia | - 8mg, a cada 8 horas.<br>- Para irradiação total do corpo e radioterapia do abdome em doses fracionadas diárias, 8mg, 1 a 2 horas antes da radioterapia, com doses subsequentes a cada 8 horas após primeira dose, durante 1 a 2 dias após o término da radioterapia. |

**Criança (2 a 11 anos de idade):**

|                                                       |                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Prevenção de náusea e vômito em geral                 | 8 a 16mg diários                                                                                                                                                                                         |
| Prevenção de náusea e vômito no pós-operatório        | 16mg, uma hora antes da indução da anestesia                                                                                                                                                             |
| Quimioterapia moderadamente emetogênica               | 4mg, a cada 8 horas durante 1 a 2 dias após término da quimioterapia                                                                                                                                     |
| Prevenção de náusea e vômito associado à radioterapia | 4mg, a cada 8 horas. A primeira deve ser administrada 1 a 2 horas antes do início da radioterapia, com doses subsequentes a cada 8 horas. Administrar durante 1 a 2 dias após o término da radioterapia. |

- ▶ **Ajuste de dose:**  
Insuficiência hepática grave: A dose diária não deve exceder 8mg.
- ▶ **ADMINISTRAÇÃO**  
Oral  
Administrar independentemente das refeições.
- ▶ **Administração com alimentos:**  
Evitar o consumo de Erva-de-São-João.
- ▶ **Administração via sonda:**  
Pode ser administrado via sonda. Triturar e diluir em 15mL de água, administrando imediatamente.
- ▶ **ARMAZENAMENTO**  
Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

ONDANSETRONA <sup>1,2</sup>

Antiemético, Procinético

Nome comercial:  
 Nausebron 8mg Cp Rev <sup>1,2</sup>  
 Ondantril 4mg Cp Rev <sup>1</sup>  
 Zofran 4mg Cp Rev <sup>1</sup>  
 Zofran 8mg Cp Rev <sup>1,2</sup>

**POSOLOGIA****Adulto:**

Náuseas induzida por  
quimioterapia e radioterapia

8mg, a cada 8 horas, iniciando 1 a 2 horas antes da  
quimioterapia e durante 1 a 2 dias após o término.

▶ **Ajuste de dose:**

Insuficiência hepática grave: A dose diária não deve exceder 8mg, IV.

▶ **ADMINISTRAÇÃO**

Oral

Administrar independentemente das refeições.

▶ **Administração com alimentos:**

Evitar o consumo da Erva-de-São-João.

▶ **Administração via sonda:**

Pode ser administrado via sonda. Triturar e diluir em 15mL de água, administrando imediatamente.

▶ **ARMAZENAMENTO**

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

**ORNITINA <sup>1</sup>**

Hepatoprotetor

Nome comercial:

Hepa Merz 0,5g/mL Amp 10mL <sup>1</sup>

**POSOLOGIA****Adulto:**

|                  |                                |
|------------------|--------------------------------|
| Dose padrão      | Até 4 ampolas, a cada 24 horas |
| Pré-coma ou coma | Até 8 ampolas, a cada 24 horas |

▶ **Ajuste de dose:**

Não é necessário ajuste de dose.

▶ **ADMINISTRAÇÃO**

Intravenosa

Infusão contínua: até 30g em 500mL de SF/SG 5%.

▶ **ARMAZENAMENTO**

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

**ORNITINA <sup>1,2</sup>**

Hepatoprotetor

Nome comercial:

Hepa Merz 0,6g/g Granulado Env 5g <sup>1,2</sup>

**POSOLOGIA****Adulto:**

|             |                        |
|-------------|------------------------|
| Dose padrão | 1 a 2 envelopes ao dia |
| Dose máxima | 6 envelopes/dia        |

▶ **Ajuste de dose:**

Não é necessário ajuste de dose.

- ▶ **ADMINISTRAÇÃO**  
Oral  
Dissolver em bastante líquido e tomar durante ou após as refeições.
- ▶ **Administração via sonda:**  
Pode ser administrado via sonda. Dissolver em água e administrar.
- ▶ **ARMAZENAMENTO**  
Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

OSELTAMIVIR <sup>1</sup>

Antiviral

Nome comercial:  
Tamiflu 30mg Cap <sup>1</sup>  
Tamiflu 75mg Cap <sup>1</sup>

**POSOLOGIA**  
**Adulto e Adolescente (> 13 anos de idade):**

|                     |                                                                                                      |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tratamento da gripe | 75mg, a cada 12 horas durante 5 dias                                                                 |
| Profilaxia da gripe | Após o contato próximo com um indivíduo infectado, a dose é de 75mg, a cada 24 horas durante 10 dias |

- ▶ **Ajuste de dose:**  
Insuficiência renal:

| Dose com Função Renal Normal | Dose Insuficiência Renal<br>clearance de creatinina (mL/min) |                                        |              |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|
|                              | >50-90                                                       | 10-50                                  | <10          |
| 75mg 12/12h                  | 75mg 12/12h                                                  | 30-50: 75mg 12/12h<br><30: 75mg 24/24h | Não há dados |

- ▶ **ADMINISTRAÇÃO**  
Oral  
Administrar com ou sem alimento.
- ▶ **Administração via sonda:**  
Pode ser administrado via sonda. Triturar e diluir em 15mL de água, administrando imediatamente.
- ▶ **ARMAZENAMENTO**  
Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.
- ▶ **Atenção:**  
Receita Branca (2 vias).

OXACILINA <sup>1,2</sup>

Antimicrobiano Penicilina

Nome comercial:  
Oxacilil 500mg FA <sup>1,2</sup>  
Oxacilina 500mg FA (Eurofarma) <sup>1,2</sup>  
Oxanon 500mg FA <sup>1,2</sup>  
Oxacilina 500mg FA (Blausiegel) <sup>1,2</sup> \*

**POSOLOGIA****Adulto e Criança (40kg ou mais):**

|                                                                                                        |                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Infecções leves a moderadas das vias aéreas superiores e infecções localizadas da pele e tecidos moles | 250 a 500mg, a cada 4 a 6 horas |
| Infecções mais graves, tais como das vias aéreas inferiores ou infecções disseminadas                  | 1g ou mais, a cada 4 a 6 horas  |

**Criança (< 40kg):**

|                                                                                                        |                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Infecções leves a moderadas das vias aéreas superiores e infecções localizadas da pele e tecidos moles | 50mg/kg/dia em doses igualmente divididas, a cada 6 horas     |
| Infecções mais graves, tais como das vias aéreas inferiores ou infecções disseminadas                  | 100 mg/kg/dia ou mais, em doses divididas, a cada 4 a 6 horas |

▶ **Ajuste de dose:**

Não é necessário ajuste de dose.

▶ **ADMINISTRAÇÃO**

Intramuscular ou Intravenosa

Intramuscular: Reconstituir em 2,7mL de água para injetáveis.

Infusão intermitente: até 2g em 50mL SF/SG 5%, 15 a 30 minutos.

até 4g em 100mL SF/SG 5%, 15 a 30 minutos.

Intravenosa direta: Durante 10 minutos.

▶ **ARMAZENAMENTO**

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

Após reconstituição, possui estabilidade de 3 dias em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C e de 1 semana sob refrigeração entre 2°C e 8°C.

Após diluição, possui estabilidade de 6 horas em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

▶ **Atenção:**

Receita Branca (2 vias).

\* Esta apresentação é livre de látex.

**OXALIPLATINA <sup>1</sup>**

Antineoplásico Citotóxico

Nome comercial:

Eloxatin 50mg FA 10mL <sup>1</sup>

Eloxatin 100mg FA 20mL <sup>1</sup>

Oxalibbs 100mg FA 20mL <sup>1</sup> \*

Oxalibbs 50mg FA 10mL <sup>1</sup> \*

**POSOLOGIA****Adulto:**

Conforme esquema quimioterápico.

▶ **ARMAZENAMENTO**

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

Após diluição, possui estabilidade de 48 horas sob refrigeração entre 2°C e 8°C e 24 horas em temperatura de 25°C, protegido da luz.

▶ **Atenção:**

Alto Custo.

\* Esta apresentação é livre de látex.

**OXCARBAZEPINA <sup>1</sup>**

Anticonvulsivante

Nome comercial:  
 Trileptal 300mg Cp Rev <sup>1</sup>

**POSOLOGIA**

**Adulto:**

|                                    |                        |
|------------------------------------|------------------------|
| Monoterapia e tratamento adjuvante | 300mg, a cada 12 horas |
| Dose máxima                        | 2.400 mg/dia           |

**Criança:**

|             |                                   |
|-------------|-----------------------------------|
| Dose padrão | 8 a 10 mg/kg/dia, a cada 12 horas |
| Dose máxima | 60 mg/kg/dia                      |

▶ **Ajuste de dose:**

Insuficiência renal:

|                              |                                                                           |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Dose com Função Renal Normal | Dose Insuficiência Renal<br>clearance de creatinina (mL/min)              |
|                              | < 30                                                                      |
| 300mg 24/24h                 | 50% da dose, aumentando lentamente até obter a resposta clínica desejada. |

▶ **ADMINISTRAÇÃO**

Oral  
 Ingerir com líquido.

▶ **Administração com alimentos:**

Evitar o consumo de álcool e Erva-de-São-João.

▶ **Administração via sonda:**

Pode ser administrado via sonda. Triturar e diluir em 15mL de água, administrando imediatamente.

▶ **ARMAZENAMENTO**

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

▶ **Atenção:**

Receita Branca (2 vias).

**OXIBUTININA CLORIDRATO <sup>1</sup>**

Antiespasmódico Urinário

Nome comercial:  
 Retemic 5mg Cp <sup>1</sup>

**POSOLOGIA**

**Adulto:**

|             |                           |
|-------------|---------------------------|
| Dose padrão | 5mg, a cada 12 ou 8 horas |
| Dose máxima | 5mg, a cada 6 horas       |

**Criança (> 5 anos de idade):**

|             |                      |
|-------------|----------------------|
| Dose padrão | 5mg, a cada 12 horas |
| Dose máxima | 5mg, a cada 8 horas  |

▶ **Ajuste de dose:**

Idosos: Administrar com cautela.

▶ **ADMINISTRAÇÃO**

Oral

▶ **Administração com alimentos:**

Evitar o consumo de álcool.

▶ **Administração via sonda:**

Pode ser administrado via sonda. Triturar e diluir em 20mL de água, administrando imediatamente.

▶ **ARMAZENAMENTO**

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C. Proteger da luz.

▶ **Atenção:**

Risco de Queda

**OXICODONA** <sup>1,2</sup>

Analgésico Narcótico

Nome comercial:

Oxycontin 10mg Cp Rev de Liberação Prolongada <sup>1,2</sup>

Oxycontin 20mg Cp Rev de Liberação Prolongada <sup>1,2</sup>

**POSOLOGIA****Adulto:**

|             |                       |
|-------------|-----------------------|
| Dose padrão | 10mg, a cada 12 horas |
|-------------|-----------------------|

▶ **Ajuste de dose:**

Insuficiência renal: Recomenda-se cautela. Doses iniciais entre um terço a metade da dose usual, seguido por ajustes criteriosos de dosagem. Há o aumento da concentração sérica.

Insuficiência hepática: Recomenda-se cautela. A dose deve ser reduzida em pacientes com hepatopatia grave. Há o aumento da concentração sérica e do tempo de meia-vida.

▶ **ADMINISTRAÇÃO**

Oral

▶ **Administração com alimentos:**

Evitar o consumo de álcool e Erva-de-São-João.

▶ **ARMAZENAMENTO**

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C. Proteger da luz.

▶ **Atenção:**

Receita Branca (2 vias).

**OXIMETAZOLINA** <sup>1,2</sup>

Descongestionante Nasal

Nome comercial:

Aturgyl Solução Nasal Fr 15mL <sup>1,2</sup>

**POSOLOGIA****Adulto e Criança (> 6 anos de idade):**



Dose padrão | 2 a 3 atomizações em cada narina, a cada 12 horas durante, no máximo 3 dias.

- ▶ **Ajuste de dose:**  
Não é necessário ajuste de dose.
- ▶ **ADMINISTRAÇÃO**  
Via nasal
- ▶ **ARMAZENAMENTO**  
Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

**PACLITAXEL<sup>1</sup>**

Antineoplásico Citotóxico

Nome comercial:

Ontax 30mg FA 5mL<sup>1\*</sup>Ontax 100mg FA 16,7mL<sup>1\*</sup>Ontax 150mg FA 25mL<sup>1\*</sup>Tarvexol 30mg FA 5mL<sup>1</sup>Taxol 30mg FA 5mL<sup>1</sup>Taxol 100mg FA 16,7mL<sup>1</sup>**POSOLOGIA****Adulto:**

Conforme esquema quimioterápico.

▶ **ADMINISTRAÇÃO**

Intravenosa. Preparo deve ser na Quimioterapia.

▶ **Administração com alimentos:**Evitar cimizifuga e angélica chinesa em tumores dependentes de estrogênio, Erva-de-São-João e valeriana (diminuem os níveis de paclitaxel), *Centella asiática* e kava kava.▶ **ARMAZENAMENTO**

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

Após diluição, possui estabilidade de 27 horas em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

▶ **Atenção:**

Alto Custo.

\* Esta apresentação é livre de látex.

**PALONOSETRONA<sup>1,2</sup>**

Antiemético, Procinético

Nome comercial:

Onicit 0,25mg FA 5mL<sup>1,2</sup> \*Onicit Ponv 0,075mg FA 1,5mL<sup>1</sup> \***POSOLOGIA****Adulto:**

|                                               |                                                                                     |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Náuseas e vômitos induzidos por quimioterapia | 0,25mg como dose única aproximadamente 30 minutos antes da quimioterapia            |
| Náuseas e vômitos no pós-operatório           | 0,075mg como dose única, por 10 segundos, imediatamente antes da indução anestésica |

**Criança e Adolescente (1 mês a 17 anos de idade):**

|                                               |                                                                                     |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Náuseas e vômitos induzidos por quimioterapia | 20 mcg/kg como dose única, durante 15 minutos, em 30 minutos antes da quimioterapia |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

▶ **Ajuste de dose:**

Não é necessário ajuste de dose.

▶ **ADMINISTRAÇÃO**

Intravenosa

Deve ser infundido ao longo de 30 segundos em adultos e de 15 minutos em crianças e adolescentes.

▶ **ARMAZENAMENTO**

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C. Proteger da luz.

- ▶ **Atenção:**  
\* Este medicamento é livre de látex.

**PAMIDRONATO DISSÓDICO <sup>1</sup>**
Inibidor da Reabsorção Óssea

Nome comercial:  
Pamidrom 90mg FA 10mL <sup>1</sup>

**POSOLOGIA**

**Adulto:**

|                                                                                            |                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Metástases ósseas predominantemente líticas e mieloma múltiplo                             | 90mg, a cada 4 semanas                                                  |
| Neoplasia maligna secundária dos ossos que recebem quimioterapia a intervalos de 3 semanas | 90mg, a cada três semanas                                               |
| Hipercalcemia induzida por tumor                                                           | Dose ajustada de acordo com os níveis de cálcio sérico (Tabela 1)       |
| Doença de Paget do osso                                                                    | 30mg, uma vez na semana ou 3 doses unitárias de 60mg, a cada 2 semanas. |

**Tabela 1**

| Cálcio sérico inicial |                | Dose recomendada (mg) |
|-----------------------|----------------|-----------------------|
| Mg/dL                 | nmol/L         |                       |
| < ou igual a 12       | < ou igual a 3 | 15 a 30               |
| 12 a 14               | 3 a 3,5        | 30 a 60               |
| 14 a 16               | 3,5 a 4        | 60 a 90               |
| > 16                  | > 4            | 90                    |

- ▶ **Ajuste de dose:**  
Insuficiência renal: Pode ser necessário ajuste de dose, monitorar.
- ▶ **ADMINISTRAÇÃO**  
Intravenosa  
Reconstituir em 10mL de diluente próprio e diluir em 250mL de SF/SG 5%. Infundir intermitentemente por 90 minutos (60mg/h)
- ▶ **ARMAZENAMENTO**  
Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.  
Após reconstituição, possui estabilidade de 24 horas sob refrigeração entre 2°C e 8°C. Após diluição, possui estabilidade de 24 horas em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.
- ▶ **Atenção:**  
\* Este medicamento é livre de látex.

**PANITUMUMAB <sup>1</sup>**
Antineoplásico Anticorpo Monoclonal

Nome comercial:  
Vectibix 100mg FA 5mL <sup>1\*</sup>

**POSOLOGIA****Adulto:**

Conforme esquema quimioterápico.

▶ **ADMINISTRAÇÃO**

Intravenosa. Preparo deve ser na Quimioterapia.

▶ **ARMAZENAMENTO**

Conservar em refrigeração entre 2°C e 8°C. Não congelar.

▶ **Atenção:**

\* Este medicamento é livre de látex.

**PANTOPRAZOL <sup>1,2</sup>**

Antiulceroso

Nome comercial:

Pantocal 40mg FA 10mL <sup>1,2</sup>

Pantoprazol 40mg + Diluente FA 10mL (Eurofarma) <sup>1,2</sup> \*

Pantozol 40mg FA 10mL <sup>1,2</sup>

**POSOLOGIA****Adulto:**

|                                                                              |                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Úlcera gástrica ou duodenal e das esofagites por refluxo moderadas ou graves | 40mg, a cada 24 horas                                                                                                                                   |
| Síndrome de Zollinger-Ellison e outras patologias hipersecretórias           | 80mg, a cada 24 horas. As doses podem ser aumentadas ou diminuídas conforme resposta clínica. Doses acima de 80mg, devem ser divididas a cada 12 horas. |
| Hemorragia digestiva alta e na prevenção do ressangramento                   | 80mg em bolus seguidos da infusão de 8mg/hora durante 72 horas                                                                                          |
| Profilaxia de sangramento agudo por úlcera de estresse                       | 40 a 80mg, a cada 24 ou 12 horas                                                                                                                        |

▶ **Ajuste de dose:**

Não é necessário ajuste de dose.

▶ **ADMINISTRAÇÃO**

Intravenosa

Reconstituir em 10mL de diluente próprio.

Intravenosa direta: por no mínimo 2 minutos

Infusão intermitente: 100mL SF/SG 5% por 15 minutos.

▶ **ARMAZENAMENTO**

Conservar em temperatura ambiente abaixo de 25°C.

Após reconstituição, possui estabilidade de 12 horas em temperatura ambiente abaixo de 25°C.

▶ **Atenção:**

\* Esta apresentação é livre de látex.

**PANTOPRAZOL <sup>1,2</sup>**

Antiulceroso

Nome comercial:

Pantopaz 40mg Cp <sup>1,2</sup>

Pantoprazol 40mg Cp (Eurofarma) <sup>1,2</sup>

Pantoprazol 40mg Cp (Biosintética) <sup>1,2</sup>  
 Pantoprazol 40mg Cp (EMS) <sup>1,2</sup>  
 Pantozol 40mg Cp <sup>1,2</sup>

**POSOLOGIA**

**Adulto:**

|                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Úlcera péptica duodenal, úlcera péptica gástrica e esofagites de refluxo moderadas ou graves            | 40mg, a cada 24 horas durante ou após o café da manhã                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Erradicação do <i>Helicobacter pylori</i>                                                               | - 40 mg duas vezes ao dia + 1.000 mg de amoxicilina duas vezes ao dia + 500 mg de claritromicina duas vezes ao dia<br>- 40 mg duas vezes ao dia + 500 mg de metronidazol duas vezes ao dia + 500 mg de claritromicina duas vezes ao dia<br>- 40 mg duas vezes ao dia + 1.000 mg de amoxicilina duas vezes ao dia + 500 mg de metronidazol duas vezes ao dia |
| Síndrome de Zollinger-Ellison e outras patologias causadoras de produção exagerada de ácido no estômago | 40mg, a cada 12 horas. A dose pode ser aumentada ou diminuída.                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

**Criança:**

|                                                                                              |                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Úlcera péptica duodenal, úlcera péptica gástrica e esofagites de refluxo moderadas ou graves | - > ou iguais a 15kg a < ou iguais a 40kg: 20mg, a cada 24 horas durante até 8 semanas<br>- > ou iguais a 40kg: 40mg, a cada 24 horas durante até 8 semanas. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

- ▶ **Ajuste de dose:**  
Não é necessário ajuste de dose.
- ▶ **ADMINISTRAÇÃO**  
VO  
Administrar com ou sem alimentos.
- ▶ **Administração com alimentos:**  
Evitar o consumo de álcool.
- ▶ **ARMAZENAMENTO**  
Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

**PAPAÍNA <sup>1</sup>**

Debridante

Nome comercial:  
 Gel de Papaína 2% Tubo 30g <sup>1</sup>  
 Gel de Papaína 6% Tubo 30g <sup>1</sup>  
 Gel de Papaína 10% Tubo 30g <sup>1</sup>  
 Papaína Env 1g <sup>1</sup>

**POSOLOGIA**

**Adulto e Criança:**

|             |                                                                                                        |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dose padrão | Aplicar sobre a área afetada, a cada 24 horas. A troca do curativo deve ser feita a cada 12 a 24 horas |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|

- ▶ **Ajuste de dose:**  
Não é necessário ajuste de dose.
- ▶ **ADMINISTRAÇÃO**  
Tópico
- ▶ **ARMAZENAMENTO**  
Conservar em refrigeração entre 2°C e 8°C.

**PAPAVERINA** <sup>1,2</sup>

Vasodilatador Periférico, Cerebral

Nome comercial:

Papaverina Cloridrato 100mg Amp 2mL <sup>1,2</sup>Hypoverin 100mg Amp 2mL <sup>1,2</sup>**POSOLOGIA****Adulto:**

|                              |                                                    |
|------------------------------|----------------------------------------------------|
| Intra-arterial               | 40mg durante 1 a 2 minutos                         |
| Intravenosa/Intramuscular    | 30 a 120mg, a cada 3 horas                         |
| Intravenosa (casos urgentes) | 100mg lentamente durante 2 minutos, a cada 3 horas |

**Criança:**

|             |                         |
|-------------|-------------------------|
| Dose padrão | 6 mg/kg, a cada 6 horas |
|-------------|-------------------------|

- ▶ **Ajuste de dose:**  
Não é necessário ajuste de dose.
- ▶ **ADMINISTRAÇÃO**  
Intravenosa, Intramuscular ou Intra-arterial
- ▶ **ARMAZENAMENTO**  
Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C. Proteger da luz.

**PARACETAMOL** <sup>1,2</sup>

Analgésico e Antipirético

Nome comercial:

Dorico 750mg Cp <sup>1,2</sup>Paracetamol 750mg Cp (Prati Donaduzzi) <sup>1,2</sup>Paracetamol 750mg Cp (Biosintética) <sup>1,2</sup>Paracetamol 750mg Cp (Neo Química) <sup>1,2</sup>Paracetamol 750mg Cp Rev (EMS) <sup>1,2</sup>Paracetamol 750mg Cp Rev (Germed) <sup>1,2</sup>Paracetamol 750mg Cp Rev (Medley) <sup>1,2</sup>Tylenol 750mg Cp Rev <sup>1,2</sup>**POSOLOGIA****Adulto e Criança (> 12 anos de idade):**

|             |                           |
|-------------|---------------------------|
| Dose padrão | 750mg, 3 a 5 vezes ao dia |
| Dose máxima | 4000mg ao dia             |

- ▶ **Ajuste de dose:**  
Insuficiência renal:

| Dose com Função Renal Normal | Dose Insuficiência Renal<br>clearance de creatinina (mL/min) |             |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------|
| 750mg 4/4h ou 6/6h           | 10-50                                                        | < 10        |
|                              | 750mg 6/6h                                                   | 750mg 8/8h. |

Insuficiência hepática: Pode ser necessário ajuste de dose, monitorar.

- ▶ **ADMINISTRAÇÃO**  
VO  
Administrar independentemente das refeições.
- ▶ **Administração com alimentos:**  
Evitar o consumo de álcool e Erva-de-São-João.
- ▶ **Administração via sonda:**  
Pode ser administrado via sonda. Triturar e diluir em 20 a 40mL de água, adminis-  
trando imediatamente.
- ▶ **ARMAZENAMENTO**  
Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C. Proteger da luz.

**PARACETAMOL <sup>1,2</sup>**

Analgésico e Antipirético

Nome comercial:  
 Paracetamol Gts 200mg/20gts/mL Fr 15mL (EMS) <sup>1,2</sup>  
 Paracetamol Gts 200mg/20gts/mL Fr 15mL (Medley) <sup>1,2</sup>  
 Paracetamol Gts 200mg/20gts/mL Fr 15mL (Germed) <sup>1,2</sup>  
 Tylenol Gts 200mg/20gts/mL Fr 15mL <sup>1,2</sup>

**POSOLOGIA**

**Adulto e Criança (> 12 anos de idade):**

|             |                                      |
|-------------|--------------------------------------|
| Dose padrão | 35 a 55 gotas, de 3 a 5 vezes ao dia |
| Dose máxima | 275 gotas                            |

**Criança (< 12 anos de idade):**

|             |                                                  |
|-------------|--------------------------------------------------|
| Dose padrão | 1 gota/kg até a dose máxima de 35 gotas por dose |
|-------------|--------------------------------------------------|

- ▶ **Ajuste de dose:**  
Insuficiência renal:

| Dose com Função Renal Normal | Dose Insuficiência Renal<br>clearance de creatinina (mL/min) |             |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------|
| 750mg 4/4h ou 6/6h           | 10-50                                                        | < 10        |
|                              | 750mg 6/6h                                                   | 750mg 8/8h. |

Insuficiência hepática: Pode ser necessário ajuste de dose, monitorar.

- ▶ **ADMINISTRAÇÃO**  
VO  
Administrar independentemente das refeições.
- ▶ **Administração com alimentos:**  
Evitar o consumo de álcool e Erva-de-São-João.

► **Administração via sonda:**

Pode ser administrado via sonda. Diluir em 15mL de água e administrar imediatamente.

► **ARMAZENAMENTO**

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

## PARACETAMOL <sup>1</sup>

Analgésico e Antipirético

Nome comercial:

Halexminophen 1000mg (10mg/ml) Bolsa 100ml <sup>1</sup>

### POSOLOGIA

Dose usual de 1.000 mg a cada 6 horas e a dose diária máxima de paracetamol é de 4.000 mg por dia (incluindo todas as vias de administração e todos os produtos contendo paracetamol).

Obs: A dose diária máxima não deve exceder 3 g em pacientes com fatores de risco adicionais para hepatotoxicidade

► **ADMINISTRAÇÃO**

Intravenosa

Infusão intravenosa durante 15 minutos.

► **ARMAZENAMENTO**

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C

## PARACETAMOL + CAFEÍNA <sup>1</sup>

Analgésico e Antipirético

Nome comercial:

Tylenol DC 500mg + 65mg Cp Rev <sup>1</sup>

### POSOLOGIA

#### Adulto e Criança (> 12 anos de idade):

|             |                               |
|-------------|-------------------------------|
| Dose padrão | 2 comprimidos, a cada 6 horas |
| Dose máxima | 8 comprimidos ao dia          |

► **Ajuste de dose:**

Insuficiência hepática: Pode ser necessário ajuste de dose, monitorar. Em casos graves, utilizar apenas doses inferiores a 4g/dia.

► **ADMINISTRAÇÃO**

VO

► **Administração com alimentos:**

Evitar o consumo de álcool e Erva-de-São-João.

► **ARMAZENAMENTO**

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C. Proteger da luz.

## PARACETAMOL + DICLOFENACO DE SÓDIO + CARISOPRODOL + CAFEÍNA <sup>1</sup>

Analgésico, Anti-inflamatório

Nome comercial:

Beserol Cp <sup>1</sup>

Tandrilax Cp <sup>1</sup>



**POSOLOGIA**  
**Adulto e Criança (> 12 anos de idade):**

|             |                               |
|-------------|-------------------------------|
| Dose mínima | 1 comprimido, a cada 12 horas |
| Dose máxima | 1 comprimido, a cada 8 horas  |

- ▶ **Ajuste de dose:**  
Insuficiência hepática: Pode ser necessário ajuste de dose, monitorar.  
Idosos: Administrar com cautela. Possui ação colinérgica, sedação e fraqueza.
- ▶ **ADMINISTRAÇÃO**  
VO
- ▶ **ARMAZENAMENTO**  
Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C. Proteger da luz.

**PARECOXIBE <sup>1</sup>** Anti-inflamatório não Esteroidal Seletivo da COX2

Nome comercial:  
Bextra 40mg FA <sup>1\*</sup>

**POSOLOGIA**  
**Adulto:**

|                                 |                                                |
|---------------------------------|------------------------------------------------|
| Analgesia imediata              | 40mg, IM/IV                                    |
| Cólica renal aguda              | 40mg, IV                                       |
| Prevenção de dor pós-operatória | 40mg, IM/IV, 30 a 45 minutos antes da cirurgia |
| Manutenção da analgesia         | 20mg ou 40mg, a cada 6 a 12 horas              |

- ▶ **Ajuste de dose:**  
Não é necessário ajuste de dose.
- ▶ **ADMINISTRAÇÃO**  
Intravenosa ou Intramuscular  
Reconstituir em 2mL de SF/SG 5%.  
Infusão intravenosa: Diluir em SF/SG 5%.
- ▶ **ARMAZENAMENTO**  
Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.  
Após reconstituição, possui estabilidade de 24 horas em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C, protegida da luz.
- ▶ **Atenção:**  
Receita Branca (2 vias).  
\* Este medicamento é livre de látex.

**PAROXETINA <sup>1,2</sup>** Antidepressivo

Nome comercial:  
Aropax 20mg Cp Rev <sup>1,2</sup>  
Paroxetina 20mg Cp Rev (EMS) <sup>1,2</sup>  
Paroxetina 20mg Cp Rev (União Química) <sup>1,2</sup>  
Paroxetina 20mg Cp Rev (Eurofarma) <sup>1,2</sup>  
Pondera 20mg Cp Rev <sup>1,2</sup>

**POSOLOGIA****Adulto:**

|                                             |                                                                         |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Transtorno depressivo maior                 | 20mg, a cada 24 horas                                                   |
| Transtorno-obsessivo-compulsivo (TOC)       | 40mg, a cada 24 horas. Iniciar com 20mg e aumentar semanalmente.        |
| Transtorno do pânico                        | 40mg, a cada 24 horas. Iniciar com 10mg ao dia e aumentar semanalmente. |
| Fobia social/transtorno de ansiedade social | 20mg, a cada 24 horas                                                   |
| Transtorno de estresse pós-traumático       | 20mg, a cada 24 horas                                                   |

▶ **Ajuste de dose:**

Insuficiência renal:

| Dose com Função Renal Normal | Dose Insuficiência Renal<br>clearance de creatinina (mL/min) |          |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------|
| 10-20mg 24/24h               | 30-60                                                        | < 30     |
|                              | 50% dose                                                     | 25% dose |

Insuficiência hepática: Administrar com cautela.

▶ **ADMINISTRAÇÃO**

VO

Administrar pela manhã, junto com a alimentação.

▶ **Administração com alimentos:**

Evitar o consumo de álcool.

▶ **Administração via sonda:**

Utilizas apenas em condições especiais. Pode ser administrado via sonda. Triturar e diluir em 15mL de água, administrando imediatamente.

▶ **ARMAZENAMENTO**

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

▶ **Atenção:**

Receita Branca (2 vias).

**PEGFILGRASTIM <sup>1</sup>**

Estimulante da Formação de Células Sanguíneas

Nome comercial:

Neulastim 6mg Ser 0,6ml <sup>1</sup>**POSOLOGIA****Adulto:**

|             |                                                                                              |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dose padrão | 6mg, uma vez por ciclo quimioterápico. Administrar 24 horas após a quimioterapia citotóxica. |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|

▶ **Ajuste de dose:**

Não é necessário ajuste de dose.

▶ **ADMINISTRAÇÃO**

Subcutânea

▶ **ARMAZENAMENTO**

Conservar em refrigeração entre 2°C e 8°C. Não congelar.

PEMBROLIZUMAB <sup>1</sup>

Antineoplásico Anticorpo Monoclonal

Nome comercial:  
Keytruda 100 Mg FA <sup>1</sup>

POSOLOGIA

**Adulto:**  
Conforme esquema quimioterápico.

- ▶ **ADMINISTRAÇÃO**  
Intravenosa. Preparo deve ser na Quimioterapia.
- ▶ **ARMAZENAMENTO**  
Conservar em refrigeração entre 2°C e 8°C. Não congelar. Não agitar.

PEMETREXEDE <sup>1</sup>

Antineoplásico Citotóxico

Nome comercial:  
Alimta 100mg FA <sup>1\*</sup>  
Alimta 500mg FA <sup>1</sup>  
Atred 100mg FA <sup>1</sup>  
Atred 500mg FA <sup>1\*</sup>

POSOLOGIA

**Adulto:**  
Conforme esquema quimioterápico.

- ▶ **ADMINISTRAÇÃO**  
Intravenosa, preparo na quimioterapia.
- ▶ **ARMAZENAMENTO**  
Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.  
Após preparo, possui estabilidade de 24 horas em refrigeração entre 2°C e 8°C.
- ▶ **Atenção:**  
Alto Custo.  
\* Esta apresentação é livre de látex.

PENICILINA G BENZATINA <sup>1,2</sup>

Antimicrobiano Penicilina

Nome comercial:  
Benzetacil 1.200.000ui FA 4mL <sup>1,2</sup>  
Bepeben 1.200.000ui FA 4mL <sup>1,2</sup>  
Biozatin 1.200.000ui FA 4mL <sup>1,2</sup>

POSOLOGIA

|                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Adulto:</b>                                                      |                                                                                                                                                                                                                                              |
| Infecções estreptocócicas (grupo A) do trato respiratório e da pele | Injeção de 1.200.000ui                                                                                                                                                                                                                       |
| Sífilis primária, secundária, latente e terciária                   | - Sífilis primária, secundária e latente precoce: injeção de 2.400.00ui<br>- Sífilis latente tardia e terciária, exceto neurosífilis: 3 injeções de 2.400.000ui, com intervalo de 1 semana<br>- Bouba, bejel e pinta: injeção de 1.200.000ui |

**Criança (< 2 e de 2 a 12 anos de idade):**

Sífilis congênita

- Menores de 2 anos: 50.000 ui/kg
- 2 a 12 anos: dose ajustada de acordo com a tabela de adultos

▶ **Ajuste de dose:**

Insuficiência renal:

- Depuração de creatinina entre 10-50mL/min: administrar 75% da dose usual.
- Depuração de creatinina menor que 10mL/min: administrar 20-50% da dose usual.

▶ **ADMINISTRAÇÃO**

Intramuscular

▶ **ARMAZENAMENTO**

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

**PENTAMIDINA <sup>1</sup>**

Antiparasitário Citotóxico

Nome comercial:

Pentamidina 300mg FA <sup>1</sup>**POSOLOGIA****Adulto e Criança (> 4 meses de idade):**

Pneumonia

4mg/kg, IM/IV, a cada 24 horas durante 14 a 21 dias

▶ **Ajuste de dose:**

Insuficiência renal:

Dose com Função Renal  
NormalDose Insuficiência Renal  
clearance de creatinina (mL/min)

4mg/Kg 24/24h

10-50

&lt; 10

4mg/Kg 24/24h ou 36/36h

4mg/Kg 48/48h

▶ **ADMINISTRAÇÃO**

Intravenosa ou Intramuscular

Reconstituir em 3mL de água estéril.

Intravenosa: Diluir em 150 a 250mL de SF/SG 5% e infundir por, no mínimo 1 hora.

▶ **Administração com alimentos:**

Evitar o consumo de álcool.

▶ **ARMAZENAMENTO**

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

Após reconstituição, possui estabilidade de 48 horas em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C, protegido da luz.

Após diluição, possui estabilidade de 24 horas em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C, protegido da luz.

**PENTOXIFILINA <sup>1,2</sup>**

Vasodilatador Periférico, Cerebral

Nome comercial:

Vascer 100mg Amp 5mL <sup>1,2</sup>**POSOLOGIA****Adulto:**

Dose padrão

400mg, a cada 12 horas

- ▶ **Ajuste de dose:**  
Insuficiência renal:

| Dose com Função Renal Normal | Dose com Insuficiência Renal<br>clearance de creatinina (mL/min) |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 400mg, 8/8h ou 12/12h        | < 30                                                             |
|                              | 30-50% dose                                                      |

Insuficiência hepática: Pode ser necessário ajuste de dose, monitorar.

- ▶ **ADMINISTRAÇÃO**  
Intravenosa  
Infusão intermitente ou contínuo: diluir a dose em 250 a 500mL de SF/SG 5% e infundir por 120-180 minutos.
- ▶ **ARMAZENAMENTO**  
Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.
- ▶ **Atenção:**  
Risco de Queda.

PENTOXIFILINA <sup>1</sup>

Vasodilatador Periférico, Cerebral

Nome comercial:  
Pentoxifilina 400mg Cp Rev (EMS) <sup>1</sup>  
Trental 400mg Cp Rev <sup>1</sup>

**POSOLOGIA**

**Adulto:**

|             |                            |
|-------------|----------------------------|
| Dose padrão | 400mg, a cada 8 ou 6 horas |
|-------------|----------------------------|

- ▶ **Ajuste de dose:**  
Insuficiência renal:

| Dose com Função Renal Normal | Dose com Insuficiência Renal<br>clearance de creatinina (mL/min) |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 400mg, 8/8h ou 12/12h        | < 30                                                             |
|                              | 30-50% dose                                                      |

Insuficiência hepática: Pode ser necessário ajuste de dose, monitorar.

- ▶ **ADMINISTRAÇÃO**  
VO  
Administrar, preferencialmente, em jejum.
- ▶ **Administração via sonda:**  
Pode ser administrado via sonda. Triturar e diluir em 50 a 100mL de água, administrando imediatamente.
- ▶ **ARMAZENAMENTO**  
Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.
- ▶ **Atenção:**  
Risco de Queda.

**PERCLORETO FÉRRICO <sup>1</sup>**

Hemostático

Nome comercial:

Hemogin 50% Gel Fr 10g Manipulado <sup>1</sup>**POSOLOGIA****Adulto:**

A critério médico.

▶ **ARMAZENAMENTO**

Conservar em temperatura ambiente entre 8°C e 15°C.

**PERICIAZINA <sup>1</sup>**

Antipsicótico, Neuroléptico

Nome comercial:

Neuleptil 4% Gts Fr 20mL (40gts/mL) <sup>1</sup>**POSOLOGIA****Adulto:**

|              |                                                                                             |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dose inicial | 5 gotas, a cada 24 horas durante os três primeiros dias.<br>Aumentar a dose gradativamente. |
| Dose padrão  | 20 a 25mg, a cada 12 ou 8 horas                                                             |

▶ **Ajuste de dose:**

Não é necessário ajuste de dose.

▶ **ADMINISTRAÇÃO**

VO

Diluir em água açucarada.

▶ **Administração com alimentos:**

Evitar o consumo de álcool.

▶ **Administração via sonda:**

Pode ser administrado via sonda. Diluir 40 gotas em 10mL de água e administrar imediatamente.

▶ **ARMAZENAMENTO**

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

▶ **Atenção:**

Receita Branca (2 vias).

Risco de Queda.

**PERMANGANATO DE POTÁSSIO <sup>1</sup>**

Outros Medicamentos

Nome comercial:

Permanganato de Potássio 100mg Cp <sup>1</sup>**POSOLOGIA****Adulto:**

|             |                                                                                                    |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dose padrão | Preparar uma solução aquosa dissolvendo 100mg em 4L de água filtrada e utilizar a cada 6 a 8 horas |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|

▶ **Ajuste de dose:**

Não é necessário ajuste de dose.

- ▶ **ADMINISTRAÇÃO**  
Tópico
- ▶ **ARMAZENAMENTO**  
Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

**PERTUZUMABE <sup>1</sup>**
Antineoplásico Anticorpo Monoclonal

Nome comercial:  
Perjeta 420mg FA <sup>1</sup>

**POSOLOGIA**  
**Adulto:**  
Conforme esquema quimioterápico.

- ▶ **ADMINISTRAÇÃO**  
Intravenosa. Preparo deve ser na Quimioterapia.
- ▶ **ARMAZENAMENTO**  
Conservar em refrigeração entre 2°C e 8°C. Não congelar. Não agitar.

**PICOSSULFATO SÓDICO <sup>1,2</sup>**
Laxante

Nome comercial:  
Guttalax 7,5mg/mL Gts Fr 30mL <sup>1,2</sup>

**POSOLOGIA**  
**Adulto:**

|             |                                |
|-------------|--------------------------------|
| Dose padrão | 10 a 20 gotas, a cada 24 horas |
|-------------|--------------------------------|

**Criança:**

|                            |                                |
|----------------------------|--------------------------------|
| Acima de 10 anos de idade  | 10 a 20 gotas, a cada 24 horas |
| De 4 a 10 anos de idade    | 5 a 10 gotas, a cada 24 horas  |
| Menores de 4 anos de idade | 0,25mg/kg, a cada 24 horas     |

- ▶ **Ajuste de dose:**  
Não é necessário ajuste de dose.
- ▶ **ADMINISTRAÇÃO**  
VO  
Administrar preferencialmente à noite.
- ▶ **Administração via sonda:**  
Pode ser administrado via sonda. Diluir as gotas em 10mL de água e administrar imediatamente.
- ▶ **ARMAZENAMENTO**  
Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

**PILOCARPINA <sup>1</sup>**
Outros – Dermatológicos, Otológicos e Oftalmológicos

Nome comercial:  
Pilocarpina 2% Sol Oft Fr 10mL(19gts/mL) <sup>1</sup>

**POSOLOGIA****Adulto:**

A critério médico.

▶ **ADMINISTRAÇÃO**

Tópico

▶ **ARMAZENAMENTO**

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

**PIOGLITAZONA CLORIDRATO <sup>1</sup>**

Hipoglicemiante

Nome comercial:

Actos 30mg Cp <sup>1</sup>Cloridrato de Pioglitazona 15mg Cp (Nova Química) <sup>1</sup>Pioglitazona 15mg Cp (EMS) <sup>1</sup>Pioglitazona 15mg Cp (Torrent) <sup>1</sup>Piotaz 15mg Cp <sup>1</sup>Stanglit 15mg Cp <sup>1</sup>Stanglit 30mg Cp <sup>1</sup>**POSOLOGIA****Adulto:**

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| Dose inicial | 15 ou 30mg ao dia |
| Dose padrão  | 15 a 45mg, ao dia |

▶ **Ajuste de dose:**

Insuficiência hepática: Pode ser necessário ajuste de dose, monitorar.

▶ **ADMINISTRAÇÃO**

VO

Administrar independentemente das refeições.

▶ **Administração com alimentos:**Evitar o consumo de álcool, aipo, alho, alfafa, aloe vera, bardana, damiana, feno grego, *garcinia*, gengibre, ginseng, *gymnema*, marshmallow, melão de São Caetano, mirtilo e urtiga.▶ **ARMAZENAMENTO**

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C. Proteger da luz.

**PIPERACILINA + TAZOBACTAM <sup>1,2</sup>**

Antimicrobiano Penicilina

Nome comercial:

Tazocin 2,25g FA <sup>1,2</sup>Tazocin 4,5g FA <sup>1,2</sup>Piperacilina 2g + Tazobactam 0,25g FA (Eurofarma) <sup>1,2</sup> \*Piperacilina 2g + Tazobactam 0,25g FA (Mylan) <sup>1,2</sup>Piperacilina 4g + Tazobactam 0,5g FA (Mylan) <sup>1,2</sup>Piperacilina 4g + Tazobactam 0,5g FA (Novafarma) <sup>1,2</sup>Piperacilina 4g + Tazobactam 0,5g FA (Eurofarma) <sup>1,2</sup>Piperacilina 4g + Tazobactam 0,5g FA (Aurobindo) <sup>1,2</sup>



**POSOLOGIA**

**Adulto e Criança (> 12 anos de idade):**

|                  |                                          |
|------------------|------------------------------------------|
| Dose padrão      | 4,5g, a cada 8 horas durante 7 a 14 dias |
| Infecções graves | 4,5g, a cada 6 horas durante 7 a 10 dias |

**Criança (< 12 anos de idade):**

|             |                         |
|-------------|-------------------------|
| Dose padrão | 80mg/kg, a cada 6 horas |
|-------------|-------------------------|

- ▶ **Ajuste de dose:**  
Insuficiência renal:

| Dose com Função Renal Normal | Dose Insuficiência Renal<br>clearance de creatinina (mL/min) |                               |            |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------|
|                              | >50-90                                                       | 10-50                         | <10        |
| 3,375-4,5g<br>6/6h ou 8/8h   | 100%                                                         | 2,25g 6/6h<br><20: 2,25g 8/8h | 2,25g 8/8h |

- ▶ **ADMINISTRAÇÃO**  
Intravenosa  
Reconstituir em 10mL de água destilada.  
Intravenosa direta: durante 3 a 5 minutos.  
Infusão intermitente: até 4,5g em 50mL de SF/SG 5% e infundir de 20 a 30 minutos.
- ▶ **ARMAZENAMENTO**  
Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.  
Após reconstituição, possui estabilidade de 24 horas em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C ou 48 horas em refrigeração entre 2°C e 8°C.
- ▶ **Atenção:**  
Alto Custo.  
Receita Branca (2 vias).  
\* Esta apresentação é livre de látex.

**PIRIDOSTIGMINA <sup>1,2</sup>**

Anticolinesterásico

Nome comercial:  
Mestinon 60mg Cp <sup>1,2</sup>

**POSOLOGIA**

**Adulto:**

|                                                                                                                                  |                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Atonia intestinal, constipação atônica                                                                                           | 60mg, em intervalos regulares             |
| Miastenia gravis pseudoparalítica                                                                                                | 60 a 180mg, a cada 6 a 12 horas           |
| Doença de Little, esclerose múltipla, esclerose lateral amiotrófica, mioatrofias espinhais, paresias consecutivas à poliomielite | 60 a 360mg, a cada 24 horas               |
| Prevenção de distúrbios pós-punção lombar e do meningismo pós-eletroencefalografia                                               | 60mg, 15 minutos antes de punção ou exame |

► **Ajuste de dose:**

Insuficiência renal: Pode ser necessário reduzir a dose, monitorar.

► **ADMINISTRAÇÃO**

VO

► **Administração via sonda:**

Pode ser administrado via sonda. Triturar e diluir em 20mL de água, administrando imediatamente.

► **ARMAZENAMENTO**

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

## PIRIMETAMINA <sup>1</sup>

Antiparasitário, Anti-helmíntico

Nome comercial:

Daraprim 25mg Cp <sup>1</sup>

### POSOLOGIA

#### Adulto e Criança (> 10 anos de idade):

Profilaxia da malária

25mg, a cada semana

#### Adulto e Criança (> 14 anos de idade):

Tratamento da malária

50 a 75mg juntamente com 1.000 a 1.500mg de sulfadiazina em dose única

#### Adulto e Criança (> 6 anos de idade):

Toxoplasmose

- Dose inicial: 100mg  
- Dose manutenção 25 a 50mg ao dia

Obs: Administrar concomitantemente com sulfadiazina ou outra sulfonamida adequada.

► **Ajuste de dose:**

Não é necessário ajuste de dose.

► **ADMINISTRAÇÃO**

VO

Administrar independentemente das refeições.

► **Administração via sonda:**

Pode ser administrado via sonda. Triturar e diluir em 15mL de água, administrando imediatamente.

► **ARMAZENAMENTO**

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C. Proteger da luz.

## PLANTAGO <sup>1</sup>

Laxante

Nome comercial:

Metamucil 5,85g Env <sup>1</sup>

Plantaben 5g Env <sup>1</sup>

### POSOLOGIA

#### Adulto e Criança (> 12 anos de idade):

Dose padrão

1 envelope dissolvido em água, a cada 12 ou 8 horas

**Criança (6 a 12 anos de idade):**

Dose padrão

½ envelope dissolvido em água, a cada 12 ou 8 horas

- ▶ **Ajuste de dose:**  
Não é necessário ajuste de dose.
- ▶ **ADMINISTRAÇÃO**  
VO
- ▶ **ARMAZENAMENTO**  
Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

PLERIXAFOR<sup>1</sup>

Estimulante da Formação de Células Sanguíneas

Nome comercial:  
Mozobil 20mg FA 1,2mL<sup>1</sup>

**POSOLOGIA**

**Adulto:**

Dose padrão

0,24mg/kg, a cada 24 horas

- ▶ **Ajuste de dose:**  
Insuficiência renal:

| Dose com Função Renal Normal | Dose Insuficiência Renal<br>clearance de creatinina (mL/min) |                     |                      |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|
|                              | <50                                                          | 20-50               | <20                  |
| 0,24mg/kg<br>24/24h          | Dose máxima:<br>27mg ao dia                                  | 0,16mg/kg<br>24/24h | Evitar administração |

- ▶ **ADMINISTRAÇÃO**  
Subcutânea
- ▶ **ARMAZENAMENTO**  
Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

POLICRESULENO + CINCHOCAÍNA<sup>1,2</sup>

Anti-hemorroidário

Nome comercial:  
Proctyl Sup<sup>1,2</sup>

**POSOLOGIA**

**Adulto:**

Dose padrão

1 supositório, após evacuação prévia, a cada 8 ou 12 horas

- ▶ **Ajuste de dose:**  
Não é necessário ajuste de dose.
- ▶ **ADMINISTRAÇÃO**  
Via retal
- ▶ **Administração com alimentos:**  
Deve-se evitar a ingestão de gorduras de difícil digestão, condimentos picantes como páprica ou curry, carnes fortemente assadas ou grelhadas, produtos defumados, alimentos que provocam gases, como café, chá, chocolate e álcool.

## ► ARMAZENAMENTO

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

## POLICRESULENO + CINCHOCAÍNA <sup>1</sup>

Anti-hemorroidário

Nome comercial:

Policresuleno 15g + Cinchocaína 0,3g Pomada Bis 30g Manip <sup>1</sup>

Proctyl Pomada Bis 30g <sup>1</sup>

## POSOLOGIA

### Adulto:

|             |                                                   |
|-------------|---------------------------------------------------|
| Dose padrão | 1 aplicação na área afetada, a cada 12 ou 8 horas |
|-------------|---------------------------------------------------|

### ► Ajuste de dose:

Não é necessário ajuste de dose.

### ► ADMINISTRAÇÃO

Tópico

### ► Administração com alimentos:

Deve-se evitar a ingestão de gorduras de difícil digestão, condimentos picantes como páprica ou curry, carnes fortemente assadas ou grelhadas, produtos defumados, alimentos que provocam gases, como café, chá, chocolate e álcool.

### ► ARMAZENAMENTO

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

## POLIDOCANOL <sup>1</sup>

Outros – Aparelho Cardiovascular

Nome comercial:

Polidocanol 1% Amp 2mL Manip <sup>1</sup>

## POSOLOGIA

### Adulto:

A critério médico.

### ► ARMAZENAMENTO

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

## POLIMIXINA B <sup>1,2</sup>

Antimicrobiano Polimixina

Nome comercial:

Polimixina B Sulfato 500.000UI Fap (Eurofarma) <sup>1,2</sup> \*

Bedfordpoly B Frasco-ampola 500.000UI <sup>1,2</sup>

## POSOLOGIA

### Adulto e Criança:

|             |                                                                                 |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Dose padrão | 25.000 ui/kg/dia, pode ser dividido e administrado em intervalos de 4 a 6 horas |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|

|             |                  |
|-------------|------------------|
| Dose máxima | 45.000 ui/kg/dia |
|-------------|------------------|

### ► Ajuste de dose:

Insuficiência renal:

| Dose com Função Renal Normal         | Dose Insuficiência Renal<br>clearance de creatinina (mL/min) |                                   |                               |                               |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
|                                      | >50-90                                                       | 20-50                             | 5-20                          | <5                            |
| 15.000-25.000 unid/Kg/dia div 12/12h | 15.000-25.000 unid/Kg/dia div 12/12h                         | 75-100% da dose normal div 12/12h | 50% da dose normal div 12/12h | 15% da dose normal div 12/12h |

- ADMINISTRAÇÃO**  
 Intravenosa e Intramuscular  
 Reconstituir em 10mL de água destilada IV. Reconstituir em 2mL de água destilada IM. Infusão intermitente: até 500.000ui em 500mL de SG 5% por 60 a 90 minutos.
- ARMAZENAMENTO**  
 Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 25°C.  
 A solução diluída em soro possui estabilidade de 24 horas em refrigeração entre 2°C e 8°C ou em temperatura ambiente entre 15°C e 25°C.
- Atenção:**  
 Receita Branca (2 vias).  
 \* Esta apresentação é livre de látex.

**POLISSULFATO DE MUCOPOLISSACARÍDEO**
<sup>1,2</sup>

Anti-inflamatório não Esteroidal Tópico

Nome comercial:  
Hirudoid 300mg Gel Bis 40g <sup>1,2</sup>

**POSOLOGIA**

**Adulto:**

|             |                                                                           |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Dose padrão | Aplicar uma camada sobre a área afetada, friccionando, a cada 6 a 8 horas |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------|

- Ajuste de dose:**  
 Não é necessário ajuste de dose.
- ADMINISTRAÇÃO**  
 Tópico
- ARMAZENAMENTO**  
 Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

**POSACONAZOL**
<sup>1</sup>

Antifúngico Sistêmico

Nome comercial:  
Noxafil 4,2g Susp Oral Fr 105 mL <sup>1</sup>

**POSOLOGIA**

**Adulto:**

|                                |                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Infecções fúngicas refratárias | 10mL, a cada 12 horas com alimento ou suplemento nutricional. Para pacientes que não podem tolerar uma refeição ou um suplemento nutricional, administrar 5mL, a cada 6 horas |
| Candidíase                     | No primeiro dia de tratamento, tomar 5mL. Após o primeiro dia, tomar 2,5mL, a cada 24 horas com alimento ou suplemento nutricional.                                           |

Prevenção de infecções  
fúngicas graves

5mL, a cada 8 horas com alimento ou suplemento nutricional

► **Ajuste de dose:**

Insuficiência renal: Pode ser necessário ajuste de dose, monitorar.

Insuficiência hepática: Pode ser necessário ajuste de dose, monitorar.

► **ADMINISTRAÇÃO**

VO

Administrar com uma refeição ou com 240mL de suplemento nutricional.

► **ARMAZENAMENTO**

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

## PRAMIPEXOL <sup>1,2</sup>

Antiparkinsoniano

Nome comercial:

Pramipexol 0,25mg Cp (Biosintética) <sup>1,2</sup>

Sifrol 0,125mg Cp <sup>1</sup>

Sifrol 0,25mg Cp <sup>1,2</sup>

Sifrol 1mg Cp <sup>1</sup>

### POSOLOGIA

#### Adulto:

|           |                         |
|-----------|-------------------------|
| 1ª semana | 0,125mg, a cada 8 horas |
| 2ª semana | 0,25, a cada 8 horas    |
| 3ª semana | 0,5, a cada 8 horas     |

► **Ajuste de dose:**

Insuficiência renal:

| Dose com Função<br>Renal Normal | Dose Insuficiência Renal<br>clearance de creatinina (mL/min) |                   |                |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|
|                                 | >50                                                          | 20-50             | <20            |
| 0,375mg 24/24h                  | 0,375mg<br>24/24h                                            | 0,125mg<br>12/12h | 0,125mg 24/24h |

► **ADMINISTRAÇÃO**

VO

Ingerir com ou sem alimento.

► **Administração com alimentos:**

Evitar o consumo de álcool e erva de São-João.

► **Administração via sonda:**

Pode ser administrado via sonda. Triturar e diluir em 15mL de água, administrando imediatamente.

► **ARMAZENAMENTO**

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

► **Atenção:**

Receita Branca (2 vias).

## PRASUGREL CLORIDRATO <sup>1</sup>

Outros - Sangue e Órgãos Hematopoiéticos

Nome comercial:

Effient 10mg Cp Rev <sup>1</sup>

**POSOLOGIA**

**Adulto:**

|             |                                                    |
|-------------|----------------------------------------------------|
| Dose padrão | Iniciar com 60mg, seguido de 10mg, a cada 24 horas |
|-------------|----------------------------------------------------|

**Idoso (> ou iguais a 75 anos de idade):**

|             |                                                                                               |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dose padrão | Iniciar com 60mg e em seguida, considerar a administração de uma dose de 5mg como alternativa |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|

- ▶ **Ajuste de dose:**  
Insuficiência hepática grave: O uso não é recomendado.  
Idosos: Administrar com cautela.
- ▶ **ADMINISTRAÇÃO**  
VO  
Administrar independentemente das refeições.
- ▶ **ARMAZENAMENTO**  
Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

**PRAVASTATINA <sup>1</sup>**

Hipolipêmico

Nome comercial:  
Pravastatina 10mg Cp (Medley) <sup>1</sup>

**POSOLOGIA**

**Adulto e Adolescente (> 14 anos de idade):**

|             |                            |
|-------------|----------------------------|
| Dose padrão | 40 a 80mg, a cada 24 horas |
| Dose máxima | 80mg, a cada 24 horas      |

**Criança (14 a 18 anos de idade):**

|             |                       |
|-------------|-----------------------|
| Dose padrão | 40mg, a cada 24 horas |
|-------------|-----------------------|

- ▶ **Ajuste de dose:**  
Insuficiência renal: 10mg, a cada 24 horas  
Insuficiência hepática: 10mg, a cada 24 horas.
- ▶ **ADMINISTRAÇÃO**  
VO  
Administrar preferencialmente à noite.
- ▶ **Administração com alimentos:**  
Evitar o consumo de álcool e Erva-de-São-João.
- ▶ **Administração via sonda:**  
Pode ser administrado via sonda. Triturar e diluir em 15mL de água, administrando imediatamente.
- ▶ **ARMAZENAMENTO**  
Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

**PREDNISOLONA <sup>1</sup>**

Anti-inflamatório Esteroidal Sistêmico

Nome comercial:  
Predsim 5mg Cp <sup>1</sup>  
Prelone 5mg Cp <sup>1</sup>

**POSOLOGIA****Adulto:**

|                    |                                                                                          |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dose padrão        | 5 a 60mg ao dia                                                                          |
| Esclerose múltipla | 200mg, a cada 24 horas durante 1 semana, seguidos de 80mg, a cada 48 horas durante 1 mês |

**Criança:**

|             |                      |
|-------------|----------------------|
| Dose padrão | 0,14 a 2mg/kg ao dia |
|-------------|----------------------|

▶ **Ajuste de dose:**

Não é necessário ajuste de dose.

▶ **ADMINISTRAÇÃO**

VO

▶ **Administração com alimentos:**

Evitar o consumo de álcool e Erva-de-São-João.

▶ **Administração via sonda:**

Pode ser administrado via sonda. Triturar e diluir em 15mL de água, administrando imediatamente.

▶ **ARMAZENAMENTO**

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

**PREDNISONA <sup>1,2</sup>**

Anti-inflamatório Esteroidal Sistêmico

Nome comercial:

Meticorten 5mg Cp <sup>1,2</sup>

Meticorten 20mg Cp <sup>1,2</sup>

Prednisona 5mg Cp (Medley) <sup>1,2</sup>

Prednisona 20mg Cp (Medley) <sup>1,2</sup>

Prednisona 5mg Cp (EMS) <sup>1,2</sup>

**POSOLOGIA****Adulto:**

|             |                           |
|-------------|---------------------------|
| Dose padrão | 5 a 60mg, a cada 24 horas |
| Dose máxima | 250mg, a cada 24 horas    |

**Criança:**

|             |                                                                          |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Dose padrão | 0,14 a 2mg/kg, fracionados a cada 6 horas ou dose única, a cada 24 horas |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------|

▶ **Ajuste de dose:**

Não é necessário ajuste de dose.

▶ **ADMINISTRAÇÃO**

VO

Administrar, preferencialmente, pela manhã.

▶ **Administração com alimentos:**

Evitar o consumo de álcool e Erva-de-São-João.

▶ **Administração via sonda:**

Pode ser administrado via sonda. Triturar e diluir em 15mL de água, administrando imediatamente.



- ▶ **ARMAZENAMENTO**  
Conservar em temperatura entre 2°C e 30°C.

**PREGABALINA** <sup>1,2</sup>

Anticonvulsivante

Nome comercial:  
Lyrice 75mg Cap <sup>1,2</sup>  
Prebictal 50mg Cap <sup>1</sup>

**POSOLOGIA**

**Adulto:**

|                                            |                                                                                                              |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dor neuropática                            | 75mg, a cada 12 horas                                                                                        |
| Epilepsia                                  | 75mg, a cada 12 horas. A dose pode ser aumentada para 150mg, a cada 12 horas após um intervalo de 3 a 7 dias |
| Transtorno de Ansiedade Generalizada (TAG) | 150 a 600mg, divididas em duas a três doses                                                                  |
| Fibromialgia                               | 300 a 450mg, dividida em duas doses                                                                          |

- ▶ **Ajuste de dose:**  
Insuficiência renal:

| Dose com Função Renal Normal | Dose Insuficiência Renal<br>clearance de creatinina (mL/min) |                                     |                                      |                         |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|
|                              | >60                                                          | 30-60                               | 15-30                                | <15                     |
| 75mg 12/12h                  | 150mg/dia,<br>2-3 doses<br>divididas                         | 75mg/dia,<br>2-3 doses<br>divididas | 225-50mg/dia, 1-2<br>doses divididas | 25mg/dia,<br>dose única |

- ▶ **ADMINISTRAÇÃO**  
VO  
Ingerir com ou sem alimento.
- ▶ **Administração com alimentos:**  
Evitar o consumo de álcool e Erva-de-São-João
- ▶ **Administração via sonda:**  
Pode ser administrado via sonda. Triturar e diluir em 15mL de água, administrando imediatamente.
- ▶ **ARMAZENAMENTO**  
Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.
- ▶ **Atenção:**  
Receita Branca (2 vias).

**PRIMIDONA** <sup>1</sup>

Anticonvulsivante

Nome comercial:  
Primid 100mg Cp <sup>1</sup>

**POSOLOGIA****Adulto e Criança (> 8 anos de idade):**

|                   |                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anticonvulsivante | - 3 primeiros dias: 100 a 125mg, a cada 24 horas<br>- 3 dias seguintes: 100 ou 125mg, a cada 12 horas.<br>- 3 dias seguintes: 100 ou 125mg, a cada 8 horas.<br>- 10º dia: 250mg, a cada 8 horas |
| Dose máxima       | 2.000mg/dia                                                                                                                                                                                     |

▶ **Ajuste de dose:**

Insuficiência renal:

| Dose com Função Renal Normal | Dose Insuficiência Renal clearance de creatinina (mL/min) |                          |                            |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|
|                              | >50-80                                                    | 10-50                    | <10                        |
| 100-125mg 8/8h               | 100-125mg 8/8h                                            | 100-125mg 8/8h ou 12/12h | 100-125mg 12/12h ou 24/24h |

▶ **ADMINISTRAÇÃO**

VO

▶ **Administração com alimentos:**

Evitar o consumo de álcool e Erva-de-São-João.

▶ **Administração via sonda:**

Pode ser administrado via sonda. Triturar e diluir em 15mL de água, administrando imediatamente.

▶ **ARMAZENAMENTO**

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C. Proteger da luz.

▶ **Atenção:**

Receita Branca (2 vias).

**PROMETAZINA** <sup>1,2</sup>

Anti-histamínico H1

Nome comercial:

Fenergan 50mg Amp 2mL <sup>1,2</sup>**POSOLOGIA****Adulto:**

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| Dose padrão  | A critério médico |
| Quadro agudo | 25 a 50mg IM      |

▶ **Ajuste de dose:**

Não é necessário ajuste de dose.

▶ **ADMINISTRAÇÃO**

Intramuscular

▶ **Administração com alimentos:**

Evitar o consumo de álcool.

▶ **ARMAZENAMENTO**

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C. Proteger da luz.

PROMETAZINA 1

Anti-histamínico H1

Nome comercial:  
Fenergan 25mg Cp Rev 1

POSOLOGIA

Adulto:

|                                       |                                                                                                  |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dose padrão                           | 50 a 150mg ao dia, fracionadas a cada 6 a 12 horas, reservando a maior fração para a noite       |
| ▶ <b>Ajuste de dose:</b>              | Não é necessário ajuste de dose.                                                                 |
| ▶ <b>ADMINISTRAÇÃO</b>                | VO                                                                                               |
| ▶ <b>Administração com alimentos:</b> | Evitar o consumo de álcool e Erva-de-São-João.                                                   |
| ▶ <b>Administração via sonda:</b>     | Pode ser administrado via sonda. Triturar e diluir em 15mL de água, administrando imediatamente. |
| ▶ <b>ARMAZENAMENTO</b>                | Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.                                             |

PROPAFENONA 1,2

Antiarrítmico

Nome comercial:  
Ritmonorm 300mg Cp Rev 1,2  
Cloridrato de Propafenona 300mg Cp Rev (Eurofarma) 1,2

POSOLOGIA

Adulto:

|             |                                                                |
|-------------|----------------------------------------------------------------|
| Dose padrão | 300 a 900mg ao dia, fracionado a cada 8 horas ou em dose única |
| Dose média  | 300mg, a cada 12 horas                                         |
| Dose máxima | 300mg, a cada 8 horas                                          |

- ▶ **Ajuste de dose:**  
Insuficiência renal: Administrar com cautela.  
Insuficiência hepática: Administrar com cautela.
- ▶ **ADMINISTRAÇÃO**  
VO  
Administrar, preferencialmente, junto às refeições.
- ▶ **Administração com alimentos:**  
Evitar erva de São-João e efedra.
- ▶ **Administração via sonda:**  
Pode ser administrado via sonda. Triturar e diluir em 15mL de água, administrando imediatamente.
- ▶ **ARMAZENAMENTO**  
Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

PROPANTELINA 1,2

Antiespasmódico

Nome comercial:  
Propantelina Brometo 15mg/ml Gel 1ml Manip 1,2

## POSOLOGIA

### Adulto:

Dose padrão

Aplicar topicamente na região das glândulas salivares.

#### ► **Ajuste de dose:**

Não é necessário ajuste de dose.

#### ► **ADMINISTRAÇÃO**

Tópico

#### ► **ARMAZENAMENTO**

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

## PROPATILNITRATO <sup>1,2</sup>

Antianginoso

Nome comercial:

Sustrate 10mg Cp Sublingual <sup>1,2</sup>

## POSOLOGIA

### Adulto:

Dose padrão

10mg, a cada 8 ou 6 horas

Dose máxima

40mg ao dia

#### ► **Ajuste de dose:**

Não é necessário ajuste de dose.

#### ► **ADMINISTRAÇÃO**

VO

Dissolver sob a língua ou na cavidade bucal.

#### ► **ARMAZENAMENTO**

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

## PROPILENOGLICOL + POLIETILENOGLICOL + HIDROXIPROPILCELULOSE + ÁCIDO LÁCTICO <sup>1,2</sup>

Hidratante, Protetor Epidérmico

Nome comercial:

K Y Gel Lubrificante Tubo 50g <sup>1,2</sup>

## POSOLOGIA

### Adulto:

Dose padrão

Aplicar na área a ser lubrificada

#### ► **Ajuste de dose:**

Não é necessário ajuste de dose.

#### ► **ADMINISTRAÇÃO**

Tópico

#### ► **ARMAZENAMENTO**

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

PROPILTIOURACIL <sup>1</sup>

Hormônio Antitireoidiano

Nome comercial:  
Propilracil 100mg Cp <sup>1</sup>  
Propil 100mg Cp <sup>1</sup>

POSOLOGIA

Adulto:

|                 |                             |
|-----------------|-----------------------------|
| Dose padrão     | 100 a 300mg ao dia          |
| Dose manutenção | 100 a 150mg, a cada 8 horas |

Criança (6 a 10 anos de idade):

|             |                                         |
|-------------|-----------------------------------------|
| Dose padrão | 50 a 150mg, ao dia em doses fracionadas |
|-------------|-----------------------------------------|

Criança (> 10 anos de idade):

|             |                                          |
|-------------|------------------------------------------|
| Dose padrão | 150 a 300mg, ao dia em doses fracionadas |
|-------------|------------------------------------------|

- ▶ **Ajuste de dose:**  
Não é necessário ajuste de dose.
- ▶ **ADMINISTRAÇÃO**  
VO  
Administrar sempre no mesmo horário em relação às refeições.
- ▶ **Administração via sonda:**  
Pode ser administrado via sonda. Triturar e diluir em 15mL de água, administrando imediatamente.
- ▶ **ARMAZENAMENTO**  
Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C. Proteger da luz.

PROPIONATO DE CLOBETASOL  
+ ALANTOÍNA <sup>1</sup>

Anti-inflamatório não Esteroidal Tópico

Nome comercial:  
Clob-x Creme bis 30g <sup>1</sup>

POSOLOGIA

Adulto:

|             |                                                     |
|-------------|-----------------------------------------------------|
| Dose padrão | 1 aplicação, a cada 12 horas (pela manhã e à noite) |
|-------------|-----------------------------------------------------|

- ▶ **Ajuste de dose:**  
Não é necessário ajuste de dose.
- ▶ **ADMINISTRAÇÃO**  
Tópico
- ▶ **ARMAZENAMENTO**  
Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C. Não congelar.

A  
B  
C  
D  
E  
F  
G  
H  
I  
J  
K  
L  
M  
N  
O  
P  
Q  
R  
S  
T  
U  
V  
W  
X  
Y  
Z

**PROPOFOL** <sup>1,2</sup>

Anestésico Geral

Nome comercial:

Diprivan 1% (10mg/mL) FA 100mL <sup>1,2</sup>  
 Diprivan 1% (10mg/mL) Amp 20mL <sup>1,2</sup>  
 Diprivan PFS 1% (10mg/mL) Ser 50mL <sup>1</sup>  
 Diprivan PFS 2% (20mg/mL) Ser 50mL <sup>1</sup>  
 Lipuro 1% (10mg/mL) FA 100mL <sup>1,2</sup> \*  
 Lipuro 1% (10mg/mL) FA 20mL <sup>1,2</sup>  
 Propovan 1% (10mg/mL) Amp 20mL <sup>1</sup>  
 Provive 1%(10mg/ml) FA 100ml <sup>1</sup>  
 Provive 1% (10mg/mL) Amp 20mL <sup>1,2</sup>  
 Propofol 1% (10mg/mL) Amp 20mL (Fresenius) <sup>1,2</sup>  
 Propofol 1% (10mg/mL) Amp 100mL (Fresenius) <sup>1,2</sup>

**POSOLOGIA****Adulto:**

|                                                                    |                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Indução de anestesia geral                                         | 1,5 a 2,5 mg/kg IV (bolus por infusão),<br>administrando 40mg, a cada 10 segundos |
| Manutenção de anestesia geral                                      | 4 a 12 mg/kg/h IV (infusão contínua) ou 25<br>a 50mg IV direta                    |
| Sedação na UTI                                                     | 0,3 a 4 mg/kg/h, IV (infusão contínua)<br>- Dose máxima: 4 mg/kg                  |
| Sedação consciente para cirurgia e<br>procedimentos de diagnóstico | 0,5 a 1 mg/kg, IV (1 a 5 minutos)<br>- Dose manutenção: 1,5 a 4,5 mg/kg/h, IV     |

▶ **Ajuste de dose:**

Não é necessário ajuste de dose.

▶ **ADMINISTRAÇÃO**

Intravenosa

Infusão contínua: 400mg em 500mL de SG 5% trilaminado.

Concentração máxima de diluição: 2mg/mL.

▶ **Administração com alimentos:**

Pode acarretar em redução dos níveis de zinco em pacientes submetidos à terapia prolongada (acima de 5 dias) ou naqueles com predisposição à deficiência (queimaduras, diarreias e/ou sepse grave).

▶ **ARMAZENAMENTO**

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C. Proteger da luz.

Após diluição, possui estabilidade de 6 horas em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C, protegido da luz.

▶ **Atenção:**

Receita Branca (2 vias).

\* Esta apresentação é livre de látex.

**PROPRANOLOL** <sup>1,2</sup>

Agente Anti-hipertensivo

Nome comercial:

Propranolol 10mg Cp (Medley) <sup>1,2</sup>  
 Propranolol 10mg Cp (EMS) <sup>1,2</sup>  
 Propranolol 10mg Cp (Germed) <sup>1,2</sup>  
 Propranolol 40mg Cp (EMS) <sup>1,2</sup>  
 Propranolol 40mg Cp (Germed) <sup>1,2</sup>

Propranolol 40mg Cp (Medley) <sup>1,2</sup>  
Inderal 10mg Cp <sup>1,2</sup>  
Inderal 40mg Cp <sup>1,2</sup>

**POSOLOGIA**

**Adulto:**

|                                                                                            |                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Hipertensão                                                                                | 80mg, a cada 12 horas. Pode ser aumentado em intervalos semanais.               |
| Angina, ansiedade, enxaqueca e tremor essencial                                            | 40mg, a cada 12 ou 8 horas. Pode ser aumentado em intervalos semanais.          |
| Arritmia, taquicardia por ansiedade, cardiomiopatia hipertrófica obstrutiva e tireotxicose | 10 a 40mg, a cada 8 ou 6 horas                                                  |
| Feocromocitoma                                                                             | Pós-operatório: 60mg diários durante 3 dias.<br>- Casos malignos: 30mg diários. |

**Criança:**

|                                         |                                                                                                |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Arritmias, feocromocitoma, tireotxicose | 0,25 a 0,5 mg/kg, a cada 8 ou 6 horas                                                          |
| Enxaqueca                               | - Abaixo de 12 anos: 20mg, a cada 12 ou 8 horas<br>- Acima de 12 anos: a mesma dose de adultos |

► **Ajuste de dose:**

Insuficiência renal:

| Dose com Função Renal Normal | Dose Insuficiência Renal<br>clearance de creatinina (mL/min) |                                      |                                      |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
|                              | >31-40                                                       | 10-30                                | <10                                  |
| 120-140mg<br>24/24h          | 120-140mg<br>36/36h ou 50%<br>24/24h                         | 120-140mg<br>48/48h ou 50%<br>24/24h | 120-140mg<br>60/60h ou 25%<br>24/24h |

► **ADMINISTRAÇÃO**

VO

Administrar, preferencialmente, em jejum.

► **Administração com alimentos:**

Evitar o consumo de álcool.

► **Administração via sonda:**

Pode ser administrado via sonda. Triturar e diluir em 15mL de água, administrando imediatamente.

► **ARMAZENAMENTO**

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C. Proteger da luz.

**PROTAMINA <sup>1,2</sup>**

Antídoto

Nome comercial:

Protamina 5000UI Amp 5mL <sup>1,2</sup>

**POSOLOGIA****Adulto:**

|             |                                                |
|-------------|------------------------------------------------|
| Dose padrão | 1mL de protamina neutraliza 1000UI de heparina |
| Dose máxima | 50mg, IV, em infusão por 10 minutos            |

▶ **Ajuste de dose:**

Não é necessário ajuste de dose.

▶ **ADMINISTRAÇÃO**

Intravenosa

Intravenosa direta: de 1 a 3 minutos.

Infusão intermitente: até 5000UI em 250mL de SG 5%, em 10 min.

▶ **ARMAZENAMENTO**

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

**PROXIMETACAÍNA** <sup>1,2</sup>

Anestésico Ocular

Nome comercial:

Anestalcon Sol Oft 25mg Fr 5mL <sup>1,2</sup>

**POSOLOGIA****Adulto:**

|                                      |                                                            |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Anestesias prolongadas               | Instilar 1 gota, a cada 5 a 10 minutos                     |
| Remoção de suturas, corpos estranhos | Instilar 1 a 2 gotas, 2 ou 3 minutos antes do procedimento |
| Tonometria                           | 1 ou 2 gotas imediatamente antes do procedimento           |

▶ **Ajuste de dose:**

Não é necessário ajuste de dose.

▶ **ADMINISTRAÇÃO**

Via ocular

▶ **ARMAZENAMENTO**

Conservar em refrigeração entre 2°C e 8°C.

▶ **Atenção:**

Receita Branca (2 vias).

**PRUCALOPRIDA** <sup>1</sup>

Laxante

Nome comercial:

Resolor 1mg Cp Rev <sup>1</sup>

**POSOLOGIA****Adulto:**

|               |                                                                                               |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dose padrão   | 2mg, a cada 24 horas                                                                          |
| <b>Idoso:</b> |                                                                                               |
| Dose padrão   | 1mg, a cada 24 horas. Caso necessário, a dose poderá ser aumentada para 2mg, a cada 24 horas. |



- ▶ **Ajuste de dose:**  
Insuficiência renal grave: O uso é contraindicado.
- ▶ **ARMAZENAMENTO**  
Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

**QUETIAPINA** <sup>1,2</sup>

Antipsicótico, Neuroléptico

Nome comercial:

Quetiapina 25mg Cp Rev (EMS) <sup>1,2</sup>Quetiapina 25mg Cp Rev (Sandoz) <sup>1,2</sup>Quetros 25mg Cp Rev <sup>1,2</sup>Seroquel 25mg Cp Rev <sup>1,2</sup>Quetiapina 100mg Cp Rev (Biosintética) <sup>1,2</sup>Quetiapina 100mg Cp Rev (EMS) <sup>1,2</sup>Seroquel 100mg Cp Rev <sup>1,2</sup>**POSOLOGIA**

|                                                                                                             |                                                 |                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Esquizofrenia                                                                                               | Adulto                                          | 1º dia: 50mg/dia<br>2º dia: 100mg/dia<br>3º dia: 200mg/dia<br>4º dia: 300mg/dia<br>Após o 4º dia: 300 a 450mg/dia                      |
|                                                                                                             | Adolescentes (13 a 17 anos de idade)            | 1º dia: 50mg/dia<br>2º dia: 100mg/dia<br>3º dia: 200mg/dia<br>4º dia: 300mg/dia<br>5º dia: 400mg/dia<br>Após o 5º dia: 400 a 800mg/dia |
| Episódios de mania associados ao transtorno afetivo bipolar                                                 | Adulto                                          | 1º dia: 100mg/dia<br>2º dia: 200mg/dia<br>3º dia: 300mg/dia<br>4º dia: 400mg/dia<br>Após o 4º dia: 400 a 800mg/dia                     |
|                                                                                                             | Crianças e adolescentes (10 a 17 anos de idade) | 1º dia: 50mg/dia<br>2º dia: 100mg/dia<br>3º dia: 200mg/dia<br>4º dia: 300mg/dia<br>5º dia: 400mg/dia<br>Após o 5º dia: 400 a 600mg/dia |
| Episódios de depressão associados ao transtorno afetivo bipolar                                             | Adulto                                          | 1º dia: 50mg/dia<br>2º dia: 100mg/dia<br>3º dia: 200mg/dia<br>4º dia: 300mg/dia<br>Após o 4º dia: 300 a 600mg/dia                      |
| Manutenção do transtorno afetivo bipolar I em combinação com os estabilizadores de humor lítio ou valproato | Adulto                                          | 200 a 400mg, 2 vezes ao dia                                                                                                            |
| Para tratamento de manutenção no transtorno bipolar em monoterapia                                          | Adulto                                          | 300 a 800mg/dia                                                                                                                        |

▶ **Ajuste de dose:**

Insuficiência Renal: Recomenda-se cautela. Nenhum ajuste é necessário.

Insuficiência Hepática: Iniciar o tratamento com 25 mg/dia, podendo ter incrementos de 25 a 50 mg até atingir a dose eficaz.

▶ **ADMINISTRAÇÃO:**

Oral

▶ **Administração com alimentos:**

Administrar em jejum ou com uma refeição leve ( $\leq 300$  calorias). Evitar o consumo de bebidas alcoólicas, Erva-de-São-João, *Centella asiática*, kava kava e valeriana.

▶ **Administração via sonda:**

Pode ser administrado via sonda. Triturar e dispersar em 20ml de água, após dissolução administrar imediatamente.

▶ **ARMAZENAMENTO:**

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C

▶ **Atenção:**

Receita Branca (2 vias).

**RACECADOTRILA** <sup>1,2</sup>

Antidiarreico e Adsorvente

Nome comercial:  
Tiorfan 100mg Cap <sup>1,2</sup>  
Avide 100mg Cap <sup>1,2</sup>

**POSOLOGIA****Adulto:**

|              |                       |
|--------------|-----------------------|
| Dose inicial | 100mg, a cada 8 horas |
| Dose máxima  | 400mg ao dia          |

▶ **Ajuste de dose:**

Não é necessário ajuste de dose.

▶ **ADMINISTRAÇÃO**

Oral

▶ **Administração via sonda:**

Pode ser administrado via sonda. Abrir a cápsula e diluir em 15mL de água, administrando imediatamente.

▶ **ARMAZENAMENTO**

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

**RAMIPRIL** <sup>1,2</sup>

Agente Anti-hipertensivo

Nome comercial:  
Naprix 5mg Cp <sup>1,2</sup>  
Ramipril 5mg Cp (Biosintética) <sup>1,2</sup>  
Triatec 5mg Cp <sup>1,2</sup>

**POSOLOGIA****Adulto:**

|                                                                       |                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hipertensão arterial                                                  | 2,5mg, a cada 24 horas. A dose pode ser aumentada para até 5mg ao dia.                        |
| Insuficiência cardíaca congestiva                                     | 1,25mg, a cada 24 horas. Pode ser necessário aumento de dose.                                 |
| Tratamento após infarto agudo do miocárdio                            | 2,5mg, a cada 12 horas (uma pela manhã e outra à noite). Pode ser necessário aumento de dose. |
| Tratamento de nefropatia glomerular manifesta e nefropatia incipiente | 1,25mg a cada 24 horas. Pode ser necessário aumento de dose.                                  |

▶ **Ajuste de dose:**

Insuficiência renal:

| Dose com Função Renal Normal | Dose com Insuficiência Renal<br>clearance de creatinina (mL/min) |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 2,5mg 24/24h                 | < 40                                                             |
|                              | 25% da dose- 24/24h                                              |

Insuficiência renal e hipertensão: 1,25mg, a cada 24 horas. Aumentar a dose quando possível.

- Insuficiência renal e insuficiência cardíaca: 1,25mg, a cada 24 horas. Aumentar para 1,25, podendo chegar até 2,5, a cada 12 horas.
- ▶ **ADMINISTRAÇÃO**  
Oral  
Administrar independentemente das refeições.
  - ▶ **ARMAZENAMENTO**  
Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

**RAMUCIRUMABE <sup>1</sup>**
Antineoplásico Anticorpo Monoclonal

Nome comercial:  
Cynamza 100mg FA 10mL <sup>1\*</sup>  
Cynamza 500mg FA 50mL <sup>1\*</sup>

**POSOLOGIA**

**Adulto:**  
Conforme esquema quimioterápico.

- ▶ **ADMINISTRAÇÃO**  
Intravenosa, preparo na quimioterapia.
- ▶ **ARMAZENAMENTO**  
Conservar em refrigeração entre 2°C e 8°C. Não congelar. Não agitar.  
Após diluição, possui estabilidade de 24 horas em refrigeração entre 2°C e 8°C.
- ▶ **Atenção:**  
\* Este medicamento é livre de látex.

**RANITIDINA <sup>1</sup>**
Antiulceroso

Nome comercial:  
Antak 50mg Amp 2mL <sup>1</sup>  
Ranitidina Cloridrato 50mg Amp 2mL (Teuto) <sup>1</sup>  
Ranitidina Cloridrato 50mg Amp 2mL (União Química) <sup>1</sup>

**POSOLOGIA**

**Adulto:**

|                                                  |                                                                  |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Hipersecreção gástrica                           | 50mg IM/IV, a cada 8 ou 6 horas                                  |
| ▶ <b>Ajuste de dose:</b><br>Insuficiência renal: |                                                                  |
| Dose com Função Renal Normal                     | Dose com Insuficiência Renal<br>clearance de creatinina (mL/min) |
| 50mg 6/6h a 8/8h                                 | <50                                                              |
|                                                  | 50mg 18/18h ou 24/24h                                            |

- ▶ **ADMINISTRAÇÃO**  
Intravenosa e Intramuscular  
Intravenosa direta: até 50mg em 20mL de SF durante 2 minutos.  
Infusão intermitente: até 50mg em 100mL de SF/SG5%.
- ▶ **ARMAZENAMENTO**  
Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

**RANITIDINA** <sup>1,2</sup>

Antiulceroso

Nome comercial:

Antak 150mg Cp <sup>1,2</sup>Ranitidina 150mg Cp (Medley) <sup>1,2</sup>Ranitidina 150mg Cp (EMS) <sup>1,2</sup>Ranitidina 150mg Cp (Biosintética) <sup>1,2</sup>**POSOLOGIA****Adulto:**

|                                                                      |                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Úlcera duodenal e úlcera gástrica benigna                            | Tratamento agudo: 150mg a cada 12 horas<br>Tratamento a longo prazo: 150mg a cada 24 horas (a noite)                 |
| Úlcera péptica associada ao uso de anti-inflamatórios não-esteroides | 150mg a cada 12 horas                                                                                                |
| Úlcera duodenal associada à infecção por <i>Helicobacter pylori</i>  | 300mg a cada 24 horas com associação de 750mg de amoxicilina, a cada 8 horas e 500mg de metronidazol, a cada 8 horas |
| Refluxo gastroesofágico                                              | Tratamento agudo: 150mg a cada 12 horas durante 8 a 12 semanas<br>Tratamento a longo prazo: 150mg a cada 12 horas    |
| Síndrome de Zollinger-Ellison                                        | 150mg a cada 8 horas. Pode ser necessário aumento de dose.                                                           |
| Dispepsia episódica crônica                                          | 150mg a cada 12 horas por até 6 semanas                                                                              |

**Criança:**

|             |                             |
|-------------|-----------------------------|
| Dose padrão | 2 a 4 mg/kg a cada 12 horas |
|-------------|-----------------------------|

► **Ajuste de dose:**

Insuficiência renal:

| Dose com Função Renal Normal | Dose com Insuficiência Renal<br>clearance de creatinina (mL/min) |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 150mg 12/12h                 | < 50                                                             |
|                              | 150mg 24/24h                                                     |

► **ADMINISTRAÇÃO**

Oral

► **Administração com alimentos:**

Evitar o consumo de álcool e tabaco.

► **ARMAZENAMENTO**

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

**RANITIDINA XAROPE** <sup>1,2</sup>

Antiulceroso

Nome comercial:

Antak 15mg/mL Xarope Fr 120mL <sup>1,2</sup>

Label Xarope 150mg/10mL Fr 120mL <sup>1,2</sup>  
Ranitidina 15mg/mL Xarope Fr 120mL (EMS) <sup>1,2</sup>  
Ranitidina 15mg/mL Xarope Fr 120mL (Biosintética) <sup>1,2</sup>

**POSOLOGIA**

**Adulto:**

|                                                                      |                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Úlcera duodenal e úlcera gástrica benigna                            | Tratamento agudo: 150mg a cada 12 horas<br>Tratamento a longo prazo: 150mg a cada 24 horas (a noite)                 |
| Úlcera péptica associada ao uso de anti-inflamatórios não-esteroides | 150mg a cada 12 horas                                                                                                |
| Úlcera duodenal associada à infecção por <i>Helicobacter pylori</i>  | 300mg a cada 24 horas com associação de 750mg de amoxicilina, a cada 8 horas e 500mg de metronidazol, a cada 8 horas |
| Refluxo gastroesofágico                                              | Tratamento agudo: 150mg, a cada 12 horas durante 8 a 12 semanas<br>Tratamento a longo prazo: 150mg, a cada 12 horas  |
| Síndrome de Zollinger-Ellison                                        | 150mg a cada 8 horas. Pode ser necessário aumento de dose.                                                           |
| Dispepsia episódica crônica                                          | 150mg a cada 12 horas por até 6 semanas                                                                              |

**Criança:**

|             |                              |
|-------------|------------------------------|
| Dose padrão | 2 a 4 mg/kg, a cada 12 horas |
|-------------|------------------------------|

► **Ajuste de dose:**

Insuficiência renal:

|                              |                                                                  |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Dose com Função Renal Normal | Dose com Insuficiência Renal<br>clearance de creatinina (mL/min) |
| 150mg 12/12h                 | < 50                                                             |
|                              | 150mg 24/24h                                                     |

► **ADMINISTRAÇÃO**

Oral

► **Administração com alimentos:**

Evitar o consumo de álcool e tabaco.

► **ARMAZENAMENTO**

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

**RASAGILINA MESILATO <sup>1</sup>**

Antiparkinsonianos

Nome comercial:  
Azilect 1mg Cp <sup>1</sup>

**POSOLOGIA**

**Adulto:**

|             |                                                              |
|-------------|--------------------------------------------------------------|
| Dose padrão | 1mg a cada 24 horas, com ou sem terapia adjunta com levodopa |
|-------------|--------------------------------------------------------------|

- ▶ **Ajuste de dose:**  
Insuficiência renal grave: O uso é contraindicado.
- ▶ **ADMINISTRAÇÃO**  
Oral  
Administrar com ou sem alimento.
- ▶ **Administração com alimentos:**  
Evitar o consumo de álcool.
- ▶ **ARMAZENAMENTO**  
Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

## RASBURICASE <sup>1</sup>

Antídoto

Nome comercial:

Fasturtec 1,5mg FA + Diluente 1mL <sup>1</sup>

### POSOLOGIA

#### Adulto:

|             |                                      |
|-------------|--------------------------------------|
| Dose padrão | 0,2 mg/kg/dia, IV durante 30 minutos |
|-------------|--------------------------------------|

- ▶ **Ajuste de dose:**  
Não é necessário ajuste de dose.
- ▶ **ADMINISTRAÇÃO**  
Intravenosa  
Reconstituir em diluente próprio e diluir em 50mL de SF. Infundir por 30 minutos.
- ▶ **ARMAZENAMENTO**  
Conservar em refrigeração entre 2°C e 8°C. Não congelar. Proteger da luz.

## REMIFENTANILA <sup>1,2</sup>

Analgésico Narcótico

Nome comercial:

Remifas 2 mg FA <sup>1,2</sup>

Remifentanila Cloridrato 2mg FA (Cristália) <sup>1,2</sup>

Ultiva 2mg FA <sup>1,2</sup> \*

### POSOLOGIA

#### Adulto:

Conforme esquema posológico.

- ▶ **Ajuste de dose:**  
Não é necessário ajuste de dose.
- ▶ **ADMINISTRAÇÃO**  
Intravenosa  
Reconstituir em 2mL de água bidestilada.  
Intravenosa direta: até 2mg em 20mL de água bidestilada.  
Infusão intermitente: até 2mg em 100mL de SF/SG 5%.
- ▶ **ARMAZENAMENTO**  
Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.  
Após reconstituição e diluição, possui estabilidade de 24 horas em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.
- ▶ **Atenção:**  
Receita Amarela.  
Alto Custo.  
\* Esta apresentação é livre de látex.



RIBAVIRINA <sup>1</sup>

Antiviral

Nome comercial:  
Ribavirin 250mg Cap <sup>1</sup>  
Ribavirina 250mg Cap (Secretaria da Saúde) <sup>1</sup>

POSOLOGIA

Adulto:

|            |                                                                                                  |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hepatite C | - Pacientes com < 75 kg: 500mg, a cada 12 horas<br>- Paciente com > 75kg: 600mg, a cada 12 horas |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|

Criança:

|             |                                |
|-------------|--------------------------------|
| Dose padrão | 10 a 12 mg/kg, a cada 12 horas |
|-------------|--------------------------------|

► **Ajuste de dose:**

Insuficiência renal:

| Dose com Função Renal Normal | Dose com Insuficiência Renal<br>clearance de creatinina (mL/min) |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 500-600mg 12/12h             | <50                                                              |
|                              | Uso não recomendado                                              |

- OBS: A dose não é recomendada para pacientes com ClCr < 50mL/min.
- **ADMINISTRAÇÃO**  
Oral  
Administrar preferencialmente junto às refeições.
  - **Administração com alimentos:**  
Evitar o consumo de álcool.
  - **Administração via sonda:**  
Pode ser administrado via sonda. Abrir a cápsula de diluir em 20mL de água, administrando imediatamente.
  - **ARMAZENAMENTO**  
Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.
  - **Atenção:**  
Receita Branca (2 vias).

RIFAMICINA <sup>1</sup>

Antimicrobiano Tópico

Nome comercial:  
Rifampicina Spray 10mg/mL Fr 20mL (EMS) <sup>1</sup>  
Rifampicina Spray 10mg/mL Fr 20mL (Germed) <sup>1</sup>  
Rifampicina Spray 10mg/mL Fr 20mL (Neoquímica) <sup>1</sup>  
Rifampicina Spray 10mg/mL Fr 20mL (Sanofi) <sup>1</sup>

POSOLOGIA

Adulto e Criança:

|             |                                                 |
|-------------|-------------------------------------------------|
| Dose padrão | Pulverizar a área afetada, a cada 8 ou 6 horas. |
|-------------|-------------------------------------------------|

- **Ajuste de dose:**  
Não é necessário ajuste de dose.
- **ADMINISTRAÇÃO**  
Tópico

## ▶ ARMAZENAMENTO

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C. Proteger da luz.

## RIFAMPICINA <sup>1,2</sup>

Antimicrobiano Tuberculostático

Nome comercial:

Rifaldin 300mg Cap <sup>1,2</sup>

Rifampicina 300mg Cap (Secretaria da Saúde) <sup>1,2</sup>

Rifampicina 300mg Cap Manip <sup>1,2</sup>

## POSOLOGIA

### Adulto:

|                              |                                                                                              |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tuberculose                  | Pacientes com > 50kg: 600mg, a cada 24 horas<br>Pacientes com < 50kg: 450mg, a cada 24 horas |
| Infecções específicas        | 600mg a cada 24 horas                                                                        |
| Infecções das vias urinárias | 900 a 1200mg a cada 24 horas                                                                 |

### Criança:

|             |                                        |
|-------------|----------------------------------------|
| Dose padrão | 20 mg/kg em uma ou duas administrações |
|-------------|----------------------------------------|

### ▶ Ajuste de dose:

Não é necessário ajuste de dose.

### ▶ ADMINISTRAÇÃO

Oral

Administrar preferencialmente em jejum, pelo menos 30 minutos antes ou 2 horas após as refeições.

### ▶ Administração com alimentos:

Evitar o consumo de álcool e Erva de São-João.

### ▶ Administração via sonda:

Pode ser administrar via sonda. Abrir cápsula e diluir em 50mL de água, administrando imediatamente.

### ▶ ARMAZENAMENTO

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

### ▶ Atenção:

Receita Branca (2 vias).

## RILUZOL <sup>1</sup>

Outros – Sistema Nervoso

Nome comercial:

Riluzol 50mg Cp Rev (Cristália) <sup>1</sup>

Fzolcris 50mg Cp Rev <sup>1</sup>

## POSOLOGIA

### Adulto:

|             |                      |
|-------------|----------------------|
| Dose padrão | 50mg a cada 12 horas |
|-------------|----------------------|

### ▶ Ajuste de dose:

Insuficiência renal: O uso é contraindicado.

Insuficiência hepática: O uso é contraindicado.

- ▶ **ADMINISTRAÇÃO**  
Oral  
Administrar 1 hora antes ou 2 horas depois das refeições.
- ▶ **Administração com alimentos:**  
Evitar o consumo de álcool.
- ▶ **ARMAZENAMENTO**  
Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

RISPERIDONA <sup>1,2</sup>

Antipsicótico, Neuroléptico

Nome comercial:  
 Respidon 1mg Cp <sup>1,2</sup>  
 Risperdal 1mg Cp <sup>1,2</sup>  
 Risperidona 1mg Cp (Biosintética) <sup>1,2</sup>  
 Risperidona 1mg Cp (Eurofarma) <sup>1,2</sup>  
 Risperidona 1mg Cp (Medley) <sup>1,2</sup>  
 Zargus 1mg Cp (Biosintética) <sup>1,2</sup>  
 Rispalum 1mg Cp (Sandoz) <sup>1,2</sup>  
 Risperidon 1mg Cp <sup>1,2</sup>

POSOLOGIA

Adulto:

|                                    |                                                                         |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Esquizofrenia                      | 1mg a cada 12 horas. A dose pode ser aumentada para 4mg no segundo dia. |
| Transtorno do humor bipolar: mania | 2 a 3mg, a cada 24 horas                                                |

Criança (5 a 17 anos de idade):

|         |                                                                                                                                                                                                         |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Autismo | - Dia 1 ao dia 3: 0,25 mg/dia para pacientes com peso < 20kg e 0,5 mg/dia para pacientes com peso > 20kg.<br>- Dia 4 ao dia 14: 0,5 mg/dia para pacientes com < 20 kg e 1 mg/dia para pacientes > 20kg. |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Idoso:

|             |                                                                                        |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Dose padrão | 0,5mg. A cada 12 horas. Pode ser ajustada com aumentos de 0,5mg a 2mg, a cada 12 horas |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|

- ▶ **Ajuste de dose:**  
Insuficiência renal e hepática: 0,5mg, a cada 12 horas. Pode ser ajustada com aumentos de 0,5mg, a cada 12 horas até 1 a 2 mg, a cada 12 horas.
- ▶ **ADMINISTRAÇÃO**  
Oral
- ▶ **Administração com alimentos:**  
Evitar o consumo de álcool.
- ▶ **Administração via sonda:**  
Pode ser administrado via sonda. Triturar e diluir em 20mL de água, administrando imediatamente.
- ▶ **ARMAZENAMENTO**  
Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.
- ▶ **Atenção:**  
Receita Branca (2 vias).

**RITUXIMABE <sup>1</sup>**

Antineoplásico Anticorpo Monoclonal

Nome comercial:

Mabthera 100mg FA 10mL <sup>1</sup>Mabthera Sc 1400mg FA 15mL <sup>1</sup>Mabthera 500mg FA 50mL <sup>1</sup>**POSOLOGIA****Adulto:**

Conforme esquema quimioterápico.

▶ **Ajuste de dose:**

Não é necessário ajuste de dose.

▶ **ARMAZENAMENTO**

Conservar em refrigeração entre 2°C e 8°C. Não congelar.

Após preparo, possui estabilidade de 48 horas em refrigeração entre 2°C e 8°C e de 8 horas em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

▶ **Atenção:**

Alto Custo.

**RIVAROXABANA <sup>1,2</sup>**

Anticoagulante

Nome comercial:

Xarelto 10mg Cp Rev <sup>1,2</sup>Xarelto 15mg Cp Rev <sup>1,2</sup>**POSOLOGIA****Adulto:**

Dose padrão

10 a 20mg, a cada 24 horas

▶ **Ajuste de dose:**

Insuficiência renal: Pode ser necessário ajuste de dose, monitorar.

Insuficiência hepática grave: O uso é contraindicado.

▶ **ADMINISTRAÇÃO**

Oral

Administrar preferencialmente com alimentos.

▶ **Administração com alimentos:**

Evitar o consumo de toranja (grapefruit).

▶ **ARMAZENAMENTO**

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

**RIVASTIGMINA <sup>1</sup>**

Anticolinesterásicos

Nome comercial:

Exelon 1,5mg Cap <sup>1</sup>**POSOLOGIA****Adulto:**

Dose inicial

1,5mg a cada 12 horas (almoço e jantar)

Após 2 semanas, se bem tolerado

3, 4, 5 ou 6mg, a cada 12 horas

|                 |                           |
|-----------------|---------------------------|
| Dose manutenção | 1,5 a 6mg a cada 12 horas |
| Dose máxima     | 12mg ao dia               |

- ▶ **Ajuste de dose:**  
Insuficiência hepática: Pode ser necessário ajuste de dose, monitorar.
- ▶ **ADMINISTRAÇÃO**  
Oral  
Administrar com as refeições.
- ▶ **Administração com alimentos:**  
Evitar o consumo de álcool.
- ▶ **ARMAZENAMENTO**  
Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.
- ▶ **Atenção:**  
Receita Branca (2 vias).

RIVASTIGMINA <sup>1,2</sup>

Antiparkinsoniano

Nome comercial:  
 Exelon Patch 10 Adv Transdérmico 9,5mg/24h <sup>1</sup>  
 Exelon Patch 15 Adv Transdérmico 13,3mg/24h <sup>1</sup>  
 Exelon Patch 5 Adv Transdérmico 4,6mg/24h <sup>1,2</sup>

POSOLOGIA

Adulto:

|                                 |                        |
|---------------------------------|------------------------|
| Dose inicial                    | 1 adv, a cada 24 horas |
| Após 4 semanas, se bem tolerado | 2 adv, a cada 24 horas |
| Dose manutenção                 | 2 adv, a cada 24 horas |

- ▶ **Ajuste de dose:**  
Insuficiência hepática: Pode ser necessário ajuste de dose, monitorar.
- ▶ **ADMINISTRAÇÃO**  
Tópico
- ▶ **ARMAZENAMENTO**  
Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.
- ▶ **Atenção:**  
Receita Branca (2 vias).

ROCURÔNIO <sup>1</sup>

Bloqueador Neuromuscular

Nome comercial:  
 Esmeron 50mg (10mg/mL) FA 5mL <sup>1</sup>  
 Rocuron 50mg (10mg/mL) FA 5mL <sup>1</sup>  
 Brometo de Rocurônio 50mg FA 5mL (Eurofarma) <sup>1\*</sup>

POSOLOGIA

Adulto:

|                 |                     |
|-----------------|---------------------|
| Intubação       | 0,6 a 0,12 mg/kg IV |
| Dose manutenção | 0,15 mcg/kg/min IV  |

**Criança (> 3 meses de idade):**

|                 |                                                  |
|-----------------|--------------------------------------------------|
| Dose inicial    | 0,6 mg/kg/dose, sob anestesia com halotano       |
| Dose manutenção | 0,075 a 0,125 mg/kg, após retorno de T1 para 25% |

▶ **Ajuste de dose:**

Insuficiência hepática: Pode ser necessário ajuste de dose, monitorar.

▶ **ADMINISTRAÇÃO**

Intravenosa

Infusão intermitente: 50mg em 100mL de SF/SG 5%.

Infusão contínua: 50mg em 100 a 500mL de SF/SG 5%.

▶ **ARMAZENAMENTO**

Conservar em refrigeração entre 2°C e 8°C.

Após diluição, possui estabilidade de 72 horas em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

▶ **Atenção:**

\* Esta apresentação é livre de látex.

**ROPIVACAÍNA** <sup>1,2</sup>

Anestésico Local

Nome comercial:

Naropin 0,75% (7,5mg/mL) Amp 20mL <sup>1,2</sup>

Naropin 1% (10mg/mL) Amp 20mL <sup>1,2</sup>

Ropi 0,75% (7,5mg/mL) Amp 20mL <sup>1</sup>

Ropi 1% (10mg/mL) amp 20mL <sup>1,2</sup>

**POSOLOGIA****Adulto:**

Conforme esquema posológico.

▶ **ARMAZENAMENTO**

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C. Proteger da luz.

**ROSUVASTATINA** <sup>1,2</sup>

Hipolipêmico

Nome comercial:

Crestor 10mg Cp Rev <sup>1,2</sup>

Rosuvastatina 10mg Cp Rev (EMS) <sup>1,2</sup>

Rosuvastatina 10mg Cp (Sandoz) <sup>1</sup>

**POSOLOGIA****Adulto:**

|                                           |                      |
|-------------------------------------------|----------------------|
| Hipercolesterolemia primária              | 10mg a cada 24 horas |
| Hipercolesterolemia familiar homozigótica | 20mg a cada 24 horas |

**Criança (6 a 9 anos de idade):**

|                                           |                           |
|-------------------------------------------|---------------------------|
| Hipercolesterolemia familiar homozigótica | 5 a 10mg, a cada 24 horas |
|-------------------------------------------|---------------------------|

- ▶ **Ajuste de dose:**  
Insuficiência renal:

| Dose com Função Renal Normal | Dose Insuficiência Renal<br>clearance de creatinina (mL/min) |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|                              | <30                                                          |
| 10 a 40mg<br>24/24h          | 5mg<br>24/24h                                                |

- ▶ **ADMINISTRAÇÃO**  
Oral  
Ingerir com ou sem alimento.
- ▶ **Administração com alimentos:**  
Evitar o consumo de álcool.
- ▶ **Administração via sonda:**  
Pode ser necessário ajuste de dose. Triturar e diluir em 15mL de água, administrando imediatamente.
- ▶ **ARMAZENAMENTO**  
Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C

**ROTIGOTINA <sup>1</sup>**
Antiparkinsonianos

Nome comercial:  
Neupro Adv Transdérmico 2mg <sup>1</sup>

**POSOLOGIA**  
**Adulto:**

|                                                          |                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dose padrão                                              | 1 aplicação a cada 24 horas                                                                         |
| Doença de Parkinson em estágio inicial                   | 2mg a cada 24 horas e então pode ser aumentada em incrementos semanais de 2mg/24h até dose efetiva. |
| Doença de Parkinson em estágios avançados com flutuações | 4mg, a cada 24 horas e então pode ser aumentada em incrementos semanais de 2mg/24h até dose efetiva |

- ▶ **Ajuste de dose:**  
Não é necessário ajuste de dose.
- ▶ **ADMINISTRAÇÃO**  
Tópico
- ▶ **ARMAZENAMENTO**  
Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

**SACCHAROMYCES BOULARDII** <sup>1,2</sup>

Antidiarreico, Repositor da Flora Intestinal

Nome comercial:  
Floratil 100mg Cap <sup>1,2</sup>

**POSOLOGIA****Adulto e Criança:**

|                                                                                      |                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Alterações agudas da flora intestinal e na diarreia por <i>Clostridium difficile</i> | 2 cápsulas, a cada 12 horas |
| Alterações crônicas da flora intestinal                                              | 1 cápsula, a cada 12 horas  |

▶ **Ajuste de dose:**

Não é necessário ajuste de dose.

▶ **ADMINISTRAÇÃO**

Oral

▶ **Administração via sonda:**

Pode ser administrado via sonda. Abrir a cápsula e diluir em 10 a 20mL de água, administrando imediatamente.

▶ **ARMAZENAMENTO**

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

**SALBUTAMOL** <sup>1,2</sup>

Broncodilatador

Nome comercial:  
Aerolin Spray 100mcg/ Dose Fr <sup>1,2</sup>  
Aerolin 5mg/ml Solução Nebulização Fr 10mL <sup>1,2</sup>  
Aerolin 5mg/mL Solução Nebulização Fr 10mL Dose <sup>1,2</sup>

**POSOLOGIA****Adulto:**

|                                                                        |                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Alívio do broncoespasmo agudo ou crise de asma                         | 100 ou 200mcg, a cada 24 horas ou fracionado                                     |
| Prevenção do broncoespasmo provocado por exercícios físicos ou alergia | 200mcg, a cada 24 horas, antes do exercício ou exposição inevitável ao alérgeno. |
| Terapia crônica                                                        | Até 200mcg, a cada 6 horas                                                       |

**Criança:**

|                                                                        |                                                                |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Alívio do broncoespasmo agudo ou crise de asma                         | 100mcg, podendo ser elevada para 200mcg, a cada 24 horas       |
| Prevenção do broncoespasmo provocado por exercícios físicos ou alergia | 100mcg antes do exercício ou exposição inevitável ao alérgeno. |
| Terapia crônica                                                        | Até 200mcg, a cada 6 horas                                     |

▶ **Ajuste de dose:**

Não é necessário ajuste de dose.

▶ **ADMINISTRAÇÃO**

Via inalatória

▶ **Administração com alimentos:**

Evitar a ingestão de cafeína, efedra e iombina.



► **ARMAZENAMENTO**

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

**SALIVA ARTIFICIAL <sup>1</sup>**

Outros – Aparelho Digestivo, Metabolismo e Nutrição

Nome comercial:

Saliform Saliva Artificial Spray Fr 40mL Manip <sup>1</sup>

Kin Hidrat Spray Saliva Artificial 40mL <sup>1</sup>

**POSOLOGIA**

**Adulto:**

Dose padrão

De acordo com a necessidade, vaporizar sobre a mucosa bucal e faringea

► **Ajuste de dose:**

Não é necessário ajuste de dose.

► **ADMINISTRAÇÃO**

Uso oral

► **ARMAZENAMENTO**

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

**SENE + ASSOCIAÇÕES <sup>1,2</sup>**

Laxante

Nome comercial:

Tamarine Geleia Pote 150g <sup>1,2</sup>

**POSOLOGIA**

**Adulto e Criança (> 12 anos de idade):**

Dose padrão

5g, após a última refeição

► **Ajuste de dose:**

Não é necessário ajuste de dose.

► **ADMINISTRAÇÃO**

Oral

► **ARMAZENAMENTO**

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

**SENE + ASSOCIAÇÕES <sup>1</sup>**

Laxante

Nome comercial:

Naturetti Cap <sup>1</sup>

Tamarine Cap <sup>1</sup>

**POSOLOGIA**

**Adulto e Criança (> 8 anos de idade):**

Dose padrão

1 a 2 cápsulas, após a última refeição

► **Ajuste de dose:**

Não é necessário ajuste de dose.

► **ADMINISTRAÇÃO**

Oral

## ► ARMAZENAMENTO

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

## SERTRALINA <sup>1,2</sup>

Antidepressivo

Nome comercial:

Assert 50mg Cp Rev <sup>1</sup>

Zoloft 50mg Cp Rev <sup>1</sup>

Sertralina 50mg Cp (EMS) <sup>1,2</sup>

Cloridrato de Sertralina 50mg Cp (Germed) <sup>1,2</sup>

Cloridrato de Sertralina 50mg Cp (Eurofarma) <sup>1,2</sup>

## POSOLOGIA

### Adulto:

|                                                                            |                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Depressão e TOC                                                            | 50mg, a cada 24 horas                                                                   |
| Transtorno do pânico, Transtorno do estresse pós-traumático e fobia social | Iniciar com 25mg, a cada 24 horas e aumentar para 50mg, a cada 24 horas após uma semana |
| Síndrome da tensão pré-menstrual e/ou transtorno disfórico pré-menstrual   | Iniciar com 50mg, a cada 24 horas                                                       |

### ► Ajuste de dose:

Insuficiência hepática: Pode ser necessário ajuste de dose, monitorar.

### ► ADMINISTRAÇÃO

Oral

Administrar pela manhã ou à noite.

### ► Administração com alimentos:

Evitar o consumo de álcool e Erva-de-São-João.

### ► ARMAZENAMENTO

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

### ► Atenção:

Receita Branca (2 vias).

## SEVELÂMER <sup>1</sup>

Quelante

Nome comercial:

Renagel 800mg Cp Rev <sup>1</sup>

Sevelamer Cloridrato 800mg Cp Rev (Ministério da Saúde) <sup>1</sup>

## POSOLOGIA

### Adulto:

|              |                              |
|--------------|------------------------------|
| Dose inicial | 800 a 1600mg, a cada 8 horas |
|--------------|------------------------------|

Seguir a tabela abaixo:

| Nível de fósforo sérico em doentes não tratados com captadores de fósforo | Faixa de Dose usual     |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 176 - 2,42 mmol/l (5,5 - 7,5 mg/dl)                                       | 800mg, a cada 8h.       |
| 2,42 - 2,91 mmol/l (7,5 - 9 mg/dl)                                        | 1200-1600mg, a cada 8h. |
| > 2,91 mmol/l                                                             | 1600mg, a cada 8h.      |

- ▶ **Ajuste de dose:**  
Insuficiência renal: Pode ser necessário ajuste de dose, monitorar.
- ▶ **ADMINISTRAÇÃO**  
Oral  
Administrar junto às refeições.
- ▶ **ARMAZENAMENTO**  
Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

SEVOFLURANO<sup>1,2</sup>

Anestésico Geral

Nome comercial:  
 Sevocris Fr 250mL<sup>1,2</sup>  
 Sevorane Fr 100ml<sup>1</sup>  
 Sevorane Fr 250mL<sup>1,2</sup>  
 Sevoflurano 1mL Dose<sup>1</sup>  
 Sevoflurano 10mL Dose<sup>1</sup>  
 Sevoflurano 5mL Dose<sup>1</sup>  
 Sevoness Fr 250mL<sup>1,2</sup>

POSOLOGIA

Adulto:

|             |                                                                               |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Dose padrão | Deve ser determinada de acordo com a necessidade individual de cada paciente. |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|

- ▶ **Ajuste de dose:**  
Insuficiência renal/hepática: Pode ser necessário ajuste de dose, monitorar.
- ▶ **ARMAZENAMENTO**  
Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.
- ▶ **Atenção:**  
Receita Branca (2 vias).  
Alto Custo.

SILDENAFILA<sup>1</sup>

Outros Medicamentos

Nome comercial:  
 Revatio 20mg Cp Rev<sup>1</sup>

POSOLOGIA

Adulto:

|             |                      |
|-------------|----------------------|
| Dose padrão | 20mg, a cada 8 horas |
|-------------|----------------------|

- ▶ **Ajuste de dose:**  
Insuficiência renal/hepática:

| Dose com Função Renal Normal | Dose com Insuficiência Renal<br>clearance de creatinina (mL/min) |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 20mg 8/8h                    | < 30                                                             |
|                              | 25mg 24/24h                                                      |

- ▶ **ADMINISTRAÇÃO**  
Oral

Administrar com ou sem alimentos.

► **Administração com alimentos:**

Evitar o consumo de grapefruit e Erva-de-São-João.

► **ARMAZENAMENTO**

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

## SILICATO DE MAGNÉSIO <sup>1,2</sup>

Hidratante, Protetor Epidérmico

Nome comercial:

Talco Neutro Estéril Vidro 50g Manip <sup>1,2</sup>

### POSOLOGIA

A critério médico.

► **ARMAZENAMENTO**

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

## SIMETICONA <sup>1</sup>

Antifisético

Nome comercial:

Luftal Max 125mg Cap Gelatinosa <sup>1</sup>

### POSOLOGIA

**Adulto:**

Dose padrão

125mg, a cada 6 horas

► **Ajuste de dose:**

Não é necessário ajuste de dose.

► **ADMINISTRAÇÃO**

Oral

Administrar, preferencialmente, junto com as refeições. Evitar o consumo de bebidas formadoras de gases.

► **ARMAZENAMENTO**

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

## SIMETICONA <sup>1,2</sup>

Antifisético

Nome comercial:

Luftal Gts 75mg/ml (25 gts) Fr 15ml <sup>1,2</sup>

Mylanta Plus Suspensão Oral Fr 240mL <sup>1</sup>

Simeticona Gts 75mg/mL Fr 15mL (Eurofarma) <sup>1,2</sup>

Simeticona Gts 75mg/mL Fr 15mL (Medley) <sup>1,2</sup>

Simeticona Gts 75mg/mL Fr 15mL (EMS) <sup>1,2</sup>

Simeticona Gts 75mg/mL Fr 15mL (Legrand) <sup>1,2</sup>

### POSOLOGIA

**Adulto e Criança (> 12 anos de idade):**

Dose padrão

16 gotas, a cada 8 horas

► **Ajuste de dose:**

Não é necessário ajuste de dose.

▸ **ADMINISTRAÇÃO**

Oral

▸ **ARMAZENAMENTO**

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

**SINVESTATINA <sup>1,2</sup>**

Hipolipêmico

Nome comercial:

Sinvascor 10mg Cp <sup>1,2</sup>

Sinvastacor 10mg Cp <sup>1,2</sup>

Sinvestatina 10mg Cp Rev (Medley) <sup>1,2</sup>

Sinvestatina 10mg Cp Rev (Merck) <sup>1,2</sup>

Vaslip 10mg Cp Rev <sup>1,2</sup>

Zocor 10mg Cp <sup>1,2</sup>

**POSOLOGIA**

**Adulto:**

|                                                                           |                           |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Dose padrão                                                               | 5 a 80mg, a cada 24 horas |
| Pacientes sob alto risco de doenças coronariana ou com doença coronariana | 40mg, a cada 24 horas     |
| Pacientes com hiperlipidemia                                              | 20mg, a cada 24 horas     |
| Pacientes com hipercolesterolemia familiar homozigótica                   | 40mg, a cada 24 horas     |

▸ **Ajuste de dose:**

Insuficiência renal:

| Dose com Função Renal Normal | Dose com Insuficiência Renal<br>clearance de creatinina (mL/min) |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 5 a 80mg 24/24h              | < 10                                                             |
|                              | 5mg 24/24h, com monitorização                                    |

▸ **ADMINISTRAÇÃO**

Oral

▸ **Administração com alimentos:**

Evitar o consumo de álcool e Erva-de-São-João.

▸ **Administração via sonda:**

Pode ser administrado via sonda. Triturar e diluir em 20mL de água, administrando imediatamente.

▸ **ARMAZENAMENTO**

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

**SIROLIMO <sup>1</sup>**

Imunossupressor

Nome comercial:

Rapamune 1mg Drg <sup>1</sup>

**POSOLOGIA**

**Adulto:**

Conforme esquema posológico.

- ▶ **Ajuste de dose:**  
Insuficiência hepática: Pode ser necessário ajuste de dose, monitorar.
- ▶ **ADMINISTRAÇÃO**  
Oral  
Administrar junto com as refeições.
- ▶ **Administração com alimentos:**  
Evitar o consumo de álcool e Erva-de-São-João.
- ▶ **Administração via sonda:**  
Pode ser administrado via sonda. Triturar e diluir em 30mL de água, administrando imediatamente.
- ▶ **ARMAZENAMENTO**  
Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

SITAGLIPTINA <sup>1</sup>

Hipoglicemiante

Nome comercial:  
Januvia 50mg Cp Rev <sup>1</sup>

POSOLOGIA

Adulto:

|             |                        |
|-------------|------------------------|
| Dose padrão | 100mg, a cada 24 horas |
|-------------|------------------------|

- ▶ **Ajuste de dose:**  
Insuficiência renal:

| Dose com Função Renal Normal | Dose Insuficiência Renal<br>clearance de creatinina (mL/min) |             |             |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
|                              | >50                                                          | 30-50       | <30         |
| 100mg 24/24h                 | Sem ajuste                                                   | 50mg 24/24h | 25mg 24/24h |

- ▶ **ADMINISTRAÇÃO**  
Oral
- ▶ **Administração via sonda:**  
Pode ser administrado via sonda. Triturar e diluir em 20mL de água, administrando imediatamente.
- ▶ **ARMAZENAMENTO**  
Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

SOLUÇÃO ÁCIDA PARA HEMODIÁLISE <sup>1,2</sup>

Solução para Diálise

Nome comercial:  
Cphd 22-90 Sol Ácida de Diálise 960ml  
(Na: 40,00mEq/L, K: 2,00mEq/L, Ca: 2,50mEq/L, Mg: 1,00mEq/L) <sup>1,2</sup>  
Cphd 24-90 Sol Ácida de Diálise 960mL <sup>1,2</sup>  
(Na: 40,00mEq/L, K: 2,00mEq/L, Ca: 3,50mEq/L, Mg: 1,00mEq/L) <sup>1</sup>  
Cphd 32-90 Sol Ácida de Diálise 960ml  
(Na: 40,00mEq/L, K: 3,00mEq/L, Ca: 2,50mEq/L, Mg: 1,00mEq/L) <sup>1,2</sup>  
Sol Ácida 22/34  
(Na:138mEq/L, K 2,0 mEq/L, Ca: 2,50mEq/L, Mg: 1,00mEq/L ) <sup>1</sup>  
Sol Ácida 24/34  
(Na: 138 mEq/L, K 2,0 mEq/L Ca: 3,50mEq/L, Mg: 1,00mEq/L) <sup>1</sup>

**POSOLOGIA**

A critério médico.

► **ARMAZENAMENTO**

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

**SOLUÇÃO BÁSICA DE DIÁLISE: BICARBONATO DE SÓDIO + CLORETO DE SÓDIO + GLICOSE ANIDRA <sup>1,2</sup>**

Solução para Diálise

Nome comercial:

Sol Básica - Ds 138/35 - 90 <sup>1,2</sup>

**POSOLOGIA**

A critério médico.

► **ADMINISTRAÇÃO**

Peritoneal

► **ARMAZENAMENTO**

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

**SÓDIO CLORETO + POTÁSSIO CLORETO + GLICOSADO 5% <sup>1</sup>**

Eletrólitos, Diluentes

Nome comercial:

Mixistar Sol bolsa 1000mL 0,4% <sup>1</sup>

Mixistar Sol bolsa 1000mL 0,8% <sup>1</sup>

**POSOLOGIA**

**Adulto:**

|             |  |                       |
|-------------|--|-----------------------|
| Dose padrão |  | 30 a 40 mL/kg/dia, IV |
|-------------|--|-----------------------|

**Criança (acima de 20kg):**

|             |  |                       |
|-------------|--|-----------------------|
| Dose padrão |  | 50 a 70 mL/kg/dia, IV |
|-------------|--|-----------------------|

**Criança (até 20kg):**

|             |  |                       |
|-------------|--|-----------------------|
| Dose padrão |  | 70 a 90 mL/kg/dia, IV |
|-------------|--|-----------------------|

► **Ajuste de dose:**

Não é necessário ajuste de dose.

► **ADMINISTRAÇÃO**

Intravenosa

► **ARMAZENAMENTO**

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

**SOLUÇÃO CARDIOPLÉGICA DE INDUÇÃO <sup>1</sup>**

Outros - Aparelho Cardiovascular

Nome comercial:

Sol Cardioplégica Amp 10ml Manip <sup>1</sup>

**POSOLOGIA**

**Adulto:**

A critério médico.

Solução de indução: indução da parada completa dos batimentos cardíacos enquanto se realiza o ato cirúrgico.

Solução de manutenção/reperfusão: manutenção da parada dos batimentos cardíacos enquanto se realiza o ato cirúrgico.

► **ARMAZENAMENTO**

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

## **SOLUÇÃO PARA CONSERVAÇÃO<sup>1,2</sup>**

Solução para Conservação de Órgãos

Nome comercial:

Sol de Preservação de Órgãos (SPS-1) 1000mL (Organ Recovery - Importado)<sup>1</sup>

Sol para Conservação de Órgãos Igl-1<sup>1,2</sup>

### **POSOLOGIA**

A solução fria é indicada para lavar o órgão (rím, fígado e pâncreas) isolado imediatamente antes da remoção do doador e/ou imediatamente após a remoção do dador. A solução é depois deixada durante o armazenamento e transporte hipotérmico. SPS-1 é para ser utilizada para armazenagem a frio do órgão e não é aceitável para máquina de perfusão contínua.

► **ARMAZENAMENTO**

Conservar em refrigeração entre 2°C e 8°C.

## **SOLUÇÃO DE DIÁLISE: BICARBONATO DE SÓDIO<sup>1</sup>**

Solução para Diálise

Nome comercial:

HD Bicarbonato de Sódio 8,4% 5L Galão<sup>1</sup>

### **POSOLOGIA**

A critério médico.

► **ARMAZENAMENTO**

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

## **SOLUÇÃO DE DIÁLISE: CLORETO DE CÁLCIO<sup>1</sup>**

Solução para Diálise

Nome comercial:

Sol Diálise 2,5meq/mL de Cálcio 5000mL Cphd 12g/34 2,5meq/L 5L<sup>1</sup>

### **POSOLOGIA**

A critério médico.

► **ARMAZENAMENTO**

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

## **SOLUÇÃO DE DIÁLISE: CLORETO DE CÁLCIO + CLORETO DE MAGNÉSIO + CLORETO DE SÓDIO + SÓDIO LACTATO<sup>1</sup>**

Solução para Diálise

Nome comercial:

Bolsa Ultrabag 1,5% Azb-1683 2000 mL<sup>1</sup>



## POSOLOGIA

A critério médico.

### ▶ ARMAZENAMENTO

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

## SOLUÇÃO DE DIÁLISE: CLORETO DE SÓDIO + CLORETO DE POTÁSSIO + ASSOCIAÇÕES <sup>1</sup>

Solução para Diálise

Nome comercial:

HD 170 Ácido de Potássio com Acetato Galão 5L <sup>1</sup>

## POSOLOGIA

A critério médico.

### ▶ ARMAZENAMENTO

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

## SOLUÇÃO DE DIÁLISE: CLORETO DE SÓDIO + SULFATO DEMAGNÉSIOHEPTAIDRATADOSEMGlicose <sup>1</sup>

Solução para Diálise

Nome comercial:

Sol de Diálise Hemolenta (sem Glicose) Bolsa 5000mL (Eurofarma) <sup>1,2</sup>

Sol de Diálise 0,61% (Life Pharma) <sup>1,2</sup>

## POSOLOGIA

### Adulto:

Volume: A critério médico, dependendo da necessidade do paciente.

Taxa de fluxo: 1000 a 2000 mL/h.

### ARMAZENAMENTO

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

## SOLUÇÃO DE DIÁLISE: CLORETO DE SÓDIO + SULFATO DE MAGNÉSIO HEPTAIDRATADO SEM GLICOSE + BICARBONATO <sup>1</sup>

Solução para Diálise

Nome comercial:

Sol de Diálise (Na + K + Mg + PO<sub>4</sub> + HCO<sub>3</sub> + Cl) Bolsa 5000mL (Life Pharma) <sup>1</sup>

## POSOLOGIA

A critério médico.

### ▶ ARMAZENAMENTO

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

## SOLUÇÃO DE DIÁLISE PERITONEAL <sup>1</sup>

Solução para Diálise

Nome comercial:

Sol de Diálise Peritoneal Pd2 1,5% Glicose 6l <sup>1</sup>

Sol de Diálise Peritoneal Pd2 2,5% Glicose 6l <sup>1</sup>

Sol de Diálise Peritoneal Pd2 4,25% Glicose 6l <sup>1</sup>

## POSOLOGIA

A critério médico.

► **ARMAZENAMENTO**

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

## SOLUÇÃO DE ELETRÓLITOS <sup>1</sup>

Expansor de Volume Sanguíneo

Nome comercial:

Plasma-Lyte Bolsa 500mL <sup>1</sup>

**POSOLOGIA**

A critério médico.

► **ARMAZENAMENTO**

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

## SOLUÇÃO SALINA: CÁLCIO CLORETO + MAGNÉSIO CLORETO + POTÁSSIO CLORETO + SÓDIO ACETATO + SÓDIO CITRATO + SÓDIO CLORETO <sup>1</sup>

Outros -Dermatológicos, Otológicos e Oftálmicos

Nome comercial:

BSS Sol Salina Balanceada Fr 500mL <sup>1</sup>

**POSOLOGIA**

**Adulto e Criança:**

Dose padrão

Irrigação durante as intervenções cirúrgicas dos olhos, ouvidos, nariz e/ou garganta

► **ARMAZENAMENTO**

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

## SOMATOSTATINA <sup>1</sup>

Hemostático

Nome comercial:

Stilamin 3mg Amp <sup>1</sup>

**POSOLOGIA**

**Adulto:**

Dose padrão

3,5 mcg/kg/ IV, infusão contínua. Uma vez cessada a hemorragia, continuar o tratamento por 48 a 72 horas.

► **Ajuste de dose:**

Não é necessário ajuste de dose

► **ADMINISTRAÇÃO**

Intravenosa

Intravenosa direta: até 3mg em 50mL de SF, dose de ataque, 15 minutos.

Infusão contínua: até 3mg em 100mL SF, 3,5mcg/Kg/h em média 250mcg/h.

até 6mg em 250mL SF, 3,5mcg/Kg/h em média 250mcg/h.

► **ARMAZENAMENTO**

Conservar em temperatura menor que 25°C.

► **Atenção:**

Alto Custo.

Nome comercial:  
Minilax 6,5g Bis <sup>1,2</sup>

POSOLOGIA

Adulto e Criança:

Dose padrão | 6,5g a 2 doses quando necessário, especialmente Fecaloma.

- ▶ **Ajuste de dose:**  
Não é necessário ajuste de dose
- ▶ **ADMINISTRAÇÃO**  
Via retal
- ▶ **ARMAZENAMENTO**  
Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

SOTALOL <sup>1,2</sup>

Antiarrítmico

Nome comercial:  
Sotalol Cloridrato 120mg Cp (Brainfarma) <sup>1,2</sup>  
Sotalol Cloridrato 160mg Cp (Brainfarma) <sup>1</sup>  
Sotalol Cloridrato 120mg Cp (Biosintética) <sup>1,2</sup>  
Sotalol Cloridrato 160mg Cp (Biosintética) <sup>1</sup>  
Sotalol Cloridrato 160mg Cp (Merck) <sup>1</sup>

POSOLOGIA

Adulto:

|                                           |                                                    |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Arritmias                                 | 160 a 320mg, em doses fracionadas, a cada 12 horas |
| Angina pectoris/ Pós-infarto do miocárdio | 160 a 320mg, em doses fracionadas, a cada 12 horas |

- ▶ **Ajuste de dose:**  
Insuficiência renal:

| Dose com Função Renal Normal | Dose Insuficiência Renal<br>clearance de creatinina (mL/min) |             |                      |                     |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|---------------------|
|                              | >60                                                          | 30-60       | 10-30                | <10                 |
| 80mg 12/12h                  | 80mg 12/12h                                                  | 80mg 24/24h | 80mg 36/36h a 48/48h | Individualizar dose |

- ▶ **ADMINISTRAÇÃO**  
Oral  
Administrar, preferencialmente, 1 a 2 horas antes das refeições.
- ▶ **Administração com alimentos:**  
Evitar o consumo de antiácidos com alumínio e magnésio em até 2 horas após a administração.
- ▶ **Administração via sonda:**  
Pode ser administrado via sonda. Triturar e diluir em 15mL de água, administrando imediatamente.
- ▶ **ARMAZENAMENTO**  
Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

**SUBGALATO DE BISMUTO <sup>1,2</sup>**

Hemostático

Nome comercial:

Subgalato de Bismuto Pote 10g Manip <sup>1,2</sup>**POSOLOGIA****Adulto:**

A critério médico ou embeber em gases em mistura 10g de subgalato de bismuto + 10mL de SF.

▶ **ADMINISTRAÇÃO**

Tópico

▶ **ARMAZENAMENTO**

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

**SUCCINATO DE DESVENLAFAXINA <sup>1,2</sup>**

Antidepressivo

Nome comercial:

Pristiq 50mg Cp Rev de Liberação Controlada <sup>1</sup>Deller 50mg Cp Rev de Liberação Controlada <sup>1</sup>**POSOLOGIA****Adulto:**

|             |                       |
|-------------|-----------------------|
| Dose padrão | 50mg, a cada 24 horas |
| Dose máxima | 200mg ao dia          |

▶ **Ajuste de dose:**

Insuficiência renal:

| Dose com Função Renal Normal | Dose com Insuficiência Renal<br>clearance de creatinina (mL/min) |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 50mg 24/24h                  | < 30                                                             |
|                              | 50mg 48/48h                                                      |

▶ **ADMINISTRAÇÃO**

Oral

Administrar com ou sem alimentos

▶ **Administração com alimentos:**

Evitar o consumo de álcool e Erva-de-São-João.

▶ **ARMAZENAMENTO**

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

▶ **Atenção:**

Receita Branca (2 vias).

**SUCCINATO DE SOLIFENACINA <sup>1</sup>**

Anticolinérgico

Nome comercial:

Vesicare 5mg Cp Rev <sup>1</sup>**POSOLOGIA**

Adulto:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Dose padrão                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5mg, a cada 24 horas. Se for necessário, pode ser aumentada até 10mg, uma vez ao dia. |
| <div> <div>► <b>Ajuste de dose:</b></div> <div> Insuficiência renal: Para pacientes com insuficiência renal grave (ClCr &lt; 30mL/min), não ultrapassar 5mg diários.<br/> Insuficiência hepática: Para pacientes com insuficiência hepática moderada (Child Pugh B), não ultrapassar 5mg diários. Para pacientes com insuficiência hepática grave, o uso é contraindicado.<br/> Ajuste de dose com Inibidores do CYP3A4: Quando administrado com doses terapêuticas de cetoconazol ou outros inibidores potentes do CYP3A4, não ultrapassar 5mg diários. </div> </div> |                                                                                       |
| <div> <div>► <b>ADMINISTRAÇÃO</b></div> <div> Oral<br/> Administrar com ou sem alimentos. </div> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                       |
| <div> <div>► <b>ARMAZENAMENTO</b></div> <div> Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C. </div> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                       |

SUCRALFATO <sup>1,2</sup>Antiulceroso

Nome comercial:  
 Sucrafilm 200mg/mL Flac 10mL <sup>1,2</sup>  
 Sucrafalto 200mg/mL Flac 10mL Manip <sup>1,2</sup>

POSOLOGIA

Adulto:

|             |                              |
|-------------|------------------------------|
| Dose padrão | 1 flac, a cada 12 horas      |
| Criança:    |                              |
| Dose padrão | 40 a 80mg/kg, a cada 6 horas |

- **Ajuste de dose:**

Insuficiência renal: Pode ser necessário ajuste de dose, monitorar.
- **ADMINISTRAÇÃO**

Oral  
Administrar em jejum com água.
- **Administração via sonda:**

Pode ser administrado via sonda. Diluir em 15mL de água e administrar imediatamente.
- **ARMAZENAMENTO**

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C. Proteger da luz.

SUFENTANILA <sup>1,2</sup>Analgésico Narcótico

Nome comercial:  
 Sufenta 50mcg/mL Amp 1mL <sup>1,2</sup>  
 Fastfen 50mcg Amp 1ml <sup>1,2</sup>

**POSOLOGIA****Adulto:**

|                                   |                                                               |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Agente analgésico                 | 0,5 a 5 mcg/kg IV (bolus), a cada 24 horas                    |
| Agente anestésico                 | Doses maiores ou iguais a 8mcg/kg IV                          |
| Dor pós-operatória                | 30 a 50mcg epidural, para promover alívio por até 4 a 6 horas |
| Agente analgésico durante o parto | 10mcg epidural                                                |

**Criança (> 1 mês de idade):**

|                                                 |                                                          |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Indução de anestesia                            | 0,2 a 0,5mcg/kg IV, durante 30 segundos                  |
| Manutenção de anestesia em pacientes ventilados | 0,3 a 2mcg/kg IV (bolus) lentamente, durante 30 segundos |

▶ **Ajuste de dose:**

Não é necessário ajuste de dose.

▶ **ADMINISTRAÇÃO**

Epidural e Intravenosa

Se necessário, pode ser misturado em SF/SG 5%.

▶ **ARMAZENAMENTO**

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C. Proteger da luz.

▶ **Atenção:**

Receita Amarela.

**SUGAMADEX SÓDICO <sup>1,2</sup>**

Antídoto

Nome comercial:

Bridion 100mg/mL FA 2mL <sup>1,2</sup> \*

**POSOLOGIA****Adulto:**

Conforme esquema posológico.

▶ **Ajuste de dose:**

Insuficiência renal grave: O uso é contraindicado.

▶ **ADMINISTRAÇÃO**

Intravenosa

▶ **ARMAZENAMENTO**

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

Após diluição, possui estabilidade de 48 horas em temperatura entre 2 e 25°C.

▶ **Atenção:**

\* Este medicamento é livre de látex.

**SULFADIAZINA <sup>1</sup>**

Antimicrobiano Sulfa

Nome comercial:

Suladrin 500mg Cp <sup>1</sup>

Sulfadiazina 500mg Cap Manip <sup>1</sup>

**POSOLOGIA**

**Adulto:**

|             |                       |
|-------------|-----------------------|
| Dose padrão | 500mg, a cada 6 horas |
|-------------|-----------------------|

**Criança:**

|             |                                                         |
|-------------|---------------------------------------------------------|
| Dose padrão | 150 mg/kg ao dia, fracionados em 3 doses a cada 8 horas |
|-------------|---------------------------------------------------------|

- ▶ **Ajuste de dose:**  
Não é necessário ajuste de dose.
- ▶ **ADMINISTRAÇÃO**  
Oral
- ▶ **Administração com alimentos:**  
Evitar o consumo de vitamina C em grande quantidade e Erva-de-São-João.
- ▶ **ARMAZENAMENTO**  
Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.
- ▶ **Atenção:**  
Receita Branca (2 vias).

**SULFADIAZINA PRATA + NITRATO DE CÉRIO <sup>1</sup>**

Antimicrobiano Tópico

Nome comercial:  
Dermacerium Creme Bis 50g <sup>1</sup>

**POSOLOGIA**

**Adulto e Criança:**

|             |                                                                                                              |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dose padrão | Aplicar uma camada, a cada 24 horas na área afetada. Caso a lesão seja muito severa, aplicar a cada 12 horas |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

- ▶ **Ajuste de dose:**  
Não é necessário ajuste de dose.
- ▶ **ADMINISTRAÇÃO**  
Tópico  
Limpar a lesão antes de aplicar.
- ▶ **ARMAZENAMENTO**  
Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.
- ▶ **Atenção:**  
Receita Branca (2 vias).

**SULFAMETOXAZOL + TRIMETROPINA <sup>1,2</sup>**

Antimicrobiano Sulfa

Nome comercial:  
Bac-Sulfitrin 400mg + 80mg Amp 5mL <sup>1,2</sup>

**POSOLOGIA**

**Adulto e Criança (> 12 anos de idade):**

|             |                                                     |
|-------------|-----------------------------------------------------|
| Dose padrão | 5 a 20 mg TMP/kg/dia IV, fracionado a cada 12 horas |
|-------------|-----------------------------------------------------|

► **Ajuste de dose:**

Insuficiência renal:

| Dose com Função Renal Normal | Dose Insuficiência Renal<br>clearance de creatinina (mL/min) |                   |                     |                                                     |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|
|                              | >50-90                                                       | 30-50             | 10-29               | <10                                                 |
| 5-20 mgTMP/<br>kg/ dia       | 5-20mg/kg/<br>dia                                            | 5-20mg/<br>kg/dia | 2,5-10mg/<br>kg/dia | Não recomendado,<br>se necessário:<br>5-10mg/kg/dia |

► **ADMINISTRAÇÃO**

Intravenosa

Infusão intermitente: até 5mL em 100mL SF/SG 5%, 30 a 60 minutos.  
 até 10mL em 250mL SF/SG 5%, 30 a 60 minutos.  
 até 15mL em 500mL SF/SG 5%, 30 a 60 minutos.

► **ARMAZENAMENTO**

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

► **Atenção:**

Receita Branca (2 vias).

**SULFAMETOXAZOL + TRIMETROPINA <sup>1,2</sup>**

Antimicrobiano Sulfa

Nome comercial:

Bactrim 400mg + 80mg Cp <sup>1</sup>Bactrim F 800mg + 160mg Cp <sup>1,2</sup>Sulfametoxazol 400mg + Trimetoprima 80mg Cp (Sandoz) <sup>1</sup>Sulfametoxazol 400mg + Trimetoprima 80mg Cp (Prati Donaduzzi) <sup>1</sup>Sulfametoxazol 800mg + Trimetoprima 160mg Cp (Prati Donaduzzi) <sup>1,2</sup>**POSOLOGIA****Adulto e Criança:**

|                                                        |                                                                                            |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dose padrão                                            | - Bactrim: 2 comprimidos, a cada 12 horas.<br>- Bactrim F: 1 comprimido, a cada 12 horas   |
| Dose mínima e para tratamentos prolongados (> 14 dias) | - Bactrim: 1 comprimido, a cada 12 horas<br>- Bactrim F: 1 e ½ comprimido, a cada 12 horas |
| Dose máxima                                            | - Bactrim: 3 comprimidos, a cada 12 horas<br>- Bactrim F: 1,5 cp, a cada 12 horas          |

► **Ajuste de dose:**

Insuficiência renal:

| Dose com Função Renal Normal | Dose Insuficiência Renal<br>clearance de creatinina (mL/min) |                   |                     |                                                     |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|
|                              | >50-90                                                       | 30-50             | 10-29               | <10                                                 |
| 5-20 mgTMP/<br>kg/ dia       | 5-20mg/kg/<br>dia                                            | 5-20mg/<br>kg/dia | 2,5-10mg/<br>kg/dia | Não recomendado,<br>se necessário:<br>5-10mg/kg/dia |

► **ADMINISTRAÇÃO**

Oral

Administrar com ou sem alimento.



- ▶ **Administração com alimentos:**  
Evitar o consumo de Erva-de-São-João.
- ▶ **Administração via sonda:**  
Pode ser administrado via sonda. Triturar e diluir em 20mL de água, administrando imediatamente.
- ▶ **ARMAZENAMENTO**  
Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.
- ▶ **Atenção:**  
Receita Branca (2 vias).

SULFASSALAZINA <sup>1</sup>

Antimicrobiano Sulfa

Nome comercial:  
Azulfin 500mg Cp Rev <sup>1</sup>

**POSOLOGIA**

**Adulto:**

|                       |                                              |
|-----------------------|----------------------------------------------|
| Tratamento inicial    | 3 a 4g diários em doses igualmente divididas |
| Tratamento manutenção | 2g diários em doses igualmente divididas     |
| Dose máxima           | 12g ao dia                                   |

- ▶ **Ajuste de dose:**  
Insuficiência renal:

| Dose com Função Renal Normal | Dose Insuficiência Renal<br>clearance de creatinina (mL/min) |           |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------|
| 1g 12/12h                    | 10-30                                                        | < 10      |
|                              | 1g 12/12h                                                    | 1g 24/24h |

- Insuficiência hepática: Evitar o uso
- ▶ **ADMINISTRAÇÃO**  
Oral
- ▶ **Administração com alimentos:**  
Evitar o consumo de Erva-de-São-João.
- ▶ **ARMAZENAMENTO**  
Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.
- ▶ **Atenção:**  
Receita Branca (2 vias).

SULPIRIDA <sup>1</sup>

Antipsicótico, Neuroléptico

Nome comercial:  
Equilid 50mg Cap <sup>1</sup>

**POSOLOGIA**

**Adulto:**

|                                |                                                   |
|--------------------------------|---------------------------------------------------|
| Estados neuróticos depressivos | 100 a 200mg, administrados em 2 ingestões diárias |
| Síndromes vertiginosas         | 150 a 300mg, em duas ingestões                    |
| Esquizofrenia                  | 400 a 800mg, em duas ingestões                    |

- ▶ **Ajuste de dose:**  
Não é necessário ajuste de dose.
- ▶ **ADMINISTRAÇÃO**  
Oral  
Ingerir com líquido.
- ▶ **ARMAZENAMENTO**  
Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.
- ▶ **Atenção:**  
Receita Branca (2 vias).

**SUMATRIPTANA <sup>1</sup>**

Antienxaquecoso

Nome comercial:  
Sumax 25mg Cp <sup>1</sup>

**POSOLOGIA****Adulto:**

|             |                                       |
|-------------|---------------------------------------|
| Dose padrão | 25mg, com intervalo mínimo de 2 horas |
| Dose máxima | 200mg diários                         |

- ▶ **Ajuste de dose:**  
Insuficiência hepática: Somente em casos de muita necessidade. Não ultrapassar a dose de 50mg.
- ▶ **ADMINISTRAÇÃO**  
Oral
- ▶ **ARMAZENAMENTO**  
Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

**SUXAMETÔNIO <sup>1,2</sup>**

Bloqueador Neuromuscular

Nome comercial:  
Succinil Colin 100mg FA <sup>1,2</sup>  
Succitrat 100mg FA <sup>1,2</sup> \*

**POSOLOGIA****Adulto**

|                                      |                    |
|--------------------------------------|--------------------|
| Procedimentos cirúrgicos curtos      | 0,6 mg/kg IV       |
| Procedimentos cirúrgicos prolongados | 2,5 a 4,3mg/min IV |

**Criança:**

- |             |                                                                  |
|-------------|------------------------------------------------------------------|
| Dose padrão | - Crianças menores: 2 mg/kg IV<br>- Crianças maiores: 1 mg/kg IV |
|-------------|------------------------------------------------------------------|
- ▶ **Ajuste de dose:**  
Insuficiência hepática: Pode ser necessário reduzir a dose, principalmente em casos graves, monitorar.
  - ▶ **ADMINISTRAÇÃO**  
Intravenosa e Intramuscular

Reconstituir em 10mL de água destilada.

Intramuscular: Apenas se for necessário, com uma dose de até 3 a 4 mg/kg, não ultrapassando 150mg da dose total.

Infusão intermitente: até 200mg em 100mL de SF/SG 5%.

até 500mg em 250mL de SF/SG 5%.

até 1000mg em 500mL de SF/SG 5%.

Infusão contínua: até 1000mg em 500mL de SF/SG 5%.

Acima de 1000mg em 1000mL de SF/SG 5%.

## ▶ ARMAZENAMENTO

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

Após preparo, possui estabilidade de 24 horas em refrigeração entre 2°C e 8°C.

► **Atenção:**

\* Esta apresentação é livre de látex.

**TACROLIMO** <sup>1,2</sup>

Imunossupressor

Nome comercial:

Prograf 1mg Cap <sup>1,2</sup>Prograf 5mg Cap <sup>1,2</sup>Tacrolimo 1mg Cap (Secretaria da Saúde) <sup>1,2</sup>Tacrolimo 0,5mg Cap Manip <sup>1</sup>Tarfic 1mg Cap <sup>1,2</sup>Tarfic 5mg Cap <sup>1,2</sup>**POSOLOGIA****Adulto:**

|                      |                                                                                                |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Transplante renal    | 0,2 mg/kg, fracionado a cada 12 horas. Administrar em até 24 horas após o transplante.         |
| Transplante hepático | 0,10 a 0,15 mg/kg, fracionado a cada 12 horas. Administrar mais de 6 horas após o transplante. |
| Transplante cardíaco | 0,15 a 0,20 mg/kg, fracionado a cada 12 horas.                                                 |

**Criança:**

|                      |                                                                                                |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Transplante hepático | 0,15 a 0,20 mg/kg, fracionado a cada 12 horas. Administrar mais de 6 horas após o transplante. |
| Transplante cardíaco | 0,10 a 0,30 mg/kg, fracionado a cada 12 horas                                                  |

▶ **Ajuste de dose:**

Não é necessário ajuste de dose.

▶ **ADMINISTRAÇÃO**

Oral

▶ **Administração com alimentos:**

Evitar o consumo de toranja (grapefruit) e Erva-de-São-João.

▶ **Administração via sonda:**

Pode ser administrado via sonda. Diluir em 10mL de água, administrando imediatamente.

▶ **ARMAZENAMENTO**

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

**TACROLIMO** <sup>1</sup>

Imunossupressor

Nome comercial:

Prograf 5mg/mL Amp 1mL <sup>1</sup>**POSOLOGIA****Adulto e Criança:**

|                              |                                               |
|------------------------------|-----------------------------------------------|
| Transplante hepático e renal | 0,03 a 0,05 mg/kg/dia IV por infusão contínua |
| Transplante cardíaco         | 0,01 a 0,02 mg/kg/dia IV por infusão contínua |

▶ **Ajuste de dose:**

Insuficiência hepática grave: Pode ser necessário ajuste de dose, monitorar.

▶ **ADMINISTRAÇÃO**

Intravenosa

Administrar antes de 6 horas depois do transplante.

- Diluir até 5mg em 250mL de SF/SG 5% trilaminado e até 10mg em 500mL de SF/SG% trilaminado.
- ▶ **Administração com alimentos:**  
Evitar o consumo de toranja (grapefruit) e Erva-de-São-João.
  - ▶ **ARMAZENAMENTO**  
Conservar em temperatura ambiente entre 5°C e 25°C.  
Após diluição, possui estabilidade de 24 horas em refrigeração entre 2°C e 8°C.

TAMOXIFENO <sup>1</sup>

Antineoplásico Oral

Nome comercial:  
 Citrato de Tamoxifeno 20mg Cp (Sandoz) <sup>1</sup>  
 Citrato de Tamoxifeno 20mg Cp (Blausiegel) <sup>1</sup>  
 Festone 20mg Cp Rev <sup>1</sup>  
 Nolvadex D 20mg Cp <sup>1</sup>

**POSOLOGIA**  
**Adulto:**  
 Conforme esquema quimioterápico.

- ▶ **ADMINISTRAÇÃO**  
Oral
- ▶ **Administração com alimentos:**  
Evitar o consumo de Erva-de-São-João.
- ▶ **Administração via sonda:**  
Triturar e diluir em 20mL de água, administrando imediatamente. Preparo deve ser feito na quimioterapia.
- ▶ **ARMAZENAMENTO**  
Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

TANSULOSINA <sup>1,2</sup>

Terapêutica Prostática

Nome comercial:  
 Secotex 0,4mg Cp Rev <sup>1</sup>  
 Omnic Ocas 0,4mg Cp Rev <sup>1</sup>  
 Tansulosina 0,4mg Cap Liberação Controlada (Manipulado) <sup>1,2</sup>  
 Combodart Cap <sup>1</sup>

**POSOLOGIA**  
**Adulto:**

|                              |                                                              |              |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|
| Dose padrão                  | 0,4mg, a cada 24 horas                                       |              |
| ▶ <b>Ajuste de dose:</b>     |                                                              |              |
| Insuficiência renal:         |                                                              |              |
| Dose com Função Renal Normal | Dose Insuficiência Renal<br>clearance de creatinina (mL/min) |              |
| 0,4 mg 24/24h                | >10                                                          | < 10         |
|                              | Sem ajuste                                                   | Não estudado |

- ▶ **ADMINISTRAÇÃO**  
Oral  
Administrar independentemente das refeições.

► **Administração com alimentos:**

Evitar o consumo de álcool, Erva-de-São-João e cimicífuga.

► **ARMAZENAMENTO**

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

## TEICOPLANINA <sup>1,2</sup>

Antimicrobiano Glicopeptídeo

Nome comercial:

Targocid 200mg FA <sup>1,2</sup>

Targocid 400mg FA <sup>1,2</sup>

Koplan 400mg FA <sup>1,2</sup>

Koplan 200mg FA <sup>1,2</sup>

Bactomax 400mg FA <sup>1,2</sup> \*

Teiplan 200mg FA <sup>1,2</sup>

### POSOLOGIA

#### Adulto:

|                                                                                                    |                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Infecções por gram-positivos em geral                                                              | Dose de ataque: 3 doses de 400mg IV, a cada 12 horas<br>Dose manutenção: 400mg IV/IM, a cada 24 horas                                                   |
| Septicemia, infecções ósteo-articulares, endocardites, pneumonias graves e outras infecções graves | Dose de ataque: 400mg IV, a cada 12 horas para as 3 primeiras doses podendo se estender por até 4 dias<br>Dose manutenção: 400mg IV/IM, a cada 24 horas |
| Profilaxia de endocardite por gram-positivos em cirurgia dental e em pacientes com doença valvular | 400mg IV, no momento da indução anestésica                                                                                                              |
| Profilaxia de infecções por gram-positivos em cirurgia ortopédica e vascular                       | 400mg IV, no momento da indução anestésica                                                                                                              |
| Diarreia causada por Clostridium difficile associada a antibióticos                                | 200mg oral, a cada 12 horas durante 7 a 14 dias                                                                                                         |

#### Criança (> 2 meses de idade até 16 anos):

|                                                                                 |                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Infecções por gram-positivos no geral                                           | 10 mg/kg IV, a cada 12 horas para as 3 primeiras doses. As doses subsequentes devem ser de 6 mg/kg em injeção IV/IM   |
| Infecções graves por microrganismos gram-positivos ou em crianças neutropênicas | 10 mg/kg IV, a cada 12 horas para as 3 primeiras doses. As doses subsequentes devem ser de 10 mg/kg em injeção IV/IM. |

#### Recém-nascidos (< 2 meses de idade):

|             |                                                                                                     |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dose padrão | 16 mg/kg IV no primeiro dia. As doses subsequentes devem ser de 8 mg/kg IV. Infusões de 30 minutos. |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|

- ▶ **Ajuste de dose:**  
Insuficiência renal: Ajustar a partir da quinta dose.

| Dose com Função Renal Normal | Dose Insuficiência Renal<br>clearance de creatinina (mL/min) |               |               |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
|                              | 40-60                                                        | 10-50         | <10           |
| 6mg/Kg/dia                   | 3mg/Kg/dia                                                   | 6mg/Kg 48/48h | 2mg/Kg 72/72h |

- ▶ **ADMINISTRAÇÃO**  
Intravenosa e Intramuscular  
Reconstituir em diluente próprio.  
Intravenosa direta: até 200mg em 10mL de SF, por 3 a 5 minutos.  
Infusão intermitente: 200mg em 100mL de SF/SG 5%, durante 30 minutos.
- ▶ **ARMAZENAMENTO**  
Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.  
Após reconstituição, possui estabilidade de 24 horas em refrigeração de 5°C.
- ▶ **Atenção:**  
Receita branca (2 vias)  
\* Esta apresentação é livre de látex.

**TELMISARTANA <sup>1</sup>**

Agente Anti-hipertensivo

Nome comercial:  
Micardis 40mg Cp <sup>1</sup>

**POSOLOGIA**

**Adulto:**

|                                                 |                                                                                                          |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hipertensão arterial                            | 40mg, a cada 24 horas. Caso a pressão pretendida não seja atingida, aumentar para 80mg, a cada 24 horas. |
| Prevenção da mortalidade e lesão cardiovascular | 80mg, a cada 24 horas.                                                                                   |

- ▶ **Ajuste de dose:**  
Insuficiência hepática: Não exceder a dose diária de 40mg nos casos leves a moderados.
- ▶ **ADMINISTRAÇÃO**  
Oral  
Administrar com ou sem alimentos.
- ▶ **Administração via sonda:**  
Pode ser administrado via sonda. Dispersar em 10mL de água por 5 minutos e administrar imediatamente.
- ▶ **ARMAZENAMENTO**  
Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

**TENOFOVIR <sup>1</sup>**

Antiviral

Nome comercial:  
Viread 300mg Cp <sup>1</sup>

**POSOLOGIA**

Adulto:

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| HIV-1 ou Hepatite B crônica | 300mg, a cada 24 horas |
|-----------------------------|------------------------|

- ▶ **Ajuste de dose:**  
Insuficiência renal:

| Dose com Função Renal Normal | Dose com Insuficiência Renal Clearance de Creatinina (mL/min) |                          |                               |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|
|                              | ClCr 30-49 mL/min                                             | ClCr 10-29mL/min         | ClCr > 10mL/min (hemodiálise) |
| 300mg a cada 24 horas        | 300mg a cada 48 horas                                         | 300mg 2 vezes por semana | 300mg a cada 7 dias           |

- ▶ **ADMINISTRAÇÃO**  
Oral  
Administrar com ou sem alimento.
- ▶ **Administração com alimentos:**  
Considerar suplementação com cálcio em pacientes com história de fratura óssea ou osteopenia.
- ▶ **Administração via sonda:**  
Pode ser administrado via sonda. Dispersar em 10mL de água por 5 minutos e administrar imediatamente.
- ▶ **ARMAZENAMENTO**  
Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

TENOXICAM <sup>1,2</sup>

Anti-inflamatório Não Esteroidal Sistêmico

Nome comercial:  
Teflan 20mg FA <sup>1,2</sup> \*  
Tenoxicam 20mg FA (Cristália) <sup>1,2</sup>  
Tenoxicam 20mg FA (Eurofarma) <sup>1,2</sup>

POSOLOGIA

Adulto:

|                    |                                                                                                                                                        |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dose padrão        | 20mg IV/IM, a cada 24 horas                                                                                                                            |
| Dor pós-operatória | 40mg IV/IM, a cada 24 horas durante 5 dias e, nas crises agudas, usar 40mg, a cada 24 horas durante 2 dias e, em seguida, 20mg diários durante 5 dias. |

- ▶ **Ajuste de dose:**  
Não é necessário ajuste de dose.
- ▶ **ADMINISTRAÇÃO**  
Intravenosa e Intramuscular  
Reconstituir em 2mL de diluente próprio.
- ▶ **ARMAZENAMENTO**  
Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.
- ▶ **Atenção:**  
\* Esta apresentação é livre de látex.



TENOXICAM 1,2

Anti-inflamatório não Esteroidal Sistêmico

Nome comercial:  
Teflan 20mg Cp 1,2  
Tenotec 20mg Cp 1,2  
Tilatil 20mg Cp 1,2  
Tiloxineo 20mg Cp 1,2  
Tenoxicam 20mg Cp (EMS) 1,2  
Tenoxicam 20mg Cp (Neo Química) 1,2

POSOLOGIA

Adulto:

|                       |                                                                                                                                                                       |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dose padrão           | 20mg, a cada 24 horas                                                                                                                                                 |
| Dismenorreia primária | - Dor leve a moderada: 20mg, a cada 24 horas<br>- Dor intensa: 40mg, a cada 24 horas                                                                                  |
| Dor pós-operatória    | 40mg, a cada 24 horas durante 5 dias. Em crises agudas de gota, utilizar 40mg, a cada 24 horas, durante 2 dias e, em seguida, 20mg diários durante os próximos 5 dias |

- ▶ **Ajuste de dose:**  
Não é necessário ajuste de dose.
- ▶ **ADMINISTRAÇÃO**  
Oral  
Ingerir logo após as refeições.
- ▶ **Administração via sonda:**  
Pode ser administrado via sonda. Triturar e diluir em 15mL de água, administrando imediatamente.
- ▶ **ARMAZENAMENTO**  
Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

TEOFILINA 1

Broncodilatador

Nome comercial:  
Teolong 200mg Cap Liberação Prolongada 1

POSOLOGIA

Adulto e Criança (> 16 anos de idade):

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Dose padrão                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 11 a 13 mg/kg, a cada 24 horas |
| <ul style="list-style-type: none"><li>▶ <b>Ajuste de dose:</b><br/>Insuficiência renal: Administrar com cautela.</li><li>▶ <b>ADMINISTRAÇÃO</b><br/>Oral<br/>Administrar 1 hora antes ou 2 horas depois das refeições.</li><li>▶ <b>Administração com alimentos:</b><br/>Evitar o consumo de alimentos com cafeína.</li><li>▶ <b>ARMAZENAMENTO</b><br/>Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.</li></ul> |                                |

**TERBUTALINA <sup>1</sup>**

Broncodilatador

Nome comercial:

Sulfato de Terbutalina/Terbutil 0,5mg/mL Amp 1mL (União Química) <sup>1</sup>Sulfato de Terbutalina 0,5mg/mL Amp 1mL (Hipolabor) <sup>1</sup>**POSOLOGIA****Via subcutânea:**

|                             |                                          |
|-----------------------------|------------------------------------------|
| Adulto                      | 0,5 a 1mL, até no máximo, a cada 6 horas |
| Criança                     | ¼ a ½ da dose do adulto                  |
| Trabalho de parto prematuro | A critério médico                        |

**Infusão:**

|             |                                        |
|-------------|----------------------------------------|
| Dose padrão | 5 mcg/mL e infundir de 20 a 30 minutos |
|-------------|----------------------------------------|

► **Ajuste de dose:**

Insuficiência renal:

| Dose com Função Renal Normal | Dose Insuficiência Renal<br>clearance de creatinina (mL/min) |              |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|
| 0,25 mg                      | 10-50                                                        | < 10         |
|                              | 50% dose                                                     | Evitar o uso |

► **ADMINISTRAÇÃO**

Intravenosa e Subcutânea

Intravenosa: Diluir 5mg em 1000mL de SG 5%.

► **ARMAZENAMENTO**

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C. Proteger da luz.

Após diluição, possui estabilidade de 12 horas em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

**TERLIPRESSINA ACETATO + MANITOL <sup>1,2</sup>**

Hemostático

Nome comercial:

Glypressin 1mg FA <sup>1,2 \*</sup>**POSOLOGIA****Adulto:**

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hemorragias digestivas por varizes esofágicas | - Dose inicial: 1 a 2mg IV (bolus), com o controle da pressão sanguínea e frequência cardíaca.<br>- Dose manutenção: Para pacientes até 50kg = 1mg; Para pacientes entre 50 a 70kg = 1,5mg; Para pacientes com mais de 70kg = 2mg |
| Urgência da síndrome hepatorenal              | 0,5 a 2mg IV (bolus), a cada 4 horas                                                                                                                                                                                              |

► **Ajuste de dose:**

Não é necessário ajuste de dose.

- ADMINISTRAÇÃO**  
 Intravenosa  
 Reconstituir em 5mL de diluente próprio.  
 Intravenosa direta: 1mg em 10mL de SF.
- ARMAZENAMENTO**  
 Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.  
 Pronto para uso, possui estabilidade de 24 meses em refrigeração entre 2°C e 8°C.
- Atenção:**  
 \* Este medicamento é livre de látex.

**TIAMAZOL**
<sup>1,2</sup>

Hormônio Antitireoidiano

Nome comercial:  
Tapazol 5mg Cp <sup>1,2</sup>

**POSOLOGIA**
**Adulto:**

|                                      |                             |
|--------------------------------------|-----------------------------|
| Hipertireoidismo leve                | 15mg, a cada 24 horas.      |
| Hipertireoidismo moderadamente grave | 30 a 40mg, a cada 24 horas. |
| Hipertireoidismo grave               | 60mg, a cada 24 horas       |

**Criança:**

|             |                            |
|-------------|----------------------------|
| Dose padrão | 0,4 mg/kg, a cada 24 horas |
|-------------|----------------------------|

- Ajuste de dose:**  
 Não é necessário ajuste de dose.
- ADMINISTRAÇÃO**  
 Oral
- Administração via sonda:**  
 Pode ser administrado via sonda. Triturar e diluir em 15mL de água, administrando imediatamente.
- ARMAZENAMENTO**  
 Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

**TICAGRELOR**
<sup>1,2</sup>

Antiagregante Plaquetário

Nome comercial:  
Brilinta 90mg Cp Rev <sup>1,2</sup>

**POSOLOGIA**
**Adulto:**

|                 |                        |
|-----------------|------------------------|
| Dose inicial    | 180mg, a cada 24 horas |
| Dose manutenção | 90mg, a cada 12 horas  |

- Ajuste de dose:**  
 Insuficiência hepática moderada a grave: Pode ser necessário ajuste de dose, monitorar.
- ADMINISTRAÇÃO**  
 Oral  
 Ingerir com ou sem alimento.

► **ARMAZENAMENTO**

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

## TICLOPIDINA <sup>1</sup>

Antiagregante Plaquetário

Nome comercial:

Plaketar 250mg Cp Rev 1

Ticlopidina Cloridrato 250mg Cp Rev (Medley) 1

### POSOLOGIA

#### Adulto:

|             |                        |
|-------------|------------------------|
| Dose padrão | 250mg, a cada 12 horas |
|-------------|------------------------|

► **Ajuste de dose:**

Não é necessário ajuste de dose.

► **ADMINISTRAÇÃO**

Oral

Ingerir durante as refeições.

► **Administração com alimentos:**

Evitar ingestão de alho, angélica chinesa, artemísia, castanha da índia, chá verde, gengibre, ginkgo biloba, ginseng, primula, trevo vermelho e unha de gato.

► **Administração via sonda:**

Pode ser administrado via sonda. Triturar e diluir em 20mL de água, administrando imediatamente.

► **ARMAZENAMENTO**

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

► **Atenção:**

Alto Custo.

## TIGECICLINA <sup>1,2</sup>

Antimicrobiano Glicilciclina

Nome comercial:

Tygacil 50mg FA <sup>1,2</sup> \*

### POSOLOGIA

#### Adulto:

|             |                                         |
|-------------|-----------------------------------------|
| Dose padrão | 100mg, seguida de 50mg, a cada 12 horas |
|-------------|-----------------------------------------|

► **Ajuste de dose:**

Insuficiência hepática: Pode ser necessário ajuste de dose, monitorar.

► **ADMINISTRAÇÃO**

Intravenosa

Reconstituir em 5,3mL de SF.

Infusão intermitente: Até 100mg em 100mL de SF/SG 5%, durante 30 a 60 minutos.

► **ARMAZENAMENTO**

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

► **Atenção:**

Receita Branca (2 vias).

\* Este medicamento é livre de látex.

**TIOCOLCHICOSÍDEO** <sup>1,2</sup>

Relaxante Muscular

Nome comercial:  
Coltrax 4mg Cp <sup>1,2</sup>

**POSOLOGIA**

**Adulto:**

|                                                                                                                                                                                                    |                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Dose padrão                                                                                                                                                                                        | 8mg, a cada 12 horas durante 7 dias |
| <p>▶ <b>Ajuste de dose:</b><br/>Não é necessário ajuste de dose.</p> <p>▶ <b>ADMINISTRAÇÃO</b><br/>Oral</p> <p>▶ <b>ARMAZENAMENTO</b><br/>Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.</p> |                                     |

**TIOCOLCHICOSÍDEO** <sup>1,2</sup>

Relaxante Muscular

Nome comercial:  
Coltrax 4mg Amp 2mL <sup>1,2</sup>

**POSOLOGIA**

**Adulto:**

|                                                                                                                                                                                                                              |                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Dose padrão                                                                                                                                                                                                                  | 4mg, a cada 12 horas durante 5 dias |
| <p>▶ <b>Ajuste de dose:</b><br/>Não é necessário ajuste de dose.</p> <p>▶ <b>ADMINISTRAÇÃO</b><br/>Intramuscular</p> <p>▶ <b>ARMAZENAMENTO</b><br/>Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C. Proteger da luz.</p> |                                     |

**TIOPENTAL** <sup>1,2</sup>

Anestésico Geral

Nome comercial:  
Thiopentax 1g FA <sup>1,2</sup> \*

**POSOLOGIA**

**Adulto e Criança (> 12 anos de idade):**

|                                                  |                                                                                                      |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Indução lenta da anestesia                       | 50 a 75mg, em intervalos de 20 a 40 segundos. Se necessário, utilizar doses adicionais de 25 a 50mg. |
| Convulsões após administração da anestesia local | 125 a 150mg, ao longo de 10 minutos                                                                  |
| Estado epilético tônico-clônico generalizado     | 3 a 5 mg/kg seguida em 30 minutos por IV contínua de 1 a 3 mg/kh/hora                                |

▶ **Ajuste de dose:**

Insuficiência renal:

| Dose com Função Renal Normal | Dose com Insuficiência Renal<br>clearance de creatinina (mL/min) |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 3-5 mg/Kg                    | < 10                                                             |
|                              | 75% da dose                                                      |

▶ **ADMINISTRAÇÃO**

Intravenosa

Reconstituir 500mg em 20mL de SF ou 1000mg em 40mL de SF.

Intravenosa direta: não necessita de diluição.

▶ **ARMAZENAMENTO**

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

Após reconstituição, possui estabilidade de 24 horas em refrigeração entre 2°C e 8°C.

▶ **Atenção:**

Receita Azul.

\* Este medicamento é livre de látex.

**TIOTRÓPIO BROMETO** <sup>1,2</sup>

Broncodilatador

Nome comercial:

Spiriva Respimat 2,5mcg/dose Fr 4mL <sup>1,2</sup>**POSOLOGIA****Adulto:**

|                                    |                                   |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica | 2 doses seguidas, a cada 24 horas |
| Asma                               | 2 doses seguidas, a cada 24 horas |

**Criança (> 6 anos de idade):**

|      |                                   |
|------|-----------------------------------|
| Asma | 2 doses seguidas, a cada 24 horas |
|------|-----------------------------------|

▶ **Ajuste de dose:**

Não é necessário ajuste de dose.

▶ **ADMINISTRAÇÃO**

Via inalatória

▶ **ARMAZENAMENTO**

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C. Não congelar.

**TIROFIBANA** <sup>1</sup>

Antiagregante Plaquetário

Nome comercial:

Agrastat 0,25mg/mL FA 50mL <sup>1\*</sup>**POSOLOGIA****Adulto:**

Conforme esquema posológico.

▶ **Ajuste de dose:**

Insuficiência renal:

| Dose com Função Renal Normal | Dose com Insuficiência Renal<br>clearance de creatinina (mL/min) |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 0,4 mcg/Kg/min               | < 30                                                             |
|                              | 50% da dose                                                      |

► **ADMINISTRAÇÃO**  
Intravenosa  
Até 12,5mg em 250mL de SF/SG 5%.

► **ARMAZENAMENTO**  
Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.  
Após diluição, possui estabilidade de 24 horas em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

► **Atenção:**  
Alto Custo.  
\* Este medicamento é livre de látex.

**TIROTROFINA <sup>1</sup>**

Agente Diagnóstico

Nome comercial:  
Thyrogen 1,08mg (0,9mg/mL) FA 1,2mL <sup>1</sup>

**POSOLOGIA**

|                |                                               |
|----------------|-----------------------------------------------|
| <b>Adulto:</b> |                                               |
| Dose padrão    | 0,9mg (2 doses) IM, em intervalos de 24 horas |

► **Ajuste de dose:**  
Não é necessário ajuste de dose.

► **ADMINISTRAÇÃO**  
Intramuscular  
Reconstituir em 1,2mL de água estéril.

► **ARMAZENAMENTO**  
Conservar em refrigeração entre 2°C e 8°C. Proteger da luz.  
Após reconstituição, possui estabilidade de 24 horas em refrigeração entre 2°C e 8°C.

**TIZANIDINA <sup>1</sup>**

Relaxante Muscular

Nome comercial:  
Sirdalud 2mg Cp <sup>1</sup>

**POSOLOGIA**

|                                                     |                                |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Adulto:</b>                                      |                                |
| Alívio dos espasmos musculares dolorosos            | 2 a 4mg, a cada 8 horas        |
| Espasticidade decorrente de distúrbios neurológicos | 12 e 24mg, a cada 8 ou 6 horas |

► **Ajuste de dose:**  
Insuficiência renal grave: Iniciar com 2mg, a cada 24 horas. Aumentar gradativamente monitorando.  
Insuficiência hepática grave: O uso é contraindicado.

► **ADMINISTRAÇÃO**  
Oral

► **Administração via sonda:**

Pode ser administrado via sonda. Triturar e diluir em 15mL de água, administrando imediatamente.

► **ARMAZENAMENTO**

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

## TOBRAMICINA <sup>1</sup>

Antimicrobiano Aminoglicosídeo

Nome comercial:

Tobramina 75mg Amp 1,5mL <sup>1</sup>

### POSOLOGIA

**Adulto:**

|                             |                                  |
|-----------------------------|----------------------------------|
| Infecção grave              | 1 mg/kg, a cada 8 horas IV/IM    |
| Infecção com risco de morte | 1,66 mg/kg, a cada 8 horas IV/IM |

**Criança:**

|                                     |                                                                        |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Recém-nascidos até 1 semana de vida | Até 2 mg/kg, a cada 24 ou 12 horas IV/IM                               |
| Crianças acima de 1 semana de vida  | 2 a 2,5 mg/kg, a cada 8 horas ou 1,5 a 1,9 mg/kg, a cada 6 horas IV/IM |

► **Ajuste de dose:**

Insuficiência renal:

| Dose com Função Renal Normal | Dose Insuficiência Renal<br>clearance de creatinina (mL/min) |                       |             |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|
|                              | >50-90                                                       | 10-50                 | <10         |
| 1,7 mg/Kg 8/8h               | 100% 8/8h                                                    | 100% 12/12h ou 24/24h | 100% 48/48h |

► **ADMINISTRAÇÃO**

Intravenosa e Intramuscular

Infusão intermitente: 75mg em 100mL de SF/SG 5%.

► **ARMAZENAMENTO**

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

Após diluição, possui estabilidade de 24 horas em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

► **Atenção:**

Receita Branca (2 vias).

## TOBRAMICINA <sup>1,2</sup>

Antimicrobiano Oftálmico

Nome comercial:

Tobramicina 0.3% Solução Oftálmica (Biosintética) <sup>1,2</sup>

Tobramicina 0.3% Solução Oftálmica (Cristália) <sup>1,2</sup>

Tobrex 0,3% Colírio Fr 5mL <sup>1,2</sup>

### POSOLOGIA

**Adulto e Criança:**



|             |                                                                                            |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dose padrão | 1 a 2 gotas. A frequência deve ser gradativamente diminuída até a suspensão do tratamento. |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|

- ▶ **Ajuste de dose:**  
Não é necessário ajuste de dose.
- ▶ **ADMINISTRAÇÃO**  
Oftálmico
- ▶ **ARMAZENAMENTO**  
Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.
- ▶ **Atenção:**  
Receita Branca (2 vias).

**TOBRAMICINA + DEXAMETASONA <sup>1</sup>**      Antimicrobiano Oftálmico e Corticóide

Nome comercial:  
Tobradex Colírio Fr 5mL <sup>1</sup>  
Tobracin - D Colírio Fr 5mL <sup>1</sup>  
Tobramicina Colírio Fr 5mL (Biosintética) <sup>1</sup>

**POSOLOGIA**  
**Adulto e Criança (> 2 anos de idade):**

|             |                                                                                                                       |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dose padrão | 1 a 2 gotas, a cada 6 ou 4 horas. Pode ser aumentado durante 24 a 48 horas iniciais para 1 a 2 gotas, a cada 2 horas. |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

- ▶ **Ajuste de dose:**  
Não é necessário ajuste de dose.
- ▶ **ADMINISTRAÇÃO**  
Oftálmico
- ▶ **ARMAZENAMENTO**  
Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.
- ▶ **Atenção:**  
Receita Branca (2 vias).

**TOCILIZUMABE <sup>1</sup>**      Antirreumático

Nome comercial:  
Actemra 20mg/mL FA 4mL <sup>1</sup>  
Actemra 20mg/mL FA 10mL <sup>1</sup>

**POSOLOGIA**  
**Adulto:**  
Conforme esquema posológico.

- ▶ **Ajuste de dose:**  
Não é necessário ajuste de dose.
- ▶ **ADMINISTRAÇÃO**  
Intravenosa e Subcutânea  
Infusão intermitente: Até 200mg em 100mL de SF.
- ▶ **ARMAZENAMENTO**  
Conservar em refrigeração entre 2°C e 8°C. Não congelar.  
Após diluição, possui estabilidade de 24 horas em temperatura ambiente até 30°C.

**TOPIRAMATO** <sup>1,2</sup>

Anticonvulsivante

Nome comercial:

Amato 25mg Cp Rev <sup>1,2</sup>Égide 100mg Cp Rev <sup>1</sup>Topamax 25mg Cp Rev <sup>1,2</sup>Topamax 100mg Cp Rev <sup>1</sup>Topiramato 25mg Cp Rev (Biosintética) <sup>1,2</sup>Topiramato 25mg Cp Rev (Eurofarma) <sup>1,2</sup>Topiramato 100mg Cp (Biosintética) <sup>1</sup>Vidmax 25mg Cp Rev <sup>1</sup>**POSOLOGIA****Adulto:**

Tratamento adjuvante em epilepsia

25 a 50mg, à noite, durante 1 semana. A intervalos de 1 a 2 semanas, a dose pode ser aumentada de 25 a 50mg, a cada 12 horas

**Criança (> 2 anos de idade):**

Dose total diária

5 a 9 mg/kg/dia, dividida em duas tomadas

▶ **Ajuste de dose:**

Insuficiência renal:

| Dose com Função Renal Normal | Dose com Insuficiência Renal<br>clearance de creatinina (mL/min) |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 25-50mg                      | < 70                                                             |
|                              | 50% da dose (titular lentamente)                                 |

Insuficiência hepática: Pode ser necessário ajuste de dose, monitorar.

▶ **ADMINISTRAÇÃO**

Oral

▶ **Administração com alimentos:**

Evitar o consumo de álcool e primulas.

▶ **Administração via sonda:**

Pode ser administrado via sonda. Triturar e diluir em 15mL de água, administrando imediatamente.

▶ **ARMAZENAMENTO**

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

▶ **Atenção:**

Receita Branca (2 vias).

**TOXINA BOTULÍNICA TIPO A** <sup>1,2</sup>

Relaxante Muscular

Nome comercial:

Botox 100UI FA <sup>1,2</sup> \*Dysport 500UI FA <sup>1</sup>**POSOLOGIA****Adulto:**

A critério médico.

- ▶ **ARMAZENAMENTO**  
Conservar em refrigeração entre 2°C e 8°C.
- ▶ **Atenção:**  
Receita Branca (2 vias).  
Alto Custo.  
\* Esta apresentação é livre de látex.

TRAMADOL<sup>1,2</sup>

Analgésico Narcótico

Nome comercial:  
Tramal 50mg Cap<sup>1,2</sup>  
Tramadol 50mg Cap (Germed)<sup>1,2</sup>  
Tramadol Cloridrato 50mg Cap (Medley)<sup>1,2</sup>  
Tramadon/ Tramadol Cloridrato 50mg Cap (Cristália)<sup>1,2</sup>

**POSOLOGIA**  
**Adulto e Criança (> 12 anos de idade):**

|                                                                                                                                                   |                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Dose padrão                                                                                                                                       | 50 a 100mg, a cada 6 ou 4 horas                                  |
| ▶ <b>Ajuste de dose:</b><br>Insuficiência renal:                                                                                                  |                                                                  |
| Dose com Função Renal Normal                                                                                                                      | Dose com Insuficiência Renal<br>clearance de creatinina (mL/min) |
| 50-100 mg 8/8h ou 12/12h                                                                                                                          | < 30                                                             |
|                                                                                                                                                   | 50-100 mg 12/12h<br>Máx 200 mg 24/24h                            |
| Insuficiência hepática:<br>Cirrose: 50mg, a cada 12 horas.                                                                                        |                                                                  |
| ▶ <b>ADMINISTRAÇÃO</b><br>Oral<br>Administrar com ou sem alimento.                                                                                |                                                                  |
| ▶ <b>Administração com alimentos:</b><br>Evitar o consumo de álcool e Erva-de-São-João.                                                           |                                                                  |
| ▶ <b>Administração via sonda:</b><br>Pode ser administrado via sonda. Abrir a cápsula e diluir em 15mL de água, adminis-<br>trando imediatamente. |                                                                  |
| ▶ <b>ARMAZENAMENTO</b><br>Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.                                                                    |                                                                  |
| ▶ <b>Atenção:</b><br>Receita Branca (2 vias).                                                                                                     |                                                                  |

TRAMADOL<sup>1,2</sup>

Analgésico Narcótico

Nome comercial:  
Tramadol Cloridrato 100mg Amp 2mL (União Química)<sup>1,2</sup>  
Tramadon 100mg Amp 2mL<sup>1,2</sup>  
Tramal 100mg Amp 2mL<sup>1,2</sup>

**POSOLOGIA**  
**Adulto e Criança (> 12 anos de idade):**

|             |                                       |
|-------------|---------------------------------------|
| Dose padrão | 50 a 100mg IV/IM, a cada 6 ou 4 horas |
|-------------|---------------------------------------|

**Criança (> 1 ano de idade):**

|             |                                    |
|-------------|------------------------------------|
| Dose padrão | 1 a 2 mg/kg IV/IM, a cada 24 horas |
|-------------|------------------------------------|

▶ **Ajuste de dose:**

Insuficiência renal:

| Dose com Função Renal Normal | Dose com Insuficiência Renal<br>clearance de creatinina (mL/min) |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|                              | < 30                                                             |
| 50-100 mg 8/8h ou 12/12h     | 50-100 mg 12/12h<br>Máx 200 mg 24/24h                            |

Insuficiência hepática:

Cirrose: 50mg, a cada 12 horas.

▶ **ADMINISTRAÇÃO**

Intravenosa e Intramuscular

Infusão intermitente: 400mg em 100mL de SF, de 30 a 60 minutos.

Infusão contínua: sim.

Intravenosa direta: sim.

▶ **ARMAZENAMENTO**

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C. Proteger da luz.

Após diluição, possui estabilidade de 24 horas em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

▶ **Atenção:**

Receita Branca (2 vias).

**TRAMADOL + PARACETAMOL <sup>1</sup>**

Analgésico Narcótico

Nome comercial:

Ultracet 37,5mg + 325mg Cp Rev <sup>1</sup>**POSOLOGIA****Adulto:**

|             |                                        |
|-------------|----------------------------------------|
| Dose padrão | 1 a 2 comprimidos, a cada 6 ou 4 horas |
| Dose máxima | 8 comprimidos, a cada 24 horas         |

▶ **Ajuste de dose:**

Insuficiência renal:

| Dose com Função Renal Normal | Dose com Insuficiência Renal<br>clearance de creatinina (mL/min) |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|                              | < 30                                                             |
| 1-2Cp - 4/4h ou 6/6h         | 1-2 Cp 12/12h                                                    |

▶ **ADMINISTRAÇÃO**

Oral

Administrar independentemente das refeições.

- ▶ **Administração com alimentos:**  
Evitar o consumo de álcool.
- ▶ **Administração via sonda:**  
Pode ser administrado via sonda. Triturar e diluir em 20mL de água, administrando imediatamente.
- ▶ **ARMAZENAMENTO**  
Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.
- ▶ **Atenção:**  
Receita Branca (2 vias).

**TRASTUZUMABE <sup>1</sup>** Antineoplásico Anticorpo Monoclonal

Nome comercial:  
Herceptin 440mg FA <sup>1</sup>

**POSOLOGIA**

**Adulto:**  
Conforme esquema quimioterápico.

- ▶ **ADMINISTRAÇÃO**  
Preparo na quimioterapia.
- ▶ **ARMAZENAMENTO**  
Conservar em refrigeração entre 2°C e 8°C. Não congelar.  
Após preparo, possui estabilidade de 48 horas em refrigeração entre 2°C e 8°C e por mais de 6 horas em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C (não ultrapassar 30°C).

**TRAZODONA <sup>1,2</sup>** Antidepressivo

Nome comercial:  
Donaren 50mg Cp Rev <sup>1,2</sup>

**POSOLOGIA**

**Adulto:**

|             |                                                                                                                       |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dose padrão | 50 a 150 mg/dia, dividida a cada 12 horas. A dose pode ser aumentada em 50 mg/dia, a cada 3 ou 4 dias, se necessário. |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Idoso:**

|             |                                                                        |
|-------------|------------------------------------------------------------------------|
| Dose padrão | 75 mg/dia, com aumento gradativo da dose em intervalos de 3 ou 4 dias. |
|-------------|------------------------------------------------------------------------|

- ▶ **Ajuste de dose:**  
Não é necessário ajuste de dose.
- ▶ **ADMINISTRAÇÃO**  
Oral
- ▶ **Administração com alimentos:**  
Evitar o consumo de álcool e Erva-de-São-João.
- ▶ **ARMAZENAMENTO**  
Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.
- ▶ **Atenção:**  
Receita Branca (2 vias).  
Alto Custo.

**TRETINOÍNA** <sup>1,2</sup>

Antineoplásico Oral

Nome comercial:

Vesanoid 10mg Cap Gelatinosa <sup>1,2</sup>**POSOLOGIA****Adulto:**

Conforme esquema quimioterápico.

▶ **ADMINISTRAÇÃO**

Oral

▶ **Administração com alimentos:**

Evitar o consumo de álcool e Erva-de-São-João.

▶ **ARMAZENAMENTO**

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

▶ **Atenção:**

Receita Branca (2 vias).

**TRIANCINOLONA** <sup>1,2</sup>

Anti-inflamatório Esteroidal Sistêmico

Nome comercial:

Triancil 20mg/mL FA 5mL <sup>1,2</sup> \***POSOLOGIA****Adulto:**

Dose padrão

2 a 20mg, a cada 24 horas

▶ **Ajuste de dose:**

Não é necessário ajuste de dose.

▶ **ADMINISTRAÇÃO**

Intra-articular

100mg em 1mL de SF/água bidestilada.

▶ **ARMAZENAMENTO**

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

▶ **Atenção:**

\* Este medicamento é livre de látex.

**TRIANCINOLONA ACETONIDA** <sup>1,2</sup>

Anti-inflamatório Esteroidal Tópico

Nome comercial:

Omcilon Orabase Creme Bis 10g <sup>1,2</sup>Triancinolona Orabase 1mg Bis 10g (Eurofarma) <sup>1,2</sup>Triancinolona Orabase 1mg Bis 10g (Germed) <sup>1,2</sup>Triancinolona Orabase 1mg Bis 10g (Medley) <sup>1,2</sup>**POSOLOGIA****Adulto e Criança:**

Dose padrão

Aplicar uma pequena quantidade, sem esfregar, sobre a área afetada, até que se desenvolva uma película fina.

▶ **Ajuste de dose:**

Não é necessário ajuste de dose.

- ▶ **ADMINISTRAÇÃO**  
Tópico  
Aplicar preferencialmente à noite.
- ▶ **Administração com alimentos:**  
Evitar o consumo de álcool, unha de gato e equináceas.
- ▶ **ARMAZENAMENTO**  
Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

**TRIMETAZIDINA <sup>1,2</sup>**
Antianginoso

Nome comercial:  
Vastarel MR 35mg Cp Rev de Liberação Prolongada <sup>1,2</sup>

**POSOLOGIA**

**Adulto:**

|             |                        |
|-------------|------------------------|
| Dose padrão | 35mg, a cada 12 horas. |
|-------------|------------------------|

- ▶ **Ajuste de dose:**  
Não é necessário ajuste de dose.
- ▶ **ADMINISTRAÇÃO**  
Oral  
Ingerir junto com as refeições.
- ▶ **ARMAZENAMENTO**  
Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

**TROMETAMOL CETOROLACO <sup>1,2</sup>**
Anti-inflamatório não Esteroidal Sistêmico

Nome comercial:  
Toradol 30mg Amp 1mL <sup>1,2</sup>  
Toragesic 30mg Amp 1mL <sup>1,2</sup>  
Cetorolaco Trometamol 30mg Amp 1mL Manip <sup>1,2</sup>  
Cetrolac 30mg Amp 1mL <sup>1,2</sup>

**POSOLOGIA**

**Adulto:**

|                 |                                                                            |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Dose única      | 10 a 60mg IM ou 10 a 30mg IV, a cada 24 horas                              |
| Doses múltiplas | 10 a 30mg IM, a cada 6 ou 4 horas ou 10 a 30mg IV (bolus), a cada 6 horas. |
| Dose máxima     | 90mg, a cada 24 horas                                                      |

**Idoso (> ou iguais a 65 anos de idade):**

|             |                              |
|-------------|------------------------------|
| Dose padrão | 10 a 30mg IM ou 10 a 15mg IV |
|-------------|------------------------------|

**Criança (16 anos ou mais):**

|             |                                |
|-------------|--------------------------------|
| Dose padrão | 1 mg/kg IM ou 0,5 a 1 mg/kg IV |
|-------------|--------------------------------|

- ▶ **Ajuste de dose:**  
Insuficiência hepática: Pode ser necessário ajuste de dose, monitorar.

► **ADMINISTRAÇÃO**

Intravenosa e Intramuscular

Intravenosa direta: sim, por 30 segundos.

Infusão intermitente: até 30mg em 50mL SF/SG 5%.  
até 60mg em 100mL SF/SG 5%.  
até 90mg em 250mL SF/SG 5%.

► **ARMAZENAMENTO**

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

## TROMETAMOL CETOROLACO <sup>1,2</sup>

Anti-inflamatório não Esteroidal Sistêmico

Nome comercial:

Toragesic 10mg Cp Sublingual <sup>1,2</sup>

### POSOLOGIA

**Adulto:**

|             |                                                       |
|-------------|-------------------------------------------------------|
| Dose padrão | 10 a 20mg, em dose única ou 10mg, a cada 8 ou 6 horas |
| Dose máxima | 60mg, a cada 24 horas                                 |

**Idoso (> 65 anos de idade, com menos de 50kg ou pacientes com Insuficiência Renal):**

|             |                                                       |
|-------------|-------------------------------------------------------|
| Dose padrão | 10 a 20mg, em dose única ou 10mg, a cada 8 ou 6 horas |
| Dose máxima | 40mg, a cada 24 horas                                 |

► **Ajuste de dose:**

Insuficiência renal: Pacientes com nível sérico de creatinina moderadamente elevado, deve usar metade da dose usual (5 a 30mg), não ultrapassando 60 mg/dia.

► **ADMINISTRAÇÃO**

Sublingual

Administrar preferencialmente com alimento.

► **Administração via sonda:**

Pode ser administrado via sonda. Dissolver em 10mL de água e administrar imediatamente.

► **ARMAZENAMENTO**

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

## TROPICAMIDA <sup>1,2</sup>

Midriático

Nome comercial:

Mydriacyl 1% Sol Oft Fr 5mL <sup>1,2</sup>

### POSOLOGIA

**Adulto e Criança:**

|             |                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dose padrão | Instilar 1 a 2 gotas e, após 5 minutos, instilar mais 1 a 2 gotas.<br>Se o paciente não for atendido nos 20 a 30 min após a 1ª instilação, instilar uma gota adicional, a fim de prolongar os efeitos ciclopégicos e midríaticos. |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

► **Ajuste de dose:**

Não é necessário ajuste de dose.



- ▶ **ADMINISTRAÇÃO**  
Oftálmico
- ▶ **ARMAZENAMENTO**  
Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

**UNDECILATO DE TESTOSTERONA <sup>1</sup>**

Hormônio Androgênico

Nome comercial:

Nebido 1g (250mg/ml) Amp 4ml <sup>1</sup>**POSOLOGIA****Adultos:**

Dose padrão:

1 g, a cada 10 a 14 semanas

1 g, a cada 10 a 14 semanas

▶ **Ajuste de dose:**

Não há ajuste especificado.

▶ **ADMINISTRAÇÃO**

Intramuscular

Injeção direta, sem diluição, muito lentamente.

▶ **ARMAZENAMENTO:**

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

Após aberto: utilizar imediatamente.

A  
B  
C  
D  
E  
F  
G  
H  
I  
J  
K  
L  
M  
N  
O  
P  
Q  
R  
S  
T  
U  
V  
W  
X  
Y  
Z

U

**VACINA CONTRA HEPATITE B <sup>1</sup>**

Vacina

Nome comercial:

Vacina Engerix B Amp 1ml <sup>1</sup>Euvax B Amp 1mL <sup>1</sup>**POSOLOGIA****Adulto (> 16 anos de idade):**

Dose padrão

20mcg. Após um mês da 1ª dose, aplicar 20mcg novamente e após 6 meses da primeira dose, aplicar 20 mcg.

**Recém-nascidos, lactentes e crianças até 15 anos de idade:**

Dose padrão

10mcg. Após um mês da 1ª dose, aplicar 10mcg novamente e após 6 meses da primeira dose, aplicar 10 mcg.

▶ **Ajuste de dose:**

Não é necessário ajuste de dose.

▶ **ADMINISTRAÇÃO**

Intramuscular.

▶ **ARMAZENAMENTO**

Conservar em refrigeração entre 2°C e 8°C. Não congelar.

**VACINA ANTIPNEUMOCOCO <sup>1</sup>**

Vacina

Nome comercial:

Pneumo 23 Fr 0,5mL <sup>1</sup>Pneumovax Fr 0,5ml <sup>1</sup>Pneumocócica 23 Fr 0,5ml <sup>1</sup>**POSOLOGIA****Adulto e Criança (> 2 anos de idade):**

Dose padrão

0,5mL, dose única

▶ **Ajuste de dose:**

Não é necessário ajuste de dose.

▶ **ADMINISTRAÇÃO**

Intramuscular e Subcutânea.

▶ **ARMAZENAMENTO**

Conservar em refrigeração entre 2°C e 8°C. Não congelar.

**VACINA ANTITÉTANO <sup>1</sup>**

Vacina Antitetânica

Nome comercial:

Vacina Dupla Adulto (Antitetânica + Diftéria) 10 Doses Fr 0,5mL <sup>1</sup>**POSOLOGIA****Adulto e Criança:**

Dose primária

2 injeções, com intervalo de 4 a 6 semanas

Dose reforço

1 injeção, um ano após a última injeção da série primária e depois, a cada 10 anos.

- ▶ **Ajuste de dose:**  
Não é necessário ajuste de dose.
- ▶ **ADMINISTRAÇÃO**  
Intramuscular.
- ▶ **ARMAZENAMENTO**  
Conservar em refrigeração entre 2°C e 8°C. Não congelar.

VALACICLOVIR <sup>1,2</sup>

Antiviral

Nome comercial:  
Valtrex 500mg Cp <sup>1,2</sup>

**POSOLOGIA**

**Adulto e Criança:**

|                                                               |                                                              |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Herpes-zoster, incluindo zoster oftálmica                     | 1000mg, a cada 8 horas durante 7 dias                        |
| Herpes simples                                                | 500mg, a cada 12 anos                                        |
| Prevenção da recorrência de infecção por herpes simples       | 500mg, a cada 24 horas                                       |
| Profilaxia da infecção ou da doença por citomegalovírus (CMV) | 2g, a cada 6 horas. Iniciar o mais breve após o transplante. |

- ▶ **Ajuste de dose:**  
Insuficiência renal:

| Dose com Função Renal Normal | Dose Insuficiência Renal<br>clearance de creatinina (mL/min) |                      |             |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|
|                              | >30-49                                                       | 10-29                | <10         |
| 1g 8/8h                      | 1g 12/12h- 2doses                                            | 0,5g 12/12h- 2 doses | 0,5g 24/24h |

- ▶ **ADMINISTRAÇÃO**  
Oral  
Administrar com ou sem alimento.
- ▶ **Administração via sonda:**  
Pode ser administrado via sonda. Triturar e diluir em 20mL de água, administrando imediatamente.
- ▶ **ARMAZENAMENTO**  
Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C

VALPROATO DE SÓDIO <sup>1</sup>

Anticonvulsivante

Nome comercial:  
Depacon 500mg Amp 5ml <sup>1</sup>

**POSOLOGIA**

**Adulto (> 10 anos de idade):**

|             |                                                                                              |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dose padrão | 5 a 15 mg/kg, a cada 24 horas. Pode ser aumentada semanalmente 5 a 10 mg/kg, a cada 24 horas |
| Dose máxima | 60 mg/kg, a cada 24 horas                                                                    |

- ▶ **Ajuste de dose:**  
Não é necessário ajuste de dose.
- ▶ **ADMINISTRAÇÃO**  
Intravenosa
- ▶ **ARMAZENAMENTO**  
Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.
- ▶ **Atenção:**  
Receita Branca (2 vias).

**VALPROATO DE SÓDIO** <sup>1,2</sup>

Anticonvulsivante

Nome comercial:

Depakene 250mg Cap <sup>1</sup>Epinelil 250mg Cap <sup>1</sup>Depakote Er 250mg Cp Rev Liberação Lenta <sup>1</sup>Depakote Er 500mg Cp Rev Liberação Lenta <sup>1</sup>Depakote 250mg Cp Rev <sup>1</sup>Depakote 500mg Cp Rev <sup>1</sup>Depakene 50mg/mL Xarope Fr 100mL <sup>1,2</sup>Valproato de Sódio Xarope Fr 10mL (Hipolabor) <sup>1</sup>Valproato de Sódio Xarope Fr 10mL (Prati Donaduzzi) <sup>1</sup>Valproato de Sódio Xarope Fr 10mL (Teuto) <sup>1</sup>**POSOLOGIA****Adulto e Criança (> 10 anos de idade):**

|                                                          |                                                                   |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Convulsões parciais complexas (CPC) Monoterapia          | - Dose padrão: 10 a 15 mg/kg/dia.<br>- Dose máxima: 60 mg/kg/dia. |
| Convulsões parciais complexas (CPC) Tratamento adjuvante | - Dose padrão: 10 a 15 mg/kg/dia.<br>- Dose máxima: 60 mg/kg/dia  |
| Convulsões do tipo ausência simples e complexa           | - Dose padrão: 15 mg/kg/dia<br>- Dose máxima: 60 mg/kg/dia        |

- ▶ **Ajuste de dose:**  
Não é necessário ajuste de dose.
- ▶ **ADMINISTRAÇÃO**  
Oral
- ▶ **Administração via sonda:**  
Depakene xarope: Dilui em 50mL de água e administrar imediatamente.
- ▶ **ARMAZENAMENTO**  
Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C. Proteger da luz e umidade.

**VALSARTANA** <sup>1,2</sup>

Agente Anti-hipertensivo

Nome comercial:

Diovan 80mg Cp Rev <sup>1,2</sup>Valsartana 80mg Cp Rev (Germed) <sup>1,2</sup>Brasart 80mg Cp Rev <sup>1,2</sup>**POSOLOGIA****Adulto:**

|             |                             |
|-------------|-----------------------------|
| Hipertensão | 80 a 160mg, a cada 24 horas |
|-------------|-----------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                 |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Insuficiência cardíaca                                                                                                                                                                                                                                               | Iniciar com 40mg, a cada 12 horas e aumentar para 80 a 160mg, uma vez ao dia, quando o paciente já estiver tolerado.            |                            |
| Pós-infarto do miocárdio                                                                                                                                                                                                                                             | Iniciar 12 horas após o infarto. Após uma dose inicial de 20mg, a cada 12 horas e aumentar para 40, 80 e 160mg, a cada 12 horas |                            |
| ▶ <b>Ajuste de dose:</b><br>Insuficiência renal:                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                            |
| Dose com Função Renal Normal                                                                                                                                                                                                                                         | Dose Insuficiência Renal<br>clearance de creatinina (mL/min)                                                                    |                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                      | <30 (em crianças)                                                                                                               | >10 (em adultos)           |
| 40-160mg 12/12h ou 24/24h                                                                                                                                                                                                                                            | Uso não recomendado                                                                                                             | Nenhum ajuste é necessário |
| Insuficiência hepática: Pode ser necessário ajuste de dose, monitorar.                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                 |                            |
| ▶ <b>ADMINISTRAÇÃO</b><br>Oral<br>Administrar, preferencialmente em jejum.                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                 |                            |
| ▶ <b>Administração com alimentos:</b><br>Evitar ingestão de alcaçuz, <i>Caulophyllum</i> , cola, efedra, gengibre, ginseng, murta, pimenta de caiena, bolsa de pastor, cimicífuga, cóleo, cratego, <i>Hydrastis</i> , papoula da Califórnia, quinino, vinca e visco. |                                                                                                                                 |                            |
| ▶ <b>Administração via sonda:</b><br>Pode ser administrado via sonda. Triturar e diluir em 15mL de água, administrando imediatamente.                                                                                                                                |                                                                                                                                 |                            |
| ▶ <b>ARMAZENAMENTO</b><br>Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                 |                            |

**VALSARTANA + SACUBITRIL <sup>1</sup>**

Agente Anti-hipertensivo

Nome comercial:  
Entresto 24mg/26mg Cp Rev <sup>1</sup>

**POSOLOGIA**  
**Adulto:**

|                                                                            |                                                              |                            |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Dose padrão                                                                | 97/103 mg, a cada 12 horas                                   |                            |
| <b>► Ajuste de dose:</b><br>Insuficiência renal:                           |                                                              |                            |
| Dose com Função Renal Normal                                               | Dose Insuficiência Renal<br>clearance de creatinina (mL/min) |                            |
|                                                                            | <30 (em crianças)                                            | >10 (em adultos)           |
| 40-160mg 12/12h ou 24/24h                                                  | Uso não recomendado                                          | Nenhum ajuste é necessário |
| <b>► ADMINISTRAÇÃO</b><br>Oral<br>Administrar, preferencialmente em jejum. |                                                              |                            |

► **Administração com alimentos:**

Evitar ingestão de alcaçuz, *Caulophyllum*, cola, efedra, gengibre, ginseng, murta, pimenta de caiena, bolsa de pastor, cimicífuga, cóleo, cratego, *Hydrastis*, papoula da Califórnia, quinino, vinca e visco.

► **ARMAZENAMENTO**

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

## VANCOMICINA <sup>1,2</sup>

Antimicrobiano Glicopeptídeo

Nome comercial:

Vancomicina 500mg FA (Abl) <sup>1,2</sup> \*

Vancomicina Cloridrato 500mg FA (Eurofarma) <sup>1,2</sup>

Vancocina 500mg FA <sup>1,2</sup>

### POSOLOGIA

**Adulto:**

|             |                                              |
|-------------|----------------------------------------------|
| Dose padrão | 500mg, a cada 6 horas ou 1g, a cada 12 horas |
| Dose máxima | 3g ao dia                                    |

► **Ajuste de dose:**

Insuficiência renal:

| Dose com Função Renal Normal | Dose Insuficiência Renal<br>clearance de creatinina (mL/min) |                              |                       |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|
|                              | >50-90                                                       | 10-50                        | <10                   |
| 1g 12/12h                    | 15-30 mg/gg<br>12/12h                                        | 15 mg/kg<br>24/24h ou 96/96h | 7,5 mg/kg<br>2-3 dias |

► **ADMINISTRAÇÃO**

Intravenosa

Reconstituir em 10mL de água destilada.

Infusão intermitente: até 500mg em 100mL de SF/SG5%, 60 min - máx. de 10mg/min.  
até 1000mg em 250mL de SF/SG 5%.

Infusão contínua: até 2000mg em 500mL de SF/SG 5%.

► **ARMAZENAMENTO**

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

► **Atenção:**

Receita Branca (2 vias).

\* Esta apresentação é livre de látex.

## VANCOMICINA <sup>1,2</sup>

Antimicrobiano Glicopeptídeo

Nome comercial:

Vancomicina 125mg Cap Manip <sup>1,2</sup>

### POSOLOGIA

**Adulto:**

|        |                             |
|--------|-----------------------------|
| Colite | 100 a 500mg, a cada 6 horas |
|--------|-----------------------------|



**Criança (> 1 mês):**

|        |                                  |
|--------|----------------------------------|
| Colite | 40 mg/kg/dia, em doses divididas |
|--------|----------------------------------|

- **Ajuste de dose:**  
Insuficiência renal:

| Dose com Função Renal Normal | Dose Insuficiência Renal<br>clearance de creatinina (mL/min) |                              |                       |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|
|                              | >50-90                                                       | 10-50                        | <10                   |
| 1g 12/12h                    | 15-30 mg/gg<br>12/12h                                        | 15 mg/kg<br>24/24h ou 96/96h | 7,5 mg/kg<br>2-3 dias |

- **ADMINISTRAÇÃO**  
Oral
- **ARMAZENAMENTO**  
Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.
- **Atenção:**  
Receita Branca (2 vias).

**VARENICLINA TARTARATO <sup>1</sup>**

Antitabagismo

Nome comercial:  
Champix Kit Tratamento Cp Rev 0,5mg + 1mg <sup>1</sup>

**POSOLOGIA**

**Adulto:**

|             |                                                  |
|-------------|--------------------------------------------------|
| Dose padrão | 1º ao 3º dia: 0,5mg, a cada 24 horas             |
|             | 4º ao 7º dia: 0,5mg, a cada 12 horas             |
|             | 9º até final do tratamento: 1mg, a cada 12 horas |

- **Ajuste de dose:**  
Insuficiência renal grave: 1mg, a cada 24 horas.
- **ADMINISTRAÇÃO**  
Oral
- **ARMAZENAMENTO**  
Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C. Proteger da luz e umidade.

**VARFARINA <sup>1,2</sup>**

Anticoagulante

Nome comercial:  
Marevan 2,5mg Cp <sup>1</sup>  
Marevan 5mg Cp <sup>1,2</sup>

**POSOLOGIA**

**Adulto:**

|                 |                              |
|-----------------|------------------------------|
| Dose inicial    | 2,5 a 5mg, a cada 24 horas   |
| Dose manutenção | 2,5 a 10mg, a cada 24 horas. |

► **Ajuste de dose:**

Insuficiência hepática:

- Dose padrão: 0,1 mg/kg/dose, a cada 24 horas durante 2 dias.
- Dose de manutenção: 0,1 mg/kg, a cada 24 horas, ajustar para o INR desejado.
- Dose máxima: 10 mg/dose.

► **ADMINISTRAÇÃO**

Oral

Administrar com ou sem alimento.

► **Administração com alimentos:**

Evitar o consumo de álcool e alimentos ricos em vitamina K.

► **Administração via sonda:**

Pode ser administrado via sonda. Triturar e diluir em 15mL de água, administrando imediatamente.

► **ARMAZENAMENTO**

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

## VASELINA <sup>1,2</sup>

Hidratante, Protetor Epidérmico

Nome comercial:

Vaselina Amp 10mL Manip <sup>1</sup>

Vaselina Amp 20mL Manip <sup>1</sup>

Vaselina Líquida Fr 100mL <sup>1,2</sup>

### POSOLOGIA

#### Adulto e Criança:

Dose padrão

Aplicar sobre a área afetada, a cada 12 a 24 horas

► **Ajuste de dose:**

Não é necessário ajuste de dose.

► **ADMINISTRAÇÃO**

Tópico

► **ARMAZENAMENTO**

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

## VASOPRESSINA <sup>1,2</sup>

Vasoconstritor e Hipertensor

Nome comercial:

Encrise 20U/mL Amp 1mL <sup>1,2</sup>

### POSOLOGIA

#### Adulto:

|                             |                                                                                                   |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Distensão abdominal         | 5 unidades IM/SC, podendo ser aumentada para 10 unidades, a cada 3 ou 4 horas.                    |
| Radiografia abdominal       | Duas injeções IM de 10 unidades cada                                                              |
| Diabetes <i>insipidus</i>   | 5 a 10 unidades IM/SC, a cada 12 ou 8 horas ou 0,001 a 0,003 U/kg/hora IV no controle dapoliúria. |
| Hemorragia gastrointestinal | 0,2U/minuto IV e ser aumentada a cada hora para 0,2 U/minuto até que a hemorragia seja controlada |
| Choque séptico              | 0,01 a 0,04 U/minuto IV por infusão contínua                                                      |

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Fibrilação ventricular ou taquicardia ventricular (Ressuscitação cardíaca)                                                                                                                                      | 40 unidades IV, uma única vez, seguida de bolus de 20mL de água destilada ou SF. |
| <div> <div>▶ <b>Ajuste de dose:</b></div> <div>Não é necessário ajuste de dose.</div> </div>                                                                                                                    |                                                                                  |
| <div> <div>▶ <b>ADMINISTRAÇÃO</b></div> <div>Intravenosa, Intramuscular e Subcutânea</div> <div>Intravenosa direta: 1mL em 10mL de SF/SG 5%.</div> <div>Infusão contínua: 1mL em 50mL de SF/SG 5%.</div> </div> |                                                                                  |
| <div> <div>▶ <b>ARMAZENAMENTO</b></div> <div>Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.</div> </div>                                                                                                  |                                                                                  |

**VENLAFAXINA <sup>1,2</sup>**
Antidepressivo

Nome comercial:

Efexor XR 37,5mg Cap de Lib. Controlada <sup>1</sup>

Efexor XR 75mg Cap de Lib. Controlada <sup>1,2</sup>

Efexor XR 150mg Cap de Lib. Controlada <sup>1</sup>

Venlafaxina 75mg Cap Lib. Prolongada (Medley) <sup>1</sup>

Venlafaxina 75mg Cp (Biosintética) <sup>1</sup>

Venlafaxina 75mg Cap Lib. Prolongada (EMS) <sup>1,2</sup>

Venlafaxina 75mg Cap Lib. Prolongada (Eurofarma) <sup>1,2</sup>

Venlafaxina 37,5mg Cap Lib Prolongada (Medley) <sup>1</sup>

Venlafaxina 37,5mg Cp (Medley) <sup>1</sup>

Venlafaxina 37,5mg Cp (Biosintética) <sup>1</sup>

Venlafaxina 37,5mg Cp (Ranbaxy) <sup>1</sup>

Venlaxin 75mg Cap Lib. Prolongada <sup>1,2</sup>

Venlift Od 75mg Cap Lib Prolongada <sup>1,2</sup>

Venlift Od 150mg Cap Lib. Prolongada <sup>1</sup>

**POSOLOGIA**

**Adulto:**

|                                      |                                                                                                 |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Depressão maior                      | 75mg, a cada 24 horas. Pode-se ter aumento de dose até, no máximo, 225 mg/dia.                  |
| Transtorno de Ansiedade Generalizada | 75mg, a cada 24 horas. Pode-se ter aumento de dose até, no máximo, 225 mg/dia.                  |
| Fobia Social                         | 75mg, a cada 24 horas                                                                           |
| Transtorno do Pânico                 | 37,5mg/dia ajustada por 7 dias. Aumentar para 75mg, a cada 24 horas até, no máximo, 225 mg/dia. |

- ▶ **Ajuste de dose:**

Insuficiência renal:

| Dose com Função Renal Normal | Dose com Insuficiência Renal<br>clearance de creatinina (mL/min) |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 37,5-150mg 24/24h            | 10-70                                                            |
|                              | 75% da dose                                                      |

- ▶ **ADMINISTRAÇÃO**

Oral

Administrar, preferencialmente, com alimentos.

- ▶ **Administração com alimentos:**  
Evitar o consumo de álcool e Erva-de-São-João.
- ▶ **ARMAZENAMENTO**  
Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.
- ▶ **Atenção:**  
Receita Branca (2 vias).

**VERAPAMIL** <sup>1,2</sup>

Agente Anti-hipertensivo

Nome comercial:

Dilacoron 80mg Cp Rev <sup>1,2</sup>Verapamil Cloridrato 120mg Cp Lib Prolongada (Biosintética) <sup>1</sup>Verapamil 80mg Cp (Ache) <sup>1,2</sup>Verapamil 80mg Cp Rev (EMS) <sup>1,2</sup>Verapamil Cloridrato Cp Ação Prolongada (Sandoz) <sup>1</sup>**POSOLOGIA****Adulto e Adolescente (> 50kg):**

|                              |                                                                  |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Doença coronariana           | 40 a 120mg, a cada 24 horas                                      |
| Taquicardia supraventricular | 240 a 480mg, fracionados a cada 8 ou 6 horas                     |
| Hipertensão                  | 120 a 480mg ao dia, fracionados a cada 12 horas ou em dose única |

**Criança (> 5 anos de idade):**

|             |                           |
|-------------|---------------------------|
| Dose padrão | 80mg, a cada 8 ou 6 horas |
|-------------|---------------------------|

▶ **Ajuste de dose:**

Insuficiência renal:

| Dose com Função Renal Normal | Dose com Insuficiência Renal<br>clearance de creatinina (mL/min) |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 40-120mg 8/8h                | < 10                                                             |
|                              | 50-75% da dose                                                   |

▶ **ADMINISTRAÇÃO**

Oral

Administrar, preferencialmente, junto às refeições.

▶ **Administração com alimentos:**

Evitar o consumo de toranja (grapefruit) e alho.

▶ **Administração via sonda:**

Pode ser administrado via sonda. Triturar e diluir em 15mL de água, administrando imediatamente.

▶ **ARMAZENAMENTO**

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

▶ **Atenção:**

Risco de Queda.

**VERAPAMIL** <sup>1</sup>

Agente Anti-hipertensivo

Nome comercial:

Dilacoron Retard 120mg Cp Rev <sup>1</sup>

**POSOLOGIA**

**Adultos:**

Dose usual: 240 a 360mg, oral, a cada 24 horas.

Dose máxima: 480mg, oral, a cada 24 horas.

**Ajuste de Insuficiência Renal:**

| Dose com Função Renal Normal | Dose com Insuficiência Renal<br>clearance de creatinina (mL/min) |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 240-360mg 24/24h             | < 10                                                             |
|                              | 50-75% da dose                                                   |

► **ADMINISTRAÇÃO**

Administração com Alimentos:

Evitar ingestão de suco de grapefruit, efedra, ginseng, ioimbina, angélica chinesa e alho. Evitar ou limitar o consumo de álcool.

Administração via sonda:

Pode ser administrado via sonda. Triturar e dispersar em 15ml de água, após dissolução administrar imediatamente.

► **ARMAZENAMENTO:**

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C

► **Atenção:**

Risco de Queda

**VERDE BRILHANTE <sup>1</sup>**

Outros Medicamentos

Nome comercial:

Verde Brilhante 2% (20mg/mL) Amp 10mL Manip <sup>1</sup>

**POSOLOGIA**

A critério médico.

► **ARMAZENAMENTO**

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

**VILDAGLIPTINA <sup>1,2</sup>**

Hipoglicemiante

Nome comercial:

Galvus 50mg Cp <sup>1,2</sup>

**POSOLOGIA**

**Adulto:**

|             |                             |
|-------------|-----------------------------|
| Dose padrão | 50mg, a cada 24 ou 12 horas |
|-------------|-----------------------------|

► **Ajuste de dose:**

Não é necessário ajuste de dose.

► **ADMINISTRAÇÃO**

Oral

Administrar com ou sem alimento.

► **Administração via sonda:**

Pode ser administrado via sonda. Triturar e diluir em 15mL de água, administrando imediatamente.

► **ARMAZENAMENTO**

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

**VIMBLASTINA <sup>1</sup>**

Antineoplásico Citotóxico

Nome comercial:

Faulblastina 10mg FA 10mL <sup>1</sup> \*Velban 10mg FA 10mL <sup>1</sup>**POSOLOGIA****Adulto:**

A depender da indicação e esquema quimioterápico.

▶ **ADMINISTRAÇÃO**

Preparo na quimioterapia.

▶ **ARMAZENAMENTO**

Conservar em refrigeração entre 2°C e 8°C.

Utilizar imediatamente após diluição.

▶ **Atenção:**

\* Esta apresentação é livre de látex.

**VIMINOL <sup>1</sup>**

Analgésico e Antipirético

Nome comercial:

Dividol 70mg Cap <sup>1</sup>**POSOLOGIA****Adulto:**

|             |                 |
|-------------|-----------------|
| Dose padrão | 70 a 140 mg/dia |
| Dose máxima | 560 mg/dia      |

▶ **Ajuste de dose:**

Não é necessário ajuste de dose.

▶ **ADMINISTRAÇÃO**

Oral

Administrar com água.

▶ **Administração via sonda:**

Pode ser administrado via sonda. Triturar e diluir em 30mL de água, administrando imediatamente.

▶ **ARMAZENAMENTO**

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

**VINCRISTINA <sup>1</sup>**

Antineoplásico Citotóxico

Nome comercial:

Fauldvincr 1mg FA 1mL <sup>1</sup> \***POSOLOGIA****Adulto:**

A depender da indicação e esquema quimioterápico.

▶ **ADMINISTRAÇÃO**

Preparo na quimioterapia.

▶ **ARMAZENAMENTO**

Conservar em refrigeração entre 2°C e 8°C.

Utilizar imediatamente após diluição.

- ▶ **Atenção:**  
\* Este medicamento é livre de látex.

VINORELBINA DITARTARATO <sup>1</sup>

Antineoplásico Citotóxico

Nome comercial:  
Navelbine 10mg FA <sup>1</sup>  
Navelbine 50mg FA <sup>1</sup>  
Neocitec 10mg FA <sup>1</sup>

**POSOLOGIA**

**Adulto:**  
A depender da indicação e esquema quimioterápico.

- ▶ **ADMINISTRAÇÃO**  
Preparo na quimioterapia.
- ▶ **ARMAZENAMENTO**  
Conservar em refrigeração entre 2°C e 8°C. Não congelar.  
Utilizar imediatamente após diluição.
- ▶ **Atenção:**  
Alto Custo.

VITAMINA A + VITAMINA B12 +  
L-CARNITINA + L-LISINA <sup>1</sup>

Orexígeno

Nome comercial:  
Carnabol Cp <sup>1</sup>

**POSOLOGIA**

**Adulto:**

|             |                                                          |
|-------------|----------------------------------------------------------|
| Dose padrão | 1 comprimido, 30 minutos antes das principais refeições. |
|-------------|----------------------------------------------------------|

- ▶ **Ajuste de dose:**  
Não é necessário ajuste de dose.
- ▶ **ADMINISTRAÇÃO**  
Oral
- ▶ **ARMAZENAMENTO**  
Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C. Proteger da luz e umidade.

VITAMINA A + VITAMINA D <sup>1,2</sup>

Vitaminas e Suplementos Minerais

Nome comercial:  
Ad-til Gts Fr 20mL <sup>1,2</sup>

**POSOLOGIA**

**Adulto e Adolescente:**

|                                                                              |                              |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Prevenção das deficiências de vitaminas A e D                                | 2 gotas, a cada 24 horas     |
| Tratamento de raquitismo/osteomalácia secundária à deficiência dietética     | 2 a 4 gotas, a cada 24 horas |
| Tratamento de raquitismo/osteomalácia secundária ao uso de anticonvulsivante | 2 a 4 gotas, a cada 24 horas |

**Criança:**

|                                                                              |                          |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Prevenção das deficiências de vitaminas A e D                                | 2 gotas, a cada 24 horas |
| Tratamento de raquitismo/osteomalácia secundária à deficiência dietética     | 2 gotas, a cada 24 horas |
| Tratamento de raquitismo/osteomalácia secundária ao uso de anticonvulsivante | 2 gotas, a cada 24 horas |

▶ **Ajuste de dose:**

Não é necessário ajuste de dose.

▶ **ADMINISTRAÇÃO**

Oral

▶ **ARMAZENAMENTO**

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

**VITAMINA B1** <sup>1,2</sup>

Vitaminas e Suplementos Minerais

Nome comercial:

Benerva 300mg Cp <sup>1,2</sup>

**POSOLOGIA****Adulto:**

Dose padrão

1 a 2 comprimidos, a cada 24 horas

▶ **Ajuste de dose:**

Não é necessário ajuste de dose.

▶ **ADMINISTRAÇÃO**

Oral

▶ **Administração via sonda:**

Pode ser administrado via sonda. Triturar e diluir em 20mL de água, administrando imediatamente.

▶ **ARMAZENAMENTO**

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

**VITAMINA B1** <sup>1</sup>

Vitaminas e Suplementos Minerais

Nome comercial:

Tiamina 100mg/mL Amp 1mL Manip (Verbenna) <sup>1</sup>

Tiamina 100mg/mL Amp 1mL Manip (Health Tech) <sup>1</sup>

Tiamina 100mg/mL Amp 1mL Manip (Centro Paulista) <sup>1</sup>

**POSOLOGIA****Adulto:**

Dose padrão

100mg IM/IV lento, a cada 8 horas

**Criança:**

Dose padrão

10 a 25mg IM/IV lento, a cada 24 horas

▶ **Ajuste de dose:**

Não é necessário ajuste de dose.



- ▶ **ADMINISTRAÇÃO**  
Intravenosa e Intramuscular  
Infusão intermitente: 100mg em 100mL de SF/SG 5%, por 30 minutos.  
100mg em 500mL de SF/SG 5%
- ▶ **ARMAZENAMENTO**  
Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

**VITAMINA B1 + VITAMINA B12**  
**+ VITAMINA B6** <sup>1,2</sup>

Vitaminas e Suplementos Minerais

Nome comercial:  
Citoneurin 5000 Drg <sup>1,2</sup>

**POSOLOGIA**  
**Adulto:**

|                                   |                                               |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------|
| Tratamento de neuralgia e neurite | 1 drg, a cada 8 horas                         |
| Suplementação                     | 1 drg, uma vez na semana ou a critério médico |

- ▶ **Ajuste de dose:**  
Não é necessário ajuste de dose.
- ▶ **ADMINISTRAÇÃO**  
Oral  
Administrar após refeições.
- ▶ **ARMAZENAMENTO**  
Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

**VITAMINA B1 + VITAMINA B12**  
**+ VITAMINA B6** <sup>1,2</sup>

Vitaminas e Suplementos Minerais

Nome comercial:  
Citoneurin 5000 Amp <sup>1,2</sup>  
Vitamina B1+ Vitamina B6 + Vitamina B12 Amp 1mL Manip <sup>1,2</sup>

**POSOLOGIA**  
**Adulto:**

|                       |                                                                                                  |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Neurites e neuralgias | 1 injeção, a cada 3 dias                                                                         |
| Anemia perniciosa     | - Casos regulares: 1 injeção, a cada 2 ou 3 dias<br>- Casos graves: 1 injeção em dias alternados |
| Suplementação         | 1 injeção, uma vez na semana ou a critério médico                                                |

- ▶ **Ajuste de dose:**  
Não é necessário ajuste de dose.
- ▶ **ADMINISTRAÇÃO**  
Intramuscular
- ▶ **ARMAZENAMENTO**  
Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

**VITAMINA B12 <sup>1</sup>**

Vitaminas e Suplementos Minerais

Nome comercial:

Cronobê 5000mcg (2500mcg/mL) Amp 2mL <sup>1</sup>**POSOLOGIA****Adulto:**

|                     |                                                                        |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Neuropatia profunda | 5000mcg, a cada 24 horas                                               |
| Mialgias            | 15000mcg, a cada 24 horas, seguidos de doses menores quando necessário |

▶ **Ajuste de dose:**

Não é necessário ajuste de dose.

▶ **ADMINISTRAÇÃO**

Intramuscular

▶ **ARMAZENAMENTO**

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

**VITAMINA B6 <sup>1</sup>**

Vitaminas e Suplementos Minerais

Nome comercial:

Vitamina B6 100mg Cap Manip <sup>1</sup>**POSOLOGIA****Adulto:**

|                                         |                                                                                                                  |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Síndrome de dependência de piridoxina   | - Dose inicial: 25 a 600mg, a cada 24 horas<br>- Dose manutenção: 50mg, a cada 24 horas                          |
| Síndrome de TPM                         | 50 a 200mg, a cada 24 horas nos 10 dias que precedem a menstruação                                               |
| Deficiência droga induzida              | - Dose inicial: 50 a 200mg, a cada 24 horas, durante 3 semanas<br>- Dose manutenção: 25 a 100mg, a cada 24 horas |
| Alcoolismo                              | 50mg, a cada 24 horas durante 2 a 4 semanas                                                                      |
| Anemia sideroblástica hereditária       | 200 a 600mg, a cada 24 horas durante 1 a 2 meses.                                                                |
| Depressão pelo uso de anticoncepcionais | 50 a 100mg, a cada 24 horas                                                                                      |

▶ **Ajuste de dose:**

Não é necessário ajuste de dose.

▶ **ADMINISTRAÇÃO**

Oral

▶ **ARMAZENAMENTO**

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

VITAMINA C <sup>1,2</sup>

Vitaminas e Suplementos Minerais

Nome comercial:  
Cewin 1g Cp Eferv Sem Açúcar <sup>1,2</sup>

**POSOLOGIA**  
**Adulto e Criança (> 10 anos de idade):**

|             |                               |
|-------------|-------------------------------|
| Dose padrão | 1 comprimido, a cada 24 horas |
|-------------|-------------------------------|

- ▶ **Ajuste de dose:**  
Não é necessário ajuste de dose.
- ▶ **ADMINISTRAÇÃO**  
Oral  
Dissolver em água.
- ▶ **ARMAZENAMENTO**  
Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

VITAMINA C <sup>1</sup>

Vitaminas e Suplementos Minerais

Nome comercial:  
Cewin 500mg Cp Desintegração Lenta <sup>1</sup>

**POSOLOGIA**  
**Adulto e Criança (> 10 anos de idade):**

|             |                        |
|-------------|------------------------|
| Dose padrão | 500mg, a cada 24 horas |
|-------------|------------------------|

- ▶ **Ajuste de dose:**  
Não é necessário ajuste de dose.
- ▶ **ADMINISTRAÇÃO**  
Oral  
Deglutir sem mastigar.
- ▶ **ARMAZENAMENTO**  
Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

VITAMINA C <sup>1,2</sup>

Vitaminas e Suplementos Minerais

Nome comercial:  
Vitamina C (Ácido Ascórbico) 1g (200mg/mL) Amp 5mL <sup>1,2</sup>

**POSOLOGIA**  
**Adulto:**

|             |                                       |
|-------------|---------------------------------------|
| Deficiência | 200 a 500mg IV/IM, a cada 24 horas    |
| Escorbuto   | 300mg a 1 hora IV/IM, a cada 24 horas |

- ▶ **Ajuste de dose:**  
Não é necessário ajuste de dose.
- ▶ **ADMINISTRAÇÃO**  
Intravenosa e Intramuscular  
Infusão contínua: em 1000mL de SF.
- ▶ **ARMAZENAMENTO**  
Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

**VITAMINA D3 <sup>1</sup>**

Vitaminas e Suplementos Minerais

Nome comercial:

Addera D3 3300UI/mL Fr 10mL <sup>1</sup>**POSOLOGIA****Adulto e Criança (> 2 anos de idade):**

Dose padrão

Até 6 gotas, a cada 24 horas

**Lactentes (crianças de 0 a 2 anos):**

Dose padrão

40UI/kg, a cada 24 horas

▶ **Ajuste de dose:**

Não é necessário ajuste de dose.

▶ **ADMINISTRAÇÃO**

Oral

▶ **ARMAZENAMENTO**

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

**VITAMINA E <sup>1,2</sup>**

Vitaminas e Suplementos Minerais

Nome comercial:

Emama 400mg Cap <sup>1,2</sup>Ephynal 400mg Cap <sup>1,2</sup>**POSOLOGIA****Adulto:**

Dose padrão

400 a 800mg, a cada 24 horas

▶ **Ajuste de dose:**

Não é necessário ajuste de dose.

▶ **ADMINISTRAÇÃO**

Oral

Administrar com líquido, sem mastigá-las.

▶ **ARMAZENAMENTO**

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

**VITAMINA K <sup>1,2</sup>**

Hemostático

Nome comercial:

Kavit IM 10mg/mL Amp 1mL <sup>1,2</sup>**POSOLOGIA****Adulto:**

Dose padrão

1 a 3mg, a cada 24 horas

**Recém-nascido:**Hemorragia 22 ou perigo  
de hemorragia1mg, após o nascimento ou a título terapêutico, 1mg/kg  
durante 1 a 3 dias

Hemorragias graves

10 a 20mg

- ▶ **Ajuste de dose:**  
Não é necessário ajuste de dose.
- ▶ **ADMINISTRAÇÃO**  
Intramuscular
- ▶ **ARMAZENAMENTO**  
Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

## VITAMINA K <sup>1,2</sup>

Hemostático

Nome comercial:  
Kanakion MM 10mg/mL Amp 1mL <sup>1,2</sup>  
Vitamina K/Fitomenadiona IV 10mg/mL Amp 1mL <sup>1,2</sup>

### POSOLOGIA

#### Adulto:

|                                             |                                                                           |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Hemorragias severas e potencialmente fatais | 5 a 10mg, pelo menos, por 30 segundos. Caso necessário, pode ser repetida |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|

- ▶ **Ajuste de dose:**  
Não é necessário ajuste de dose.
- ▶ **ADMINISTRAÇÃO**  
Intravenosa  
Infusão contínua: diluir em SF/SG 5%
- ▶ **ARMAZENAMENTO**  
Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

## VITAMINA K <sup>1</sup>

Hemostático

Nome comercial:  
Kanakion MM Pediátrico 2mg Amp 0,2mL <sup>1</sup>  
Fitomenadiona Miscelas Pediátrico 2mg/0,2ml Manip <sup>1</sup>

### POSOLOGIA

#### Criança:

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Profilaxia | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Recém-nascidos sadios de 36 semanas, 1mg IM ao nascimento ou logo após ou 2mg oral.</li> <li>- Recém-nascidos prematuros com menos de 36 semanas (2,5kg ou mais): 1mg IM ao nascer ou pouco depois</li> <li>- Recém-nascidos prematuros com menos de 36 semanas (menos que 2,5kg): 0,4 mg/kg IM/IV ao nascer ou logo após</li> </ul> |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

- ▶ **Ajuste de dose:**  
Não é necessário ajuste de dose.
- ▶ **ADMINISTRAÇÃO**  
Intravenosa, Intramuscular ou Oral
- ▶ **ARMAZENAMENTO**  
Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

## VITAMINAS <sup>1</sup>

Vitaminas e Suplementos Minerais

Nome comercial:  
Frutovitam Amp 10mL <sup>1</sup>

### POSOLOGIA

## Adultos:

A critério médico.

### ► ADMINISTRAÇÃO

Intravenosa

Infusão contínua: até 10mL em 500mL de SF/SG 5%.

### ► ARMAZENAMENTO

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

## VITAMINAS + ÁCIDO FÓLICO <sup>1,2</sup>

Vitaminas e Suplementos Minerais

Nome comercial:

Cerne 12 Fr 5mL <sup>1,2</sup>

## POSOLOGIA

### Adulto e Criança (> 11 anos de idade):

Dose padrão

1 frasco IV/IM, a cada 24 horas

### ► Ajuste de dose:

Não é necessário ajuste de dose.

### ► ADMINISTRAÇÃO

Intravenosa e Intramuscular

Intravenosa: reconstituir em 5mL de água bidestilada.

Infusão: 5mL em 100mL SF/SG 5%, 60-90min

5mL em 500mL SF/SG 5%, 60-90min.

5mL em 1000mL SF/SG 5%, 90min.

Intramuscular: Reconstituir em 2,5mL de água bidestilada.

### ► ARMAZENAMENTO

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

## VITAMINAS + LECITINA + ÓLEO VEGETAL <sup>1,2</sup>

Hidratante, Protetor Epidérmico

Nome comercial:

Creme Reparador Dérmico Loção Fr 200mL <sup>1,2</sup>

## POSOLOGIA

### Adulto e Criança:

Dose padrão

Aplicar na pele de todo o corpo, após a higienização, a cada 8 horas

### ► Ajuste de dose:

Não é necessário ajuste de dose.

### ► ADMINISTRAÇÃO

Tópico

Não aplicar sobre lesões da pele: descamação com lesão epidérmica, feridas e outros.

Não massagear sobre áreas isquêmicas, somente ao seu redor.

### ► ARMAZENAMENTO

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

## VITAMINAS DO COMPLEXO B <sup>1</sup>

Vitaminas e Suplementos Minerais

Nome comercial:

Complexo B Cp Rev <sup>1</sup>

## POSOLOGIA

### Adulto:

Dose padrão | 1 cp rev, a cada 24 horas

- ▶ **Ajuste de dose:**  
Não é necessário ajuste de dose.
- ▶ **ADMINISTRAÇÃO**  
Oral
- ▶ **ARMAZENAMENTO**  
Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

## VITAMINAS DO COMPLEXO B <sup>1</sup>

Vitaminas e Suplementos Minerais

Nome comercial:  
Complexo B Amp 2mL <sup>1</sup>  
Hyplex B Amp 2mL <sup>1</sup>

## POSOLOGIA

### Adulto:

Dose padrão | 2 a 4mL, a cada 24 horas

- ▶ **Ajuste de dose:**  
Não é necessário ajuste de dose.
- ▶ **ADMINISTRAÇÃO**  
Intramuscular e Intravenosa  
Infusão intermitente: apenas quando necessário. Diluir 2mL em 100mL de SF/SG 5%.
- ▶ **ARMAZENAMENTO**  
Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

## VITAMINAS DO COMPLEXO B (SEM VIT B1) <sup>1</sup>

Vitaminas e Suplementos Minerais

Nome comercial:  
Complexo B Amp 2mL (sem Vit. B1) <sup>1</sup>

## POSOLOGIA

### Adulto:

Dose padrão | 2 a 4mL, a cada 24 horas

- ▶ **Ajuste de dose:**  
Não é necessário ajuste de dose.
- ▶ **ADMINISTRAÇÃO**  
Intramuscular e Intravenosa  
Infusão intermitente: apenas quando necessário. Diluir 2mL em 100mL de SF/SG 5%.
- ▶ **ARMAZENAMENTO**  
Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

## VITAMINAS + POLIMINERAIS <sup>1,2</sup>

Vitaminas e Suplementos Minerais

Nome comercial:  
Centrum Cp <sup>1,2</sup>

**POSOLOGIA****Adulto e Criança (> 3 anos de idade):**

|             |                               |
|-------------|-------------------------------|
| Dose padrão | 1 comprimido, a cada 24 horas |
|-------------|-------------------------------|

▶ **Ajuste de dose:**

Não é necessário ajuste de dose.

▶ **ADMINISTRAÇÃO**

Oral

Ingerir, preferencialmente, com alimentos.

▶ **ARMAZENAMENTO**

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

**VORICONAZOL <sup>1,2</sup>**

Antifúngico Sistêmico

Nome comercial:

Vfend 200mg FA <sup>1,2</sup> \*Veac 200mg FA <sup>1,2</sup>**POSOLOGIA****Adulto:**

|              |                                                       |
|--------------|-------------------------------------------------------|
| Dose inicial | 6 mg/kg IV, fracionado a cada 12 horas, durante 1 dia |
|--------------|-------------------------------------------------------|

|                 |                             |
|-----------------|-----------------------------|
| Dose manutenção | 4 mg/kg IV, a cada 12 horas |
|-----------------|-----------------------------|

**Criança (2 a 12 anos de idade):**

|                 |                             |
|-----------------|-----------------------------|
| Dose manutenção | 7 mg/kg IV, a cada 12 horas |
|-----------------|-----------------------------|

▶ **Ajuste de dose:**

Insuficiência renal:

| Dose com Função Renal Normal                | Dose Insuficiência Renal<br>clearance de creatinina (mL/min) |                |                                                                                                  |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                             | >50-90                                                       | 40 a 60        | <20                                                                                              |
| 6mg/Kg 12/12h 2 doses, depois 4mg/Kg 12/12h | Sem alterações                                               | Sem alterações | Se ClCr <50 mL/min, acumulação do excipiente IV (ciclodextrina). Passar a via oral ou suspender. |

▶ **ADMINISTRAÇÃO**

Intravenosa

Reconstituir em 19mL de água bidestilada.

Infusão intermitente: 200mg em 50mL de SF, 3 mg/kg/hora, durante 1 a 2 horas.

▶ **ARMAZENAMENTO**

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

Após preparo, possui estabilidade de 24 horas em refrigeração entre 2°C e 8°C.

▶ **Atenção:**

\* Esta apresentação é livre de látex.

**VORICONAZOL <sup>1</sup>**

Antifúngico Sistêmico

Nome comercial:



Vfend 200mg Cp Rev <sup>1</sup>  
 Veac 200mg Cp Rev <sup>1</sup>  
 Vori 200mg Cp Rev <sup>1</sup>  
 Voriconazol 200mg Cp Rev (Cristália) <sup>1</sup>

**POSOLOGIA**  
**Adulto:**

|                                                                               |                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Infecção por Aspergilose invasiva, <i>Candida Scedosporioses e Fusarioses</i> | - Dose de ataque: iniciar com o regime de dose de ataque intravenoso<br>- Dose manutenção Adultos > 40kg: 200mg, a cada 12 horas<br>- Dose manutenção Adultos < 40kg: 100mg, a cada 12 horas |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

- **Ajuste de dose:**  
 Insuficiência renal:

| Dose com Função Renal Normal                | Dose Insuficiência Renal<br>clearance de creatinina (mL/min) |                |                                                                                                  |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                             | >50-90                                                       | 40 a 60        | <20                                                                                              |
| 6mg/Kg 12/12h 2 doses, depois 4mg/Kg 12/12h | Sem alterações                                               | Sem alterações | Se ClCr <50 mL/min, acumulação do excipiente IV (ciclodextrina). Passar a via oral ou suspender. |

- **ADMINISTRAÇÃO**  
 Oral  
 Administrar 1 hora antes ou 2 horas depois das refeições.
- **Administração com alimentos:**  
 Evitar o consumo de Erva-de-São-João.
- **Administração via sonda:**  
 Pode ser administrado via sonda. Triturar e diluir em 20mL de água, administrando imediatamente.
- **ARMAZENAMENTO**  
 Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

**VORTIOXETINA <sup>1</sup>** Antidepressivos

Nome comercial:  
 Brintellix 5mg Cp Rev <sup>1</sup>

**POSOLOGIA**  
**Adulto:**

|             |                       |
|-------------|-----------------------|
| Dose padrão | 10mg, a cada 24 horas |
| Dose máxima | 20mg ao dia           |

- **Ajuste de dose:**  
 Não é necessário ajuste de dose.
- **ADMINISTRAÇÃO**  
 Oral  
 Administrar com ou sem alimento.
- **Administração com alimentos:**  
 Evitar o consumo de álcool.
- **ARMAZENAMENTO**  
 Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

**ZINCO+COBRE+MANGANÊS+CROMO<sup>1,2</sup>** Vitaminas e Suplementos Minerais

Nome comercial:

Ad-element Amp 2mL<sup>1</sup>

Olig Trat Amp 2mL<sup>1</sup>

**POSOLOGIA**

**Adultos:**

Dose padrão: 1 a 2 mL, 1 vez ao dia

► **Ajuste de dose:**

Não há ajuste especificado.

► **ADMINISTRAÇÃO**

Intravenoso

Diluir a dose recomendada em SG 5% e infundir.

► **ARMAZENAMENTO:**

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C

Após aberto: utilizar imediatamente.

**ZOLEDRÔNICO ÁCIDO<sup>1</sup>**

Inibidor da Reabsorção Óssea

Nome comercial:

Zolibbs 4mg FA + Diluente 5mL<sup>1\*</sup>

Zometa 4mg FA 5mL<sup>1</sup>

Ácido Zoledrônico 4mg FA 5mL (Sandoz)<sup>1</sup>

**POSOLOGIA**

**Adultos:**

Prevenção de eventos relacionados ao esqueleto em pacientes com metástases ósseas 4 mg, a cada 3 ou 4 semanas

Tratamento da hipercalcemia induzida por tumor (HIT) 4 mg, uma única vez

► **Ajuste de dose:**

Insuficiência Renal:

| Dose com Função Renal Normal | Dose Insuficiência Renal<br>clearance de creatinina (mL/min) |         |         |         |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|
|                              | < 30                                                         | 30 - 39 | 40 - 49 | 50 - 60 |
| 4mg                          | Não recomendado                                              | 3 mg    | 3,3 mg  | 3,5 mg  |

► **ADMINISTRAÇÃO**

Intravenoso

Diluir a dose recomendada em 100 mL de SF/SG 5% e infundir por no mínimo 15 minutos.

► **ARMAZENAMENTO:**

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C

Após diluição: estabilidade de 24 horas.

► **Atenção:**

Alto Custo.

\* Esta apresentação é livre de látex.

# ZOLEDRÔNICO ÁCIDO <sup>1</sup>

Inibidor da Reabsorção Óssea

Nome comercial:  
Aclasta 5mg Fr 100mL<sup>1</sup>

### POSOLOGIA

#### Adultos:

Dose padrão: 5 mg ao dia, esquema anual.

- ▶ **Ajuste de Dose:**  
Evitar uso em pacientes com clearance (depuração) de creatinina < 35 mL/min.
- ▶ **ADMINISTRAÇÃO**  
Intravenoso  
Infundir a dose recomendada por no mínimo 15 minutos.
- ▶ **ARMAZENAMENTO:**  
Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C  
Após aberto: estabilidade de 24 horas em temperatura de 2°C a 8°C.
- ▶ **Atenção:**  
Alto Custo.

# ZOLPIDEM <sup>1,2</sup>

Hipnótico

Nome comercial:  
Lioram 10mg Cp <sup>1,2</sup>  
Patz 5mg Cp Sublingual <sup>1,2</sup>  
Stilnox 10mg Cp <sup>1,2</sup>  
Zolpidem 10mg Cp (EMS) <sup>1,2</sup>  
Zolpidem 10mg Cp (Germed) <sup>1,2</sup>  
Zolpidem 10mg Cp (Novartis) <sup>1,2</sup>  
Zolpidem 10mg Cp (Sandoz) <sup>1,2</sup>

### POSOLOGIA

#### Adultos:

Dose padrão: 5 a 10mg, a cada 24 horas.

- ▶ **Ajuste de dose:**  
Insuficiência Renal: O ajuste da dose não é necessário.  
Insuficiência Hepático: Pode ser necessário redução da dose, monitorar.
- ▶ **ADMINISTRAÇÃO:**  
Oral
- ▶ **Administração com alimentos:**  
Administrar imediatamente antes de o paciente deitar-se, devido ao rápido início de ação, e em horário distante da alimentação (2 horas após no mínimo). Evitar o consumo de bebidas alcoólicas, *Centella asiática*, kava kava, valeriana e Erva-de-São-João.
- ▶ **Administração via sonda:**  
Pode ser administrado via sonda. Triturar e dispersar em 20ml de água, após dissolução administrar imediatamente.
- ▶ **ARMAZENAMENTO:**  
Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C
- ▶ **Atenção:**  
Receita Branca (2 vias).

**ZOPICLONA** <sup>1</sup>

Hipnótico

Nome comercial:  
Imovane 7,5mg Cp <sup>1</sup>

**POSOLOGIA****Adultos:**

Dose padrão: | 3,75 a 7,5mg, a cada 24 horas.

▶ **Ajuste de dose:**

Insuficiência Renal: Iniciar com 3,75mg.

Insuficiência Hepática: 3,75mg, podendo ser aumentada cuidadosamente para 7,5mg

▶ **ADMINISTRAÇÃO:**

Oral

▶ **Administração com alimentos:**

Administrar imediatamente antes de o paciente deitar-se, devido ao rápido início de ação. Evitar o consumo de bebidas alcoólicas, *Centella asiática*, kava kava, valeriana, Erva-de-São-João e suco de toranja (grapefruit).

▶ **Administração via sonda:**

Pode ser administrado via sonda. Triturar e dispersar em 20ml de água, após dissolução administrar imediatamente.

▶ **ARMAZENAMENTO:**

Conservar em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C, em local seco

▶ **Atenção:**

Receita Branca (2 vias).

A  
B  
C  
D  
E  
F  
G  
H  
I  
J  
K  
L  
M  
N  
O  
P  
Q  
R  
S  
T  
U  
V  
W  
X  
Y

Z

## ORIENTAÇÕES GERAIS SOBRE MEDICAMENTOS

### DOSES USUAIS E DILUIÇÃO DOS INJETÁVEIS:

As informações dos medicamentos sobre dose usuais de administração, reconstituição e diluição dos injetáveis foram retiradas principalmente das bulas dos fabricantes e/ou do Lexi-comp.

#### REFERÊNCIAS:

LACY, C.F., ARMSTRONG, L.L, GOLDMAN, M. P. **Medicamentos Lexi-Comp Manole**. 1º edição Brasileira. Lexi-Comp.  
Bulas dos medicamentos.

### AJUSTE DE DOSE PARA INSUFICIÊNCIA RENAL:

Objetivando-se assegurar a devida administração dos medicamentos em pacientes que sofrem de insuficiência renal, adicionou-se uma tabela de ajuste de dose nos princípios ativos que necessitam dessa diferenciação.

#### REFERÊNCIAS:

GILBERT, D. N. MOELLERING, R. B. JR. ELIOPOULOS, G. M, CHAMBERS, H. F. SAAG, M. S. Guia Stanford: Guia de Terapêutica Antimicrobiana 2011. Linha Anti-infectiva.  
LACY, C.F., ARMSTRONG, L.L, GOLDMAN, M. P. **Medicamentos Lexi-Comp Manole**. 1º edição Brasileira. Lexi-Comp.

### ADMINISTRAÇÃO VIA Sonda

Para administrar um medicamento via sonda nasogástrica de forma correta devemos estar cientes de uma série de normas e precauções. No manual teremos algumas informações gerais de como proceder nessa forma de administração para princípios ativos padronizados no Hospital.

Classificação das formas farmacêuticas orais e recomendações gerais:

| FORMA FARMACÊUTICA                 | RECOMENDAÇÕES                                                                         |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Comprimidos de liberação imediata  | Geralmente pode triturar em pó fino, diluir em água e administrar em seguida.         |
| Comprimidos de liberação lenta     | Não se deve triturar.                                                                 |
| Comprimidos com cobertura entérica | Não se deve triturar.                                                                 |
| Cápsulas de gelatina               | Em geral, pode abrir a cápsula, misturar o conteúdo em água e administrar em seguida. |
| Xaropes e soluções                 | Em geral, são as melhores formas de administração via sonda nasogástrica.             |

*Descrição de formas farmacêuticas orais e recomendações para administração por sonda*

#### **Comprimidos normais (de liberação imediata):**

Deve-se triturar até a formação de um pó bem fino.

#### **Comprimidos com cobertura pelicular (para mascarar o sabor):**

São de liberação imediata. Deve-se triturar até a formação de um pó bem fino.

**Comprimidos de liberação lenta:**

Não devem ser triturados.

A trituração proporciona a perda das características de liberação.

Risco de toxicidade por liberação de uma dose inadequada.

**Comprimidos com cobertura entérica:**

Não devem ser triturados.

A perda da cobertura pode provocar a inativação do princípio ativo e favorecer irritação na mucosa gástrica.

**Comprimidos efervescentes:**

Devem ser dissolvidos em água e administrar após o término da efervescência.

**Comprimidos sublinguais:**

A administração por sonda não é recomendável.

**Cápsulas de gelatina dura (conteúdo em pó):**

Abrir a cápsula e dissolver o conteúdo em água e administrar em seguida.

Em caso de instabilidade e princípios ativos muito irritantes, essa administração não é adequada.

**Cápsulas de gelatina dura (conteúdo de microgrânulos de liberação lenta ou com cobertura entérica):**

A cápsula pode ser aberta, porém não deve triturar os grânulos, pois perderiam suas características.

A disponibilidade da administração por sonda depende do diâmetro das microesferas e de sua aderência à sonda.

**Cápsulas de gelatina (com conteúdo líquido):**

Se o princípio ativo é estável e não irritante, pode-se optar por extrair o conteúdo com uma seringa, porém não se recomenda, pois pode haver perda na dosagem além de se aderir à sonda.

Os medicamentos que podem ser administrados via sonda têm a recomendação e a forma de administração específica destacada em cada princípio ativo como um Alerta de Administração via sonda.

**REFERÊNCIAS:**

- ▶ Lexicomp Online®, Lexi-Drugs®, Hudson, Ohio: Lexi-Comp, Inc.; Fevereiro 12, 2015.
- ▶ UpToDate, Post TW (Ed), UpToDate, Waltham, MA. Fevereiro 12, 2015.
- ▶ WHITE, Rebecca; BRADNAM, Vicky (Ed.). Handbook of drug administration via enteral feeding tubes. Pharmaceutical Press, 2007.
- ▶ López, I.M. Guía de administración de medicamentos por sonda. Hospital Son Dureta. 143p. - 163p. 2004.
- ▶ IZCO, N. et al. Incompatibilidades fármaco-nutrición enteral: recomendaciones generales para su prevención. Farm Hosp, v. 25, n. 1, p. 13-24, 2001.
- ▶ GORZONI, MILTON LUIZ; DELLA TORRE, ANDERSON; PIRES, SUELI LUCIANO. Medicamentos e sondas de nutrição. Rev Assoc Med Bras, v. 56, n. 1, p. 17-21, 2010.
- ▶ HIDALGO, F. J. et al. Guía de administración de fármacos por sonda nasogástrica. Farmacia Hospitalaria, v. 19, p. 251-258, 1995.
- ▶ Micromedex® Healthcare Series [Internet database]. Greenwood Village, CO: Thomson Micromedex; 2014 [updated periodically]. Cited 2014 Dec. Available from <http://www.thomsonhc.com/>.
- ▶ LISBOA, Carolina de Deus; SILVA, Lolita Dopico da and MATOS, Guacira Corrêa de. Investigação da administração de medicamentos por cateteres em terapia intensiva. Texto contexto - enferm. [online]. 2014, vol.23, n.3, pp. 573-580. ISSN 0104-0707.

- ▶ Engle FK, Hannawa TE. Técnicas para administração de medicamentos orais para pacientes críticos recebendo alimentação enteral contínua. Am J Health Syst Pharm. 2009 Abr; 56(14):1441-4.
- ▶ LÓPEZ, Lilian Gómez; PISÓN, Sergio Pinillos. Guía pediátrica para la administración de fármacos por sonda de alimentación. Elsevier, 2008.
- ▶ COOPER, Mandelin K.; BROCK, David G.; MCDANIEL, Cara M. Interaction between levodopa and enteral nutrition. Annals of Pharmacotherapy, v. 42, n. 3, p. 439-442, 2008.
- ▶ PROHASKA, Emily S.; KING, Allison R. Administration of antiretroviral medication via enteral tubes. American Journal of Health-System Pharmacy, v. 69, n. 24, p. 2140-2146, 2012.
- ▶ Bula do medicamento.
- ▶ NPPG, RCPCH and WellChild. Medicine for Children - Atenolol for hypertension. Disponível em: <<http://www.medicinesforchildren.org.uk/search-for-a-leaflet/atenolol-for-hypertension/>> Acesso em: 27/08/2015.
- ▶ Lundbeck uk – escitalopram.

### ADMINISTRAÇÃO COM ALIMENTOS:

A ingestão de alimentos pode alterar a absorção dos medicamentos administrados via oral, acelerando, retardando ou impossibilitando sua absorção. Para conciliar, de forma adequada, a administração de alimentos com os medicamentos foram elaborados **Aler-tas de Administração com Alimentos** nos princípios ativos que informam sobre o horário mais apropriado para a administração, jejum e quais alimentos devem ser evitados durante o uso de cada medicamento.

#### REFERÊNCIAS:

LACY, C.F., ARMSTRONG, L.L., GOLDMAN, M. P. Medicamentos Lexi-Comp Manole. 1ª edição Brasileira. Lexi-Comp.

### ADMINISTRAÇÃO EM IDOSOS:

No intuito de melhorar a segurança em relação à prescrição de medicamentos aos pacientes idosos, foram incluídos **Alertas de Administração em Idosos** nos princípios ativos que não devem ser administrados aos idosos ou devem ser Administrados com cautela, segundo os critérios de Beers, 2002.

O paciente idoso apresenta maior número de doenças crônicas e faz uso, em média, de três vezes mais medicamentos que um paciente adulto jovem, dessa forma, há a ocorrência de um maior número de interações medicamentosas e de reações adversas, além da diminuição do metabolismo e da eliminação dos medicamentos.

#### REFERÊNCIAS:

The American Geriatrics Society 2012 Beers Criteria Update Expert Panel. (2012). **American Geriatrics Society Updated Beers Criteria for Potentially Inappropriate Medication Use in Older Adults**. Journal of the American Geriatrics Society, 60, 616-631.

### ALTO CUSTO

Os medicamentos de alto custo também foram destacados por princípio ativo em **Aler-tas de Atenção**, visando, desta forma, melhorar os cuidados com a armazenagem e dispensação destes ao paciente.

### ALTA VIGILÂNCIA

No intuito de melhorar a segurança em relação a medicamentos, foram definidos itens de Alta vigilância, sinalizados com **Alertas de Atenção** em cada princípio ativo especí-



fico. Para estes medicamentos, foram estabelecidos planos específicos para armazenamento, distribuição, prescrição, transcrição, preparo e administração que são identificados com uma etiqueta vermelha de código de barras e são distribuídos em embalagem plástica vermelha.

Ao ser prescrito, o medicamento de alta vigilância sai em destaque na prescrição médica, por meio de uma fonte diferenciada, com o objetivo de alertar para as fases de preparo e administração (Meta 3AS). Estas drogas estão disponíveis apenas na Farmácia e em setores com a devida justificativa clínica, validada pelo MMU (“Programa de Gerenciamento e Utilização do Medicamento”).

#### REFERÊNCIAS:

PERINI, E. NEIVA, H. M. NASCIMENTO, M. M. G, ROSA, M. B, ANACLETO, T. A. **Medicamentos Potencialmente Perigosos:** Saiba mais sobre a lista atualizada de medicamentos usados nos hospitais. Boletim ISPM. Jan. 2013 – Volume 2, nº 1.

#### ARMAZENAMENTO

Para melhorar o monitoramento dos medicamentos armazenados foram colocados **Aler-tas de Atenção** quanto Armazenagem em todos os princípios ativos, destacando se o medicamento deverá ser armazenado em temperatura ambiente ou refrigerado.

#### REFERÊNCIAS:

LACY, C.F., ARMSTRONG, L.L, GOLDMAN, M. P. **Medicamentos Lexi-Comp Manole.** 1ª edição Brasileira. Lexi-Comp.

#### RISCO DE QUEDA

Queda pode ser definida como “um evento não intencional que tem como resultado a mudança de posição do indivíduo para um nível mais baixo, em relação a sua posição inicial”. Para Cunha e Guimarães (1989), a queda se dá em decorrência da perda total do equilíbrio postural, podendo estar relacionada à insuficiência súbita dos mecanismos neurais e osteoarticulares envolvidos na manutenção da postura. Alguns autores referem-se à queda como uma síndrome geriátrica por ser considerado um evento multifatorial e heterogêneo. O risco de ter uma queda ou quedas recorrentes aumenta com o número de fatores de risco intrínseco associados abaixo:

- ▶ Idade menor ou igual a 7 anos;
- ▶ Idade maior ou igual a 65 anos;
- ▶ História de queda anterior;
- ▶ Sinais e sintomas de comprometimento neurológico;
- ▶ Uso de drogas que possam causar hipotensão postural, sonolência, tonturas e/ou que interfiram no Sistema Nervoso Central (especial atenção para bloqueadores de canal de cálcio);
- ▶ Comprometimento da locomoção;
- ▶ Agitação psicomotora/sonolência;
- ▶ Déficit sensitivo;

Os pacientes com quatro ou mais fatores de riscos identificados acima estão no maior risco de ter uma queda. Quedas em pacientes hospitalizados são comuns e podem levar a ferimentos sérios ou até a morte. O resultado de uma queda pode ser pior para um doente que recebe anticoagulante. Fatores de risco de quedas em Hospital incluem debilidade, hipotensão ortostática, alteração no estado mental, sedação, história de quedas anteriores, as recentes mudanças ambientais, restrições em vias de acesso (como cateteres urinários), falta de comunicação entre cuidadores do paciente, depressão e comprometimento sensoriais. Quedas tendem a ocorrer em períodos de menor número

de funcionários, como plantões noturnos e de fins de semana. As intervenções para prevenir quedas incluem a identificação de pacientes de risco, evitando excesso dos objetos no ambiente e de via de acesso, por exemplo, cateter de oxigênio e incentivando a movimentação precoce com ajuda da fisioterapia.

Os medicamentos que possuem possibilidade de ocasionar ao paciente perda total do equilíbrio postural foram destacados por princípio ativo em **Alertas de Atenção**, para assegurar os cuidados com o paciente.

RISCO DE QUEDA

|                   | Princípio ativo | Nome comercial                  | Observações                                                                                                                 |
|-------------------|-----------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Benzodiazepínicos | Buspirona       | Ansitec 10mg Cp                 | ½ vida longa podem causar sedação residual durante o dia em pacientes idosos, aumentando a incidência de quedas e fraturas. |
|                   | Clobazam        | Frisium 10mg Cp                 |                                                                                                                             |
|                   |                 | Urbanil 10mg Cp                 |                                                                                                                             |
|                   | Clonazepam      | Rivotril 0,25mg Cp Sublingual   |                                                                                                                             |
|                   |                 | Rivotril 0,5mg Comprimido       |                                                                                                                             |
|                   |                 | Rivotril 2mg Comprimido         |                                                                                                                             |
|                   |                 | Rivotril 2,5mg/ml Gota Fr 20ml  |                                                                                                                             |
|                   | Cloxazolam      | Olcadil 1mg Cp                  |                                                                                                                             |
|                   |                 | Olcadil 2mg Cp                  |                                                                                                                             |
|                   | Diazepam        | Compaz 10mg Amp 2mL             |                                                                                                                             |
|                   |                 | Uni-Diazepax 10mg Amp 2mL       |                                                                                                                             |
|                   |                 | Valium 5mg Cp                   |                                                                                                                             |
|                   | Flunitrazepam   | Rohypnol 1mg Cp                 | Severidade Alta.                                                                                                            |
|                   | Midazolam       | Dormire 15mg Amp 3mL            | Optar por um benzodiazepínico de ação curta ou intermediária: lorazepam, bromazepam, alprazolam                             |
|                   |                 | Dormire 50mg Amp 10mL           |                                                                                                                             |
|                   |                 | Dormire 5mg Amp 5mL             |                                                                                                                             |
|                   |                 | Dormire 2mg/mL Sol Oral Fr 10mL |                                                                                                                             |
|                   |                 | Dormire 15mg Cp Rev             |                                                                                                                             |
|                   |                 | Dormium 5mg Amp 5mL             |                                                                                                                             |
|                   |                 | Dormium 50mg Amp 10mL           |                                                                                                                             |
|                   |                 | Dormonid 15mg Amp 3mL           |                                                                                                                             |
|                   |                 | Dormonid 15mg Cp Rev            |                                                                                                                             |
|                   |                 | Dormonid 50mg Amp 10mL          |                                                                                                                             |
|                   |                 | Dormonid 5mg Amp 5mL            |                                                                                                                             |
|                   |                 | Midazolam 15mg Cp Rev - Medley  |                                                                                                                             |
| Hipnóticos        | Zolpidem        | Zolpidem 10mg Cp - EMS          |                                                                                                                             |
|                   |                 | Stilnox 10mg Cp Rev             |                                                                                                                             |
|                   |                 | Lioram 10mg Cp                  |                                                                                                                             |
|                   |                 | Patz 5mg Cp Sublingual          |                                                                                                                             |

|                    | Princípio ativo | Nome comercial                            | Observações                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------|-----------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anticonvulsivantes | Carbamazepina   | Tegretol 200mg Cp                         | Podem diminuir a atividade sináptica e ocasionar falta de coordenação dos movimentos.<br><br>Severidade Alta.<br><br>Os anticonvulsivantes como primidona, topiramato e fenitoína são de menor índice em relação a reação adversa. |
|                    |                 | Tegretol 400mg Cp                         |                                                                                                                                                                                                                                    |
|                    |                 | Tegretol Cr 200mg Cp                      |                                                                                                                                                                                                                                    |
|                    | Clonazepam      | Rivotril 0,25mg Cp SL                     |                                                                                                                                                                                                                                    |
|                    |                 | Rivotril 0.5mg Cp                         |                                                                                                                                                                                                                                    |
|                    |                 | Rivotril 2mg Cp                           |                                                                                                                                                                                                                                    |
|                    |                 | Rivotril 2.5mg/mL Gts Fr 20mL             |                                                                                                                                                                                                                                    |
|                    |                 | Clonazepam 2,5mg/mL Gts Fr 20mL - EMS     |                                                                                                                                                                                                                                    |
|                    | Gabapentina     | Neurontin 300mg Cap                       |                                                                                                                                                                                                                                    |
|                    |                 | Neurontin 400mg Cap                       |                                                                                                                                                                                                                                    |
|                    |                 | Gabapentina 300mg Cap - Biossintética     |                                                                                                                                                                                                                                    |
|                    |                 | Gabapentina 300mg Cap - Biolab            |                                                                                                                                                                                                                                    |
|                    |                 | Gabapentina 400mg Cap - Biolab            |                                                                                                                                                                                                                                    |
|                    | Fenobarbital    | Fenocris 200mg Amp 2mL                    |                                                                                                                                                                                                                                    |
|                    |                 | Gardenal 100mg Cp                         |                                                                                                                                                                                                                                    |
|                    | Lacosamida      | Vimpat 50mg Cp Rev                        |                                                                                                                                                                                                                                    |
|                    |                 | Vimpat Sol Oral 100mg/mL 200mL            |                                                                                                                                                                                                                                    |
|                    |                 | Vimpat 10mg/mL FA 20mL                    |                                                                                                                                                                                                                                    |
|                    | Levetiracetam   | Keppra 250mg Cp Rev                       |                                                                                                                                                                                                                                    |
| Antipsicóticos     | Clorpromazina   | Amplictil 25mg Amp 5mL                    | Sedação excessiva e hipotensão ortostática.<br><br>Severidade Alta.<br><br>Preferível: quetiapina, risperidona, clozapina, olanzapina.                                                                                             |
|                    |                 | Amplictil 25mg Cp                         |                                                                                                                                                                                                                                    |
|                    |                 | Amplictil 40mg/mL Gts (1mL=40gts) Fr 20ml |                                                                                                                                                                                                                                    |
|                    |                 | Longactil 25mg Cp                         |                                                                                                                                                                                                                                    |
|                    |                 | Longactil 25mg Amp 5mL                    |                                                                                                                                                                                                                                    |
|                    |                 | Longactil 40mg/mL Gts (1mL=40gts) Fr 20ml |                                                                                                                                                                                                                                    |
|                    | Levomepromazina | Neozine 40mg/mL Gts (1mL=40gts) Fr 20ml   |                                                                                                                                                                                                                                    |
|                    | Periciazina     | Neuleptil 4% Gts Fr 20mL                  |                                                                                                                                                                                                                                    |

|                | Princípio ativo        | Nome comercial                                   | Observações                                                                                                                                  |
|----------------|------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Antipsicóticos | Haloperidol            | Haldol 5mg Amp 1mL                               | Sedação excessiva e hipotensão ortostática.<br><br>Severidade Alta.<br><br>Preferível: quetiapina, risperidona, clozapina, olanzapina.       |
|                |                        | Halo 5mg Amp 1mL                                 |                                                                                                                                              |
|                |                        | Uni Haloper 5mg Amp 1mL                          |                                                                                                                                              |
|                | Levodopa + Benserazida | Prolopa 200mg/50mg Cp                            |                                                                                                                                              |
|                |                        | Prolopa Hbs 100mg/25mg Cap Lib Prolongada        |                                                                                                                                              |
|                |                        | Prolopa Bd 100mg/25mg Cp Birranhurado            |                                                                                                                                              |
|                |                        | Prolopa 100mg/25mg Cp Dispersível                |                                                                                                                                              |
|                | Dopamina               | Dopamina Cloridrato 5mg Amp 10mL - Teuto         |                                                                                                                                              |
|                |                        | Dopacris 50mg (5mg/mL) Amp 10mL - Teuto          |                                                                                                                                              |
|                |                        | Dopamina Cloridrato 5mg Amp 10mL - União Química |                                                                                                                                              |
| Outros         | Difenidramina          | Difenidrin 50mg Amp 1mL                          | Sedação. Severidade Alta. Optar pelos de 2ª geração: fexonadina, loratadina, cetirizina.                                                     |
|                | Amitriptilina          | Amytril 25mg Cp                                  | Fortes propriedades anticolinérgicas e sedativas é raramente o antidepressivo de escolha para idosos. Severidade Alta. Opção: Nortriptilina. |
|                | Oxibutinina            | Retemic 5mg Cp                                   | Como tem ação anticolinérgica e sedação pode causar estados confusionais agudos em idosos. Severidade Alta.                                  |

#### Referência Bibliográfica:

Nathalie van der Velde, Bruno H Ch Stricker, Huib A P Pols, and Tischa J M van der Cammen; **Risk of falls after withdrawal of fall-risk-increasing drugs: a prospective cohort study**; Received February 23, Accepted April 11, 2006.

**American Geriatrics Society 2019 Updated AGS Beers Criteria® for Potentially Inappropriate Medication Use in Older Adults.** DOI: 10.1111/jgs.15767

**MEDICAMENTOS ASSOCIADOS À OCORRÊNCIA DE QUEDAS - ISMP  
(INSTITUTO DE PRÁTICAS SEGURAS NO USO DE MEDICAMENTOS)**

| CLASSE MEDICAMENTO                                                                                  | OBSERVAÇÕES                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Opioides, Antipsicóticos,<br>Anticonvulsivantes, Benzodiazepínicos e<br>outros hipnóticos-sedativos | Sedação, tontura, distúrbios posturais,<br>alteração da marcha e do equilíbrio,<br>déficit cognitivo |
| Anti-hipertensivos, Antiarrítmicos e<br>Antidepressivos                                             | Indução do ortostatismo,<br>comprometimento da perfusão cerebral                                     |
| Diuréticos                                                                                          | Aumento da deambulação, indução do<br>ortostatismo                                                   |

Fonte: Medicamentos Associados à Ocorrência de Quedas - ISSN: 2317-2312 | VOLUME 6 |  
NÚMERO 1 | FEVEREIRO 2017

# MEDICAMENTOS SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL

Segundo Portaria 344/98:

| Classe                                               | Receita                                                         | Validade                              | Quantidade Máxima / Receita                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>A1, A2 e A3</b>                                   | NR<br>Amarela (1)                                               | 30 dias na UF                         | <ul style="list-style-type: none"><li>• 05 ampolas</li><li>• Outras FF: 30 dias de tratamento (2)</li></ul>                                                                                                                                                                                                      |
| <b>B1 e B2</b>                                       | NR<br>Azul (1)                                                  | 30 dias na UF                         | <ul style="list-style-type: none"><li>• 05 ampolas</li><li>• Outras FF: 60 dias de tratamento (2)</li></ul>                                                                                                                                                                                                      |
| <b>C1, C2 (tópico), C5 e adendos A1, A2, B1, B2.</b> | RCE<br>Branca em 2 vias (1)                                     | 30 dias em todo o Território Nacional | <ul style="list-style-type: none"><li>• 05 ampolas</li><li>• Outras FF:<ul style="list-style-type: none"><li>- 60 dias de tratamento C1, C5.</li><li>- 30 dias de tratamento C2.</li><li>- 03 medicamentos C1, C2.</li><li>- 6 meses de tratamento (Antiparkinsoniano e Anticonvulsivantes).</li></ul></li></ul> |
| <b>C2 (uso sistêmico)</b>                            | NR Especial (1) + TC                                            | 30 dias na UF                         | <ul style="list-style-type: none"><li>• 05 ampolas</li><li>• Outras FF: 30 dias de tratamento (2)</li><li>• 01 medicação/receita</li></ul>                                                                                                                                                                       |
| <b>C3</b>                                            | RCE<br>Branca em 2 vias (1) + TE + TR                           | 15 dias na UF                         | 30 dias de tratamento                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>C4</b>                                            | RCE Branca em 2 vias + Formulário Próprio Programa DST/AIDS (1) | 30 dias em todo o Território Nacional | <ul style="list-style-type: none"><li>• 05 medicamentos</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                |

Segundo RDC 20/11:

| Classe          | Receita | Validade | Quantidade Máxima / Receita                                                                                          |
|-----------------|---------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Antimicrobianos | RCE     | 10 dias  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Não há limitação de FF por RCE</li><li>• 30 dias de tratamento (2)</li></ul> |

(1) Formulários de Receita Fornecidos pela Vigilância Sanitária Estadual.

(2) Em situações de tratamento prolongado a receita poderá ser utilizada para aquisições posteriores dentro de um período de 90 dias a contar da data de sua emissão; a receita deverá conter a indicação de uso contínuo, com a quantidade a ser utilizada para cada 30 dias. Acima destas quantidades, somente com autorização prévia da Vigilância Sanitária Estadual.

**Legenda:**

- NR: Notificação de Receita
- RCE: Receituário Controle Especial
- UF: Unidade Federativa
- FF: Formas Farmacêuticas
- TC: Termo de Consentimento Pós Informação
- TE: Termo de Esclarecimento
- TR: Termo de Responsabilidade

A dispensação dos medicamentos de controle especial segue a Portaria 344/98 e a RDC 20/11 e nos princípios ativos que se enquadram a estas legislações foram colocados **Alertas de Atenção**, destacando o tipo de receita que o médico deverá utilizar para prescrição: Receita Amarela, Receita Azul e Receita Branca em 2 vias.

### NOTIFICAÇÃO DE RECEITA A (AMARELA)

|                                                                                                                                                                  |  |          |                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                           |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>NOTIFICAÇÃO DE RECEITA</b><br>UF: <b>SP</b> NÚMERO: <b>193.659</b><br>Data ____ de ____ de ____                                                               |  | <b>A</b> | <b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b><br><b>HOSPITAL ALEMÃO OSWALDO CRUZ</b><br>CNPJ: 00.726.502/0001-26<br>Rua João Julião, 331 - Paraíso<br>CEP: 01323-903 - São Paulo - SP<br>Tel: 11 3549-0000 |  | <b>ESPECIALIDADE FARMACÉUTICA</b><br>Nome: _____<br>Quantidade e Apresentação: _____<br>Forma Farm.   Concent: p/ Unid. Posológica: _____ |  |
| Assinatura do Emissor: _____<br><b>IDENTIFICAÇÃO DO COMPRADOR</b><br>Nome: _____<br>Endereço: _____<br>Identidade Nº: _____ Órgão Emissor: _____ Telefone: _____ |  |          | <b>IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR</b><br>Nome: _____<br>Data: ____/____/____                                                                                                                     |  |                                                                                                                                           |  |

Imprensa Oficial do Estado S.A. - IMESP - Rua da Mooca, 1.921 - São Paulo - CNPJ 48.066.047/0001-84 (Abril/2019) Numeração desta impressão: 000.001 a 999.999

### NOTIFICAÇÃO DE RECEITA B (AZUL)

|                                                                                                                                                                     |  |          |                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                 |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>NOTIFICAÇÃO DE RECEITA SÉRIE BR</b><br>UF: <b>SP</b> NÚMERO: <b>01-172414</b><br>Data ____ de ____ de ____                                                       |  | <b>B</b> | <b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b><br> <b>OSWALDO CRUZ</b><br>HOSPITAL ALEMÃO<br>Rua João Julião, 331 - Tel.: (11) 3549-0000<br>CEP 01323-903 - São Paulo - SP<br>CNPJ: 00.726.502/0001-26 |  | <b>MEDICAMENTO OU SUBSTÂNCIA</b><br>QUANTIDADE E FORMA FARMACÉUTICA<br>DOSE POR UNIDADE POSOLÓGICA<br>POSOLOGIA |  |
| Assinatura do Emissor: _____<br><b>IDENTIFICAÇÃO DO COMPRADOR</b><br>NOME: _____<br>ENDEREÇO: _____<br>TELEFONE: _____<br>IDENTIDADE Nº: _____ ÓRGÃO EMISSOR: _____ |  |          | <b>CARIMBO DO FORNECEDOR</b>                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                 |  |

GRÁFICA MAGENGRÁFICA LTDA - Rua Oscar Horta, 62 - Mooca - Tel.: 3209-5684 - CNPJ 47.207.410/0001-71 - 20 Tis. 50x1 - 01.171.601 a 01.172.600 - 12/2019 - Cód.



## ESPECIAL (RECEITA BRANCA CARBONADA)



**OSWALDO CRUZ**  
UNIDADE REFERENCIADA | VERGUEIRO

CNPJ 60.726.502/0007-11 - CCM 5.644.780-9

Rua São Joaquim, 36/94  
CEP 01508-000  
São Paulo - SP  
**Tel.: (11) 3549-1999**  
**Fax: (11) 3287-8177**

### RECEITUÁRIO CONTROLE ESPECIAL

Paciente: \_\_\_\_\_

Endereço: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Prescrição: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

#### IDENTIFICAÇÃO DO COMPRADOR

Nome: \_\_\_\_\_

Identif.: \_\_\_\_\_ Órg. Emissor: \_\_\_\_\_

End.: \_\_\_\_\_

Cidade: \_\_\_\_\_ UF: \_\_\_\_\_

Telefone: \_\_\_\_\_

Cód. 110407 - Magengrafica

#### IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR

Assinatura do Farmacêutico \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

## SERVIÇO DE TERAPIA DA DOR

A Associação Internacional para o Estudo da Dor define dor como uma sensação ou experiência emocional desagradável, associada com dano tecidual real ou potencial, ou descrito nos termos de tal dano (1).

A queixa de dor varia individualmente e muitas vezes, não é diretamente proporcional à lesão tecidual pois sofre influência de diversos fatores como sensibilidade individual, depressão, ansiedade, falta de esperança, desamparo, entre outros (1).

O tratamento da dor requer uma cuidadosa avaliação inicial de sua natureza, conhecimento e compreensão dos diferentes tipos de dor e de suas causas, sendo o tratamento medicamentoso uma parte da estratégia de tratamento, que pode envolver aspectos necessidades de intervenções multiprofissionais (1).


### TRATAMENTO DA DOR

As necessidades individuais devem ser avaliadas previamente para tratamento da dor. A avaliação da temporalidade da dor, sendo aguda ou crônica, já direciona o tratamento imediato em caso de crise aguda.

Depois, a escolha do tratamento analgésico deve ser definida de acordo com a origem da dor, características, fatores desencadeantes, devendo-se avaliar também a necessidade de terapias adjuvantes.

### ESCALA ANALGÉSICA DA DOR

O tratamento da dor segue as diretrizes da Organização Mundial de Saúde (OMS), com ajustes necessários conforme cada caso clínico. A Escada Analgésica da OMS sugere a organização e padronização do tratamento analgésico da dor baseado em uma escada de três degraus de acordo com a intensidade de dor que o paciente apresenta.



Escada OMS(1)

SOLUÇÕES DE ANALGESIA - SACP’S

As Soluções de Analgesia são soluções padronizadas que devem ser prescritas por médicos através do sistema operacional Tasy®.

Todas as soluções de analgesia devem ser infundidas em bomba de PCA com instalação e programação exclusiva do médico e/ou enfermeiro mediante prescrição médica.

As fórmulas padronizadas estão descritas abaixo:

| SACP-1 (Endovenosa)                                                              |        |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------|
| Medicamento                                                                      | Volume | Via de Administração |
| Cloreto de Sódio 0,9% Bolsa 100ml #                                              | 97mL   | ENDOVENOSA           |
| Morfina 10mg (10mg/ml) Ampola 1ml #                                              | 3mL    |                      |
| Volume Total                                                                     | 100mL  |                      |
| SACP-2 (Epidural)                                                                |        |                      |
| Medicamento                                                                      | Volume | Via de Administração |
| Cloreto de Sódio 0,9% Bolsa 250ml #                                              | 123mL  | EPIDURAL             |
| LEVObupivacaína Cloridrato 0,5% (5mg/ml) Sem Vasoconstritor Frasco-ampola 20ml # | 15mL   |                      |
| FentaNILA 500mcg (50mcg/ml) Ampola 10ml                                          | 12mL   |                      |
| Volume Total                                                                     | 150mL  |                      |
| SACP-3 (Epidural)                                                                |        |                      |
| Medicamento                                                                      | Volume | Via de Administração |
| Cloreto de Sódio 0,9% Bolsa 250ml #                                              | 123mL  | EPIDURAL             |
| ROpivacaína 0,75% (7,5mg/ml) Ampola 20ml #                                       | 15mL   |                      |
| FentaNILA 500mcg (50mcg/ml) Ampola 10ml                                          | 12mL   |                      |
| Volume Total                                                                     | 150mL  |                      |
| SACP-4 (Endovenosa)                                                              |        |                      |
| Medicamento                                                                      | Volume | Via de Administração |
| Cloreto de Sódio 0,9% Bolsa 250ml #                                              | 123mL  | EPIDURAL             |
| Morfina 10mg (10mg/ml) Ampola 1ml #                                              | 3mL    |                      |
| Cetamina 50mg/ml Frasco-ampola 10ml                                              | ACM    |                      |
| Volume Total                                                                     | ACM    |                      |


| SACP-5 (Plexular)                          |              |                      |
|--------------------------------------------|--------------|----------------------|
| Medicamento                                | Volume       | Via de Administração |
| Cloreto de Sódio 0,9% Bolsa 100ml #        | 80mL         | PLEXULAR             |
| ROpivacaína 0,75% (7,5mg/ml) Ampola 20ml # | 20mL         |                      |
| <b>Volume Total</b>                        | <b>100mL</b> |                      |

| SACP-6 (Endovenosa)                     |              |                      |
|-----------------------------------------|--------------|----------------------|
| Medicamento                             | Volume       | Via de Administração |
| Cloreto de Sódio 0,9% Bolsa 100ml #     | 123mL        | ENDOVENOSA           |
| FentaNILA 500mcg (50mcg/ml) Ampola 10ml | 20mL         |                      |
| <b>Volume Total</b>                     | <b>150mL</b> |                      |

Para maiores informações verificar o protocolo institucional PR014 - Gerenciamento da Dor, disponível no Tasy®.

As soluções de uso endovenoso SACP1 e SACP6 devem se programadas em mg ou mcg.  
As soluções para uso em bloqueios SACP2, SACP3 e SACP5 devem ser programadas em mililitros (mL).

## Prescrição de SACP



## Bibliografia

1. MINISTÉRIO DA SAÚDE INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER (Rio de Janeiro). Instituto Nacional de Câncer (INCA). **Cuidados paliativos oncológicos**: Controle da Dor. 1. ed. atual. Rio de Janeiro: Gráfica do INCA, 2002. 201 p. v. 1. ISBN 85-7318-079-X.

## NUTRIÇÃO PARENTERAL

A Nutrição Parenteral é solução ou emulsão, composta basicamente de carboidratos, aminoácidos, lipídios, vitaminas e minerais, estéril e apirogênica, acondicionada em recipiente plástico, destinada à administração intravenosa, podendo ser total ou parcial, visando a síntese ou manutenção dos tecidos, órgãos ou sistemas.

É indicada quando a alimentação pelo trato gastrointestinal não é possível, quando a absorção é ineficiente, quando a alimentação por via oral não é recomendada e, principalmente, nos quadros de desnutrição. Pode ser administrada por via central ou periférica, dependendo da osmolaridade da solução.

As solicitações de Nutrição Parenteral devem ser feitas utilizando a prescrição eletrônica. Após preenchimento devem ser encaminhadas para a Farmácia Central ao Setor de Dispensação para que seja providenciada a sua preparação junto à Farmácia de Manipulação. Ver fluxograma abaixo.


O Hospital disponibiliza fórmulas padronizadas como uma opção para facilitar a prescrição, assim como as individualizadas que podem ser formuladas para a necessidade de cada paciente.

Outra opção disponível são as bolsas de nutrição parenteral prontas que são para uso imediato, porém não há a possibilidade de alterar componentes.

Em casos de dúvidas no momento de preenchimento da prescrição pode-se esclarecer com os Farmacêuticos nos telefones: 3549-0265 / 3549-0270.

## PRESCRIÇÕES DE DIETAS PARENTERAIS

As solicitações de Nutrição Parenteral, tanto as fórmulas padronizadas, individualizadas, quanto as prontas para uso devem ser feitas utilizando a prescrição eletrônica, na aba de prescrição Nutrição, NPT Adulto Protocolo:



Após a liberação da prescrição deve ser impresso duas cópias da prescrição protocolo que devem ser carimbadas e assinadas pelo médico prescritor, uma das vias será encaminhada para manipulação e a outra ficará arquivada no prontuário.

**FÓRMULAS PADRONIZADAS DE NUTRIÇÃO PARENTERAL**

| <b>Componentes</b>            | <b>NP1</b> | <b>NP2</b> | <b>NP3</b> | <b>NP4<br/>(periférica)</b> | <b>NP<br/>Hepato</b> |
|-------------------------------|------------|------------|------------|-----------------------------|----------------------|
| Aminoácidos 10%               | 500mL      | 500mL      | 450mL      | 400mL                       |                      |
| Aminoácidos 8%                |            |            |            |                             | 450mL                |
| Glicose 50%                   | 450mL      | 420mL      | 350mL      | 90mL                        | 440mL                |
| Glicose 5%                    |            |            |            |                             |                      |
| Lipídios 20% TCM/TCL          |            |            | 200mL      | 180mL                       | 100mL                |
| Lipídio 20% SMOF              |            | 100mL      |            |                             |                      |
| Cloreto de sódio 20%          | 7mL        | 8mL        | 8mL        | 4mL                         | 4mL                  |
| Acetato de sódio 10%          | 10mL       | 10mL       | 10mL       | 10mL                        | 5mL                  |
| Cloreto de potássio 19,1%     | 17mL       | 17mL       | 17mL       | 16mL                        | 16mL                 |
| Sulfato de magnésio 10%       | 12mL       | 12mL       | 12mL       | 12mL                        | 10mL                 |
| Gluconato de cálcio 10%       | 10mL       | 10mL       | 10mL       | 10mL                        | 10mL                 |
| Glycophós                     | 10mL       | 10mL       | 10mL       | 10mL                        | 8mL                  |
| Insulina regular humana       | 9UI        | 8UI        | 7UI        |                             |                      |
| Cerne 12                      | 5mL        | 5mL        | 5mL        | 5mL                         | 5mL                  |
| Oligoelemento adulto          | 2mL        | 2mL        | 2mL        | 2mL                         | 2mL                  |
| Selênio 6 mcg/mL              |            | 1mL        |            |                             |                      |
| Água destilada qsp            | 27mL       | 5mL        | 26mL       | 281mL                       |                      |
| VOLUME FINAL                  | 1050mL     | 1100mL     | 1100mL     | 1020mL                      | 1050mL               |
| DENSIDADE CALÓRICA            | 0,91       | 1,01       | 1,06       | 0,65                        | 1,04                 |
| VIA DE ADMINISTRAÇÃO          | Central    | Central    | Central    | Periférica                  | Central              |
| Gramaa/mL                     | 50         | 50         | 45         | 40                          | 36                   |
| Relação Kcal não proteica/g N | 96         | 114        | 138        | 80                          | 164,58               |
| % proteína                    | 20,72      | 18,28      | 15,85      | 25,12                       | 13,43                |
| OSMOLARIDADE                  | 1920,50    | 1769,87    | 1150,36    | 884,22                      | 1707,05              |
| Calorias/Bolsa                | 965        | 1094       | 1135       | 637                         | 1072                 |

**INDICAÇÕES CLÍNICAS**


---

**NP 1** - ADULTOS HIPERMETABÓLICOS COM TRIGLICERIDES ACIMA DE 400mg/dl

**NP 2** - ADULTOS HIPERMETABÓLICOS E HIPERCATAVÓLICOS "ALTO STRESS"  
COM INDICAÇÃO DE IMUNOMODULAÇÃO

---

---

**NP 3 – ADULTOS HIPERMETABÓLICOS COM ALTAS DEMANDAS ENERGÉTICAS**

---

**NP 4 – ADULTOS EM USO EXCLUSIVO EM VIA PARENTERAL PERIFÉRICAS POR PERÍODOS LIMITADOS – TEMPO MÁXIMO 7-10 DIAS**

---

**NP Hepatopata – ADULTOS COM NECESSIDADE DE NPT CENTRAL EM ENCEFALOPATIA HEPÁTICA GRAU III A IV**


---

| TIPO DE NUTRIÇÃO                                 | RECOMENDAÇÃO DE USO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>NP1</b><br>Central sem Lipídeos               | Nesta preparação completa para adulto tipo 2 em 1 (sem lipídeos) utiliza-se como fonte de calorias somente a glicose a 50%. A mistura de aminoácidos é convencional para casos sem transtornos metabólicos. Todos os eletrólitos, minerais e vitaminas usuais são acrescentados. Recomendado o uso em adultos sem adição de lipídeos por tempo máximo de 10 dias, acima desse prazo pode haver sintomas de deficiência de ácidos graxos essenciais. A fórmula hiperosmolar, consequentemente necessita de cateter venoso central para sua administração.      |
| <b>NP2</b><br>Central com Lipídeos               | Esta preparação completa com a diferença que parte das calorias da glicose é substituída por lipídeos (100 mL de emulsão a 20 % com w-3 3g/100mL) tem função imunomoduladora com ação em redução inflamatória generalizada além de ser acrescida de selênio.<br>Constitui-se, pois numa mistura moderna 3 em 1 (glicose lipídeos e aminoácidos). Todos os eletrólitos, minerais e vitaminas usuais são acrescentados. Requer o uso de cateter venoso central para sua administração.                                                                          |
| <b>NP3</b><br>Central com Lipídeos Hipercalórica | A principal diferença desta alternativa em relação à NP-2 consiste no teor e tipo de lipídeo TCL/TCM, que é maior (200 mL de emulsão a 20% por litro), com menor teor de glicose em composição. Todos os eletrólitos, minerais e vitaminas usuais são acrescentados.<br>A fórmula continua sendo hiperosmolar, consequentemente o cateter venoso central para sua administração.                                                                                                                                                                              |
| <b>NP4</b><br>Periférica                         | Nesta preparação completa para adulto tipo 3 em 1 (com lipídeos), a concentração de glicose foi reduzida para ofertar menor osmolaridade, possibilitando a oferta por veias periféricas. A mistura de aminoácidos é convencional, para casos sem transtornos metabólicos. Todos os eletrólitos, minerais e vitaminas são acrescentados. Ainda que dispensado o cateter venoso central aconselha-se efetuar-se o rodízio de veias (troca de posição a cada 72 horas, ou sempre que aparecer hiperemia ou irritação), a fim de prevenir eventual tromboflebite. |
| <b>NP Hepato</b>                                 | A principal diferença desta alternativa em relação à NP-3 consiste na composição de aminoácidos totais com maior proporção de AACR (aminoácidos de cadeia ramificada) e não necessitam de metabolismo hepático, indicado em casos de encefalopatia hepática graus III e IV. Todos os eletrólitos, minerais e vitaminas usuais são acrescentados.<br>A fórmula continua sendo hiperosmolar, consequentemente o cateter venoso central para sua administração.                                                                                                  |

FÓRMULAS DE NUTRIÇÃO PARENTERAL PRONTAS PARA USO

|                              | Olimel N4                                                                 | Olimel N9                                                                 | Smofkabiven                                                               |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Volume                       | 1000ml                                                                    | 1000ml                                                                    | 1477ml                                                                    |
| Via de administração         | Periférica                                                                | Central                                                                   | Central                                                                   |
| Eletrólitos                  | Sim                                                                       | Sim                                                                       | Sim                                                                       |
| Vitaminas e Sais<br>Mineiras | Não<br><br>Obs: devem<br>ser prescritos<br>a parte na aba<br>medicamento. | Não<br><br>Obs: devem<br>ser prescritos<br>a parte na aba<br>medicamento. | Não<br><br>Obs: devem<br>ser prescritos<br>a parte na aba<br>medicamento. |
| Osmolaridade                 | 760 mOsm/L                                                                | 1310 mOsm/L                                                               | 1500 mosm/L                                                               |

FLUXOGRAMA: SOLICITAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL





# FARMACOVIGILÂNCIA EM NUTRIÇÃO PARENTERAL

Em casos de ocorrerem intercorrências como instabilidade físico-química ou suspeita de Choque Pirogênico, preencher o Formulário de Farmacovigilância e encaminhar ao setor de Farmacovigilância. Ver fluxograma abaixo.




TABELA DE CONTRASTES

| Contraste Iodado Iônico                                                                                                                 |                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Princípio Ativo                                                                                                                         | Apresentação Comercial                           |
| Ácido ioxitalâmico<br>Meglumina<br>Hidróxido de sódio<br>Fosfato monossódico diidratado<br>Calciedetato de sódio                        | Telebrix Coronar (350mg de Iodo/mL)<br>FA 100mL  |
| Ácido ioxitalâmico<br>Fosfato de sódio monobásico diidratado<br>Calciedetato sódico<br>Meglumina<br>Polividona<br>Sulfito de sódio      | Telebrix Hystero FA 20mL                         |
| Ioxitalamato de Meglumina 660<br>Ácido ioxitalâmico<br>Fosfato de sódio monobásico diidratado<br>Edetato dissódico de cálcio diidratado | Telebrix 30 Meglumina (300mg de Iodo/mL) FA 50mL |
| Iodo<br>Ésteres Etílicos de Ácidos Graxos de Óleo de Papoula Iodado                                                                     | Lipiodol Uf (480mg de Iodo/mL)<br>Amp10mL        |
| Contraste Iodado não Iônico                                                                                                             |                                                  |
| Princípio Ativo                                                                                                                         | Apresentação Comercial                           |
| Iopamidol                                                                                                                               | Iopamiron 300 FA 20mL                            |
|                                                                                                                                         | Iopamiron 300 FA 50mL                            |
|                                                                                                                                         | Iopamiron 300 FA 100mL                           |
|                                                                                                                                         | Iopamiron 370 FA 50mL                            |
| Iopromida                                                                                                                               | Ultravist 300 (iodo 300mg/mL) FA 20mL            |
|                                                                                                                                         | Ultravist 300 (iodo 300mg/mL) FA 50mL            |
|                                                                                                                                         | Ultravist 300 (iodo 300mg/mL) FA 100mL*          |
|                                                                                                                                         | Ultravist 370 (iodo 370mg/mL) FA 50mL            |
|                                                                                                                                         | Ultravist 370 (iodo 370mg/mL) FA 100mL*          |
| Iodixanol                                                                                                                               | Visipaque (iodo 320mg/mL) FA 100mL               |
|                                                                                                                                         | Visipaque (iodo 320mg/mL) FA 50mL                |

|          |                                  |
|----------|----------------------------------|
| Ioversol | Optiray 320 ser Preenchida 75ml  |
|          | Optiray 320 ser Preenchida 100ml |
|          | Optiray 320 ser Preenchida 125ml |
|          | Optiray 350 ser Preenchida 100ml |
|          | Optiray 350 ser Preenchida 125ml |
|          | Optiray 350 ser Preenchida 75ml  |

*\*Contraste não padrão no HAOC*

**Contraste não iodado Iônico**

| Princípio Ativo            | Apresentação Comercial                    |
|----------------------------|-------------------------------------------|
| Ácido Gadotérico           | Dotarem 5mmol (0,5mmol/ml) FA 10ml        |
|                            | Dotarem 7,5mmol (0,5mmol/mL) FA 10mL *    |
|                            | Dotarem 7,5mmol (0,5mmol/mL) FA 15mL      |
|                            | Dotarem 10mmol (0,5mmol/ml) FA 20ml       |
| Gadobutrol                 | Gadovist 604,72mg/ml FA 15ml              |
| Gadopentetato de Dimeglumi | Magnevistan 469mg/mL (0,5mmol/mL) FA 10mL |
|                            | Magnevistan 469mg/mL (0,5mmol/mL) FA 15mL |
| Gadoxetato Dissódico       | Primovist 181,43mg / 0,25ml/ml ser 10ml   |

*\*Contraste não padrão no HAOC*

**Contraste Baritado**

| Princípio Ativo  | Apresentação Comercial                                      |
|------------------|-------------------------------------------------------------|
| Sulfato de Bário | Micropaque Scanner 0,05g/mL P/v Suspensão Oral Frasco 150mL |
|                  | Bariogel 100% (1g/mL) Suspensão Oral Copo 150mL             |
|                  | Readi-cat 2,1% Frasco 450mL                                 |

TABELA DE INSULINAS

| Ação          | Tipo                  | Nome comercial                       | Início da ação         | Pico de ação                | Duração          | Via de Administração |
|---------------|-----------------------|--------------------------------------|------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------|
| Ultrarrápida  | Lispro<br>Gluilisina  | Humalog<br>Apidra                    | < 15 min.<br>< 15 min. | 30 min. - 2h<br>30 min - 2h | 4 a 5h<br>3 a 4h | SC<br>SC             |
| Rápida        | Regular               | Novolin R<br>Insunorm R<br>Humulin R | 30 min a 1h.           | 2 a 3h                      | 5 a 8h           | SC / EV              |
| Intermediária | NPH                   | Novolin N<br>Insunorm N<br>Humulin N | 2 a 4h                 | 4 a 10h                     | 10 a 18h         | SC                   |
| Ultralenta    | Degludeca<br>Glargina | Tresiba<br>Lantus                    | ~ 1 h<br>2 a 4h        | ~9horas<br>Não apresenta    | 20 a 24h         | SC                   |

# TABELA DE RADIOFÁRMACOS

Os radiofármacos são compostos radioativos utilizados no diagnóstico e tratamento de patologias.

Em função de serem compostos radioativos, necessitam de cuidados especiais para transporte, armazenamento, manipulação e descarte, segundo normas estabelecidas pela Comissão Nacional de Energia Nuclear (CENEM), órgão que regulamenta e fiscaliza este tipo de produto.

O Hospital Alemão Oswaldo Cruz conta com uma seção de Radioterapia, onde são realizados procedimentos de diagnóstico e tratamento.

## RADIOFÁRMACOS NO HAOC

| PRINCÍPIO ATIVO                  | APRESENTAÇÃO COMERCIAL                   |
|----------------------------------|------------------------------------------|
| CITRATO DE GÁLIO                 | GÁLIO CITRATO IPEN                       |
| ÁC. DIMERCAPTOSUCCÍNICO          | ÁCIDO DMSA IPEN                          |
| DEXTRAN                          | DEXTRAN RADIOFÁRMACO IPEN                |
| ÁC. DIISOPROPILMINODIACÉTICO     | ÁCIDO DISIDA IPEN                        |
| ÁC. DIETILENOTRIAMINOPENTACÉTICO | ÁCIDO DTPA IPEN                          |
| ETILENODICISTEÍNA                | ECD RADIOFÁRMACO IPEN                    |
| FITATO SÓDIO                     | FITATO RADIOFÁRMACO IPEN                 |
| IODETO DE SÓDIO                  | IODO I -131 IODETOSÓDIO IPEN             |
| MACRO AGREGADO DE ALBUMINA       | MAA MACRO MACROAGREGADO DE ALBUMINA IPEN |
| METILENODIFOSFONATO              | MDP METILENODIFOSFONATO IPEN             |
| PIROFOSFATO DE SÓDIO             | PIROFOSFATO DE SÓDIO IPEN                |

TABELA DE MEDICAMENTOS RELACIONADOS À FLEBITE

ANTIMICROBIANOS

| Medicamento (nome comercial) | Princípio Ativo                       | pH            | Tempo de infusão       | Recomendações                                                                              |
|------------------------------|---------------------------------------|---------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ambisome®                    | Anfotericina B LIPOSSOMAL             | 5 a 6 (1)     | De 2 a 6 horas (2)     | **Alto Potencial para FLEBITE QUÍMICA**<br>Respeitar com rigor diluição e tempo de infusão |
| Avalox®                      | MOXifloxacino                         | 4,1 e 4,6 (2) | 60 minutos (2)         | **Alto Potencial para FLEBITE QUÍMICA**<br>Respeitar com rigor tempo de infusão            |
| Bactrim® / Bac-Sulfitrin®    | Sulfametoxazol + Trimetoprima         | 10 (1)        | De 60 min a 90 min (4) | **Alto Potencial para FLEBITE QUÍMICA**<br>Respeitar com rigor diluição e tempo de infusão |
| Bedfordpoly B®               | Polimixina B                          | 5 a 7,5 (4)   | 60 min a 90 min (4)    | **Alto Potencial para FLEBITE QUÍMICA**<br>Respeitar com rigor diluição e tempo de infusão |
| Cilinson®                    | Ampicilina                            | 8 a 10 (1)    | De 15min a 30 min (2)  | **Alto Potencial para FLEBITE QUÍMICA**<br>Respeitar com rigor diluição e tempo de infusão |
| Cipro®                       | CIPROfloxacino                        | 3,3 a 4,6 (1) | Mínimo 60 min (2)      | **Alto Potencial para FLEBITE QUÍMICA**<br>Respeitar com rigor tempo de infusão            |
| Claforan®                    | CefOTAXima                            | 5 a 7,5 (1)   | De 20 min a 60 min (2) | **Alto Potencial para FLEBITE QUÍMICA**<br>Respeitar com rigor diluição e tempo de infusão |
| Clavulin®                    | Amoxicilina + Clavulanato de Potássio | 8 a 10 (1)    | De 30 min a 40 min (2) | **Alto Potencial para FLEBITE QUÍMICA**<br>Respeitar com rigor diluição e tempo de infusão |

|                     |                  |               |                        |                                                                                            |
|---------------------|------------------|---------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cubicin®            | Daptomicina      | 4 a 5 (2)     | 30 min (4)             | **Alto Potencial para FLEBITE QUÍMICA**<br>Respeitar com rigor diluição e tempo de infusão |
| Kefazol®            | CeFAZolina       | 4,5 a 7 (1)   | De 30 min a 60 min (2) | **Alto Potencial para FLEBITE QUÍMICA**<br>Respeitar com rigor diluição e tempo de infusão |
| Keflin®             | CefaLOTina       | 4,5 a 7 (3)   | 30 minutos (2)         | **Alto Potencial para FLEBITE QUÍMICA**<br>Respeitar com rigor diluição e tempo de infusão |
| Klaricid®           | Claritromicina   | 4,8 a 6 (1)   | Mínimo 60 min          | **Alto Potencial para FLEBITE QUÍMICA**<br>Respeitar com rigor diluição e tempo de infusão |
| Levaquin®           | LEVOfloracino    | 3,8 a 5,8 (1) | De 60 min a 90 min (2) | **Alto Potencial para FLEBITE QUÍMICA**<br>Respeitar com rigor tempo de infusão            |
| Meropenem®          | MEROpenem        | 7,3 a 8,3 (1) | 15 min a 30 min (2)    | **Alto Potencial para FLEBITE QUÍMICA**<br>Respeitar com rigor diluição e tempo de infusão |
| Oxanon® / Oxacilin® | Oxacilina Sódica | 6 a 8,5 (4)   | 30 min a 60 min (5)    | **Alto Potencial para FLEBITE QUÍMICA**<br>Respeitar com rigor diluição e tempo de infusão |
| Rocefin EV®         | CeFTRIAXona      | 6,2 a 6,9 (1) | Mínimo 30 min (2)      | **Alto Potencial para FLEBITE QUÍMICA**<br>Respeitar com rigor diluição e tempo de infusão |
| Targocid®           | Teicoplanina     | 7,2 a 7,8 (1) | 30 min (2)             | **Alto Potencial para FLEBITE QUÍMICA**<br>Respeitar com rigor diluição e tempo de infusão |

|            |                               |               |                        |                                                                                            |
|------------|-------------------------------|---------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tazocin®   | Piperacilina + Tazobactam     | 6,2 a 6,7 (1) | De 20 min a 30 min (2) | **Alto Potencial para FLEBITE QUÍMICA**<br>Respeitar com rigor diluição e tempo de infusão |
| Tienam®    | Imipenem + Cilastatina Sódica | 6,5 a 7,5 (1) | De 30 min a 60 min (2) | **Alto Potencial para FLEBITE QUÍMICA**<br>Respeitar com rigor diluição e tempo de infusão |
| Vancocina® | Vancomicina                   | 2,5 a 4,5 (1) | Mínimo 60 min (2)      | **Alto Potencial para FLEBITE QUÍMICA**<br>Respeitar com rigor diluição e tempo de infusão |

OUTROS MEDICAMENTOS

| Medicamento (nome comercial) | Princípio Ativo        | pH            | Tempo de infusão            | Frases Tasy / Recomendações                                                     |
|------------------------------|------------------------|---------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| dipRivan®                    | Propofol               | 7 a 8,5 (4)   | ACM                         | **Alto Potencial para FLEBITE QUÍMICA**<br>Respeitar com rigor tempo de infusão |
| Endobulin Kiovig®            | Imunoglobulina G       | 4,6 a 5,1 (2) | 5g/hora em Bomba de Infusão | **Alto Potencial para FLEBITE QUÍMICA**<br>Respeitar com rigor tempo de infusão |
| Ferinject®                   | Carboximaltose Férrica | 5 a 7 (2)     | 15 min2                     | **Alto Potencial para FLEBITE QUÍMICA**<br>Respeitar com rigor tempo de infusão |
| Flebogamma®                  | Imunoglobulina Humana  | 4 a 6 (4)     | 5g/hora em Bomba de Infusão | **Alto Potencial para FLEBITE QUÍMICA**<br>Respeitar com rigor tempo de infusão |



|                 |                       |                |                             |                                                                                            |
|-----------------|-----------------------|----------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hidantal®       | Fenitoína             | 10 a 12,3 (4)  | não exceder 50 mg/min (2)   | **Alto Potencial para FLEBITE QUÍMICA**<br>Respeitar com rigor diluição e tempo de infusão |
| Noripurum®      | Hidróxido de Ferro    | 10,5 a 11 (2)  | 15 min para 100mg (2)       | **Alto Potencial para FLEBITE QUÍMICA**<br>Respeitar com rigor diluição e tempo de infusão |
| Pantozol®       | PANTOprazol           | 9,0 a 10,5 (4) | 15 min (2)                  | **Alto Potencial para FLEBITE QUÍMICA**<br>Respeitar com rigor diluição e tempo de infusão |
| Profenid®       | CEToprofeno           | 6,0 a 8,0 (2)  | 30min (2)                   | **Alto Potencial para FLEBITE QUÍMICA**<br>Respeitar com rigor diluição e tempo de infusão |
| Sandoglobulina® | Imunoglobulina Humana | 5 a 7 (4)      | 5g/hora em Bomba de Infusão | **Alto Potencial para FLEBITE QUÍMICA**<br>Respeitar com rigor diluição e tempo de infusão |

#### DROGAS VASOATIVAS

| Medicamento (nome comercial) | Princípio Ativo       | pH            | Tempo de infusão | Frase Tasy / Recomendações                                                                 |
|------------------------------|-----------------------|---------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Adren®                       | EPINEFrina/adrenalina | 2,2 a 5,0 (4) | ACM              | **Alto Potencial para FLEBITE QUÍMICA**<br>Respeitar com rigor diluição e tempo de infusão |
| Atlansil® / Ancoron® (*)     | AmioDARONA            | 4,1 (4)       | ACM              | **Alto Potencial para FLEBITE QUÍMICA**<br>Respeitar com rigor diluição e tempo de infusão |

|                     |                         |               |     |                                                                                            |
|---------------------|-------------------------|---------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dobutrex® / Dobtan® | DoBUTAmína              | 2,5 a 5,5 (4) | ACM | **Alto Potencial para FLEBITE QUÍMICA**<br>Respeitar com rigor diluição e tempo de infusão |
| Dopacris®           | DoPAmína                | 2,5 a 5,0 (4) | ACM | **Alto Potencial para FLEBITE QUÍMICA**<br>Respeitar com rigor diluição e tempo de infusão |
| Efedrin®            | eFEDRina                | 4,5 a 7,0 (4) | ACM | **Alto Potencial para FLEBITE QUÍMICA**<br>Respeitar com rigor diluição e tempo de infusão |
| Encrise®            | VASopressina            | 2,5 a 4,5 (4) | ACM | **Alto Potencial para FLEBITE QUÍMICA**<br>Respeitar com rigor diluição e tempo de infusão |
| Nitropruss®         | NitroPRUSSIATO de Sódio | 4,0 a 6,0     | ACM | **Alto Potencial para FLEBITE QUÍMICA**<br>Respeitar com rigor diluição e tempo de infusão |
| NOREpinefrina®      | NOREPinefrina           | 3,0 a 4,5 (4) | ACM | **Alto Potencial para FLEBITE QUÍMICA**<br>Respeitar com rigor diluição e tempo de infusão |
| Tridil®             | Nitroglicerina          | 3,0 a 6,5 (4) | ACM | **Alto Potencial para FLEBITE QUÍMICA**<br>Respeitar com rigor diluição e tempo de infusão |

| SOLUÇÕES / ELETRÓLITOS                             |                                             |                  |                      |                                                                                            |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Medicamento (nome comercial)                       | Princípio Ativo                             | Osmolaridade     | Tempo de infusão     | Frases Tasy / Recomendações                                                                |
| Bicarbonato de Sódio*                              | Bicarbonato de Sódio                        | 2000 mOsm/L (4)  | Varia com o peso (1) | **Alto Potencial para FLEBITE QUÍMICA**<br>Respeitar com rigor tempo de infusão            |
| Cloreto de Potássio* 19,1% (2.564 mEq/ml de K (2)) | Cloreto de Potássio 19,1%                   | 4000mOsm/L (4)   | ACM                  | Periférica: 10mEq/100ml- (máx. 10mEq/h)                                                    |
|                                                    |                                             |                  |                      | Central: 20 a 40mEq/100ml -(máx.40mEq/h)                                                   |
|                                                    |                                             |                  |                      | Conc. >0,1mEq/ml = Vesicante/Irritante                                                     |
| Mixistar® 0,8%                                     | NaCl 20% 40ml/ KCl 19,1% 10ml/SG 5% 1000 ml | 577,3 mOsm/L (2) | Varia com o peso (2) | **Alto Potencial para FLEBITE QUÍMICA**<br>Respeitar com rigor diluição e tempo de infusão |
|                                                    |                                             |                  |                      | **Alto Potencial para FLEBITE QUÍMICA**<br>Respeitar com rigor tempo de infusão            |
|                                                    |                                             |                  |                      | **Alto Potencial para FLEBITE QUÍMICA**<br>Respeitar com rigor tempo de infusão            |

| Legenda |                                                                                                                                                                                                               |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | Stranz, M. Infusion Drug List: pH, Osmolality, reported phlebitis. 2003                                                                                                                                       |
| 2       | Informações fornecidas pelo laboratório                                                                                                                                                                       |
| 3       | U.S. Pharmacopeia                                                                                                                                                                                             |
| 4       | TRISSEL, L.A. Handbook on Injectable Drugs. 15ªed. American Society of Health-System Pharmacists, 2009.                                                                                                       |
| 5       | University College London Hospitals. UCL Hospitals Injectable Medicines Administration Guide. 3ª ed. Wiley-Blackwell, 2010                                                                                    |
| 6       | UpToDate ®. Evidence-based Clinical Decision Support Resource.<br>Disponível em:<br><a href="http://www.uptodate.com/contents/search">http://www.uptodate.com/contents/search</a> . Acesso em: março de 2018. |

TABELA DE VASOATIVOS - DILUIÇÕES PADRONIZADAS NA UTI

| DROGA                                                         | DOSE    | DILUENTE  | CONCENTRAÇÃO FINAL | K    |
|---------------------------------------------------------------|---------|-----------|--------------------|------|
| <b>DOBUTAMINA</b><br>Não recomendável o uso puro              | 250mg   | SG 230 mL | 1mg/mL             | 16,7 |
|                                                               | 500mg   | SG 210 mL | 2mg/mL             | 33,3 |
|                                                               | 250mg   | SG 30 mL  | 5mg/mL             | 83,3 |
| <b>DOPAMINA</b><br>Não recomendável o uso puro                | 250mg   | SG 200 mL | 1mg/mL             | 16,7 |
|                                                               | 500mg   | SG 150 mL | 2mg/mL             | 33,3 |
| <b>NITROPRUSSIATO DE SÓDIO</b><br>Não recomendável o uso puro | 50mg    | SG 250 mL | 0,2mg/mL           | 3,33 |
| <b>LIDOCAÍNA 2%</b><br>s/ vaso<br>Não recomendável o uso puro |         | SG 200 mL | 4g/mL              | 66,7 |
|                                                               |         | SG 100 mL | 0,004g/mL          | 55,6 |
|                                                               |         | SG 50mL   | 5,7mg/mL           | 55,6 |
| <b>NITROGLICERINA</b><br>Não recomendável o uso puro          | 50mg/mL | SG 240 mL | 0,20mg/mL          | 3,33 |
| <b>NORADRENALINA/LEVOPHED</b><br>Não recomendável o uso puro  | 8mg     | SG 192 mL | 0,04mg/mL          | 0,66 |
|                                                               | 4mg     | SG 96 mL  | 0,04mg/mL          | 0,66 |
|                                                               |         |           | 0,08mg/mL          |      |

### **CÁLCULO PARA MEDICAMENTOS VASOATIVOS**

$$K = \frac{(\text{princípio ativo})\text{mg} \times 1000 / \text{volume total solução (vol. soluto + vol. solvente)}}{(\text{tempo } 60) \text{ min}}$$

#### **MCG/KG/MIN:**

Dosagem fornecida ao paciente em mcg num intervalo de tempo conhecido (1min), adequando os efeitos das drogas (dose) ao peso do paciente.

$$\frac{\text{mcg/kg/min} = \text{mL da solução} \times K}{\text{peso}}$$

# GLICOCORTICOIDES: EQUIVALÊNCIA DE DOSES

| Composto          | Potência Anti-inflamatória Relativa | Potência de Retenção de Sódio Relativa | Duração do Efeito (meia vida) | Dose equivalente aproximada (mg) para Administração VO e EV |
|-------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Betametasona      | 30                                  | 0                                      | L                             | 0,75                                                        |
| Cortisona         | 0,8                                 | 0,8                                    | C                             | 25                                                          |
| Dexametasona      | 30                                  | 0                                      | L                             | 0,75                                                        |
| Fludrocortisona   | 10                                  | 125                                    | C                             | 0                                                           |
| Hidrocortisona    | 1                                   | 1                                      | C                             | 20                                                          |
| Metilprednisolona | 5                                   | 0,5                                    | I                             | 4                                                           |
| Prednisona        | 4                                   | 0,8                                    | I                             | 5                                                           |
| Prednisolona      | 4                                   | 0,8                                    | I                             | 5                                                           |
| Triancinolona     | 5                                   | 0                                      | I                             | 4                                                           |

**Legenda:**

- L: Longa (36-72h)
- I: Intermediária (12-36h)
- C: Curta (8-12h)

**CORRELAÇÃO DE MEDIDAS DOMÉSTICAS**

| <b>Medida</b>                    | <b>g</b> | <b>cm<sup>3</sup></b> |
|----------------------------------|----------|-----------------------|
| 1 colher de café                 | 2,5      | 2,5                   |
| 1 colher de chá                  | 5        | 5                     |
| 1 colher de sobremesa            | 10       | 10                    |
| 1 colher de sopa                 | 15       | 15                    |
| 1 xícara média                   | 100      | 100                   |
| 1 copo                           | 200      | 200                   |
| 1 prato fundo abaixo da 1ª borda | 200      | 200                   |
| 1 prato fundo até a 1ª borda     | 250      | 250                   |
| ¼ litro                          | 250      | 250                   |



# CORRESPONDÊNCIA EM MEQ

O equivalente-grama de um elemento químico é a massa deste elemento que é capaz de reagir (ou deslocar) com 1g de hidrogênio ou 8g de oxigênio.

Na prática a proposta, mEquivalente pode ser calculada da seguinte forma:

$$1 \text{ mEq} = \frac{\text{peso molecular (gramas)}}{\text{Valência}} \times \frac{1}{100}$$

Em caso de conversão de Miliequivalentes em miligramas, usa-se a seguinte fórmula:

$$1\text{mg} = \frac{\text{mEq/L} \times \text{Peso atômico}}{10 \times \text{Valência}}$$

Para gases:

$$\text{Vol. \%} = \frac{\text{mEq/L} \times 22,4}{10}$$

## PESO MOLECULAR E VALÊNCIA:

| Elemento | Peso molecular | Valência |
|----------|----------------|----------|
| Cálcio   | 40             | 2        |
| Cloro    | 35,5           | 1        |
| Magnésio | 24             | 2        |
| Potássio | 39             | 1        |
| Sódio    | 23             | 1        |

| Eletrólito           | Concentração da<br>ampola | Fórmula Química                                                                        | Peso molecular       | mEq/mL (cátion) | mEq/mL (ânion) |
|----------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|----------------|
| Acetato de sódio     | 27,22%                    | CH <sub>3</sub> CONa <sub>3</sub> .H <sub>2</sub> O                                    | 136,10               | 2,00            | 2,00           |
| Acetato de zinco     | 5,49%                     | (CH <sub>3</sub> CO <sub>2</sub> ) <sub>2</sub> Zn . 2H <sub>2</sub> O                 | 219,50               | 0,50            | 0,50           |
| Bicarbonato de sódio | 8,4%                      | NaHCO <sub>3</sub>                                                                     | 84,10                | 1,00            | 1,00           |
| Cloreto de cálcio    | 10%                       | CaCl <sub>2</sub>                                                                      | 110,99               | 1,80            | 0,90           |
| Cloreto de potássio  | 19,1%                     | KCl                                                                                    | 74,55                | 2,56            | 2,56           |
| Cloreto de sódio     | 10%                       | NaCl                                                                                   | 58,44                | 1,71            | 1,71           |
| Cloreto de sódio     | 20%                       | NaCl                                                                                   | 58,44                | 3,42            | 3,42           |
| Fosfato de potássio  | 17,5%                     | KH <sub>2</sub> PO <sub>4</sub> monobásico<br>K <sub>2</sub> HPO <sub>4</sub> dibásico | 136,10<br>monobásico | 2,00            | 2,00           |
| Gluconato de cálcio  | 10%                       | C <sub>12</sub> H <sub>22</sub> CaO <sub>4</sub> . 7H <sub>2</sub> O                   | 448,40               | 0,45            | 0,45           |
| Sulfato de magnésio  | 10%                       | MgSO <sub>4</sub> . 7H <sub>2</sub> O                                                  | 246,50               | 0,81            | 0,81           |
| Sulfato de magnésio  | 50%                       | MgSO <sub>4</sub> . 7H <sub>2</sub> O                                                  | 246,50               | 4,06            | 4,06           |

# CORRESPONDÊNCIA IÔNICA

Os Eletrólitos auxiliam o controle híbrido corporal por meio da pressão osmótica. A pressão de uma determinada solução é referida em termos de osmoles ou miliosmoles e está relacionado com o número de partículas osmoticamente ativas, presentes na solução. Por exemplo: Um mMol de NaCl, que se dissocia em Na<sup>+</sup> e Cl<sup>-</sup> contribui com dois miliosmoles.

Assim 1 mMol de substância não ionizada, tal como glicose ou ureia, contribui com um mMol.

Na prática, o mMol pode ser calculado da seguinte forma:

$$\text{milimol/L (mMol/L)} = \frac{\text{concentração da substância em g/L} \times 1000}{\text{Peso molecular}}$$

|                            |                                                                |                        |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1g de sódio                | 43,5 mEq de Na <sup>+</sup>                                    | 43,5 mMol              |
| 1g de potássio             | 26 mEq de K <sup>+</sup>                                       | 26,0 mMol              |
| 1g de magnésio             | 82 mEq de Mg <sup>2+</sup>                                     | 41,0 mMol              |
| 1g de cálcio               | 50 mEq de Ca <sup>2+</sup>                                     | 25,0 mMol              |
| 1g de bicarbonato          | 16,3 mEq de (HCO3) <sup>-</sup>                                | 16,3 mMol              |
| 1g de sulfato              | 62,5 mEq de (SO4) <sup>-</sup>                                 | 31,2 mMol              |
| 1g de fósforo              | 64,5 mEq de (HPO4) <sup>-</sup>                                | 32,2 mMol              |
| 1g de fósforo              | 32,2 mEq de (H2PO4) <sup>-</sup>                               | 32,2 mMol              |
| 1g de cloreto de sódio     | 17mEq de Na <sup>+</sup><br>17 mEq de Cl <sup>-</sup>          | 17,0 mMol<br>17,0 mMol |
| 1g de cloreto de potássio  | 13,4 mEq de K <sup>+</sup><br>13,4 mEq de Cl <sup>-</sup>      | 13,4 mMol<br>13,4 mMol |
| 1g de cloreto de cálcio    | 13,6 mEq de Ca <sup>2+</sup><br>13,6 mEq de Cl <sup>-</sup>    | 6,8 mMol<br>13,6 mMol  |
| 1g de acetato de sódio     | 7,3 mEq de Na <sup>+</sup><br>7,3 mEq de acetato               | 7,3 mMol<br>7,3 mMol   |
| 1g de bicarbonato de sódio | 11,9 mEq de Na <sup>+</sup><br>11,9 mEq de (HCO3) <sup>-</sup> | 11,9 mMol<br>11,9 mMol |
| 1g de sulfato de magnésio  | 8,1 mEq de Mg <sup>2+</sup>                                    | 4,1 mMol               |
| 1g de gluconato de cálcio  | 4,5 mEq de Ca <sup>2+</sup>                                    | 2,2 mMol               |

**CORRELAÇÃO ENTRE DOSE, GOTAS E MILILITROS**

| <b>Nome Comercial</b>                                         | <b>Princípio Ativo</b>                               | <b>Indicação</b>                           | <b>Nº gotas/mL</b> |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------|
| Addera D3<br>(vitamina D3)<br>3300 UI/mL Gotas<br>Frasco 10ml | Colecalciferol (vitamina D3) 132ui/gota              | Vitaminas e Suplementos Minerais           | 25                 |
| Aderogil D3<br>(vitamina A + Vitamina D3)<br>Frasco 10ml      | Vitamina A 250ui/gota + Vitamina D3 100ui/gota Gotas | Vitaminas e Suplementos Minerais           | 22                 |
| Ad-TIL Gotas<br>Frasco 20ml                                   | Vitamina A 50000ui + Vitamina D3 10000ui / ml Gotas  | Vitaminas e Suplementos Minerais           | 40                 |
| Alivium 50mg/ml<br>Gotas Frasco 30ml                          | IBUprofeno Gotas 50mg/ml                             | Antiinflamatório não esteroideal sistêmico | 10                 |
| Amplicitil 40mg/mL<br>Gotas Frasco 20ml                       | Clorpromazina 4% Gotas                               | Antipsicótico, Neuroepilético              | 40                 |
| Ancoron gotas 200mg/mL<br>30mL Fr                             | Amiodarona 200mg/mL                                  | Antiarrítmicos                             | 20                 |
| Atrovent 0,25mg/ml<br>Gotas Frasco 20ml                       | IPRAtrópio 0,025% (250mcg/ml) Solução Gotas          | Broncodilatador                            | 20                 |
| Berotec 5mg/mL<br>Gotas Frasco 20mL                           | Fenoterol 0,5% Gotas                                 | Broncodilatador                            | 20                 |
| Biamotil 0,35% (3,5mg/mL)<br>5mL Fr                           | Ciprofloxacino Cloridrato 3,5mg/mL                   | Antimicrobiano Oftálmico                   | 22                 |
| Buscopan Simples 10mg/ml Gotas<br>Frasco 20ml                 | N-butilscopolamina Gotas 10mg/ml                     | Antiespasmódico                            | 20                 |
| Ciloxan 0,35% Colírio Frasco 5ml                              | Ciprofloxacino Cloridrato Colírio 3,5mg/ml           | Antimicrobiano Oftálmico                   | 31                 |
| CLONAzepam 2,5mg/ml Gotas<br>Frasco 20ml                      | Clonazepam 2,5mg/ml                                  | Ansiolítico                                | 25                 |
| Daforin 20mg/ml Gotas<br>Frasco 20ml                          | FLUoxetina Gotas 20mg/ml                             | Antidepressivo                             | 20                 |
| DIGESan 4mg/mL Gotas<br>Frasco 20ml                           | BromoPRIDA Gotas 4mg/ml                              | Antiemético e Procinético                  | 24                 |

| <b>Nome Comercial</b>                              | <b>Princípio Ativo</b>                               | <b>Indicação</b>              | <b>Nº gotas/mL</b> |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|
| Dorilen 5mg + 500mg + 10mg/1,5mL Gotas Frasco 15ml | Adifenina 10mg + Dipirona 500mg + Prometazina 5mg    | Analgésico e Antipirético     | 33                 |
| Guttalax 7,5mg/ml Gotas Frasco 20ml                | Picossulfato Sódico 7,5mg/ml Gotas                   | Laxante                       | 15                 |
| Haldol 2mg/ml Gotas Frasco 30ml                    | HaloPERidol Gotas 2mg/ml/20gts                       | Antipsicótico, Neuroepilético | 20                 |
| Lexapro 20mg/ml Gotas Frasco 15ml                  | ESCitalopram Gotas 20mg/ml                           | Antidepressivo                | 20                 |
| Longactil 40mg/mL Gotas Frasco 20ml                | Clorpromazina 4% Gotas                               | Antipsicótico e Neuroléptico  | 40                 |
| Luftal 75mg/ml Gotas Frasco 15ml                   | Simeticona Gotas 75mg/ml                             | Antifisético                  | 25                 |
| Mydriacyl 1% Colírio Solução Oftálmica Frasco 5ml  | Tropicamida 10mg/mL                                  | Midriático                    | 34                 |
| Neozine 40mg/mL Gotas Frasco 20ml                  | LevoMEPROmazina 4% Gotas                             | Antipsicótico e Neuroléptico  | 40                 |
| Neuleptil 40mg/ml Gotas Frasco 20ml                | Periciazina 4% (40mg/ml) Gotas                       | Antipsicótico e Neuroléptico  | 40                 |
| Novalgina 500mg/ml Frasco 10ml                     | DipiRONA Sódica Gotas 500mg/ml                       | Analgésico e Antipiréticos    | 20                 |
| Plamet 4 mg/mL Gotas Frasco 20ml - Dose            | BromoPRIDA Gotas 4mg/ml /24gts                       | Antiemético e Procinético     | 24                 |
| Rinosoro Gotas Frasco 30mL                         | Cloreto de Sódio 9mg/ml + Benzalcônio 0,1mg/ml Gotas | Descongestionante Nasal       | 26                 |
| Rivotril 2,5mg/ml Gotas Frasco 20ml                | Clonazepam Gotas 2,5mg/mL                            | Ansiolíticos                  | 25                 |
| Seki 20mg/ml Gotas Frasco 15ml                     | Cloperastina Gotas 20mg/ml                           | Antitussígenos                | 20                 |
| Sorine Infantil Gotas Frasco 30mL                  | Cloreto de Sódio 9mg/ml + Benzalcônio 0,1mg/ml Gotas | Descongestionante Nasal       | 26                 |
| Tylenol 200mg/ml Gotas Frasco 15ml                 | Paracetamol Gotas 200mg/ml                           | Analgésico e Antipiréticos    | 15                 |

## MEDICAMENTOS DE ALTA VIGILÂNCIA CLÁSSICA

**Definição:** Medicamentos de Alta Vigilância Clássica, eletrólitos concentrados e outras Classes terapêuticas potencialmente perigosas, são aqueles que apresentam alto risco de dano significativo ou fatal ao paciente caso sejam utilizados inadvertidamente

Compete aos profissionais envolvidos nas etapas de:

### PRESCRIÇÃO:

- ▶ Avaliar a indicação, paciente, dose e via antes de realizar a prescrição ou replicá-la;

### PREPARO E ADMINISTRAÇÃO:

- ▶ Atentar para destaque da fonte em prescrição eletrônica – MAIUSCULO NEGRITO.
- ▶ Em setores que por ventura ainda tenham prescrição manual, compete ao enfermeiro
- ▶ Sublinhar com caneta vermelha (nome, dose, via e frequência);
- ▶ Preparar e administrar medicamentos sempre de posse da prescrição medica;
- ▶ Identificar a solução com rotulo específico e aderir etiqueta vermelha ao equipo (1);
- ▶ Salientar ao paciente e familiares a importância de não mexerem nos dispositivos de infusão para segurança da administração;
- ▶ Conferir a velocidade de infusão antes da administração e a cada passagem de plantão;

### RECEBIMENTO:

- ▶ Conferir o item no ato do recebimento e aderir etiqueta vermelha em cada frasco;(2)

### ARMAZENAMENTO:

- ▶ Armazenar em local segregado, identificado e restringir acesso apenas aos setores autorizados pela política institucional. Nas unidades de internação os medicamentos atendidos na rotina deverão estar acondicionados em gaveta específica até o momento da utilização/devolução;

### DISTRIBUIÇÃO, DISPENSAÇÃO E DEVOLUÇÃO:

- ▶ Separar medicamento por meio da leitura de código de barras e embalar em saco plástico vermelho.(3)

### IDENTIFICAÇÃO VISUAL AO LONGO DO PROCESSO:

1 a

*Somente escrita manual*

1 b

1 c



2



### LEGENDA



*Lembre-se sempre da importância de notificar quaisquer eventos adversos relacionados ao processo.*



**7911 • ALTEPLASE**

**Fap 50mg**

**Risco:** Hemorragia

**Restrito a:** PA, Hemodinâmica



**4245 • CLORETO DE CÁLCIO 10%**

**Amp 10 ml**

**Risco:** Fibrilação Ventricular

**Restrito a:** Hemodinâmica



**1610 • CLORETO DE POTÁSSIO 19.1%**

**Amp 10ml**

**Risco:** Parada Cardíaca

**Restrito a:** PA, Hemodiálise,  
Hemodinâmica



**36208 • CLORETO DE SÓDIO 20%**

**Amp 10ml**

**Risco:** Hipernatremia e  
Hiperosmolaridade

**Restrito a:** PA, Hemodiálise,  
Hemodinâmica



**2224 • DOBUTAMINA**

**250mg Amp 20ml**

**Risco:** Arritmia

**Restrito a:** PA, CDI, Campo Belo  
Cardiologia, Hemodinâmica



**85758 • DOPAMINA**

**50mg Amp 10ml**

**Risco:** Hipertensão severa

**Restrito a:** PA, CDI, Campo Belo,  
Hemodinâmica



**1582 • EPINEFRINA/ADRENALINA**

**1mg Amp 1ml**

**Risco:** Hipertensão severa

**Restrito a:** PA, Endoscopia, Campo Belo,  
CDI, Hemodinâmica



**12370 • FENILEFRINA 1%**

**10mg Amp 1ml**

**Risco:** Hipertensão severa

**Restrito a:** Endoscopia



**113463 • FOSFATO POTÁSSIO 17,5%  
Amp 10ml**

**Risco:** Hiperfosfatemia, arritmia  
Não há estoque em setores assistenciais



**51768 • GLICEROFOSFATO DE  
SÓDIO (2mmol/ml de Sódio -  
1mmol/ml de Fósforo) Amp 20ml**

**Risco:** Hiperfosfatemia, arritmia Não há  
estoque em setores assistenciais



**113461 • GLUCONATO DE  
CÁLCIO 10% Amp 10ml**

**Risco:** Fibrilação ventricular  
**Restrito a:** PA, Hemodinâmica



**407 • HEPARINA SÓDICA  
25.000ui Fap 5ml**

**Risco:** Hemorragia  
**Restrito a:** PA, Hemodiálise, CDI,  
Hemodinâmica



**40203 • INSULINA HUMANA  
REGULAR 100ui/ml Fr 10ml**

**Risco:** Coma hipoglicêmico  
**Restrito a:** PA, Campo Belo



**467 • LIDOCAÍNA 2% SEM  
Vasoconstritor Fap 20ml**

**Risco:** Arritmia  
**Restrito a:** PA, CDI, Instituto da  
Próstata, Campo Belo, Hemodinâmica,  
Oncologia



**465 • LIDOCAÍNA 2% COM  
EPINEFRINA 5mcg/ml Fap 20ml**

**Risco:** Arritmia  
**Restrito a:** PA, Endoscopia, Campo Belo,  
Hemodinâmica, Caixa Dermatologia  
(UI\*)



**6261 • METOPROLOL  
5mg Amp 5ml**

**Risco:** Braquicardia severa  
**Restrito a:** PA, CDI, Endoscopia, Campo  
Belo, Cardiologia, Hemodinâmica





**857 • NITROPRUSIATO  
DE SÓDIO 50mg Fap 2ml**

**Risco:** Hipertensão severa

**Restrito a:** PA, Hemodinâmica



**1434 • NOREPINEFRINA  
8mg Amp 4ml**

**Risco:** Hipertensão severa

**Restrito a:** PA, CDI, Campo Belo,  
Hemodinâmica



**82403 • SUXAMETÔNIO  
100mg Fap**

**Risco:** Parada respiratória

**Restrito a:** PA, CDI, Endoscopia, Campo  
Belo, Hemodinâmica

MEDICAMENTOS DE ALTA VIGILÂNCIA POR FONÉTICA/ ESCRITA SEMELHANTE

Definição: Medicamentos de Alta Vigilância por Fonética/ Escrita Semelhante são aqueles que apresentam alto risco de dano em função de suas semelhanças fonéticas/ escritas, podendo induzir ao uso inadvertido.

| Descrição CD3* | Nome Comercial ou Princípio Ativo       | Descrição CD3* | Nome Comercial ou Princípio Ativo       |
|----------------|-----------------------------------------|----------------|-----------------------------------------|
| ALfentanila    | Rapifen®                                | fentaNILA      | Fentanil® / Fentanest® Durogesic®       |
| ALfentanila    | Rapifen®                                | SUFentanila    | Sufenta®                                |
| DIFENIDRAMina  | Benadryl® / Difenidrin®                 | eFEDRina       | Efedrina Sulfato                        |
| doBUTamina     | Dobutrex®                               | doPAMina       | Dopacris®                               |
| eFEDrina       | Efedrina Sulfato                        | EPINEFrina     | Adrenalina / Adren® Drenalin® / Hydren® |
| eFEDrina       | Efedrina Sulfato                        | FENILEFrina    | Fenilefrin®                             |
| EPINEFrina     | Adrenalina / Adren® Drenalin® / Hydren® | FENILEFrina    | Fenilefrin®                             |

| Descrição CD3* | Nome Comercial ou Princípio Ativo       | Descrição CD3* | Nome Comercial ou Princípio Ativo |
|----------------|-----------------------------------------|----------------|-----------------------------------|
| EPINEFrina     | Adrenalina / Adren® Drenalin® / Hydren® | NOREPinefrina  | Norepine®                         |
| FentaNIL®      | Fentanila Citrato Fentanest®            | SUFenta®       | Sufentanila Citrato               |
| fentaNILA      | Fentanil® / Fentanest® Durogesic®       | SUFentanila    | Sufenta®                          |
| HumALOG®       | Insulina lispro                         | HumULIN®       | Insulina humana                   |
| NEXium®        | Esomeprazol                             | NIMbium®       | Cisatracúrio                      |
| NIMbium®       | Cisatracúrio                            | NuBAIN®        | Nalbufina                         |
| nitroGLICERINA | Tridil® / Nitroderm®                    | nitroPRUSSIATO | Nitroprus®                        |

\* Descrição CD3: descrições MAIÚSCULAS nas sílabas diferentes entre os nomes semelhantes.

COMPETE AOS PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS NAS ETAPAS DE:

- **Identificação:** conferir cada item antes da identificação e aderir etiqueta com nome do produto com o símbolo # para medicamentos semelhantes por aparência e descrição CD3 para medicamentos semelhantes por fonética/escrita;
- **Prescrição:** Avaliar a indicação, paciente, dose e via antes de realizar a prescrição ou replicá-la. Atentar-se a descrição CD3 para medicamentos semelhantes por fonética/escrita;

► **Preparo e administração:**

- Atentar para o nome do produto com o símbolo # ao final da descrição para medicamentos semelhantes por aparência e o destaque da descrição CD3 para medicamentos semelhantes por fonética/escrita em prescrição eletrônica. Em setores que por ventura ainda tenham prescrição manual, compete ao enfermeiro sublinhar com caneta vermelha (nome, dose, via e frequência) antes da liberação para administração.
- Identificar o medicamento preparado, preferencialmente, com etiqueta emitida pelo sistema SIGHA-Tasy contendo o nome do produto com o símbolo # ao final da descrição para medicamentos semelhantes por aparência e o destaque da descrição CD3 para medicamentos semelhantes por fonética/escrita.
- Preparar e administrar medicamentos sempre de posse da prescrição médica;
  - **Aquisição:** Verificar disponibilidade no mercado de medicamentos não semelhantes;
  - **Recebimento:** Conferir cada item atentando-se à semelhança entre medicamentos.
  - **Armazenamento:** acondicionar em locais distintos e/ou distanciados, identificar com nome do produto contendo símbolo # ao final da descrição para medicamentos semelhantes por aparência e o destaque da descrição CD3 para medicamentos semelhantes por fonética/escrita.
  - **Distribuição, dispensação e devolução:** Separar medicamento por meio da leitura de código de barras, assegurando a dupla checagem eletrônica.

## MEDICAMENTOS DE ALTA VIGILÂNCIA POR APARÊNCIA SEMELHANTE

### DEMAIS CLASSES TERAPÊUTICAS



**76392**  
**Novalgina 500mg/ml Amp 2ml #**  
Analgésico e Antipirético



**239571**  
**Atropion 0,5mg/ml Amp 1ml #**  
Antiarrítmico



**238016**  
**Ancoron 150mg Amp 3ml #**  
Antiarrítmico



**538**  
**Adenocard 6mg Amp 2ml #**  
Antiarrítmico



**23479**  
**Dormire 15mg (5mg/ml) Amp 3ml #**  
Hipnótico



**23480**  
**Dormire 5mg (1mg/ml) Amp 5ml #**  
Hipnótico



**19462**  
**Difenidrin 50mg/ml**  
**Amp 1ml #**  
Anti-Histamínicos H1



**52371**  
**Efedrina 50mg/ml**  
**Amp 1ml #**  
Estimulante Adrenérgico



**76513**  
**Fenilefrin 1% 10mg**  
**Amp 1ml #**  
Estimulante Adrenérgico



**839**  
**Aramin 10mg**  
**Amp 1ml #**  
Estimulante Adrenérgico



**242703**  
**Tramadol 100mg Amp 2ml #**  
**União Química**  
Analgésico Narcótico



**1296**  
**Dimorf 2mg Amp 2ml #**  
Analgésico Narcótico



**1300**  
**Dimorf 10mg**  
**Amp 1ml #**  
Analgésico Narcótico



**1534**  
**Nubain 10mg**  
**Amp 1ml #**  
Analgésico narcótico



**240922**  
**Dopamina Cloridrato 50mg (5mg/  
ml) Amp 10ml (teuto) #**  
Estimulante Adrenérgico



**501**  
**Dramin B6 DI (iv) Amp 10ml #**  
Antiemético, Antivertiginoso



**448**  
**Neocaína 0,5% (sem  
adrenalina) Fap 20ml #**  
Anestésico local



**24111**  
**Xylestesin 1,0%  
(sem vasoconstritor)  
Fap 20ml #**  
Anestésico local



**82068**  
**Novabupi 0,5%  
(sem vasoconstritor)  
Fap 20ml #**  
Anestésico local



**24106**  
**Xylestesin 2,0%  
(sem vasoconstritor)  
Fap 20ml #**  
Anestésico local



**44261**  
**Neocaína Pesada  
0,5%  
Amp 4ml #**  
Anestésico Local



**85348**  
**Xylestesin 2%  
Isobárica  
Amp 5ml #**  
Anestésico Local



**114330**  
**Neocaína  
Isobárica 0,5%  
Amp 4ml #**  
Anestésico  
Local

MEDICAMENTOS DE ALTA VIGILÂNCIA POR APARÊNCIA SEMELHANTE

Definição: Medicamentos de Alta Vigilância por Aparência Semelhante são aqueles que apresentam alto risco de dano em função de suas semelhanças físicas, podendo induzir ao uso inadvertido.

| Tipo      | HIPOGLICEMIANTES - INSULINAS                                                        |                                                                                     |                                            | Início Ação                         | Via                                |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| Glulisina |    |    | <b>Apidra®</b><br>(Sanofi - Aventis)       | ULTRA-RÁPIDA<br>15 min              | SC                                 |
| Lispro    |    |    | <b>Humalog®</b><br>(Eli Lilly)             | ULTRA-RÁPIDA<br>15 min              | SC                                 |
| Regular   |    |    | <b>Humulin® R</b><br>(Eli Lilly)<br>Código | <b>Novolin® R</b><br>(Novo Nordisk) | RÁPIDA<br>30 min<br><br>EV         |
| NPH       |  |  | <b>Humulin® N</b><br>(Eli Lilly)           | <b>Novolin® N</b><br>(Novo Nordisk) | INTERME-DIÁRIA<br>60 min<br><br>SC |
| Glargina  |  |  | <b>Lantus®</b><br>(Sanofi - Aventis)       | ULTRA-LENTA<br>90 min               | SC                                 |

## MEDICAMENTOS SEMELHANTES POR FONÉTICA E/OU ESCRITA

| DROGA 1 POR FONÉTICA/ESCRITA SEMELHANTE | DESCRIÇÃO CD3  | NOME COMERCIAL OU PRINCÍPIO ATIVO (DROGA 1) | INDICAÇÃO TERAPEÚTICA     | DROGA 2 POR FONÉTICA/ESCRITA SEMELHANTE | DESCRIÇÃO CD3   | NOME COMERCIAL OU PRINCÍPIO ATIVO (DROGA 2) | INDICAÇÃO TERAPEÚTICA                      |
|-----------------------------------------|----------------|---------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Abciximabe                              | ABCIXimabe     | Reopro                                      | Antiagregante Plaquetário | Bevacizumabe                            | BEVACizu-mabe   | Avastin                                     | Antineoplásico Citotóxico                  |
| Acetilcisteína                          | ACETILcisteína | Fluimucil                                   | Mucolítico                | Carbocisteína                           | CARBOcis-teína  | Mucofan/ Mu-coltic                          | Mucolítico                                 |
| Aciclovir                               | ACiclovir      | Aciclovir                                   | Antiviral                 | Ganciclovir                             | GANciclovir     | Cymevene                                    | Antivirais Cito-tóxicos                    |
| Aciclovir                               | ACiclovir      | Aciclovir                                   | Antivirais                | Valaciclovir                            | ValACiclovir    | Valtrex                                     | Antivirais Cito-tóxicos                    |
| Aciclovir                               | ACiclovir      | Aciclovir                                   | Antivirais                | Valganciclovir (não padrão)             | ValGANCi-clovir | Valcyte                                     | Antivirais Cito-tóxicos                    |
| Aciclovir                               | ACiclovir      | Aciclovir                                   | Antivirais                | Fanciclovir (não padrão)                | FANciclovir     | Penvir                                      | Antivirais Cito-tóxicos                    |
| Ácido Fólico                            | Ácido FoliNico | Ácido Fólico                                | Antianêmico               | Ácido Folinico                          | Ácido Fólico    | Fauldleuco/ Leucovorin                      | Antianêmicos                               |
| Ácido Folinico                          | Ácido Fólico   | Fauldleuco/ Leucovorin                      | Antianêmicos              | Ácido Fólico                            | Ácido Foll-Nico | Ácido Fólico                                | Antianêmico                                |
| Ad-Til                                  | Ad-TIL         | Vit.A/Vit.D                                 | Poli vitamínico           | Advil                                   | Advil           | Ibuprofeno                                  | Antiinflamatório não esteroi-dal sistêmico |

MEDICAMENTOS SEMELHANTES POR FONÉTICA/ ESCRITA

| DROGA 1 POR FONÉTICA/ESCRITA SEMELHANTE | DESCRIÇÃO CD3 | NOME COMERCIAL OU PRINCÍPIO ATIVO (DROGA 1) | INDICAÇÃO TERAPEÚTICA                     | DROGA 2 POR FONÉTICA/ESCRITA SEMELHANTE | DESCRIÇÃO CD3 | NOME COMERCIAL OU PRINCÍPIO ATIVO (DROGA 2) | INDICAÇÃO TERAPEÚTICA        |
|-----------------------------------------|---------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------|---------------------------------------------|------------------------------|
| Advil                                   | Advil         | Ibuprofeno                                  | Antiinflamatório não esteroidal sistêmico | Ad-Til                                  | Ad-Til        | Vit.A/Vit.D                                 | Polivitamínico               |
| Alfentanila                             | ALfentanila   | Rapifen                                     | Analgésicos Narcóticos                    | Fentanila                               | FENTanila     | Fentanil / Fen-tanest Durogesic             | Analgésico Narcótico         |
| Alfentanila                             | ALfentanila   | Rapifen                                     | Analgésicos Narcóticos                    | Sufentanila                             | SUFentanila   | Sufenta                                     | Analgésico Narcótico         |
| Alkeran                                 | ALkeran       | Melfalano                                   | Antineoplásico                            | Leukeran                                | LEUkeran      | Clorambucila                                | Antineoplásico               |
| Alopurinol                              | AloPURinol    | Alopurinol                                  | Antigotoso                                | Haloperidol                             | HaloPERIdol   | Haldol                                      | Antipsicótico, Neurolépticos |
| Alprazolam                              | ALPRAZOlam    | Frontal                                     | Ansiolítico                               | Lorazepam                               | LORAZEPam     | Lorax                                       | Ansiolítico                  |
| Alprazolam                              | ALPRAZolam    | Apraz/Frontal                               | Ansiolíticos                              | Cloxadolam                              | CLOXAZolam    | Olcadil                                     | Ansiolíticos                 |
| Alprazolam                              | ALPRAZolam    | Apraz/Frontal                               | Ansiolíticos                              | Midazolam                               | MIDAZolam     | Dormine/ Dor-monid                          | Hipnóticos                   |
| Amaryl                                  | AMARyl        | Glimepirida                                 | Hipoglicemiante                           | Reminyl                                 | REMInyl       | Galantamina                                 | Anticolinesté-rásicos        |



## MEDICAMENTOS SEMELHANTES POR FONÉTICA/ ESCRITA

| DROGA 1 POR FONÉTICA/ESCRITA SEMELHANTE | DESCRIÇÃO CD3               | NOME COMERCIAL OU PRINCÍPIO ATIVO (DROGA 1) | INDICAÇÃO TERAPEÚTICA | DROGA 2 POR FONÉTICA/ESCRITA SEMELHANTE    | DESCRIÇÃO CD3                            | NOME COMERCIAL OU PRINCÍPIO ATIVO (DROGA 2) | INDICAÇÃO TERAPEÚTICA |
|-----------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------|
| Aminofilina                             | AminOFILina                 | Aminofilina                                 | Broncodilatador       | Amiodarona                                 | AmioDARO-NA                              | Ancoron/Atlansil                            | Antiarrítmico         |
| Amiodarona                              | AmioDARONA                  | Ancoron/Atlansil                            | Antiarrítmico         | Aminofilina                                | AminOFILina                              | Aminofilina                                 | Broncodilatador       |
| Amitriptilina                           | AmiTRIPTilina               | Amytril                                     | Antidepressivos       | Nortriptilina                              | NORtripilina                             | Pamelor                                     | Antidepressivo        |
| Anfotericina B lipídica                 | Anfotericina B LIPÍDICA     | Abelcet                                     | Fungicida             | Anfotericina B (lipossomal e desoxicolato) | Anfotericina B LIPOSSOMAL E DESOXICOLATO | Ambisome/Abelcet                            | Fungicida             |
| Anfotericina B lipossomal               | Anfotericina B LIPOSSOMAL   | Ambisome                                    | Fungicida             | Anfotericina B complexo lipídico           | Anfotericina B COMPLEXO LIPÍDICO         | Ambisome/Abelcet                            | Fungicida             |
| Anfotericina B, desoxicolato            | Anfotericina B DESOXICOLATO | Fungizon                                    | Fungicida             | Anfotericina B ( lipossomal e lipídica )   | Anfotericina B LIPOSSOMAL E LIPÍDICA     | Ambisome/Abelcet                            | Fungicida             |
| Anidulafungina                          | ANIDULAfungina              | Ecalta                                      | Antifúngico Sistêmico | Caspofungina                               | CASPOfungina                             | Cancidas                                    | Antifúngico Sistêmico |
| Anidulafungina                          | ANIDULAfungina              | Ecalta                                      | Antifúngico Sistêmico | Fusafungina                                | FUSAFungina                              | Locabiotol                                  | Broncodilatadores     |

MEDICAMENTOS SEMELHANTES POR FONÉTICA/ ESCRITA

| DROGA 1 POR FONÉTICA/ESCRITA SEMELHANTE | DESCRIÇÃO CD3  | NOME COMERCIAL OU PRINCÍPIO ATIVO (DROGA 1) | INDICAÇÃO TERAPEÚTICA     | DROGA 2 POR FONÉTICA/ESCRITA SEMELHANTE | DESCRIÇÃO CD3 | NOME COMERCIAL OU PRINCÍPIO ATIVO (DROGA 2) | INDICAÇÃO TERAPEÚTICA     |
|-----------------------------------------|----------------|---------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------|---------------|---------------------------------------------|---------------------------|
| Anidulafungina                          | ANIDULAfungina | Ecalta                                      | Antifúngico Sistêmico     | Micafungina                             | MICAfungina   | Mycamine                                    | Antifúngico Sistêmico     |
| Anzemet                                 | ANZEmet        | Dolasetrona                                 | Antiemético, Procinético  | Avandamet                               | AVANDAmet     | Rosiglitazona/metformina                    | Hipoglicemiantes          |
| Atorvastatina                           | ATORvastatina  | Lípitor                                     | Hipolipêmico              | Sinvastatina                            | SINVastatina  | Zocor                                       | Hipolipêmico              |
| Atorvastatina                           | ATORvastatina  | Lípitor                                     | Hipolipêmico              | Pravastatina                            | PRAVastatina  | Pravastatina                                | Hipolipêmico              |
| Atorvastatina                           | ATORvastatina  | Lípitor                                     | Hipolipêmico              | Rosuvastatina                           | ROSUvastatina | Crestor                                     | Hipolipêmico              |
| Avandamet                               | AVANDAmet      | Rosiglitazona/metformina                    | Hipoglicemiantes          | Anzemet                                 | ANZEmet       | Dolasetrona                                 | Antiemético, Procinético  |
| Azatioprina                             | AzaTIOprina    | Imunem                                      | Imunossupressor           | Azitromicina                            | AZITromicina  | Zitromax                                    | Antimicrobiano Macrolídeo |
| Azitromicina                            | AZITromicina   | Zitromax                                    | Antimicrobiano Macrolídeo | Azatioprina                             | AzaTIOprina   | Imunem                                      | Imunossupressor           |
| Azitromicina                            | AZITROMICINA   | Zitromax                                    | Antibiótico               | Aztreonan                               | AzTREONAN     | Aztreonan                                   | Antibiótico               |

MEDICAMENTOS SEMELHANTES POR FONÉTICA/ ESCRITA

| DROGA 1 POR FONÉTICA/ESCRITA SEMELHANTE | DESCRIÇÃO CD3      | NOME COMERCIAL OU PRINCÍPIO ATIVO (DROGA 1) | INDICAÇÃO TERAPEÚTICA                         | DROGA 2 POR FONÉTICA/ESCRITA SEMELHANTE | DESCRIÇÃO CD3      | NOME COMERCIAL OU PRINCÍPIO ATIVO (DROGA 2) | INDICAÇÃO TERAPEÚTICA                         |
|-----------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Aztreonan                               | AZTREONAN          | Aztreonan                                   | Antibiótico                                   | Azitromicina                            | AZITROMI-<br>CINA  | Zitromax                                    | Antibiótico                                   |
| Basiliximabe                            | BASILIXIMABE       | Simulect                                    | Imunossupressor                               | Bevacizumabe                            | BEVACIZU-<br>mabe  | Avastin                                     | Antineoplásico<br>Citotóxico                  |
| Beclometasona                           | BECLOMETASO-<br>na | Clenil A                                    | Antiinflamatório<br>esteroidal siste-<br>mico | Betametasona                            | BETAmeta-<br>sona  | Betametasona                                | Antiinflamató-<br>rio esteroidal<br>sistêmico |
| Beclometasona                           | BECLOMETASO-<br>na | Clenil A                                    | Antiinflamatório<br>esteroidal siste-<br>mico | Dexametasona                            | DEXAmeta-<br>sona  | Decadron                                    | Antiinflamató-<br>rio esteroidal<br>sistêmico |
| Betametasona                            | BETAmetasona       | Betametasona                                | Antiinflamatório<br>esteroidal siste-<br>mico | Dexametasona                            | DEXAmeta-<br>sona  | Decadron                                    | Antiinflamató-<br>rio esteroidal<br>sistêmico |
| Betametasona                            | BETAmetasona       | Betametasona                                | Antiinflamatório<br>esteroidal siste-<br>mico | Beclometasona                           | BECLOMETASO-<br>na | Clenil A                                    | Antiinflamató-<br>rio esteroidal<br>sistêmico |
| Bevacizumabe                            | BEVACIZUMABE       | Avastin                                     | Antineoplásico<br>Citotóxico                  | Abciximabe                              | ABCIXIMABE         | Reopro                                      | Antiagregante<br>Plaquetário                  |
| Bevacizumabe                            | BEVACIZUMABE       | Avastin                                     | Antineoplásico<br>Citotóxico                  | Basiliximabe                            | BASILIXIMABE       | Simulect                                    | Imunossupres-<br>sor                          |

MEDICAMENTOS SEMELHANTES POR FONÉTICA/ ESCRITA

| DROGA 1 POR FONÉTICA/ESCRITA SEMELHANTE | DESCRIÇÃO CD3 | NOME COMERCIAL OU PRINCÍPIO ATIVO (DROGA 1) | INDICAÇÃO TERAPÊUTICA       | DROGA 2 POR FONÉTICA/ESCRITA SEMELHANTE | DESCRIÇÃO CD3   | NOME COMERCIAL OU PRINCÍPIO ATIVO (DROGA 2) | INDICAÇÃO TERAPÊUTICA          |
|-----------------------------------------|---------------|---------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------|--------------------------------|
| Bevacizumabe                            | BEVACizumabe  | Avastin                                     | Antineoplásico Citotóxico   | Rituximabe                              | RiTUXimabe      | Mabthera                                    | Antineoplásico Citotóxico      |
| Bevacizumabe                            | BEVACizumabe  | Avastin                                     | Antineoplásico Citotóxico   | Trastuzumabe                            | TRASTuzu-mabe   | Herceptin                                   | Antineoplásico Citotóxico      |
| Bisoprolol                              | BISOprolol    | Concor                                      | Agentes Anti-Hipertensivos  | Metoprolol                              | METOprolol      | Seloken e Se-lozok                          | Agentes Anti-Hipertensivos     |
| Bleomicina                              | BLEOmicina    | Bonar                                       | Antineoplásicos Citotóxicos | Mitomicina                              | MitoMlcina      | Mitocin                                     | Antineoplásico Citotóxico      |
| Bleomicina                              | BLEOmicina    | Bonar                                       | Antineoplásicos Citotóxicos | Neomicina                               | NEOmicina       | Neomicina                                   | Antimicrobiano Aminoglicosídeo |
| Bleomicina                              | BLEOmicina    | Bonar                                       | Antineoplásicos Citotóxicos | Claritromicina                          | CLARITRO-micina | Klaricid                                    | Antimicrobiano Macrolídeo      |
| Bleomicina                              | BLEOmicina    | Bonar                                       | Antineoplásicos Citotóxicos | Vancomicina                             | VANCOMi-cina    | Vancocina                                   | Antimicrobiano Glicopeptídeo   |
| Bleomicina                              | BLEOmicina    | Bonar                                       | Antineoplásicos Citotóxicos | Tobramicina                             | TOBRAmicina     | Tobrex e Tobi                               | Antimicrobiano Aminoglicosídeo |
| Bleomicina                              | BLEOmicina    | Bonar                                       | Antineoplásicos Citotóxicos | Gentamicina                             | GENTAmicina     | Gentamicin                                  | Antimicrobiano Aminoglicosídeo |

MEDICAMENTOS SEMELHANTES POR FONÉTICA/ ESCRITA

| DROGA 1 POR FONÉTICA/ESCRITA SEMELHANTE | DESCRIÇÃO CD3 | NOME COMERCIAL OU PRINCÍPIO ATIVO (DROGA 1) | INDICAÇÃO TERAPÊUTICA       | DROGA 2 POR FONÉTICA/ESCRITA SEMELHANTE | DESCRIÇÃO CD3 | NOME COMERCIAL OU PRINCÍPIO ATIVO (DROGA 2) | INDICAÇÃO TERAPÊUTICA       |
|-----------------------------------------|---------------|---------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|---------------|---------------------------------------------|-----------------------------|
| Bleomicina                              | BLEOmicina    | Bonar                                       | Antineoplásicos Citotóxicos | Rifamicina                              | RIFAmicina    | Rifocina                                    | Antimicrobiano Tópico       |
| Bleomicina                              | BLEOmicina    | Bonar                                       | Antineoplásicos Citotóxicos | Garamicina                              | GARAMicina    | Garamicina                                  | Antimicrobiano Tópico       |
| Bleomicina                              | BLEOmicina    | Bonar                                       | Antineoplásicos Citotóxicos | Vibramicina                             | VIBRAmicina   | Vibramicina                                 | Antimicrobiano Tetraciclina |
| Bleomicina                              | BLEOmicina    | Bonar                                       | Antineoplásicos Citotóxicos | Eritomicina                             | ERITROmi-cina | Eritrex                                     | Antimicrobiano Macrolídeo   |
| Bleomicina                              | BLEOmicina    | Bonar                                       | Antineoplásicos Citotóxicos | Clindamicina                            | CLINDAmi-cina | Dalacin                                     | Antimicrobiano Lincosamida  |
| Bleomicina                              | BLEOmicina    | Bonar                                       | Antineoplásicos Citotóxicos | Daptomicina                             | DAPTOmicina   | Cubicin                                     | Antimicrobiano Lipopeptídeo |
| Bromazepam                              | BROMAzepam    | Lexotan / So-mallum                         | Ansiolíticos                | Clonazepam                              | CLONAzepam    | Rivotril                                    | Anticonvulsivantes          |
| Bromazepam                              | BROMAzepam    | Lexotan / So-mallum                         | Ansiolíticos                | Diazepam                                | DIAZepam      | Dienpax/Valium                              | Ansiolíticos                |
| Bromazepam                              | BROMAzepam    | Lexotan / So-mallum                         | Ansiolíticos                | Lorazepam                               | LORAzepam     | Lorax/ Loraze-fast                          | Ansiolíticos                |

**MEDICAMENTOS SEMELHANTES POR FONÉTICA/ ESCRITA**

| DROGA 1 POR FONÉTICA/ESCRITA SEMELHANTE | DESCRIÇÃO CD3  | NOME COMERCIAL OU PRINCÍPIO ATIVO (DROGA 1) | INDICAÇÃO TERAPÊUTICA         | DROGA 2 POR FONÉTICA/ESCRITA SEMELHANTE | DESCRIÇÃO CD3   | NOME COMERCIAL OU PRINCÍPIO ATIVO (DROGA 2) | INDICAÇÃO TERAPÊUTICA    |
|-----------------------------------------|----------------|---------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------|--------------------------|
| Bromazepam                              | BROMAZepam     | Lexotan / So-malium                         | Ansiolíticos                  | Flurazepam                              | FLURAZepam      | Rohydorm/ Rohypnol                          | Hipnóticos               |
| Bromazepam                              | BROMAZepam     | Lexotan / So-malium                         | Ansiolíticos                  | Flunitrazepam                           | FLUNITRAZepam   | Rohydorm/ Rohypnol                          | Hipnóticos               |
| Bromocriptina                           | BromoCRIP-TINA | Parlodel                                    | Antiparkinsoniano             | Bromoprida                              | BromoPRIDA      | Bromoprida                                  | Antiemético, Procinético |
| Bromoprida                              | BromoPRIDA     | Bromoprida                                  | Antiemético, Procinético      | Bromocriptina                           | BromoCRIP-TINA  | Parlodel                                    | Antiparkinsoniano        |
| Bupivacaína                             | BUPivacaína    | Neocaína                                    | Anestésico Local              | Levobupivacaína                         | LEVOBupivacaína | Novabupi                                    | Anestésico Local         |
| Bupivacaína                             | BUPivacaína    | Neocaína                                    | Anestésico Local              | Ropivacaína                             | ROPivacaína     | Naropin                                     | Anestésico Local         |
| Bupropiona                              | BuPROPiona     | Wellbutrin                                  | Antidepressivo                | Buspirona                               | BusPIRona       | Ansitec                                     | Ansiolítico              |
| Buspirona                               | BusPIRona      | Ansitec                                     | Ansiolítico                   | Bupropiona                              | BuPROPiona      | Wellbutrin                                  | Antidepressivo           |
| Calcitriol                              | CalciTRIOL     | Calcijex                                    | Vitamina e suplemento mineral | Carvedilol                              | CarVEDilol      | Cardilol                                    | Agente Anti-Hipertensivo |

MEDICAMENTOS SEMELHANTES POR FONÉTICA/ ESCRITA

| DROGA 1 POR FONÉTICA/ESCRITA SEMELHANTE | DESCRIÇÃO CD3 | NOME COMERCIAL OU PRINCÍPIO ATIVO (DROGA 1) | INDICAÇÃO TERAPÊUTICA                   | DROGA 2 POR FONÉTICA/ESCRITA SEMELHANTE | DESCRIÇÃO CD3  | NOME COMERCIAL OU PRINCÍPIO ATIVO (DROGA 2) | INDICAÇÃO TERAPÊUTICA                   |
|-----------------------------------------|---------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Carbamazepina                           | CarBAMazepina | Tegretol                                    | Anticonvulsivante                       | Oxcarbazepina                           | OXcarbazeptina | Trileptal                                   | Anticonvulsivante                       |
| Carbocisteína                           | CARBOcisteína | Mucofan/ Mucolitic                          | Mucolítico                              | Acetilcisteína                          | ACETILcisteína | Fluimucil                                   | Mucolítico                              |
| Carboplatina                            | CARBOplatina  | Fauldcarbo                                  | Antineoplásico Citotóxico               | Cisplatina                              | CISplatina     | Fauldcispla                                 | Antineoplásico Citotóxico               |
| Carboplatina                            | CARBOplatina  | Fauldcarbo                                  | Antineoplásico Citotóxico               | Oxaliplatina                            | OXALIplatina   | Eloxatin                                    | Antineoplásico Citotóxico               |
| Carvedilol                              | CarVEDilol    | Cardilol                                    | Agente Anti-Hipertensivo                | Calcitriol                              | CalcitRIOL     | Calcijex                                    | Vitamina e suplemento mineral           |
| Caspofungina                            | CASPOfungina  | Cancidas                                    | Antifúngico Sistêmico                   | Anidulafungina                          | ANIDULAfungina | Ecalta                                      | Antifúngico Sistêmico                   |
| Caspofungina                            | CASPOfungina  | Cancidas                                    | Antifúngico Sistêmico                   | Fusafungina                             | FUSAfungina    | Locabiotol                                  | Broncodilatadores                       |
| Caspofungina                            | CASPOfungina  | Cancidas                                    | Antifúngico Sistêmico                   | Micafungina                             | MICAfungina    | Mycamine                                    | Antifúngico Sistêmico                   |
| Cefadroxila                             | CefaDROXILa   | Cefadroxil                                  | Antimicrobiano Cefalosporina 1ª geração | Cefalotina                              | CefaLOTina     | Keflin                                      | Antimicrobiano Cefalosporina 1ª geração |

MEDICAMENTOS SEMELHANTES POR FONÉTICA/ ESCRITA

| DROGA 1 POR FONÉTICA/ESCRITA SEMELHANTE | DESCRIÇÃO CD3 | NOME COMERCIAL OU PRINCÍPIO ATIVO (DROGA 1) | INDICAÇÃO TERAPÊUTICA                   | DROGA 2 POR FONÉTICA/ESCRITA SEMELHANTE | DESCRIÇÃO CD3 | NOME COMERCIAL OU PRINCÍPIO ATIVO (DROGA 2) | INDICAÇÃO TERAPÊUTICA                   |
|-----------------------------------------|---------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|---------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Cefadroxila                             | CefaDROXILa   | Cefadroxil                                  | Antimicrobiano Cefalosporina 1º geração | Cefalexina                              | CefaLEXina    | Keflex                                      | Antimicrobiano Cefalosporina 1º geração |
| Cefadroxila                             | CefaDROXILa   | Cefadroxil                                  | Antimicrobiano Cefalosporina 1º geração | Cefaltina                               | CefaLOTina    | Keflin                                      | Antimicrobiano Cefalosporina 1º geração |
| Cefalexina                              | CefaLEXina    | Keflex                                      | Antimicrobiano Cefalosporina 1º geração | Cefadroxila                             | CefaDROXILa   | Cefadroxil                                  | Antimicrobiano Cefalosporina 1º geração |
| Cefalotina                              | CefaLOTina    | Keflin                                      | Antimicrobiano Cefalosporina 1º geração | Cefazolina                              | CeFAZolina    | Kefazol                                     | Antimicrobiano Cefalosporina 1º geração |
| Cefalotina                              | CefaLOTina    | Cefalotina Sódica                           | Antimicrobiano Cefalosporina 1º geração | Ceftriaxona                             | CeTRIAXona    | Rocefin                                     | Antimicrobiano Cefalosporina 3º geração |
| Cefalotina                              | CefaLOTina    | Keflin                                      | Antimicrobiano Cefalosporina 1º geração | Cefalexina                              | CefaLEXina    | Keflex                                      | Antimicrobiano Cefalosporina 1º geração |
| Cefalotina                              | CefaLOTina    | Keflin                                      | Antimicrobiano Cefalosporina 1º geração | Cefadroxila                             | CefaDROXILa   | Cefadroxil                                  | Antimicrobiano Cefalosporina 1º geração |



## MEDICAMENTOS SEMELHANTES POR FONÉTICA/ ESCRITA

| DROGA 1 POR FONÉTICA/ESCRITA SEMELHANTE | DESCRIÇÃO CD3 | NOME COMERCIAL OU PRINCÍPIO ATIVO (DROGA 1) | INDICAÇÃO TERAPÊUTICA                   | DROGA 2 POR FONÉTICA/ESCRITA SEMELHANTE | DESCRIÇÃO CD3 | NOME COMERCIAL OU PRINCÍPIO ATIVO (DROGA 2) | INDICAÇÃO TERAPÊUTICA                   |
|-----------------------------------------|---------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|---------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Cefazolina                              | CeFAZolina    | Kefazol                                     | Antimicrobiano Cefalosporina 1º geração | Cefalotina                              | CefaLOTina    | Keflin                                      | Antimicrobiano Cefalosporina 1º geração |
| Cefazolina                              | CeFAZolina    | Kefazol                                     | Antimicrobiano Cefalosporina 1º geração | Cefoxitina                              | CefOXitina    | Kefox                                       | Antimicrobiano Cefalosporina 2º geração |
| Cefazolina                              | CeFAZolina    | Kefazol                                     | Antimicrobiano Cefalosporina 1º geração | Ceftriaxona                             | CeFTRIAXona   | Rocefin                                     | Antimicrobiano Cefalosporina 3º geração |
| Cefotaxima                              | CefOTAXima    | Cefotaxima                                  | Antimicrobiano Cefalosporina 3º geração | Cefazolina                              | CeFAZolina    | Kefazol                                     | Antimicrobiano Cefalosporina 1º geração |
| Cefotaxima                              | CefOTAXima    | Cefotaxima                                  | Antimicrobiano Cefalosporina 3º geração | Cefoxitina                              | CefOXitina    | Kefox                                       | Antimicrobiano Cefalosporina 2º geração |
| Cefotaxima                              | CefOTAXima    | Cefotaxima                                  | Antimicrobiano Cefalosporina 3º geração | Ceftazidima                             | CefTAZidima   | Fortaz                                      | Antimicrobiano Cefalosporina 3º geração |
| Cefotaxima                              | CefOTAXima    | Cefotaxima                                  | Antimicrobiano Cefalosporina 3º geração | Ceftriaxona                             | CeFTRIAXona   | Rocefin                                     | Antimicrobiano Cefalosporina 3º geração |

MEDICAMENTOS SEMELHANTES POR FONÉTICA/ ESCRITA

| DROGA 1 POR FONÉTICA/ESCRITA SEMELHANTE | DESCRIÇÃO CD3 | NOME COMERCIAL OU PRINCÍPIO ATIVO (DROGA 1) | INDICAÇÃO TERAPÊUTICA                   | DROGA 2 POR FONÉTICA/ESCRITA SEMELHANTE | DESCRIÇÃO CD3 | NOME COMERCIAL OU PRINCÍPIO ATIVO (DROGA 2) | INDICAÇÃO TERAPÊUTICA                   |
|-----------------------------------------|---------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|---------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Cefoxitina                              | CefOXitina    | Kefox                                       | Antimicrobiano Cefalosporina 2º geração | Cefazolina                              | CeFAZolina    | Kefazol                                     | Antimicrobiano Cefalosporina 1º geração |
| Cefoxitina                              | CefOXitina    | Kefox                                       | Antimicrobiano Cefalosporina 2º geração | Cefotaxima                              | CefOTAXima    | Cefotaxima                                  | Antimicrobiano Cefalosporina 3º geração |
| Cefoxitina                              | CefOXitina    | Kefox                                       | Antimicrobiano Cefalosporina 2º geração | Ceftazidima                             | CeFTAZidima   | Fortaz                                      | Antimicrobiano Cefalosporina 3º geração |
| Ceftazidima                             | CeFTAZidima   | Fortaz                                      | Antimicrobiano Cefalosporina 3º geração | Cefazolina                              | CeFAZolina    | Kefazol                                     | Antimicrobiano Cefalosporina 1º geração |
| Ceftazidima                             | CeFTAZidima   | Fortaz                                      | Antimicrobiano Cefalosporina 3º geração | Cefotaxima                              | CefOTAXima    | Cefotaxima                                  | Antimicrobiano Cefalosporina 3º geração |
| Ceftazidima                             | CeFTAZidima   | Fortaz                                      | Antimicrobiano Cefalosporina 3º geração | Cefoxitina                              | CefOXitina    | Kefox                                       | Antimicrobiano Cefalosporina 2º geração |
| Ceftriaxona                             | CefTRIAXona   | Rocefin                                     | Antimicrobiano Cefalosporina 3º geração | Cefalotina                              | CefaLOTina    | Cefalotina Sódica                           | Antimicrobiano Cefalosporina 1º geração |
| Ceftriaxona                             | CefTRIAXona   | Rocefin                                     | Antimicrobiano Cefalosporina 3º geração | Cefazolina                              | CeFAZolina    | Kefazol                                     | Antimicrobiano Cefalosporina 1º geração |

## MEDICAMENTOS SEMELHANTES POR FONÉTICA/ ESCRITA

| DROGA 1 POR FONÉTICA/ESCRITA SEMELHANTE | DESCRIÇÃO CD3 | NOME COMERCIAL OU PRINCÍPIO ATIVO (DROGA 1) | INDICAÇÃO TERAPEÚTICA                             | DROGA 2 POR FONÉTICA/ESCRITA SEMELHANTE | DESCRIÇÃO CD3      | NOME COMERCIAL OU PRINCÍPIO ATIVO (DROGA 2) | INDICAÇÃO TERAPEÚTICA                          |
|-----------------------------------------|---------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Ceftriaxona                             | CefTRIAXona   | Rocefin                                     | Antimicrobiano<br>Cefalosporina 3ª geração        | Cefotaxima                              | CefOTAXima         | Cefotaxima                                  | Antimicrobiano<br>Cefalosporina 3ª geração     |
| Cetoconazol                             | CETOconazol   | Cetoconazol                                 | Antifúngico                                       | Voriconazol                             | VORIconazol        | Vfend                                       | Antifúngico<br>Sistêmico                       |
| Cetoconazol                             | CETOconazol   | Cetoconazol                                 | Antifúngico                                       | Fluconazol                              | FLUconazol         | Zoltec                                      | Antifúngico<br>Sistêmico                       |
| Cetoconazol                             | CETOconazol   | Cetoconazol                                 | Antifúngico                                       | Tioconazol                              | TIOconazol         | Tralen                                      | Antifúngico                                    |
| Cetoconazol                             | CETOconazol   | Cetoconazol                                 | Antifúngico                                       | Oxiconazol                              | OXIconazol         | Oceral                                      | Antifúngico                                    |
| Cetoconazol                             | CETOconazol   | Cetoconazol                                 | Antifúngico                                       | Miconazol                               | MIconazol          | Vodol                                       | Antifúngico                                    |
| Cetoconazol                             | CETOconazol   | Cetoconazol                                 | Antifúngico                                       | Isoconazol                              | ISOconazol         | Icaden                                      | Antifúngico                                    |
| Cetoconazol                             | CETOconazol   | Cetoconazol                                 | Antifúngico                                       | Itraconazol                             | ITRAconazol        | Sporanox                                    | Antifúngico                                    |
| Cetoprofeno                             | CETOprofeno   | Profenid                                    | Antiinflamatório<br>não esteroi-<br>dal sistêmico | Flurbiprofeno                           | FLURBipro-<br>feno | Strepsils                                   | Antiinflamatório não esteroi-<br>dal sistêmico |

MEDICAMENTOS SEMELHANTES POR FONÉTICA/ ESCRITA

| DROGA 1 POR FONÉTICA/ESCRITA SEMELHANTE | DESCRIÇÃO CD3   | NOME COMERCIAL OU PRINCÍPIO ATIVO (DROGA 1) | INDICAÇÃO TERAPÊUTICA                     | DROGA 2 POR FONÉTICA/ESCRITA SEMELHANTE | DESCRIÇÃO CD3   | NOME COMERCIAL OU PRINCÍPIO ATIVO (DROGA 2) | INDICAÇÃO TERAPÊUTICA                     |
|-----------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Cetoprofeno                             | CEToprofeno     | Profenid                                    | Antiinflamatório não esteroidal sistêmico | Ibuprofeno                              | IBUprefeno      | Alivium/ Ad-vil                             | Antiinflamatório não esteroidal sistêmico |
| Cetuximabe                              | CETuximabe      | Erbitux                                     | Antineoplásico Citotóxico                 | Rituximabe                              | RITUXimabe      | Mabthera                                    | Antineoplásico Citotóxico                 |
| Ciclofosfamida                          | CicloFOSFA-Mida | Genuxal                                     | Antineoplásico Citotóxico                 | Ifosfamida                              | IFOSfamida      | Holoxane                                    | Antineoplásicos Citotóxicos               |
| Ciclofosfamida                          | CicloFOSFA-Mida | Genuxal                                     | Antineoplásico Citotóxico                 | Ciclosporina                            | CiclosPORINA    | Sandimmun                                   | Imunossupressor                           |
| Ciclosporina                            | CiclosPORINA    | Sandimmun                                   | Imunossupressor                           | Ciclofosfamida                          | CicloFOSFA-Mida | Genuxal                                     | Antineoplásico Citotóxico                 |
| Ciprofloxacino                          | CIPROfloxacino  | Cipro / Fresoflox                           | Antimicrobiano Quinolona                  | Levofloxacino                           | CIPROfloxacino  | Levaquin / Levotac                          | Antimicrobiano Quinolona                  |
| Ciprofloxacino                          | CIPROfloxacino  | Cipro / Fresoflox                           | Antimicrobiano Quinolona                  | Moxifloxacino                           | MOXifloxacino   | Avalox                                      | Antimicrobiano Quinolona                  |
| Ciprofloxacino                          | CIPROfloxacino  | Cipro / Fresoflox                           | Antimicrobiano Quinolona                  | Norfloxacino                            | NORfloxacino    | Floxacin                                    | Antimicrobiano Quinolona                  |
| Cisplatina                              | CISplatina      | Fauldcispla                                 | Antineoplásico Citotóxico                 | Carboplatina                            | CARBOplatina    | Fauldcarbo                                  | Antineoplásico Citotóxico                 |
| Cisplatina                              | CISplatina      | Fauldcispla                                 | Antineoplásico Citotóxico                 | Oxaliplatina                            | OXALIplatina    | Eloxatin                                    | Antineoplásico Citotóxico                 |

## MEDICAMENTOS SEMELHANTES POR FONÉTICA/ ESCRITA

| DROGA 1 POR FONÉTICA/ESCRITA SEMELHANTE | DESCRIÇÃO CD3  | NOME COMERCIAL OU PRINCÍPIO ATIVO (DROGA 1) | INDICAÇÃO TERAPÊUTICA     | DROGA 2 POR FONÉTICA/ESCRITA SEMELHANTE | DESCRIÇÃO CD3    | NOME COMERCIAL OU PRINCÍPIO ATIVO (DROGA 2) | INDICAÇÃO TERAPÊUTICA          |
|-----------------------------------------|----------------|---------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------|------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|
| Citalopram                              | CiTalopram     | Cipramil                                    | Antidepressivo            | Citalorâ                                | CitalOR          | Atorvastatina                               | Redutor de colesterol          |
| Citalopram                              | CiTalopram     | Cipramil                                    | Antidepressivo            | Escitalopram                            | ESCitalopram     | Lexapro                                     | Antidepressivo                 |
| Citalor                                 | CiTaloR        | Atorvastatina                               | Redutor de colesterol     | Citalopram                              | CiTalopram       | Cipramil                                    | Antidepressivo                 |
| Citoneurin                              | Citoneurin     | Vit. B1 + Vit. B6 +Vit. B12                 | Antineuríticos            | Dexa-Citoneurin                         | DEXA-Cito-neurin | Dexametasona + Vit. B1 + Vit. B6 +Vit. B12  | Antineuríticos                 |
| Claritromicina                          | CLARITROMicina | Klaricid                                    | Antimicrobiano Macrolídeo | Mitomicina                              | MitoMlcina       | Mitocin                                     | Antineoplásico Citotóxico      |
| Claritromicina                          | CLARITROMicina | Klaricid                                    | Antimicrobiano Macrolídeo | Neomicina                               | NEOMICina        | Neomicina                                   | Antimicrobiano Aminoglicosídeo |
| Claritromicina                          | CLARITROMicina | Klaricid                                    | Antimicrobiano Macrolídeo | Bleomicina                              | BLEOMICina       | Bonar                                       | Antineoplásicos Citotóxicos    |
| Claritromicina                          | CLARITROMicina | Klaricid                                    | Antimicrobiano Macrolídeo | Vancomicina                             | VANCOMicina      | Vancocina                                   | Antimicrobiano Glicopeptídeo   |
| Claritromicina                          | CLARITROMicina | Klaricid                                    | Antimicrobiano Macrolídeo | Tobramicina                             | TOBRAMicina      | Tobrex e Tobi                               | Antimicrobiano Aminoglicosídeo |

MEDICAMENTOS SEMELHANTES POR FONÉTICA/ ESCRITA

| DROGA 1 POR FONÉTICA/ESCRITA SEMELHANTE | DESCRIÇÃO CD3  | NOME COMERCIAL OU PRINCÍPIO ATIVO (DROGA 1) | INDICAÇÃO TERAPÊUTICA      | DROGA 2 POR FONÉTICA/ESCRITA SEMELHANTE | DESCRIÇÃO CD3 | NOME COMERCIAL OU PRINCÍPIO ATIVO (DROGA 2) | INDICAÇÃO TERAPÊUTICA          |
|-----------------------------------------|----------------|---------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|---------------|---------------------------------------------|--------------------------------|
| Claritromicina                          | CLARITROMicina | Klaricid                                    | Antimicrobiano Macrolídeo  | Gentamicina                             | GENTAmicina   | Gentamicin                                  | Antimicrobiano Aminoglicosídeo |
| Claritromicina                          | CLARITROMicina | Klaricid                                    | Antimicrobiano Macrolídeo  | Rifamicina                              | RIFAmicina    | Rifocina                                    | Antimicrobiano Tópico          |
| Claritromicina                          | CLARITROMicina | Klaricid                                    | Antimicrobiano Macrolídeo  | Garamicina                              | GARAMicina    | Garamicina                                  | Antimicrobiano Tópico          |
| Claritromicina                          | CLARITROMicina | Klaricid                                    | Antimicrobiano Macrolídeo  | Vibramicina                             | VIBRAMicina   | Vibramicina                                 | Antimicrobiano Tetraciclina    |
| Claritromicina                          | CLARITROMicina | Klaricid                                    | Antimicrobiano Macrolídeo  | Eritomicina                             | ERITROMicina  | Eritrex                                     | Antimicrobiano Macrolídeo      |
| Claritromicina                          | CLARITROMicina | Klaricid                                    | Antimicrobiano Macrolídeo  | Clindamicina                            | CLINDAmicina  | Dalacin                                     | Antimicrobiano Lincosamida     |
| Claritromicina                          | CLARITROMicina | Klaricid                                    | Antimicrobiano Macrolídeo  | Daptomicina                             | DAPTOmicina   | Cubicin                                     | Antimicrobiano Lipopeptídeo    |
| Clindamicina                            | CLINDAmicina   | Dalacin                                     | Antimicrobiano Lincosamida | Mitomicina                              | MitoMlcina    | Mitocin                                     | Antineoplásico Citotóxico      |
| Clindamicina                            | CLINDAmicina   | Dalacin                                     | Antimicrobiano Lincosamida | Neomicina                               | NEOmicina     | Neomicina                                   | Antimicrobiano Aminoglicosídeo |
| Clindamicina                            | CLINDAmicina   | Dalacin                                     | Antimicrobiano Lincosamida | Bleomicina                              | BLEOmicina    | Bonar                                       | Antineoplásicos Citotóxicos    |

## MEDICAMENTOS SEMELHANTES POR FONÉTICA/ ESCRITA

| DROGA 1 POR FONÉTICA/ESCRITA SEMELHANTE | DESCRIÇÃO CD3 | NOME COMERCIAL OU PRINCÍPIO ATIVO (DROGA 1) | INDICAÇÃO TERAPÊUTICA      | DROGA 2 POR FONÉTICA/ESCRITA SEMELHANTE | DESCRIÇÃO CD3   | NOME COMERCIAL OU PRINCÍPIO ATIVO (DROGA 2) | INDICAÇÃO TERAPÊUTICA          |
|-----------------------------------------|---------------|---------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------|--------------------------------|
| Clindamicina                            | CLINDamicina  | Dalacin                                     | Antimicrobiano Lincosamida | Vancomicina                             | VANComi-cina    | Vancocina                                   | Antimicrobiano Glicopeptídeo   |
| Clindamicina                            | CLINDamicina  | Dalacin                                     | Antimicrobiano Lincosamida | Tobramicina                             | TOBRamicina     | Tobrex e Tobi                               | Antimicrobiano Aminoglicosídeo |
| Clindamicina                            | CLINDamicina  | Dalacin                                     | Antimicrobiano Lincosamida | Gentamicina                             | GENTAmicina     | Gentamicin                                  | Antimicrobiano Aminoglicosídeo |
| Clindamicina                            | CLINDamicina  | Dalacin                                     | Antimicrobiano Lincosamida | Rifamicina                              | RIFAmicina      | Rifocina                                    | Antimicrobiano Tópico          |
| Clindamicina                            | CLINDamicina  | Dalacin                                     | Antimicrobiano Lincosamida | Garamicina                              | GARAMicina      | Garamicina                                  | Antimicrobiano Tópico          |
| Clindamicina                            | CLINDamicina  | Dalacin                                     | Antimicrobiano Lincosamida | Vibramicina                             | VIBRAmicina     | Vibramicina                                 | Antimicrobiano Tetraciclina    |
| Clindamicina                            | CLINDamicina  | Dalacin                                     | Antimicrobiano Lincosamida | Eritomicina                             | ERITROmi-cina   | Eritrex                                     | Antimicrobiano Macrolídeo      |
| Clindamicina                            | CLINDamicina  | Dalacin                                     | Antimicrobiano Lincosamida | Claritomicina                           | CLARITRO-micina | Klaricid                                    | Antimicrobiano Macrolídeo      |
| Clindamicina                            | CLINDamicina  | Dalacin                                     | Antimicrobiano Lincosamida | Daptomicina                             | DAPTOmicina     | Cubicin                                     | Antimicrobiano Lipopeptídeo    |

MEDICAMENTOS SEMELHANTES POR FONÉTICA/ ESCRITA

| DROGA 1 POR FONÉTICA/ESCRITA SEMELHANTE | DESCRIÇÃO CD3 | NOME COMERCIAL OU PRINCÍPIO ATIVO (DROGA 1) | INDICAÇÃO TERAPÊUTICA        | DROGA 2 POR FONÉTICA/ESCRITA SEMELHANTE | DESCRIÇÃO CD3 | NOME COMERCIAL OU PRINCÍPIO ATIVO (DROGA 2) | INDICAÇÃO TERAPÊUTICA        |
|-----------------------------------------|---------------|---------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|---------------|---------------------------------------------|------------------------------|
| Clomipramina                            | ClomiPRAMINA  | Anafranil                                   | Antidepressivo               | Clorpromazina                           | ClorproMAZINA | Amplictil                                   | Antipsicótico, Neurolépticos |
| Clonazepam                              | CLONAZepam    | Rivotril                                    | Anticonvulsivantes           | Bromazepam                              | BROMAZepam    | Lexotan / So-malium                         | Ansiolíticos                 |
| Clonazepam                              | CLONAZepam    | Rivotril                                    | Anticonvulsivantes           | Diazepam                                | DIAZepam      | Dienpax/Valium                              | Ansiolíticos                 |
| Clonazepam                              | CLONAZepam    | Rivotril                                    | Anticonvulsivantes           | Lorazepam                               | LORAZepam     | Lorax/ Loraze-fast                          | Ansiolíticos                 |
| Clonazepam                              | CLONAZepam    | Rivotril                                    | Anticonvulsivantes           | Cloxacolam                              | CLOXAZolam    | Rivotril                                    | Anticonvulsivantes           |
| Clonazepam                              | CLONAZepam    | Rivotril                                    | Anticonvulsivantes           | Flurazepam                              | FLURAZepam    | Dalmadorm                                   | Hipnóticos                   |
| Clonazepam                              | CLONAZepam    | Rivotril                                    | Anticonvulsivantes           | Flunitrazepam                           | FLUNITRAZepam | Rohydorm/ Rohypnol                          | Hipnóticos                   |
| Clonidina                               | CloniDINA     | Atensina                                    | Agente cardiovascular        | Colchicina                              | COLCHicina    | Colchicina                                  | Agente antigotoso            |
| Clorpromazina                           | ClorproMAZINA | Amplictil                                   | Antipsicótico, Neurolépticos | Clomipramina                            | ClomiPRA-MINA | Anafranil                                   | Antidepressivo               |
| Clorpromazina                           | ClorproMAZINA | Longactil/ Amplictil                        | Antipsicótico, Neurolépticos | Clozapina                               | CLOZApina     | Leponex                                     | Antipsicótico, Neurolépticos |



## MEDICAMENTOS SEMELHANTES POR FONÉTICA/ ESCRITA

| DROGA 1 POR FONÉTICA/ESCRITA SEMELHANTE | DESCRIÇÃO CD3 | NOME COMERCIAL OU PRINCÍPIO ATIVO (DROGA 1) | INDICAÇÃO TERAPÊUTICA        | DROGA 2 POR FONÉTICA/ESCRITA SEMELHANTE | DESCRIÇÃO CD3  | NOME COMERCIAL OU PRINCÍPIO ATIVO (DROGA 2) | INDICAÇÃO TERAPÊUTICA          |
|-----------------------------------------|---------------|---------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|----------------|---------------------------------------------|--------------------------------|
| Clozapolan                              | CLOXAzolam    | Olcadil                                     | Ansiolíticos                 | Clonazepam                              | CLONaze-pam    | Rivotril                                    | Anticonvulsivantes             |
| Clozapolan                              | CLOXAzolam    | Olcadil                                     | Ansiolíticos                 | Alprazolam                              | ALPRAzolam     | Apraz/Frontal                               | Ansiolíticos                   |
| Clozapolan                              | CLOXAzolam    | Olcadil                                     | Ansiolíticos                 | Midazolam                               | MIDAzolam      | Dormine/ Dormonid                           | Hipnóticos                     |
| Clozapina                               | CLOZApina     | Leponex                                     | Antipsicótico, Neurolépticos | Clorpromazina                           | ClorproMA-ZINA | Longactil/ Am- plictil                      | Antipsicótico, Neurolépticos   |
| Clozapina                               | CLOZApina     | Leponex                                     | Antipsicótico, Neurolépticos | Olanzapina                              | OLANZapina     | Zyprexa                                     | Antipsicótico, Neurolépticos   |
| Colchicina                              | COLCHicina    | Colchicina                                  | Agente antígeno-toso         | Clonidina                               | CloniDINA      | Atensina                                    | Agente cardiovascular          |
| Coumadin                                | COUMAdin      | Varfarina                                   | Anticoagulante               | Prandin                                 | PRANDin        | Repaglinida                                 | Hipoglicemiantes               |
| Cozaar                                  | CoZAAR        | Losartano                                   | Antihipertensivo             | Zacor                                   | ZOcor          | Sinvastatina                                | Hipolipêmico                   |
| Daptomicina                             | DAPTOmicina   | Cubcin                                      | Antimicrobiano Lipopeptídeo  | Mitomicina                              | MitoMlcina     | Mitocin                                     | Antineoplásico Citotóxico      |
| Daptomicina                             | DAPTOmicina   | Cubcin                                      | Antimicrobiano Lipopeptídeo  | Neomicina                               | NEOmicina      | Neomicina                                   | Antimicrobiano Aminoglicosídeo |

MEDICAMENTOS SEMELHANTES POR FONÉTICA/ ESCRITA

| DROGA 1 POR FONÉTICA/ESCRITA SEMELHANTE | DESCRIÇÃO CD3 | NOME COMERCIAL OU PRINCÍPIO ATIVO (DROGA 1) | INDICAÇÃO TERAPÊUTICA       | DROGA 2 POR FONÉTICA/ESCRITA SEMELHANTE | DESCRIÇÃO CD3 | NOME COMERCIAL OU PRINCÍPIO ATIVO (DROGA 2) | INDICAÇÃO TERAPÊUTICA          |
|-----------------------------------------|---------------|---------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|---------------|---------------------------------------------|--------------------------------|
| Daptomicina                             | DAPTOmicina   | Cubcin                                      | Antimicrobiano Lipopeptídeo | Bleomicina                              | BLEOmicina    | Bonar                                       | Antineoplásicos Citotóxicos    |
| Daptomicina                             | DAPTOmicina   | Cubcin                                      | Antimicrobiano Lipopeptídeo | Vancomicina                             | VANCOmicina   | Vancocina                                   | Antimicrobiano Glicopeptídeo   |
| Daptomicina                             | DAPTOmicina   | Cubcin                                      | Antimicrobiano Lipopeptídeo | Tobramicina                             | TOBRAmicina   | Tobrex e Tobi                               | Antimicrobiano Aminoglicosídeo |
| Daptomicina                             | DAPTOmicina   | Cubcin                                      | Antimicrobiano Lipopeptídeo | Gentamicina                             | GENTAmicina   | Gentamicin                                  | Antimicrobiano Aminoglicosídeo |
| Daptomicina                             | DAPTOmicina   | Cubcin                                      | Antimicrobiano Lipopeptídeo | Rifamicina                              | RIFAmicina    | Rifocina                                    | Antimicrobiano Tópico          |
| Daptomicina                             | DAPTOmicina   | Cubcin                                      | Antimicrobiano Lipopeptídeo | Garamicina                              | GARAmicina    | Garamicina                                  | Antimicrobiano Tópico          |
| Daptomicina                             | DAPTOmicina   | Cubcin                                      | Antimicrobiano Lipopeptídeo | Vibramicina                             | VIBRAmicina   | Vibramicina                                 | Antimicrobiano Tetraciclina    |
| Daptomicina                             | DAPTOmicina   | Cubcin                                      | Antimicrobiano Lipopeptídeo | Eritomicina                             | ERITROmicina  | Eritrex                                     | Antimicrobiano Macrolídeo      |
| Daptomicina                             | DAPTOmicina   | Cubcin                                      | Antimicrobiano Lipopeptídeo | Clindamicina                            | CLINDAmicina  | Dalacin                                     | Antimicrobiano Lincosamida     |

## MEDICAMENTOS SEMELHANTES POR FONÉTICA/ ESCRITA

| DROGA 1 POR FONÉTICA/ESCRITA SEMELHANTE | DESCRIÇÃO CD3   | NOME COMERCIAL OU PRINCÍPIO ATIVO (DROGA 1) | INDICAÇÃO TERAPÊUTICA                 | DROGA 2 POR FONÉTICA/ESCRITA SEMELHANTE | DESCRIÇÃO CD3  | NOME COMERCIAL OU PRINCÍPIO ATIVO (DROGA 2) | INDICAÇÃO TERAPÊUTICA                 |
|-----------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|
| Daptomicina                             | DAPTOmicina     | Cubicin                                     | Antimicrobiano Lipopeptídeo           | Claritomicina                           | CLARITROmicina | Klaricid                                    | Antimicrobiano Macrolídeo             |
| Daunorrubicina                          | DAUNORrubicina  | Daunorrubicina                              | Antineoplásico Citotóxico             | Doxorrubicina                           | DOXORrubicina  | Adriblastina                                | Antineoplásico Citotóxico             |
| Daunorrubicina                          | DAUNORrubicina  | Daunorrubicina                              | Antineoplásico Citotóxico             | Idarrubicina                            | IDArrubicina   | Zavedos                                     | Antineoplásico Citotóxico             |
| Decitabina                              | DECitabina      | Dacogen                                     | Antineoplásico Citotóxico             | Gencitabina                             | GENCITabina    | Gemzar                                      | Antineoplásico Citotóxico             |
| Depo- Medrol                            | DEPO-Medrol     | Acetato metil-prednisolona                  | Antiinflamatório esteroidal sistêmico | Solu-Medrol                             | SOLU-Medrol    | Suc.sódico metilprednisolona                | Antiinflamatório esteroidal sistêmico |
| Desmopressina                           | DESMopressina   | Ddavp                                       | Hormônio Anti-diurético               | Vasopressina                            | VASopressina   | Encrise                                     | Vasoconstritor e Hipertensor          |
| Dexa-Citoneurin                         | DEXA-Citoneurin | Dexametasona + Vit. B1 + Vit. B6 + Vit. B12 | Antineuríticos                        | Citoneurin                              | Citoneurin     | Vit. B1 + Vit. B6 + Vit. B12                | Antineuríticos                        |
| Dexametasona                            | DEXAmetasona    | Decadron                                    | Antiinflamatório esteroidal sistêmico | Betametasona                            | BETAmetasona   | Betametasona                                | Antiinflamatório esteroidal sistêmico |
| Dexametasona                            | DEXAmetasona    | Decadron                                    | Antiinflamatório esteroidal sistêmico | Beclometasona                           | BECLOmetasona  | Clenil A                                    | Antiinflamatório esteroidal sistêmico |

MEDICAMENTOS SEMELHANTES POR FONÉTICA/ ESCRITA

| DROGA 1 POR FONÉTICA/ESCRITA SEMELHANTE | DESCRIÇÃO CD3  | NOME COMERCIAL OU PRINCÍPIO ATIVO (DROGA 1) | INDICAÇÃO TERAPÊUTICA    | DROGA 2 POR FONÉTICA/ESCRITA SEMELHANTE | DESCRIÇÃO CD3  | NOME COMERCIAL OU PRINCÍPIO ATIVO (DROGA 2) | INDICAÇÃO TERAPÊUTICA    |
|-----------------------------------------|----------------|---------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|----------------|---------------------------------------------|--------------------------|
| Diamox                                  | DiaMOX         | Acetazolamida                               | Diurético                | Diabinese                               | DiABINESE      | Clorpropamida                               | Hipoglicemiantes         |
| Diazepam                                | DIAZepam       | Dienpax/Valium                              | Ansiolíticos             | Bromazepam                              | BROMAze-pam    | Lexotan / Somalium                          | Ansiolíticos             |
| Diazepam                                | DIAZepam       | Dienpax/Valium                              | Ansiolíticos             | Clonazepam                              | CLONAze-pam    | Rivotril                                    | Anticonvulsivantes       |
| Diazepam                                | DIAZepam       | Dienpax/Valium                              | Ansiolíticos             | Lorazepam                               | LORAZepam      | Lorax/ Lorazepam fast                       | Ansiolíticos             |
| Diazepam                                | DIAZepam       | Dienpax/Valium                              | Ansiolíticos             | Flurazepam                              | FLURAZepam     | Dalmadorm                                   | Hipnóticos               |
| Diazepam                                | DIAZepam       | Dienpax/Valium                              | Ansiolíticos             | Flunitrazepam                           | FLUNITRAze-pam | Rohydorm/ Rohypnol                          | Hipnóticos               |
| Difenidramina                           | DIFENIDRA-Mina | Benadryl / Difenidrin                       | Anti-Histamínicos H1     | Efedrina                                | eFEDRina       | Efedrina Sulfato                            | Estimulante Adrenérgico  |
| Digesan                                 | DIGESan        | Bromoprida                                  | Antiemético, Procinético | Superan                                 | SUPERan        | Allisaprida                                 | Antiemético, Procinético |
| Diovan                                  | DIOvan         | Valsartana                                  | Antihipertensivo         | Diprivan                                | dIPRlvan       | Propofol                                    | Anestésico Geral         |
| Diovan                                  | DIOvan         | Valsartana                                  | Antihipertensivo         | Zyban                                   | ZYBan          | Bupropiona                                  | Antidepressivo           |
| Diovan                                  | DIOvan         | Valsartana                                  | Antihipertensivo         | Diprivan                                | dIPRlvan       | Propofol                                    | Anestésico Geral         |

## MEDICAMENTOS SEMELHANTES POR FONÉTICA/ ESCRITA

| DROGA 1 POR FONÉTICA/ESCRITA SEMELHANTE | DESCRIÇÃO CD3 | NOME COMERCIAL OU PRINCÍPIO ATIVO (DROGA 1) | INDICAÇÃO TERAPEÚTICA                 | DROGA 2 POR FONÉTICA/ESCRITA SEMELHANTE | DESCRIÇÃO CD3 | NOME COMERCIAL OU PRINCÍPIO ATIVO (DROGA 2) | INDICAÇÃO TERAPEÚTICA                 |
|-----------------------------------------|---------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|---------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|
| Dipiridamol                             | dipiRIDAMOL   | Persantin                                   | Antiagregante Plaquetário             | Dipirona                                | dipiRONA      | Dipirona Sódica                             | Analgésicos e Antipiréticos           |
| Dipirona                                | dipiRONA      | Dipirona Sódica                             | Analgésicos e Antipiréticos           | Dipiridamol                             | dipiRIDAMOL   | Persantin                                   | Antiagregante Plaquetário             |
| Dipirona                                | dipiRONA      | Novalgina                                   | Analgésico                            | Diprospon                               | dipiRONA      | Betametasona                                | Antiinflamatório esteroidal sistêmico |
| Diprivan                                | dipRlvan      | Propofol                                    | Anestésico Geral                      | Diovan                                  | DIOvan        | Valsartana                                  | Antihipertensivo                      |
| Diprivan                                | dipRlvan      | Propofol                                    | Anestésico Geral                      | Diprospon                               | diPROspan     | Betametasona                                | Antiinflamatório esteroidal sistêmico |
| Diprospon                               | diPROspan     | Betametasona                                | Antiinflamatório esteroidal sistêmico | Dipirona                                | diPROspan     | Novalgina                                   | Analgésico                            |
| Diprospon                               | diPROspan     | Betametasona                                | Antiinflamatório esteroidal sistêmico | Diprivan                                | dipRlvan      | Propofol                                    | Anestésico Geral                      |
| Dobutamina                              | doBUTAmína    | Dobutrex                                    | Estimulante Adrenérgico               | Dopamina                                | doPAmína      | Dopacris                                    | Estimulante Adrenérgico               |
| Docetaxel                               | DOCEtaxel     | Taxotere                                    | Antineoplásico Citotóxico             | Paclitaxel                              | PACLitaxel    | Anzatax                                     | Antineoplásico Citotóxico             |

**MEDICAMENTOS SEMELHANTES POR FONÉTICA/ ESCRITA**

| DROGA 1 POR FONÉTICA/ESCRITA SEMELHANTE | DESCRIÇÃO CD3 | NOME COMERCIAL OU PRINCÍPIO ATIVO (DROGA 1) | INDICAÇÃO TERAPÊUTICA     | DROGA 2 POR FONÉTICA/ESCRITA SEMELHANTE | DESCRIÇÃO CD3  | NOME COMERCIAL OU PRINCÍPIO ATIVO (DROGA 2)    | INDICAÇÃO TERAPÊUTICA        |
|-----------------------------------------|---------------|---------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|------------------------------|
| Dopamina                                | doPAmina      | Dopacris                                    | Estimulante Adrenérgico   | Dobutamina                              | doBUTAmina     | Dobutrex                                       | Estimulante Adrenérgico      |
| Doxorrubicina                           | DOXOrrubicina | Adriblastina                                | Antineoplásico Citotóxico | Daunorrubicina                          | DAUNOrrubicina | Daunorrubicina                                 | Antineoplásico Citotóxico    |
| Doxorrubicina                           | DOXOrrubicina | Adriblastina                                | Antineoplásico Citotóxico | Epirubicina                             | EPIrrubicina   | Farmorubicina                                  | Antineoplásico Citotóxico    |
| Doxorrubicina                           | DOXOrrubicina | Adriblastina                                | Antineoplásico Citotóxico | Idarrubicina                            | IDArrubicina   | Zavedos                                        | Antineoplásico Citotóxico    |
| Duloxetina                              | DULoxetina    | Cymbalta                                    | Antidepressivo            | Fluoxetina                              | FLUoxetina     | Daforin                                        | Antidepressivo               |
| Efedrina                                | eFEDRina      | Efedrina Sulfato                            | Estimulante Adrenérgico   | Difenidramina                           | DIFENIDRA-Mina | Benadryl / Difenidrin                          | Anti-Histamínicos H1         |
| Efedrina                                | eFEDrina      | Efedrina Sulfato                            | Estimulante Adrenérgico   | Epinefrina                              | EPINEFrina     | Adrenalina Adren / Drenalin Efrinalin / Hydren | Estimulante Adrenérgico      |
| Efedrina                                | eFEDrina      | Efedrina Sulfato                            | Estimulante Adrenérgico   | Fenilefrina                             | FENILEFrina    | Fenilefrin®                                    | Estimulante Adrenérgico      |
| Efedrina                                | eFEDrina      | Efedrina Sulfato                            | Estimulante Adrenérgico   | Etilefrina                              | eTILEfrina     | Efortil                                        | Vasoconstritor e Hipertensor |

## MEDICAMENTOS SEMELHANTES POR FONÉTICA/ ESCRITA

| DROGA 1 POR FONÉTICA/ESCRITA SEMELHANTE | DESCRIÇÃO CD3 | NOME COMERCIAL OU PRINCÍPIO ATIVO (DROGA 1)                 | INDICAÇÃO TERAPEÚTICA        | DROGA 2 POR FONÉTICA/ESCRITA SEMELHANTE | DESCRIÇÃO CD3      | NOME COMERCIAL OU PRINCÍPIO ATIVO (DROGA 2) | INDICAÇÃO TERAPEÚTICA           |
|-----------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------|---------------------------------|
| Epinefrina                              | EPINEFrina    | Adrenalina<br>Adren/ Dre-<br>nalin<br>Efrinalin /<br>Hydren | Estimulante<br>Adrenérgico   | Efedrina                                | eFEDrina           | Efedrina Sulfato                            | Estimulante<br>Adrenérgico      |
| Epinefrina                              | EPINEFrina    | Adrenalina<br>Adren/ Dre-<br>nalin<br>Efrinalin /<br>Hydren | Estimulante<br>Adrenérgico   | Etilefrina                              | eTILEfrina         | Efortil                                     | Vasoconstritor<br>e Hipertensor |
| Epinefrina                              | EPINEFrina    | Adrenalina<br>Adren/ Dre-<br>nalin<br>Efrinalin /<br>Hydren | Estimulante<br>Adrenérgico   | Fenilefrina                             | FENILEFrina        | Fenilefrin                                  | Estimulante<br>Adrenérgico      |
| Epinefrina                              | EPINEFrina    | Adrenalina<br>Adren/ Dre-<br>nalin<br>Efrinalin /<br>Hydren | Estimulante<br>Adrenérgico   | Norepinefrina                           | NOREPine-<br>frina | Norepine                                    | Estimulante<br>Adrenérgico      |
| Epirrubicina                            | EPIRRubicina  | Farmorubicina                                               | Antineoplásico<br>Citotóxico | Doxorrubicina                           | DOXORrubi-<br>cina | Adriblastina                                | Antineoplásico<br>Citotóxico    |
| Eritromicina                            | ERITROmicina  | Eritrex                                                     | Antimicrobiano<br>Macrolídeo | Mitomicina                              | MitoMICina         | Mitocin                                     | Antineoplásico<br>Citotóxico    |

MEDICAMENTOS SEMELHANTES POR FONÉTICA/ ESCRITA

| DROGA 1 POR FONÉTICA/ESCRITA SEMELHANTE | DESCRIÇÃO CD3 | NOME COMERCIAL OU PRINCÍPIO ATIVO (DROGA 1) | INDICAÇÃO TERAPÊUTICA     | DROGA 2 POR FONÉTICA/ESCRITA SEMELHANTE | DESCRIÇÃO CD3 | NOME COMERCIAL OU PRINCÍPIO ATIVO (DROGA 2) | INDICAÇÃO TERAPÊUTICA          |
|-----------------------------------------|---------------|---------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------|---------------|---------------------------------------------|--------------------------------|
| Eritromicina                            | ERITROMICINA  | Eritrex                                     | Antimicrobiano Macrolídeo | Neomicina                               | NEOMICINA     | Neomicina                                   | Antimicrobiano Aminoglicosídeo |
| Eritromicina                            | ERITROMICINA  | Eritrex                                     | Antimicrobiano Macrolídeo | Bleomicina                              | BLEOMICINA    | Bonar                                       | Antineoplásicos Citotóxicos    |
| Eritromicina                            | ERITROMICINA  | Eritrex                                     | Antimicrobiano Macrolídeo | Vancomicina                             | VANCOMICINA   | Vancocina                                   | Antimicrobiano Glicopeptídeo   |
| Eritromicina                            | ERITROMICINA  | Eritrex                                     | Antimicrobiano Macrolídeo | Tobramicina                             | TOBRAMICINA   | Tobrex e Tobi                               | Antimicrobiano Aminoglicosídeo |
| Eritromicina                            | ERITROMICINA  | Eritrex                                     | Antimicrobiano Macrolídeo | Gentamicina                             | GENTAMICINA   | Gentamicin                                  | Antimicrobiano Aminoglicosídeo |
| Eritromicina                            | ERITROMICINA  | Eritrex                                     | Antimicrobiano Macrolídeo | Rifamicina                              | RIFAMICINA    | Rifocina                                    | Antimicrobiano Tópico          |
| Eritromicina                            | ERITROMICINA  | Eritrex                                     | Antimicrobiano Macrolídeo | Garamicina                              | GARAMICINA    | Garamicina                                  | Antimicrobiano Tópico          |
| Eritromicina                            | ERITROMICINA  | Eritrex                                     | Antimicrobiano Macrolídeo | Vibramicina                             | VIBRAMICINA   | Vibramicina                                 | Antimicrobiano Tetraciclina    |
| Eritromicina                            | ERITROMICINA  | Eritrex                                     | Antimicrobiano Macrolídeo | Daptomicina                             | DAPTOMICINA   | Cubicin                                     | Antimicrobiano Lipopeptídeo    |



## MEDICAMENTOS SEMELHANTES POR FONÉTICA/ ESCRITA

| DROGA 1 POR FONÉTICA/ESCRITA SEMELHANTE | DESCRIÇÃO CD3    | NOME COMERCIAL OU PRINCÍPIO ATIVO (DROGA 1) | INDICAÇÃO TERAPEÚTICA           | DROGA 2 POR FONÉTICA/ESCRITA SEMELHANTE | DESCRIÇÃO CD3    | NOME COMERCIAL OU PRINCÍPIO ATIVO (DROGA 2) | INDICAÇÃO TERAPEÚTICA           |
|-----------------------------------------|------------------|---------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|------------------|---------------------------------------------|---------------------------------|
| Eritromicina                            | ERITROMicina     | Eritrex                                     | Antimicrobiano Macrolídeo       | Clindamicina                            | CLINDAmicina     | Dalacin                                     | Antimicrobiano Lincosamida      |
| Eritromicina                            | ERITROMicina     | Eritrex                                     | Antimicrobiano Macrolídeo       | Claritomicina                           | CLARITROmicina   | Klaricid                                    | Antimicrobiano Macrolídeo       |
| Ertapenem                               | ERTApemem        | Invanz                                      | Antimicrobiano Carbapenêmicos   | Imipenem                                | IMipenem         | Tienam                                      | Antimicrobiano Carbapenêmicos   |
| Ertapenem                               | ERTApemem        | Invanz                                      | Antimicrobiano Carbapenêmicos   | Meropenem                               | MEROpenem        | Meronem                                     | Antimicrobiano Carbapenêmicos   |
| Escitalopram                            | ESCitalopram     | Lexapro                                     | Antidepressivo                  | Citalopram                              | CIItalopram      | Cipramil                                    | Antidepressivo                  |
| Esomeprazol                             | ESOmeprazol      | Nexium                                      | Antiulceroso                    | omeprazol                               | OMEprazol        | Losec/ Losar                                | Antiulceroso                    |
| Esomeprazol                             | ESOmeprazol      | Nexium                                      | Antiulceroso                    | Pantoprazol                             | PANTOprazol      | Pantocal / Pantozol                         | Antiulceroso                    |
| Estreptomicina                          | estreptoMICINA   | Estreptomicina                              | Antimicrobiano Tuberculostático | Estreptoquinase                         | estreptoQUI-NASE | Streptase                                   | Trombolítico                    |
| Estreptoquinase                         | estreptoQUI-NASE | Streptase                                   | Trombolítico                    | Estreptomicina                          | estreptoMI-CINA  | Estreptomicina                              | Antimicrobiano Tuberculostático |

MEDICAMENTOS SEMELHANTES POR FONÉTICA/ ESCRITA

| DROGA 1 POR FONÉTICA/ESCRITA SEMELHANTE | DESCRIÇÃO CD3 | NOME COMERCIAL OU PRINCÍPIO ATIVO (DROGA 1) | INDICAÇÃO TERAPÊUTICA        | DROGA 2 POR FONÉTICA/ESCRITA SEMELHANTE | DESCRIÇÃO CD3   | NOME COMERCIAL OU PRINCÍPIO ATIVO (DROGA 2)    | INDICAÇÃO TERAPÊUTICA          |
|-----------------------------------------|---------------|---------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------|--------------------------------|
| Etilefrina                              | eTILEfrina    | Efortil                                     | Vasoconstritor e Hipertensor | Efedrinaâ                               | eFEDrina        | Sulfato Efedrina                               | Estimulante Adrenérgico        |
| Etilefrina                              | eTILEfrina    | Efortil                                     | Vasoconstritor e Hipertensor | Epinefrina                              | EPINEFrina      | Adrenalina Adren/ Drenalin Efrinalin / Hy-dren | Estimulante Adrenérgico        |
| Etilefrina                              | eTILEfrina    | Efortil                                     | Vasoconstritor e Hipertensor | Fenilefrina                             | FENILEFrina     | Fenilefrina                                    | Estimulante Adrenérgico        |
| Fanciclovir                             | FAnciclovir   | Penvir                                      | Antiviral                    | Ganciclovir                             | GANCiclovir     | Cymevene                                       | Antivirais Cito-tóxicos        |
| Fanciclovir                             | FAnciclovir   | Penvir                                      | Antivirais Citotóxicos       | Valaciclovir                            | ValACiclovir    | Valtrex                                        | Antivirais Cito-tóxicos        |
| Fanciclovir                             | FAnciclovir   | Penvir                                      | Antivirais Citotóxicos       | Valganciclovir (não padrão)             | ValGANCi-clovir | Valcyte                                        | Antivirais Cito-tóxicos        |
| Fanciclovir                             | FAnciclovir   | Penvir                                      | Antivirais Citotóxicos       | Aciclovir                               | ACiclovir       | Aciclovir                                      | Antivirais Cito-tóxicos        |
| Fauldacar                               | FauldACAR     | Doxorrubicina                               | Antineoplásicos Citotóxicos  | Fauldvincrl                             | FauldVINCRI     | Vincristina                                    | Antineoplási-cos Citotóxicos   |
| Fauldacar                               | FauldACAR     | Doxorrubicina                               | Antineoplásicos Citotóxicos  | Fauldpami                               | FauldPAMI       | Pamidronato Dissódico                          | Inibidores da Reabsorção Óssea |

MEDICAMENTOS SEMELHANTES POR FONÉTICA/ ESCRITA

| DROGA 1 POR FONÉTICA/ESCRITA SEMELHANTE | DESCRIÇÃO CD3 | NOME COMERCIAL OU PRINCÍPIO ATIVO (DROGA 1) | INDICAÇÃO TERAPEÚTICA       | DROGA 2 POR FONÉTICA/ESCRITA SEMELHANTE | DESCRIÇÃO CD3 | NOME COMERCIAL OU PRINCÍPIO ATIVO (DROGA 2) | INDICAÇÃO TERAPEÚTICA          |
|-----------------------------------------|---------------|---------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|---------------|---------------------------------------------|--------------------------------|
| Fauldacar                               | FauldACAR     | Doxorrubicina                               | Antineoplásicos Citotóxicos | Fauldmetro                              | FauldMETRO    | Metotrexato                                 | Antineoplásicos Citotóxicos    |
| Fauldacar                               | FauldACAR     | Doxorrubicina                               | Antineoplásicos Citotóxicos | Fauldleuco                              | FauldLEUCO    | Folinato de Cálcio                          | Antídoto                       |
| Fauldacar                               | FauldACAR     | Doxorrubicina                               | Antineoplásicos Citotóxicos | Fauldfluor                              | FauldFLUOR    | Fluoruracila                                | Antineoplásicos Citotóxicos    |
| Fauldacar                               | FauldACAR     | Doxorrubicina                               | Antineoplásicos Citotóxicos | Fauldcita                               | FauldCITA     | Citarabina                                  | Antineoplásicos Citotóxicos    |
| Fauldacar                               | FauldACAR     | Doxorrubicina                               | Antineoplásicos Citotóxicos | Fauldcispla                             | FauldCISPLA   | Cisplatina                                  | Antineoplásicos Citotóxicos    |
| Fauldacar                               | FauldACAR     | Doxorrubicina                               | Antineoplásicos Citotóxicos | Fauldcarbo                              | FauldCARBO    | Carboplatina                                | Antineoplásicos Citotóxicos    |
| Fauldacar                               | FauldACAR     | Doxorrubicina                               | Antineoplásicos Citotóxicos | Fauldacar                               | FauldACAR     | Dacarbazina                                 | Antineoplásicos Citotóxicos    |
| Fauldcarbo                              | FauldCARBO    | Carboplatina                                | Antineoplásicos Citotóxicos | Fauldvinci                              | FauldVINCRI   | Vincristina                                 | Antineoplásicos Citotóxicos    |
| Fauldcarbo                              | FauldCARBO    | Carboplatina                                | Antineoplásicos Citotóxicos | Fauldpami                               | FauldPAMI     | Pamidronato Dissódico                       | Inibidores da Reabsorção Óssea |
| Fauldcarbo                              | FauldCARBO    | Carboplatina                                | Antineoplásicos Citotóxicos | Fauldodoxo                              | FauldOXO      | Doxorrubicina                               | Antineoplásicos Citotóxicos    |

MEDICAMENTOS SEMELHANTES POR FONÉTICA/ ESCRITA

| DROGA 1 POR FONÉTICA/ESCRITA SEMELHANTE | DESCRIÇÃO CD3 | NOME COMERCIAL OU PRINCÍPIO ATIVO (DROGA 1) | INDICAÇÃO TERAPÊUTICA       | DROGA 2 POR FONÉTICA/ESCRITA SEMELHANTE | DESCRIÇÃO CD3 | NOME COMERCIAL OU PRINCÍPIO ATIVO (DROGA 2) | INDICAÇÃO TERAPÊUTICA            |
|-----------------------------------------|---------------|---------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|---------------|---------------------------------------------|----------------------------------|
| Fauldcarbo                              | FauldCARBO    | Carboplatina                                | Antineoplásicos Citotóxicos | Fauldmetro                              | FauldMETRO    | Metotrexato                                 | Antineoplási-<br>cos Citotóxicos |
| Fauldcarbo                              | FauldCARBO    | Carboplatina                                | Antineoplásicos Citotóxicos | Fauldleuco                              | FauldLEUCO    | Folinato de Cálcio                          | Antídoto                         |
| Fauldcarbo                              | FauldCARBO    | Carboplatina                                | Antineoplásicos Citotóxicos | Fauldfluor                              | FauldFLUOR    | Fluoruracila                                | Antineoplási-<br>cos Citotóxicos |
| Fauldcarbo                              | FauldCARBO    | Carboplatina                                | Antineoplásicos Citotóxicos | Fauldcita                               | FauldCITA     | Citarabina                                  | Antineoplási-<br>cos Citotóxicos |
| Fauldcarbo                              | FauldCARBO    | Carboplatina                                | Antineoplásicos Citotóxicos | Fauldcispla                             | FauldCISPLA   | Cisplatina                                  | Antineoplási-<br>cos Citotóxicos |
| Fauldcarbo                              | FauldCARBO    | Carboplatina                                | Antineoplásicos Citotóxicos | Fauldacar                               | FauldACAR     | Dacarbazina                                 | Antineoplási-<br>cos Citotóxicos |
| Fauldcispla                             | FauldCISPLA   | Cisplatina                                  | Antineoplásicos Citotóxicos | Fauldvincri                             | FauldVINCRI   | Vincristina                                 | Antineoplási-<br>cos Citotóxicos |
| Fauldcispla                             | FauldCISPLA   | Cisplatina                                  | Antineoplásicos Citotóxicos | Fauldpami                               | FauldPAMI     | Pamidronato Dissódico                       | Inibidores da Reabsorção Óssea   |
| Fauldcispla                             | FauldCISPLA   | Cisplatina                                  | Antineoplásicos Citotóxicos | Fauldoxo                                | FauldOXO      | Doxorrubicina                               | Antineoplási-<br>cos Citotóxicos |
| Fauldcispla                             | FauldCISPLA   | Cisplatina                                  | Antineoplásicos Citotóxicos | Fauldmetro                              | FauldMETRO    | Metotrexato                                 | Antineoplási-<br>cos Citotóxicos |

MEDICAMENTOS SEMELHANTES POR FONÉTICA/ ESCRITA

| DROGA 1 POR FONÉTICA/ESCRITA SEMELHANTE | DESCRIÇÃO CD3 | NOME COMERCIAL OU PRINCÍPIO ATIVO (DROGA 1) | INDICAÇÃO TERAPÊUTICA       | DROGA 2 POR FONÉTICA/ESCRITA SEMELHANTE | DESCRIÇÃO CD3 | NOME COMERCIAL OU PRINCÍPIO ATIVO (DROGA 2) | INDICAÇÃO TERAPÊUTICA                |
|-----------------------------------------|---------------|---------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|---------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|
| Fauldcispla                             | FauldCISPLA   | Cisplatina                                  | Antineoplásicos Citotóxicos | Fauldleuco                              | FauldLEUCO    | Folinato de Cálcio                          | Antídoto                             |
| Fauldcispla                             | FauldCISPLA   | Cisplatina                                  | Antineoplásicos Citotóxicos | Fauldfluor                              | FauldFLUOR    | Fluoruracila                                | Antineoplási-<br>cos Citotóxicos     |
| Fauldcispla                             | FauldCISPLA   | Cisplatina                                  | Antineoplásicos Citotóxicos | Fauldcita                               | FauldCITA     | Citarabina                                  | Antineoplási-<br>cos Citotóxicos     |
| Fauldcispla                             | FauldCISPLA   | Cisplatina                                  | Antineoplásicos Citotóxicos | Fauldcarbo                              | FauldCARBO    | Carboplatina                                | Antineoplási-<br>cos Citotóxicos     |
| Fauldcispla                             | FauldCISPLA   | Cisplatina                                  | Antineoplásicos Citotóxicos | Fauldacar                               | FauldACAR     | Dacarbazina                                 | Antineoplási-<br>cos Citotóxicos     |
| Fauldcita                               | FauldCITA     | Citarabina                                  | Antineoplásicos Citotóxicos | Fauldvinci                              | FauldVINCRI   | Vincristina                                 | Antineoplási-<br>cos Citotóxicos     |
| Fauldcita                               | FauldCITA     | Citarabina                                  | Antineoplásicos Citotóxicos | Fauldpami                               | FauldPAMI     | Pamidronato Dissódico                       | Inibidores da<br>Reabsorção<br>Óssea |
| Fauldcita                               | FauldCITA     | Citarabina                                  | Antineoplásicos Citotóxicos | Fauldexo                                | FauldOXO      | Doxorrubicina                               | Antineoplási-<br>cos Citotóxicos     |
| Fauldcita                               | FauldCITA     | Citarabina                                  | Antineoplásicos Citotóxicos | Fauldmetro                              | FauldMETRO    | Metotrexato                                 | Antineoplási-<br>cos Citotóxicos     |
| Fauldcita                               | FauldCITA     | Citarabina                                  | Antineoplásicos Citotóxicos | Fauldleuco                              | FauldLEUCO    | Folinato de Cálcio                          | Antídoto                             |

MEDICAMENTOS SEMELHANTES POR FONÉTICA/ ESCRITA

| DROGA 1 POR FONÉTICA/ESCRITA SEMELHANTE | DESCRIÇÃO CD3 | NOME COMERCIAL OU PRINCÍPIO ATIVO (DROGA 1) | INDICAÇÃO TERAPÊUTICA       | DROGA 2 POR FONÉTICA/ESCRITA SEMELHANTE | DESCRIÇÃO CD3 | NOME COMERCIAL OU PRINCÍPIO ATIVO (DROGA 2) | INDICAÇÃO TERAPÊUTICA          |
|-----------------------------------------|---------------|---------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|---------------|---------------------------------------------|--------------------------------|
| Fauldcita                               | FauldCITA     | Citarabina                                  | Antineoplásicos Citotóxicos | Fauldfluor                              | FauldFLUOR    | Fluoruracila                                | Antineoplásicos Citotóxicos    |
| Fauldcita                               | FauldCITA     | Citarabina                                  | Antineoplásicos Citotóxicos | Fauldcispla                             | FauldCISPLA   | Cisplatina                                  | Antineoplásicos Citotóxicos    |
| Fauldcita                               | FauldCITA     | Citarabina                                  | Antineoplásicos Citotóxicos | Fauldcarbo                              | FauldCARBO    | Carboplatina                                | Antineoplásicos Citotóxicos    |
| Fauldcita                               | FauldCITA     | Citarabina                                  | Antineoplásicos Citotóxicos | Fauldacar                               | FauldACAR     | Dacarbazina                                 | Antineoplásicos Citotóxicos    |
| Fauldfluor                              | FauldFLUOR    | Fluoruracila                                | Antineoplásicos Citotóxicos | Fauldvincri                             | FauldVINCRI   | Vincristina                                 | Antineoplásicos Citotóxicos    |
| Fauldfluor                              | FauldFLUOR    | Fluoruracila                                | Antineoplásicos Citotóxicos | Fauldpami                               | FauldPAMI     | Pamidronato Dissódico                       | Inibidores da Reabsorção Óssea |
| Fauldfluor                              | FauldFLUOR    | Fluoruracila                                | Antineoplásicos Citotóxicos | Fauldodoxo                              | FauldOXO      | Doxorrubicina                               | Antineoplásicos Citotóxicos    |
| Fauldfluor                              | FauldFLUOR    | Fluoruracila                                | Antineoplásicos Citotóxicos | Fauldmetro                              | FauldMETRO    | Metotrexato                                 | Antineoplásicos Citotóxicos    |
| Fauldfluor                              | FauldFLUOR    | Fluoruracila                                | Antineoplásicos Citotóxicos | Fauldleuco                              | FauldLEUCO    | Folinato de Cálcio                          | Antídoto                       |
| Fauldfluor                              | FauldFLUOR    | Fluoruracila                                | Antineoplásicos Citotóxicos | Fauldcita                               | FauldCITA     | Citarabina                                  | Antineoplásicos Citotóxicos    |

## MEDICAMENTOS SEMELHANTES POR FONÉTICA/ ESCRITA

| DROGA 1 POR FONÉTICA/ESCRITA SEMELHANTE | DESCRIÇÃO CD3 | NOME COMERCIAL OU PRINCÍPIO ATIVO (DROGA 1) | INDICAÇÃO TERAPÊUTICA       | DROGA 2 POR FONÉTICA/ESCRITA SEMELHANTE | DESCRIÇÃO CD3 | NOME COMERCIAL OU PRINCÍPIO ATIVO (DROGA 2) | INDICAÇÃO TERAPÊUTICA          |
|-----------------------------------------|---------------|---------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|---------------|---------------------------------------------|--------------------------------|
| Fauldfluor                              | FauldFLUOR    | Fluoruracila                                | Antineoplásicos Citotóxicos | Fauldcispla                             | FauldCISPLA   | Cisplatina                                  | Antineoplásicos Citotóxicos    |
| Fauldfluor                              | FauldFLUOR    | Fluoruracila                                | Antineoplásicos Citotóxicos | Fauldcarbo                              | FauldCARBO    | Carboplatina                                | Antineoplásicos Citotóxicos    |
| Fauldfluor                              | FauldFLUOR    | Fluoruracila                                | Antineoplásicos Citotóxicos | Fauldacar                               | FauldACAR     | Dacarbazina                                 | Antineoplásicos Citotóxicos    |
| Fauldacar                               | FauldACAR     | Dacarbazina                                 | Antineoplásicos Citotóxicos | Fauldvincri                             | FauldVINCRI   | Vincristina                                 | Antineoplásicos Citotóxicos    |
| Fauldacar                               | FauldACAR     | Dacarbazina                                 | Antineoplásicos Citotóxicos | Fauldpami                               | FauldPAMI     | Pamidronato Dissódico                       | Inibidores da Reabsorção Óssea |
| Fauldacar                               | FauldACAR     | Dacarbazina                                 | Antineoplásicos Citotóxicos | Fauldoxo                                | FauldOXO      | Doxorrubicina                               | Antineoplásicos Citotóxicos    |
| Fauldacar                               | FauldACAR     | Dacarbazina                                 | Antineoplásicos Citotóxicos | Fauldmetro                              | FauldMETRO    | Metotrexato                                 | Antineoplásicos Citotóxicos    |
| Fauldacar                               | FauldACAR     | Dacarbazina                                 | Antineoplásicos Citotóxicos | Fauldfluor                              | FauldFLUOR    | Fluoruracila                                | Antineoplásicos Citotóxicos    |
| Fauldacar                               | FauldACAR     | Dacarbazina                                 | Antineoplásicos Citotóxicos | Fauldcita                               | FauldCITA     | Citarabina                                  | Antineoplásicos Citotóxicos    |
| Fauldacar                               | FauldACAR     | Dacarbazina                                 | Antineoplásicos Citotóxicos | Fauldcispla                             | FauldCISPLA   | Cisplatina                                  | Antineoplásicos Citotóxicos    |

MEDICAMENTOS SEMELHANTES POR FONÉTICA/ ESCRITA

| DROGA 1 POR FONÉTICA/ESCRITA SEMELHANTE | DESCRIÇÃO CD3 | NOME COMERCIAL OU PRINCÍPIO ATIVO (DROGA 1) | INDICAÇÃO TERAPÊUTICA       | DROGA 2 POR FONÉTICA/ESCRITA SEMELHANTE | DESCRIÇÃO CD3 | NOME COMERCIAL OU PRINCÍPIO ATIVO (DROGA 2) | INDICAÇÃO TERAPÊUTICA            |
|-----------------------------------------|---------------|---------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|---------------|---------------------------------------------|----------------------------------|
| Fauldacar                               | FauldACAR     | Dacarbazina                                 | Antineoplásicos Citotóxicos | Fauldcarbo                              | FauldCARBO    | Carboplatina                                | Antineoplási-<br>cos Citotóxicos |
| Fauldacar                               | FauldACAR     | Dacarbazina                                 | Antineoplásicos Citotóxicos | Fauldleuco                              | FauldLEUCO    | Folinato de Cálcio                          | Antídoto                         |
| Fauldleuco                              | FauldLEUCO    | Folinato de Cálcio                          | Antídoto                    | Fauldvincri                             | FauldVINCRI   | Vincristina                                 | Antineoplási-<br>cos Citotóxicos |
| Fauldleuco                              | FauldLEUCO    | Folinato de Cálcio                          | Antídoto                    | Fauldpami                               | FauldPAMI     | Pamidronato Dissódico                       | Inibidores da Reabsorção Óssea   |
| Fauldleuco                              | FauldLEUCO    | Folinato de Cálcio                          | Antídoto                    | Fauldmetro                              | FauldMETRO    | Metotrexato                                 | Antineoplási-<br>cos Citotóxicos |
| Fauldleuco                              | FauldLEUCO    | Folinato de Cálcio                          | Antídoto                    | Fauldleuco                              | FauldLEUCO    | Folinato de Cálcio                          | Antídoto                         |
| Fauldleuco                              | FauldLEUCO    | Folinato de Cálcio                          | Antídoto                    | Fauldfluor                              | FauldFLUOR    | Fluoruracila                                | Antineoplási-<br>cos Citotóxicos |
| Fauldleuco                              | FauldLEUCO    | Folinato de Cálcio                          | Antídoto                    | Fauldcita                               | FauldCITA     | Citarabina                                  | Antineoplási-<br>cos Citotóxicos |
| Fauldleuco                              | FauldLEUCO    | Folinato de Cálcio                          | Antídoto                    | Fauldcispla                             | FauldCISPLA   | Cisplatina                                  | Antineoplási-<br>cos Citotóxicos |
| Fauldleuco                              | FauldLEUCO    | Folinato de Cálcio                          | Antídoto                    | Fauldcarbo                              | FauldCARBO    | Carboplatina                                | Antineoplási-<br>cos Citotóxicos |



## MEDICAMENTOS SEMELHANTES POR FONÉTICA/ ESCRITA

| DROGA 1 POR FONÉTICA/ESCRITA SEMELHANTE | DESCRIÇÃO CD3 | NOME COMERCIAL OU PRINCÍPIO ATIVO (DROGA 1) | INDICAÇÃO TERAPÊUTICA          | DROGA 2 POR FONÉTICA/ESCRITA SEMELHANTE | DESCRIÇÃO CD3 | NOME COMERCIAL OU PRINCÍPIO ATIVO (DROGA 2) | INDICAÇÃO TERAPÊUTICA                |
|-----------------------------------------|---------------|---------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|---------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|
| Fauldleuco                              | FauldLEUCO    | Folinato de Cálcio                          | Antídoto                       | Fauldacar                               | FauldACAR     | Dacarbazina                                 | Antineoplá-<br>cos Citotóxicos       |
| Fauldmetro                              | FauldMETRO    | Metotrexato                                 | Antineoplásicos<br>Citotóxicos | Fauldvinci                              | FauldVINCRI   | Vincristina                                 | Antineoplá-<br>cos Citotóxicos       |
| Fauldmetro                              | FauldMETRO    | Metotrexato                                 | Antineoplásicos<br>Citotóxicos | Fauldpami                               | FauldPAMI     | Pamidronato<br>Dissódico                    | Inibidores da<br>Reabsorção<br>Óssea |
| Fauldmetro                              | FauldMETRO    | Metotrexato                                 | Antineoplásicos<br>Citotóxicos | Fauldoxo                                | FauldOXO      | Doxorrubicina                               | Antineoplá-<br>cos Citotóxicos       |
| Fauldmetro                              | FauldMETRO    | Metotrexato                                 | Antineoplásicos<br>Citotóxicos | Fauldleuco                              | FauldLEUCO    | Folinato de<br>Cálcio                       | Antídoto                             |
| Fauldmetro                              | FauldMETRO    | Metotrexato                                 | Antineoplásicos<br>Citotóxicos | Fauldfluor                              | FauldFLUOR    | Fluoruracila                                | Antineoplá-<br>cos Citotóxicos       |
| Fauldmetro                              | FauldMETRO    | Metotrexato                                 | Antineoplásicos<br>Citotóxicos | Fauldcita                               | FauldCITA     | Citarabina                                  | Antineoplá-<br>cos Citotóxicos       |
| Fauldmetro                              | FauldMETRO    | Metotrexato                                 | Antineoplásicos<br>Citotóxicos | Fauldcispla                             | FauldCISPLA   | Cisplatina                                  | Antineoplá-<br>cos Citotóxicos       |
| Fauldmetro                              | FauldMETRO    | Metotrexato                                 | Antineoplásicos<br>Citotóxicos | Fauldcarbo                              | FauldCARBO    | Carboplatina                                | Antineoplá-<br>cos Citotóxicos       |
| Fauldmetro                              | FauldMETRO    | Metotrexato                                 | Antineoplásicos<br>Citotóxicos | Fauldacar                               | FauldACAR     | Dacarbazina                                 | Antineoplá-<br>cos Citotóxicos       |

MEDICAMENTOS SEMELHANTES POR FONÉTICA/ ESCRITA

| DROGA 1 POR FONÉTICA/ESCRITA SEMELHANTE | DESCRIÇÃO CD3 | NOME COMERCIAL OU PRINCÍPIO ATIVO (DROGA 1) | INDICAÇÃO TERAPÊUTICA          | DROGA 2 POR FONÉTICA/ESCRITA SEMELHANTE | DESCRIÇÃO CD3 | NOME COMERCIAL OU PRINCÍPIO ATIVO (DROGA 2) | INDICAÇÃO TERAPÊUTICA          |
|-----------------------------------------|---------------|---------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|---------------|---------------------------------------------|--------------------------------|
| Fauldodoxo                              | FauldOXO      | Doxorrubicina                               | Antineoplásicos Citotóxicos    | Fauldvinciri                            | FauldVINCRI   | Vincristina                                 | Antineoplásicos Citotóxicos    |
| Fauldodoxo                              | FauldOXO      | Doxorrubicina                               | Antineoplásicos Citotóxicos    | Fauldpami                               | FauldPAMI     | Pamidronato Dissódico                       | Inibidores da Reabsorção Óssea |
| Fauldodoxo                              | FauldOXO      | Doxorrubicina                               | Antineoplásicos Citotóxicos    | Fauldmetro                              | FauldMETRO    | Metotrexato                                 | Antineoplásicos Citotóxicos    |
| Fauldodoxo                              | FauldOXO      | Doxorrubicina                               | Antineoplásicos Citotóxicos    | Fauldleuco                              | FauldLEUCO    | Folinato de Cálcio                          | Antídoto                       |
| Fauldodoxo                              | FauldOXO      | Doxorrubicina                               | Antineoplásicos Citotóxicos    | Fauldfluor                              | FauldFLUOR    | Fluoruracila                                | Antineoplásicos Citotóxicos    |
| Fauldodoxo                              | FauldOXO      | Doxorrubicina                               | Antineoplásicos Citotóxicos    | Fauldcita                               | FauldCITA     | Citarabina                                  | Antineoplásicos Citotóxicos    |
| Fauldodoxo                              | FauldOXO      | Doxorrubicina                               | Antineoplásicos Citotóxicos    | Fauldcispla                             | FauldCISPLA   | Cisplatina                                  | Antineoplásicos Citotóxicos    |
| Fauldodoxo                              | FauldOXO      | Doxorrubicina                               | Antineoplásicos Citotóxicos    | Fauldcarbo                              | FauldCARBO    | Carboplatina                                | Antineoplásicos Citotóxicos    |
| Fauldodoxo                              | FauldOXO      | Doxorrubicina                               | Antineoplásicos Citotóxicos    | Fauldacar                               | FauldACAR     | Dacarbazina                                 | Antineoplásicos Citotóxicos    |
| Fauldpami                               | FauldPAMI     | Pamidronato Dissódico                       | Inibidores da Reabsorção Óssea | Fauldcarbo                              | FauldCARBO    | Carboplatina                                | Antineoplásicos Citotóxicos    |

## MEDICAMENTOS SEMELHANTES POR FONÉTICA/ ESCRITA

| DROGA 1 POR FONÉTICA/ESCRITA SEMELHANTE | DESCRIÇÃO CD3 | NOME COMERCIAL OU PRINCÍPIO ATIVO (DROGA 1) | INDICAÇÃO TERAPEÚTICA           | DROGA 2 POR FONÉTICA/ESCRITA SEMELHANTE | DESCRIÇÃO CD3 | NOME COMERCIAL OU PRINCÍPIO ATIVO (DROGA 2) | INDICAÇÃO TERAPEÚTICA          |
|-----------------------------------------|---------------|---------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|---------------|---------------------------------------------|--------------------------------|
| Fauldpami                               | FauldPAMI     | Pamidronato Dissódico                       | Inibidores da Re-absorção Óssea | Fauldvinci                              | FauldVINCRI   | Vincristina                                 | Antineoplásicos Citotóxicos    |
| Fauldpami                               | FauldPAMI     | Pamidronato Dissódico                       | Inibidores da Re-absorção Óssea | Fauldoxo                                | FauldOXO      | Doxorrubicina                               | Antineoplásicos Citotóxicos    |
| Fauldpami                               | FauldPAMI     | Pamidronato Dissódico                       | Inibidores da Re-absorção Óssea | Fauldmetro                              | FauldMETRO    | Metotrexato                                 | Antineoplásicos Citotóxicos    |
| Fauldpami                               | FauldPAMI     | Pamidronato Dissódico                       | Inibidores da Re-absorção Óssea | Fauldleuco                              | FauldLEUCO    | Folinato de Cálcio                          | Antídoto                       |
| Fauldpami                               | FauldPAMI     | Pamidronato Dissódico                       | Inibidores da Re-absorção Óssea | Fauldfluor                              | FauldFLUOR    | Fluoruracila                                | Antineoplásicos Citotóxicos    |
| Fauldpami                               | FauldPAMI     | Pamidronato Dissódico                       | Inibidores da Re-absorção Óssea | Fauldcita                               | FauldCITA     | Citarabina                                  | Antineoplásicos Citotóxicos    |
| Fauldpami                               | FauldPAMI     | Pamidronato Dissódico                       | Inibidores da Re-absorção Óssea | Fauldcispla                             | FauldCISPLA   | Cisplatina                                  | Antineoplásicos Citotóxicos    |
| Fauldpami                               | FauldPAMI     | Pamidronato Dissódico                       | Inibidores da Re-absorção Óssea | Fauldacar                               | FauldACAR     | Dacarbazina                                 | Antineoplásicos Citotóxicos    |
| Fauldvinci                              | FauldVINCRI   | Vincristina                                 | Antineoplásicos Citotóxicos     | Fauldpami                               | FauldPAMI     | Pamidronato Dissódico                       | Inibidores da Reabsorção Óssea |
| Fauldvinci                              | FauldVINCRI   | Vincristina                                 | Antineoplásicos Citotóxicos     | Fauldoxo                                | FauldOXO      | Doxorrubicina                               | Antineoplásicos Citotóxicos    |

MEDICAMENTOS SEMELHANTES POR FONÉTICA/ ESCRITA

| DROGA 1 POR FONÉTICA/ESCRITA SEMELHANTE | DESCRIÇÃO CD3 | NOME COMERCIAL OU PRINCÍPIO ATIVO (DROGA 1) | INDICAÇÃO TERAPÊUTICA       | DROGA 2 POR FONÉTICA/ESCRITA SEMELHANTE | DESCRIÇÃO CD3 | NOME COMERCIAL OU PRINCÍPIO ATIVO (DROGA 2)                    | INDICAÇÃO TERAPÊUTICA            |
|-----------------------------------------|---------------|---------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Fauldvinciri                            | FauldVINCRI   | Vincristina                                 | Antineoplásicos Citotóxicos | Fauldmetro                              | FauldMETRO    | Metotrexato                                                    | Antineoplási-<br>cos Citotóxicos |
| Fauldvinciri                            | FauldVINCRI   | Vincristina                                 | Antineoplásicos Citotóxicos | Fauldleuco                              | FauldLEUCO    | Folinato de Cálcio                                             | Antídoto                         |
| Fauldvinciri                            | FauldVINCRI   | Vincristina                                 | Antineoplásicos Citotóxicos | Fauldfluor                              | FauldFLUOR    | Fluoruracila                                                   | Antineoplási-<br>cos Citotóxicos |
| Fauldvinciri                            | FauldVINCRI   | Vincristina                                 | Antineoplásicos Citotóxicos | Fauldcita                               | FauldCITA     | Citarabina                                                     | Antineoplási-<br>cos Citotóxicos |
| Fauldvinciri                            | FauldVINCRI   | Vincristina                                 | Antineoplásicos Citotóxicos | Fauldcispla                             | FauldCISPLA   | Cisplatina                                                     | Antineoplási-<br>cos Citotóxicos |
| Fauldvinciri                            | FauldVINCRI   | Vincristina                                 | Antineoplásicos Citotóxicos | Fauldcarbo                              | FauldCARBO    | Carboplatina                                                   | Antineoplási-<br>cos Citotóxicos |
| Fauldvinciri                            | FauldVINCRI   | Vincristina                                 | Antineoplásicos Citotóxicos | Fauldacar                               | FauldACAR     | Dacarbazina                                                    | Antineoplási-<br>cos Citotóxicos |
| Fenilefrina                             | FENILEFRina   | Fenilefrin                                  | Estimulante Adrenérgico     | Efedrina                                | eFEDrina      | Efedrina Sulfato                                               | Estimulante Adrenérgico          |
| Fenilefrina                             | FENILEFRina   | Fenilefrin                                  | Estimulante Adrenérgico     | Epinefrina                              | EPINEFRina    | Adrenalina<br>Adren / Dre-<br>nalin<br>Efrinalin / Hy-<br>dren | Estimulante Adrenérgico          |

## MEDICAMENTOS SEMELHANTES POR FONÉTICA/ ESCRITA

| DROGA 1 POR FONÉTICA/ESCRITA SEMELHANTE | DESCRIÇÃO CD3 | NOME COMERCIAL OU PRINCÍPIO ATIVO (DROGA 1) | INDICAÇÃO TERAPÊUTICA   | DROGA 2 POR FONÉTICA/ESCRITA SEMELHANTE | DESCRIÇÃO CD3    | NOME COMERCIAL OU PRINCÍPIO ATIVO (DROGA 2) | INDICAÇÃO TERAPÊUTICA        |
|-----------------------------------------|---------------|---------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|------------------|---------------------------------------------|------------------------------|
| Fenilefrina                             | FENILEFRina   | Fenilefrin                                  | Estimulante Adrenérgico | Etilefrina                              | eTILEfrina       | Efortil                                     | Vasoconstritor e Hipertensor |
| Fenitoína                               | FENItóina     | Hidantal                                    | Anticonvulsivantes      | NITROFURAntoína                         | NITROFU-RANToína | Macrofantina                                | Antimicrobiano Nitrofurano   |
| Fentanil                                | fentaNIL      | Fentanila Citrato Fentanest                 | Analgésico Narcótico    | Sufenta                                 | SUFenta          | Sufentanila Citrato                         | Analgésico Narcótico         |
| Fentanila                               | FENTanila     | Fentanil / Fentanest Durogesic              | Analgésico Narcótico    | Alfantanila                             | ALfantanila      | Rapifen                                     | Analgésico Narcótico         |
| Fentanila                               | FENTanila     | Fentanil/ Fentanest Durogesic               | Analgésico Narcótico    | Sufentanila                             | SUFentanila      | Sufenta                                     | Analgésicos Narcóticos       |
| Fentanila                               | FENTanila     | Fentanest/ Fentanil                         | Analgésicos Narcóticos  | Remifentanila                           | REMIfentanila    | Ultiva                                      | Analgésicos Narcóticos       |
| Fluconazol                              | FLUconazol    | Zoltec                                      | Antifúngico             | Voriconazol                             | VORIconazol      | Vfend                                       | Antifúngico Sistêmico        |
| Fluconazol                              | FLUconazol    | Zoltec                                      | Antifúngico             | Cetoconazol                             | CETOconazol      | Cetoconazol                                 | Antifúngico Sistêmico        |
| Fluconazol                              | FLUconazol    | Zoltec                                      | Antifúngico             | Tioconazol                              | TIOconazol       | Tralen                                      | Antifúngico                  |

MEDICAMENTOS SEMELHANTES POR FONÉTICA/ ESCRITA

| DROGA 1 POR FONÉTICA/ESCRITA SEMELHANTE | DESCRIÇÃO CD3    | NOME COMERCIAL OU PRINCÍPIO ATIVO (DROGA 1) | INDICAÇÃO TERAPÊUTICA                  | DROGA 2 POR FONÉTICA/ESCRITA SEMELHANTE | DESCRIÇÃO CD3   | NOME COMERCIAL OU PRINCÍPIO ATIVO (DROGA 2) | INDICAÇÃO TERAPÊUTICA                  |
|-----------------------------------------|------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|
| Fluconazol                              | FLUconazol       | Zoltec                                      | Antifúngico                            | Oxiconazol                              | OXIconazol      | Oceral                                      | Antifúngico                            |
| Fluconazol                              | FLUconazol       | Zoltec                                      | Antifúngico                            | Miconazol                               | Miconazol       | Vodol                                       | Antifúngico                            |
| Fluconazol                              | FLUconazol       | Zoltec                                      | Antifúngico                            | Isoconazol                              | ISOconazol      | Icaden                                      | Antifúngico                            |
| Fluconazol                              | FLUconazol       | Zoltec                                      | Antifúngico                            | Itraconazol                             | ITRAconazol     | Sporanox                                    | Antifúngico                            |
| Fludrocortisona                         | FLUDROcorti-sona | Florinef                                    | Antiinflamatório esteroideal sistêmico | Hidro cortisona                         | HIDROcorti-sona | Cortisonal                                  | Antiinflamatório esteroideal sistêmico |
| Flunitrazepam                           | FluNITRAze-pam   | Rohydorm/ Rohypnol                          | Hipnóticos                             | Clonazepam                              | CLONAze-pam     | Rivotril                                    | Anticonvulsivantes                     |
| Flunitrazepam                           | FluNITRAze-pam   | Rohydorm/ Rohypnol                          | Hipnóticos                             | Diazepam                                | DIAzepam        | Dienpax/Valium                              | Ansiolíticos                           |
| Flunitrazepam                           | FluNITRAze-pam   | Rohydorm/ Rohypnol                          | Hipnóticos                             | Bromazepam                              | BROMAze-pam     | Lexotan / So-malium                         | Ansiolíticos                           |
| Flunitrazepam                           | FluNITRAze-pam   | Rohydorm/ Rohypnol                          | Hipnóticos                             | Flurazepam                              | FLURAzepam      | Dalmadorm                                   | Hipnóticos                             |
| Flunitrazepam                           | FluNITRAze-pam   | Rohydorm/ Rohypnol                          | Hipnóticos                             | Lorazepam                               | LORAzepam       | Lorax/ Loraze-fast                          | Ansiolíticos                           |

## MEDICAMENTOS SEMELHANTES POR FONÉTICA/ ESCRITA

| DROGA 1 POR FONÉTICA/ESCRITA SEMELHANTE | DESCRIÇÃO CD3 | NOME COMERCIAL OU PRINCÍPIO ATIVO (DROGA 1) | INDICAÇÃO TERAPÊUTICA                          | DROGA 2 POR FONÉTICA/ESCRITA SEMELHANTE | DESCRIÇÃO CD3       | NOME COMERCIAL OU PRINCÍPIO ATIVO (DROGA 2) | INDICAÇÃO TERAPÊUTICA                          |
|-----------------------------------------|---------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Fluoxetina                              | FLUoxetina    | Daforin                                     | Antidepressivo                                 | Duloxetina                              | DULoxetina          | Cymbalta                                    | Antidepressivo                                 |
| Flurbiprofeno                           | FLURBiprofeno | Strepsils                                   | Antiinflamatório Oftálmico                     | Cetoprofeno                             | CETOprofeno         | Profenid                                    | Antiinflamatório não esteroi-<br>dal sistêmico |
| Flurbiprofeno                           | FLURBiprofeno | Strepsils                                   | Antiinflamatório não esteroi-<br>dal sistêmico | Ibuprofeno                              | IBUprofeno          | Alivium / Ad-vil                            | Antiinflamatório não esteroi-<br>dal sistêmico |
| Foradil                                 | ForaDIL       | Formoterol                                  | Broncodilatador                                | Toradol                                 | TORadol             | Trometamina,<br>cetorolaco                  | Antiinflamatório não esteroi-<br>dal sistêmico |
| Formoterol                              | FORMoterol    | Formoterol                                  | Broncodilata-<br>dores                         | Fenoterol                               | FENoterol           | Berotec                                     |                                                |
| Fusafungina                             | FUSAfungina   | Locabiotol                                  | Broncodilatador                                | Anidulafungina                          | ANIDULAfun-<br>gina | Ecalta                                      | Antifúngico Sistêmico                          |
| Fusafungina                             | FUSAfungina   | Locabiotol                                  | Broncodilatador                                | Caspofungina                            | CASPOfun-<br>gina   | Cancidas                                    | Antifúngico Sistêmico                          |
| Fusafungina                             | FUSAfungina   | Locabiotol                                  | Broncodilatador                                | Micafungina                             | MICAfungina         | Mycamine                                    | Antifúngico Sistêmico                          |
| Ganciclovir                             | GANCiclovir   | Cymevene                                    | Antivirais Cito-<br>tóxicos                    | Aciclovir                               | Aciclovir           | Aciclovir                                   | Antivirais                                     |

MEDICAMENTOS SEMELHANTES POR FONÉTICA/ ESCRITA

| DROGA 1 POR FONÉTICA/ESCRITA SEMELHANTE | DESCRIÇÃO CD3 | NOME COMERCIAL OU PRINCÍPIO ATIVO (DROGA 1) | INDICAÇÃO TERAPÊUTICA | DROGA 2 POR FONÉTICA/ESCRITA SEMELHANTE | DESCRIÇÃO CD3 | NOME COMERCIAL OU PRINCÍPIO ATIVO (DROGA 2) | INDICAÇÃO TERAPÊUTICA          |
|-----------------------------------------|---------------|---------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|---------------|---------------------------------------------|--------------------------------|
| Garamicina                              | GARAMicina    | Garamicina                                  | Antimicrobiano Tópico | Mitomicina                              | MitoMicina    | Mitocin                                     | Antineoplásico Citotóxico      |
| Garamicina                              | GARAMicina    | Garamicina                                  | Antimicrobiano Tópico | Neomicina                               | NEOMicina     | Neomicina                                   | Antimicrobiano Aminoglicosídeo |
| Garamicina                              | GARAMicina    | Garamicina                                  | Antimicrobiano Tópico | Bleomicina                              | BLEOMicina    | Bonar                                       | Antineoplásicos Citotóxicos    |
| Garamicina                              | GARAMicina    | Garamicina                                  | Antimicrobiano Tópico | Vancomicina                             | VANCOMicina   | Vancocina                                   | Antimicrobiano Glicopeptídeo   |
| Garamicina                              | GARAMicina    | Garamicina                                  | Antimicrobiano Tópico | Tobramicina                             | TOBRAMicina   | Tobrex e Tobi                               | Antimicrobiano Aminoglicosídeo |
| Garamicina                              | GARAMicina    | Garamicina                                  | Antimicrobiano Tópico | Gentamicina                             | GENTAMicina   | Gentamicin                                  | Antimicrobiano Aminoglicosídeo |
| Garamicina                              | GARAMicina    | Garamicina                                  | Antimicrobiano Tópico | Rifamicina                              | RIFAMicina    | Rifocina                                    | Antimicrobiano Tópico          |
| Garamicina                              | GARAMicina    | Garamicina                                  | Antimicrobiano Tópico | Eritromicina                            | ERITROMicina  | Eritrex                                     | Antimicrobiano Macrolídeo      |
| Garamicina                              | GARAMicina    | Garamicina                                  | Antimicrobiano Tópico | Vibramicina                             | VIBRAMicina   | Vibramicina                                 | Antimicrobiano Tetraciclina    |



## MEDICAMENTOS SEMELHANTES POR FONÉTICA/ ESCRITA

| DROGA 1 POR FONÉTICA/ESCRITA SEMELHANTE | DESCRIÇÃO CD3 | NOME COMERCIAL OU PRINCÍPIO ATIVO (DROGA 1) | INDICAÇÃO TERAPÊUTICA          | DROGA 2 POR FONÉTICA/ESCRITA SEMELHANTE | DESCRIÇÃO CD3  | NOME COMERCIAL OU PRINCÍPIO ATIVO (DROGA 2) | INDICAÇÃO TERAPÊUTICA          |
|-----------------------------------------|---------------|---------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|----------------|---------------------------------------------|--------------------------------|
| Garamicina                              | GARAMicina    | Garamicina                                  | Antimicrobiano Tópico          | Daptomicina                             | DAPTOmicina    | Cubicin                                     | Antimicrobiano Lipopeptídeo    |
| Garamicina                              | GARAMicina    | Garamicina                                  | Antimicrobiano Tópico          | Clindamicina                            | CLINDAmicina   | Dalacin                                     | Antimicrobiano Lincosamida     |
| Garamicina                              | GARAMicina    | Garamicina                                  | Antimicrobiano Tópico          | Claritomicina                           | CLARITROmicina | Klaricid                                    | Antimicrobiano Macrolídeo      |
| Gencitabina                             | GENCITabina   | Gemzar                                      | Antineoplásico Citotóxico      | Decitabina                              | DECitabina     | Dacogen                                     | Antineoplásico Citotóxico      |
| Gencitabina                             | GENCITabina   | Gemzar                                      | Antineoplásico Citotóxico      | Gentamicina                             | GENTAmicina    | Garamicina                                  | Antimicrobiano Aminoglicosídeo |
| Gentamicina                             | GENTAmicina   | Gentamicin                                  | Antimicrobiano Aminoglicosídeo | Mitomicina                              | MitoMicina     | Mitocin                                     | Antineoplásico Citotóxico      |
| Gentamicina                             | GENTAmicina   | Gentamicin                                  | Antimicrobiano Aminoglicosídeo | Neomicina                               | NEOmicina      | Neomicina                                   | Antimicrobiano Aminoglicosídeo |
| Gentamicina                             | GENTAmicina   | Gentamicin                                  | Antimicrobiano Aminoglicosídeo | Bleomicina                              | BLEOmicina     | Bonar                                       | Antineoplásicos Citotóxicos    |
| Gentamicina                             | GENTAmicina   | Gentamicin                                  | Antimicrobiano Aminoglicosídeo | Vancomicina                             | VANCOMicina    | Vancocina                                   | Antimicrobiano Glicopeptídeo   |

MEDICAMENTOS SEMELHANTES POR FONÉTICA/ ESCRITA

| DROGA 1 POR FONÉTICA/ESCRITA SEMELHANTE | DESCRIÇÃO CD3 | NOME COMERCIAL OU PRINCÍPIO ATIVO (DROGA 1) | INDICAÇÃO TERAPÊUTICA          | DROGA 2 POR FONÉTICA/ESCRITA SEMELHANTE | DESCRIÇÃO CD3   | NOME COMERCIAL OU PRINCÍPIO ATIVO (DROGA 2) | INDICAÇÃO TERAPÊUTICA          |
|-----------------------------------------|---------------|---------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------|--------------------------------|
| Gentamicina                             | GENTamicina   | Gentamicin                                  | Antimicrobiano Aminoglicosídeo | Tobramicina                             | TOBRamicina     | Tobrex e Tobi                               | Antimicrobiano Aminoglicosídeo |
| Gentamicina                             | GENTamicina   | Gentamicin                                  | Antimicrobiano Aminoglicosídeo | Garamicina                              | GARAMicina      | Garamicina                                  | Antimicrobiano Aminoglicosídeo |
| Gentamicina                             | GENTamicina   | Gentamicin                                  | Antimicrobiano Aminoglicosídeo | Rifamicina                              | RIFAmicina      | Rifocina                                    | Antimicrobiano Tópico          |
| Gentamicina                             | GENTamicina   | Gentamicin                                  | Antimicrobiano Aminoglicosídeo | Eritromicina                            | ERITROmi-cina   | Eritrex                                     | Antimicrobiano Macrolídeo      |
| Gentamicina                             | GENTamicina   | Gentamicin                                  | Antimicrobiano Aminoglicosídeo | Vibramicina                             | VIBRamicina     | Vibramicina                                 | Antimicrobiano Tetraciclina    |
| Gentamicina                             | GENTamicina   | Gentamicin                                  | Antimicrobiano Aminoglicosídeo | Daptomicina                             | DAPTomicina     | Cubicin                                     | Antimicrobiano Lipopeptídeo    |
| Gentamicina                             | GENTamicina   | Gentamicin                                  | Antimicrobiano Aminoglicosídeo | Clindamicina                            | CLINDAmi-cina   | Dalacin                                     | Antimicrobiano Lincosamida     |
| Gentamicina                             | GENTamicina   | Gentamicin                                  | Antimicrobiano Aminoglicosídeo | Clarithomicina                          | CLARITRO-micina | Klaricid                                    | Antimicrobiano Macrolídeo      |
| Gentamicina                             | GENTamicina   | Garamicina                                  | Antimicrobiano Aminoglicosídeo | Gencitabina                             | GENCITabina     | Gemzar                                      | Antineoplásico Citotóxico      |
| Gliclazida                              | gliCLAZida    | Azukon                                      | Hipoglicemiante                | Glimepirida                             | gliMEPIRida     | Amaryl                                      | Hipoglicemiante                |

## MEDICAMENTOS SEMELHANTES POR FONÉTICA/ ESCRITA

| DROGA 1 POR FONÉTICA/ESCRITA SEMELHANTE | DESCRIÇÃO CD3          | NOME COMERCIAL OU PRINCÍPIO ATIVO (DROGA 1) | INDICAÇÃO TERAPEÚTICA                         | DROGA 2 POR FONÉTICA/ESCRITA SEMELHANTE | DESCRIÇÃO CD3          | NOME COMERCIAL OU PRINCÍPIO ATIVO (DROGA 2) | INDICAÇÃO TERAPEÚTICA                          |
|-----------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Glimepirida                             | gliMEPIRida            | Amaryl                                      | Hipoglicemiante                               | Gliclazida                              | gliCLAZida             | Azukon                                      | Hipoglicemian-<br>te                           |
| Haloperidol                             | HaloPERIdol            | Haldol                                      | Antipsicótico,<br>Neurolépticos               | Alopurinol                              | AloPURinol             | Alopurinol                                  | Antigotoso                                     |
| Hidralazina                             | HidrALAZina            | Apresolina                                  | Hipotensor                                    | Hidroxizina                             | HidOXizina             | Hixizine                                    | Antihistami-<br>nico                           |
| Hidralazina                             | hidrALAZINA            | Hidralazina                                 | Agente Anti-Hi-<br>pertensivo                 | Hidroclorotiazida                       | hidroCLORO-<br>Tiazida | Hidroclorotia-<br>zida                      | Diuréticos                                     |
| Hidroclorotiazida                       | hidroCLORO-<br>Tiazida | Hidroclorotia-<br>zida                      | Diuréticos                                    | Hidralazina                             | hidrALAZINA            | Hidralazina                                 | Agente Anti-<br>-Hipertensivo                  |
| Hidrocortisona                          | HIDROcorti-<br>sona    | Cortisonal                                  | Antiinflamatório<br>esteroidal siste-<br>mico | Fludrocortisona                         | FLUDROcor-<br>tisona   | Florinef                                    | Antiinflamató-<br>rio esteroideal<br>sistêmico |
| Hidroxizina                             | HidroxIZina            | Hixizine                                    | Antihistamínico                               | Hidralazina                             | HidrALAZina            | Apresolina                                  | Hipotensor                                     |
| Humalog                                 | HumALOG                | Insulina lispro                             | Hipoglicemiante                               | Humulin                                 | HumULIN                | Insulina humana                             | Hipoglicemian-<br>te                           |
| Humulin                                 | HumULIN                | Insulina hu-<br>mana                        | Hipoglicemiante                               | Humalog                                 | HumALOG                | Insulina lispro                             | Hipoglicemian-<br>te                           |

**MEDICAMENTOS SEMELHANTES POR FONÉTICA/ ESCRITA**

| DROGA 1 POR FONÉTICA/ESCRITA SEMELHANTE | DESCRIÇÃO CD3 | NOME COMERCIAL OU PRINCÍPIO ATIVO (DROGA 1) | INDICAÇÃO TERAPÊUTICA                          | DROGA 2 POR FONÉTICA/ESCRITA SEMELHANTE | DESCRIÇÃO CD3       | NOME COMERCIAL OU PRINCÍPIO ATIVO (DROGA 2) | INDICAÇÃO TERAPÊUTICA                          |
|-----------------------------------------|---------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Ibuprofeno                              | IBUprofeno    | Alivium / Ad-vil                            | Antiinflamatório não esteroi-<br>dal sistêmico | Cetoprofeno                             | CETOprefeno         | Profenid                                    | Antiinflamatório não esteroi-<br>dal sistêmico |
| Ibuprofeno                              | IBUprofeno    | Alivium / Ad-vil                            | Antiinflamatório não esteroi-<br>dal sistêmico | Flurbiprofeno                           | FLURBIpro-<br>feno  | Strepsils                                   | Antiinflamatório não esteroi-<br>dal sistêmico |
| Idarrubicina                            | IDArrubicina  | Zavedos                                     | Antineoplásico Citotóxico                      | Daunorrubicina                          | DAUNORrubi-<br>cina | Daunorrubicina                              | Antineoplásico Citotóxico                      |
| Idarrubicina                            | IDArrubicina  | Zavedos                                     | Antineoplásico Citotóxico                      | Doxorrubicina                           | DOXORrubi-<br>cina  | Adriblastina                                | Antineoplásico Citotóxico                      |
| Ifosfamida                              | IFOSfamida    | Holoxane                                    | Antineoplásicos Citotóxicos                    | Ciclofosfamida                          | CicloFOSFA-<br>Mida | Genuxal                                     | Antineoplásico Citotóxico                      |
| Imipenem                                | IMipenem      | Tienam                                      | Antimicrobiano Carbapenêmicos                  | Ertapenem                               | IMipenem            | Invanz                                      | Antimicrobiano Carbapenemi-<br>cos             |
| Imipenem                                | IMipenem      | Tienam                                      | Antimicrobiano Carbapenêmicos                  | Meropenem                               | MEROpenem           | Meronom                                     | Antimicrobiano Carbapenemi-<br>cos             |
| Imosec                                  | IMOsec        | Loperamida                                  | Antidiarreicos e Adsorventes                   | Losec                                   | LoSEC               | Omeprazol                                   | Antiulceroso                                   |
| Infliximabe                             | INFLIXimabe   | Remicade                                    | Anticorpo mono-<br>clonal                      | Rituximabe                              | RITUXimabe          | Mabthera                                    | Anticorpo monoclonal                           |

## MEDICAMENTOS SEMELHANTES POR FONÉTICA/ ESCRITA

| DROGA 1 POR FONÉTICA/ESCRITA SEMELHANTE | DESCRIÇÃO CD3 | NOME COMERCIAL OU PRINCÍPIO ATIVO (DROGA 1) | INDICAÇÃO TERAPEÚTICA | DROGA 2 POR FONÉTICA/ESCRITA SEMELHANTE | DESCRIÇÃO CD3 | NOME COMERCIAL OU PRINCÍPIO ATIVO (DROGA 2) | INDICAÇÃO TERAPEÚTICA     |
|-----------------------------------------|---------------|---------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|---------------|---------------------------------------------|---------------------------|
| Infliximabe                             | inFLIXimabe   | Influximabe                                 | Imunomodulador        | Rituximabe                              | riTUXimabe    | Mabthera                                    | Antineoplásico Citológico |
| Ipratrópio                              | IPRAtrópio    | Atrovent                                    | Broncodilatador       | Tiotrópio                               | TIOtrópio     | Spiriva Res-pimat                           | Broncodilatador           |
| Isoconazol                              | ISOconazol    | Icaden                                      | Antifúngico           | Voriconazol                             | VORIconazol   | Vfend                                       | Antifúngico Sistêmico     |
| Isoconazol                              | ISOconazol    | Icaden                                      | Antifúngico           | Cetoconazol                             | CETOconazol   | Cetoconazol                                 | Antifúngico Sistêmico     |
| Isoconazol                              | ISOconazol    | Icaden                                      | Antifúngico           | Tioconazol                              | TIOconazol    | Tralen                                      | Antifúngico               |
| Isoconazol                              | ISOconazol    | Icaden                                      | Antifúngico           | Oxiconazol                              | OXIconazol    | Oceral                                      | Antifúngico               |
| Isoconazol                              | ISOconazol    | Icaden                                      | Antifúngico           | Miconazol                               | Miconazol     | Vodol                                       | Antifúngico               |
| Isoconazol                              | ISOconazol    | Icaden                                      | Antifúngico           | Fluconazol                              | FLUconazol    | Zoltec                                      | Antifúngico               |
| Isoconazol                              | ISOconazol    | Icaden                                      | Antifúngico           | Itraconazol                             | ITRAconazol   | Sporanox                                    | Antifúngico               |
| Isotretinoína                           | ISOtretinoína | Roacutan                                    | Antiacneico           | Tretinoína                              | TREtinoína    | Vesanoid                                    | Antineoplásico            |

MEDICAMENTOS SEMELHANTES POR FONÉTICA/ ESCRITA

| DROGA 1 POR FONÉTICA/ESCRITA SEMELHANTE | DESCRIÇÃO CD3 | NOME COMERCIAL OU PRINCÍPIO ATIVO (DROGA 1) | INDICAÇÃO TERAPÊUTICA                   | DROGA 2 POR FONÉTICA/ESCRITA SEMELHANTE | DESCRIÇÃO CD3 | NOME COMERCIAL OU PRINCÍPIO ATIVO (DROGA 2) | INDICAÇÃO TERAPÊUTICA                   |
|-----------------------------------------|---------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|---------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Itraconazol                             | ITRAconazol   | Sporanox                                    | Antifúngico                             | Voriconazol                             | VORlconazol   | Vfend                                       | Antifúngico Sistêmico                   |
| Itraconazol                             | ITRAconazol   | Sporanox                                    | Antifúngico                             | Cetoconazol                             | CETOconazol   | Cetoconazol                                 | Antifúngico Sistêmico                   |
| Itraconazol                             | ITRAconazol   | Sporanox                                    | Antifúngico                             | Tioconazol                              | TIOconazol    | Tralen                                      | Antifúngico                             |
| Itraconazol                             | ITRAconazol   | Sporanox                                    | Antifúngico                             | Oxiconazol                              | OXlconazol    | Oceral                                      | Antifúngico                             |
| Itraconazol                             | ITRAconazol   | Sporanox                                    | Antifúngico                             | Miconazol                               | Mlconazol     | Vodol                                       | Antifúngico                             |
| Itraconazol                             | ITRAconazol   | Sporanox                                    | Antifúngico                             | Fluconazol                              | FLUconazol    | Zoltec                                      | Antifúngico                             |
| Itraconazol                             | ITRAconazol   | Sporanox                                    | Antifúngico                             | Isoconazol                              | ISOconazol    | Icaden                                      | Antifúngico                             |
| Keflin                                  | KEFLin        | Cefalotina                                  | Antimicrobiano Cefalosporina 1ª geração | Quelcin                                 | QUELICin      | Succinilcolina                              | Bloqueador Neuromuscular                |
| Kefox                                   | kefoX         | Cefoxitina                                  | Antimicrobiano Cefalosporina 1ª geração | Kefoxin                                 | kefoXIN       | Cefotaxima                                  | Antibiótico                             |
| Kefoxin                                 | kefoXIN       | Cefotaxima                                  | Antibiótico                             | Kefox                                   | kefoX         | Cefoxitina                                  | Antimicrobiano Cefalosporina 1ª geração |

## MEDICAMENTOS SEMELHANTES POR FONÉTICA/ ESCRITA

| DROGA 1 POR FONÉTICA/ESCRITA SEMELHANTE | DESCRIÇÃO CD3   | NOME COMERCIAL OU PRINCÍPIO ATIVO (DROGA 1) | INDICAÇÃO TERAPEÚTICA            | DROGA 2 POR FONÉTICA/ESCRITA SEMELHANTE | DESCRIÇÃO CD3 | NOME COMERCIAL OU PRINCÍPIO ATIVO (DROGA 2) | INDICAÇÃO TERAPEÚTICA            |
|-----------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|---------------|---------------------------------------------|----------------------------------|
| Lamictal                                | LamiCTAL        | Lamotrigina                                 | Anticonvulsivante                | Lamisil                                 | LamiSIL       | Terbinalina                                 | Antimicótico                     |
| Lamivudina                              | LamiVUDina      | Epivir                                      | Antiviral                        | Lamotrigina                             | LamOTRIGina   | Lamictal                                    | Anticonvulsivante                |
| Lamisil                                 | LamiSIL         | Terbinalina                                 | Antimicótico                     | Lamictal                                | LamiCTAL      | Lamotrigina                                 | Anticonvulsivante                |
| Lamotrigina                             | LamOTRIGina     | Lamictal                                    | Anticonvulsivante                | Lamiduviná                              | LamiDUDVina   | Epivir                                      | Antiviral                        |
| Lanoxin                                 | LANOxin         | Digoxina                                    | Cardiotônico                     | Levotiroxina                            | LEVOTIRO-xinA | Euthyrox/Synthroid                          | Hormônio Tireoidiano             |
| Lasix                                   | LaSIX           | Furosemida                                  | Diurético                        | Losec                                   | LoSEC         | Omeprazol                                   | Antiulceroso                     |
| Leucovorin                              | LeuCOVORIN      | Ácido folínico                              | Antídoto/Associação Fluorouracil | Leukeran                                | LeuKERAN      | Clorambucila                                | Antineoplásico                   |
| Leukeraná                               | LeuKERAN        | Clorambucila                                | Antineoplásico                   | Leucovorinâ                             | LeuCOVORIN    | Ácido folínico                              | Antídoto/Associação Fluorouracil |
| Leukeraná                               | LEUkeran        | Clorambucila                                | Antineoplásico                   | Alkeranâ                                | ALkeran       | Melfalano                                   | Antineoplásico                   |
| Levobupivacaína                         | LEVObupivacaína | Novabupivacaína                             | Anestésico Local                 | Bupivacaína                             | Bupivacaína   | Neocaina                                    | Anestésico Local                 |

**MEDICAMENTOS SEMELHANTES POR FONÉTICA/ ESCRITA**

| DRUGA 1 POR FONÉTICA/ESCRITA SEMELHANTE | DESCRIÇÃO CD3   | NOME COMERCIAL OU PRINCÍPIO ATIVO (DRUGA 1) | INDICAÇÃO TERAPÉUTICA       | DRUGA 2 POR FONÉTICA/ESCRITA SEMELHANTE | DESCRIÇÃO CD3   | NOME COMERCIAL OU PRINCÍPIO ATIVO (DRUGA 2) | INDICAÇÃO TERAPÉUTICA       |
|-----------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------|-----------------------------|
| Levofloxacino                           | LEVOfloxacino   | Levaquin / Levotac                          | Antimicrobiano Quinolona    | Ciprofloxacino                          | CIPROfloxacino  | Cipro / Fresoflox                           | Antimicrobiano Quinolona    |
| Levofloxacino                           | LEVOfloxacino   | Levaquin / Levotac                          | Antimicrobiano Quinolona    | Moxifloxacino                           | MOXifloxacino   | Avalox                                      | Antimicrobiano Quinolona    |
| Levofloxacino                           | LEVOfloxacino   | Levaquin/ Levotac                           | Antimicrobiano Quinolona    | Norfloxacino                            | NORfloxacino    | Floxacin                                    | Antimicrobiano Quinolona    |
| Levomepromazina                         | levoMEPROmazina | Neozine                                     | Antipsicótico, Neuroléptico | Levotiroxina                            | levoTIROXina    | Euthyrox                                    | Homonio Tireo-diano         |
| Levotiroxina                            | LEVOTIROXina    | Euthyrox/Synthroid                          | Hormônio Tireo-diano        | Lanoxin                                 | LANOxin         | Digoxina                                    | Cardiotônico                |
| Levotiroxina                            | levoTIROXina    | Euthyrox                                    | Homonio Tireo-diano         | Levomepromazina                         | levoMEPROmazina | Neozine                                     | Antipsicótico, Neuroléptico |
| Lorazepam                               | LORAzepam       | Lorax                                       | Ansiolítico                 | Alprazolam                              | ALPRAzolam      | Frontal                                     | Ansiolítico                 |
| Lorazepam                               | LORAzepam       | Lorax/ Lora-zefast                          | Ansiolíticos                | Clonazepam                              | CLONAze-pam     | Rivotril                                    | Anticonvulsivantes          |
| Lorazepam                               | LORAzepam       | Lorax/ Lora-zefast                          | Ansiolíticos                | Diazepam                                | DIAzepam        | Dienpax/Valium                              | Ansiolíticos                |
| Lorazepam                               | LORAzepam       | Lorax/ Lora-zefast                          | Ansiolíticos                | Bromazepam                              | BROMAze-pam     | Lexotan / Somalium                          | Ansiolíticos                |



## MEDICAMENTOS SEMELHANTES POR FONÉTICA/ ESCRITA

| DROGA 1 POR FONÉTICA/ESCRITA SEMELHANTE | DESCRIÇÃO CD3   | NOME COMERCIAL OU PRINCÍPIO ATIVO (DROGA 1) | INDICAÇÃO TERAPEÚTICA                | DROGA 2 POR FONÉTICA/ESCRITA SEMELHANTE | DESCRIÇÃO CD3 | NOME COMERCIAL OU PRINCÍPIO ATIVO (DROGA 2) | INDICAÇÃO TERAPEÚTICA                |
|-----------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|---------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|
| Lorazepam                               | LORAzepam       | Lorax/ Lora-zefast                          | Ansiolíticos                         | Flurazepam                              | FLURAzepam    | Dalmadorm                                   | Hipnóticos                           |
| Lorazepam                               | LORAzepam       | Lorax/ Lora-zefast                          | Ansiolíticos                         | Flunitrazepam                           | FluNITRAZepam | Rohydorm/ Rohypnol                          | Hipnóticos                           |
| Losec                                   | LoSEC           | Omeprazol                                   | Antiulceroso                         | Lasix                                   | LaSIX         | Furosemda                                   | Diurético                            |
| Losec                                   | LoSEC           | Omeprazol                                   | Antiulceroso                         | Imosec                                  | IMOsec        | Loperamida                                  | Antidiarreicos e Adsorventes         |
| Luvor                                   | LuVOX           | Fluvoxamina                                 | Antidepressivo                       | Lasix                                   | LaSIX         | Furosemda                                   | Diurético                            |
| Meropenem                               | MEROOpenem      | Meronom                                     | Antimicrobiano Carbapenemicos        | Ertapenem                               | ERTApemem     | Invanz                                      | Antimicrobiano Carbapenemicos        |
| Meropenem                               | MEROOpenem      | Meronom                                     | Antimicrobiano Carbapenemicos        | Imipenem                                | IMIpemem      | Tienam                                      | Antimicrobiano Carbapenemicos        |
| Metilprednisona                         | METILprednisona | SOLU-medrol                                 | Antiinflamatório esteroide sistêmico | Prednisolona                            | predniSO-NA   | Predsin                                     | Antiinflamatório esteroide sistêmico |
| Metoprolol                              | METOProlol      | Seloken e Selozok                           | Agentes Anti-Hipertensivos           | Bisoprolol                              | BISOprolol    | Concor                                      | Agentes Anti-Hipertensivos           |

MEDICAMENTOS SEMELHANTES POR FONÉTICA/ ESCRITA

| DROGA 1 POR FONÉTICA/ESCRITA SEMELHANTE | DESCRIÇÃO CD3 | NOME COMERCIAL OU PRINCÍPIO ATIVO (DROGA 1) | INDICAÇÃO TERAPÊUTICA     | DROGA 2 POR FONÉTICA/ESCRITA SEMELHANTE | DESCRIÇÃO CD3  | NOME COMERCIAL OU PRINCÍPIO ATIVO (DROGA 2) | INDICAÇÃO TERAPÊUTICA     |
|-----------------------------------------|---------------|---------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------|----------------|---------------------------------------------|---------------------------|
| Metotrexato                             | metoTREXATO   | Fauldmetro                                  | Antineoplásico Citolítico | Mitoxantrona                            | mitoXANtrona   | Evomixan                                    | Antineoplásico Citolítico |
| Micafungina                             | MICAfungina   | Mycamine                                    | Antifúngico Sistêmico     | Anidulafungina                          | ANIDULAfungina | Ecalta                                      | Antifúngico Sistêmico     |
| Micafungina                             | MICAfungina   | Mycamine                                    | Antifúngico Sistêmico     | Caspofungina                            | CASPOfun-gina  | Cancidas                                    | Antifúngico Sistêmico     |
| Micafungina                             | MICAfungina   | Mycamine                                    | Antifúngico Sistêmico     | Fusafungina                             | FUSAfungina    | Locabiotol                                  | Broncodilatador           |
| Miconazol                               | Mlconazol     | Vodol                                       | Antifúngico               | Voriconazol                             | VORlconazol    | Vfend                                       | Antifúngico Sistêmico     |
| Miconazol                               | Mlconazol     | Vodol                                       | Antifúngico               | Cetoconazol                             | CETOconazol    | Cetoconazol                                 | Antifúngico Sistêmico     |
| Miconazol                               | Mlconazol     | Vodol                                       | Antifúngico               | Tioconazol                              | TIOconazol     | Tralen                                      | Antifúngico               |
| Miconazol                               | Mlconazol     | Vodol                                       | Antifúngico               | Oxiconazol                              | OXlconazol     | Oceral                                      | Antifúngico               |
| Miconazol                               | Mlconazol     | Vodol                                       | Antifúngico               | Itraconazol                             | ITRAconazol    | Sporanox                                    | Antifúngico               |
| Miconazol                               | Mlconazol     | Vodol                                       | Antifúngico               | Fluconazol                              | FLUconazol     | Zoltec                                      | Antifúngico               |

## MEDICAMENTOS SEMELHANTES POR FONÉTICA/ ESCRITA

| DROGA 1 POR FONÉTICA/ESCRITA SEMELHANTE | DESCRIÇÃO CD3 | NOME COMERCIAL OU PRINCÍPIO ATIVO (DROGA 1) | INDICAÇÃO TERAPÊUTICA        | DROGA 2 POR FONÉTICA/ESCRITA SEMELHANTE | DESCRIÇÃO CD3    | NOME COMERCIAL OU PRINCÍPIO ATIVO (DROGA 2) | INDICAÇÃO TERAPÊUTICA                  |
|-----------------------------------------|---------------|---------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|
| Miconazol                               | Miconazol     | Vodol                                       | Antifúngico                  | Isoconazol                              | ISOconazol       | Icaden                                      | Antifúngico                            |
| Midazolam                               | MIDazolam     | Dormine/ Dor-<br>monid                      | Hipnóticos                   | Alprazolam                              | ALPRAzolam       | Apraz/ Frontal                              | Ansiolíticos                           |
| Midazolam                               | MIDazolam     | Dormine/ Dor-<br>monid                      | Hipnóticos                   | Cloxacilam                              | CLOXAzolam       | Olcadil                                     | Ansiolíticos                           |
| Mitomicina                              | MitoMicina    | Mitocin                                     | Antineoplásico<br>Citotóxico | Gentamicina                             | GENTAmicina      | Gentamicin                                  | Antimicrobiano<br>Aminoglicosí-<br>deo |
| Mitomicina                              | MitoMicina    | Mitocin                                     | Antineoplásico<br>Citotóxico | Neomicina                               | NEOMicina        | Neomicina                                   | Antimicrobiano<br>Aminoglicosí-<br>deo |
| Mitomicina                              | MitoMicina    | Mitocin                                     | Antineoplásico<br>Citotóxico | Bleomicina                              | BLEOMicina       | Bonar                                       | Antineoplási-<br>cos Citotóxicos       |
| Mitomicina                              | MitoMicina    | Mitocin                                     | Antineoplásico<br>Citotóxico | Vancomicina                             | VANCOmi-<br>cina | Vancocina                                   | Antimicrobiano<br>Glicopeptídeo        |
| Mitomicina                              | MitoMicina    | Mitocin                                     | Antineoplásico<br>Citotóxico | Tobramicina                             | TOBRAmicina      | Tobrex e Tobi                               | Antimicrobiano<br>Aminoglicosí-<br>deo |
| Mitomicina                              | MitoMicina    | Mitocin                                     | Antineoplásico<br>Citotóxico | Garamicina                              | GARAMicina       | Garamicina                                  | Antimicrobiano<br>Aminoglicosí-<br>deo |

MEDICAMENTOS SEMELHANTES POR FONÉTICA/ ESCRITA

| DROGA 1 POR FONÉTICA/ESCRITA SEMELHANTE | DESCRIÇÃO CD3 | NOME COMERCIAL OU PRINCÍPIO ATIVO (DROGA 1) | INDICAÇÃO TERAPÊUTICA     | DROGA 2 POR FONÉTICA/ESCRITA SEMELHANTE | DESCRIÇÃO CD3   | NOME COMERCIAL OU PRINCÍPIO ATIVO (DROGA 2) | INDICAÇÃO TERAPÊUTICA       |
|-----------------------------------------|---------------|---------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------|-----------------------------|
| Mitomomicina                            | MitoMicina    | Mitocin                                     | Antineoplásico Citotóxico | Rifamicina                              | RIFamicina      | Rifocina                                    | Antimicrobiano Tópico       |
| Mitomomicina                            | MitoMicina    | Mitocin                                     | Antineoplásico Citotóxico | Eritromicina                            | ERITROmi-cina   | Eritrex                                     | Antimicrobiano Macrolídeo   |
| Mitomomicina                            | MitoMicina    | Mitocin                                     | Antineoplásico Citotóxico | Vibramicina                             | VIBRAMicina     | Vibramicina                                 | Antimicrobiano Tetraciclina |
| Mitomomicina                            | MitoMicina    | Mitocin                                     | Antineoplásico Citotóxico | Daptomicina                             | DAPTOmicina     | Cubicin                                     | Antimicrobiano Lipopeptídeo |
| Mitomomicina                            | MitoMicina    | Mitocin                                     | Antineoplásico Citotóxico | Clindamicina                            | CLINDAmi-cina   | Dalacin                                     | Antimicrobiano Lincosamida  |
| Mitomomicina                            | MitoMicina    | Mitocin                                     | Antineoplásico Citotóxico | Claritomicina                           | CLARITRO-micina | Klaricid                                    | Antimicrobiano Macrolídeo   |
| Mitomomicina                            | mitoMicina    | Mitocin                                     | Antineoplásico Citotóxico | Mitoxantrona                            | mitoXAN-trona   | Evomixan                                    | Antineoplásico Citotóxico   |
| Mitoxantrona                            | mitoXANtrona  | Evomixan                                    | Antineoplásico Citotóxico | Metotrexato                             | metoTREXA-TO    | Fauldmetro                                  | Antineoplásico Citotóxico   |
| Mitoxantrona                            | mitoXANtrona  | Evomixan                                    | Antineoplásico Citotóxico | Mitomomicina                            | mitoMicina      | Mitocin                                     | Antineoplásico Citotóxico   |
| Moxifloxacino                           | MOXifloxacino | Avalox                                      | Antimicrobiano Quinolona  | Ciprofloxacino                          | CIPROfloxa-cino | Cipro / Freso-flox                          | Antimicrobiano Quinolona    |

## MEDICAMENTOS SEMELHANTES POR FONÉTICA/ ESCRITA

| DROGA 1 POR FONÉTICA/ESCRITA SEMELHANTE | DESCRIÇÃO CD3 | NOME COMERCIAL OU PRINCÍPIO ATIVO (DROGA 1) | INDICAÇÃO TERAPEÚTICA          | DROGA 2 POR FONÉTICA/ESCRITA SEMELHANTE | DESCRIÇÃO CD3 | NOME COMERCIAL OU PRINCÍPIO ATIVO (DROGA 2) | INDICAÇÃO TERAPEÚTICA          |
|-----------------------------------------|---------------|---------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|---------------|---------------------------------------------|--------------------------------|
| Moxifloxacino                           | MOXifloxacino | Avalox                                      | Antimicrobiano Quinolona       | Levofloxacino                           | LEVOfloxacino | Levaquin/ Levotac                           | Antimicrobiano Quinolona       |
| Moxifloxacino                           | MOXifloxacino | Avalox                                      | Antimicrobiano Quinolona       | Norfloxacino                            | NORfloxacino  | Floxacin                                    | Antimicrobiano Quinolona       |
| Moxifloxacino                           | MOXifloxacino | Avalox                                      | Antimicrobiano Quinolona       | Norfloxacino                            | NORfloxacino  | Floxacin                                    | Antimicrobiano Quinolona       |
| Neomicina                               | NEOmicina     | neomicina                                   | Antimicrobiano Aminoglicosídeo | Gentamicina                             | GENTAmicina   | Gentamicin                                  | Antimicrobiano Aminoglicosídeo |
| Neomicina                               | NEOmicina     | neomicina                                   | Antimicrobiano Aminoglicosídeo | Mitomicina                              | mitoMlcina    | Mitocin                                     | Antineoplásico Citotóxico      |
| Neomicina                               | NEOmicina     | neomicina                                   | Antimicrobiano Aminoglicosídeo | Bleomicina                              | BLEOmicina    | Bonar                                       | Antineoplásicos Citotóxicos    |
| Neomicina                               | NEOmicina     | neomicina                                   | Antimicrobiano Aminoglicosídeo | Vancomicina                             | VANComicina   | Vancocina                                   | Antimicrobiano Glicopeptídeo   |
| Neomicina                               | NEOmicina     | neomicina                                   | Antimicrobiano Aminoglicosídeo | Tobramicina                             | TOBRAmicina   | Tobrex e Tobi                               | Antimicrobiano Aminoglicosídeo |
| Neomicina                               | NEOmicina     | neomicina                                   | Antimicrobiano Aminoglicosídeo | Garamicina                              | GARAmicina    | Garamicina                                  | Antimicrobiano Aminoglicosídeo |

**MEDICAMENTOS SEMELHANTES POR FONÉTICA/ ESCRITA**

| DRUGA 1 POR FONÉTICA/ESCRITA SEMELHANTE | DESCRIÇÃO CD3 | NOME COMERCIAL OU PRINCÍPIO ATIVO (DRUGA 1) | INDICAÇÃO TERAPÉUTICA          | DRUGA 2 POR FONÉTICA/ESCRITA SEMELHANTE | DESCRIÇÃO CD3   | NOME COMERCIAL OU PRINCÍPIO ATIVO (DRUGA 2) | INDICAÇÃO TERAPÉUTICA         |
|-----------------------------------------|---------------|---------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------|-------------------------------|
| Neomicina                               | NEOMICINA     | neomicina                                   | Antimicrobiano Aminoglicosídeo | Rifamicina                              | RIFamicina      | Rifocina                                    | Antimicrobiano Tópico         |
| Neomicina                               | NEOMICINA     | neomicina                                   | Antimicrobiano Aminoglicosídeo | Eritromicina                            | ERITROmi-cina   | Eritrex                                     | Antimicrobiano Macrolídeo     |
| Neomicina                               | NEOMICINA     | neomicina                                   | Antimicrobiano Aminoglicosídeo | Vibramicina                             | VIBRAMicina     | Vibramicina                                 | Antimicrobiano Tetraciclina   |
| Neomicina                               | NEOMICINA     | neomicina                                   | Antimicrobiano Aminoglicosídeo | Daptomicina                             | DAPTOmicina     | Cubicin                                     | Antimicrobiano Lipopeptídeo   |
| Neomicina                               | NEOMICINA     | neomicina                                   | Antimicrobiano Aminoglicosídeo | Clindamicina                            | CLINDAmi-cina   | Dalacin                                     | Antimicrobiano Lincossamida   |
| Neomicina                               | NEOMICINA     | neomicina                                   | Antimicrobiano Aminoglicosídeo | Claritomicina                           | CLARITRO-micina | Klaricid                                    | Antimicrobiano Macrolídeo     |
| Nexium                                  | NEXIUM        | Esomeprazol                                 | Antiulceroso                   | Nimbium                                 | NIMbium         | Cisatracúrio                                | Bloqueador neuromuscular      |
| Nifedipino                              | niFEDipino    | Adalat                                      | Antianginoso                   | Nimodipino                              | niMODipino      | Nimotop                                     | Bloqueador de canal de cálcio |
| Nimbium                                 | NIMBium       | Cisatracúrio                                | Bloqueador neuromuscular       | Nexium                                  | NEXium          | Esomeprazol                                 | Antiulceroso                  |
| Nimbium                                 | NIMbium       | Cisatracúrio                                | Bloqueador neuromuscular       | Nubain                                  | NuBAIN          | Nalbupina                                   | Analgésico Narcótico          |

## MEDICAMENTOS SEMELHANTES POR FONÉTICA/ ESCRITA

| DROGA 1 POR FONÉTICA/ESCRITA SEMELHANTE | DESCRIÇÃO CD3   | NOME COMERCIAL OU PRINCÍPIO ATIVO (DROGA 1) | INDICAÇÃO TERAPÊUTICA         | DROGA 2 POR FONÉTICA/ESCRITA SEMELHANTE | DESCRIÇÃO CD3   | NOME COMERCIAL OU PRINCÍPIO ATIVO (DROGA 2)   | INDICAÇÃO TERAPÊUTICA     |
|-----------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------|---------------------------|
| Nimodipino                              | NIMODipino      | Nimotop                                     | Bloqueador de canal de cálcio | Nifedipino                              | nIFEDipino      | Adalat                                        | Antianginoso              |
| Nistatina                               | NISTatina       | Nistatina                                   | Antifúngico                   | Somatostatina                           | SOMATOSSta-tina | Stilamin                                      | Hemostático               |
| Nitroglicerina                          | nitroGLICERINA  | Tridil Nitroderm                            | Antianginoso                  | Nitroprussiato                          | nitroPRUSSIA TO | Nitroprus                                     | Agentes Anti-Hipertensivo |
| Nitrofurantoina                         | NITROFURANtoina | Macrofantina                                | Antimicrobiano Nitrofurano    | Fenitoína                               | FENItioína      | Hidantal                                      | Anticonvulsivantes        |
| Nitroprussiato                          | nitroPRUSSIA TO | Nitroprus                                   | Agentes Anti-Hipertensivo     | Nitroglicerina                          | nitroGLICE-RINA | Tridil Nitroderm                              | Antianginoso              |
| Norepinefrina                           | NOREPinefrina   | Norepine                                    | Estimulante Adrenérgico       | Epinefrina                              | EPINEFrina      | Adrenalina Adren/ Drenalin Efrinalin / Hydren | Estimulante Adrenérgico   |
| Norfloxacino                            | NORfloxacino    | Floxacín                                    | Antimicrobiano Quinolona      | Ciprofloxacino                          | CIPROfloxa-cino | Cipro/ Fresoflox                              | Antimicrobiano Quinolona  |
| Norfloxacino                            | NORfloxacino    | Floxacín                                    | Antimicrobiano Quinolona      | Levofloxacino                           | LEVOfloxa-cino  | Levaquin/ Levotac                             | Antimicrobiano Quinolona  |
| Norfloxacino                            | NORfloxacino    | Floxacín                                    | Antimicrobiano Quinolona      | Moxifloxacino                           | MOXIfloxa-cino  | Avalox                                        | Antimicrobiano Quinolona  |

MEDICAMENTOS SEMELHANTES POR FONÉTICA/ ESCRITA

| DROGA 1 POR FONÉTICA/ESCRITA SEMELHANTE | DESCRIÇÃO CD3 | NOME COMERCIAL OU PRINCÍPIO ATIVO (DROGA 1) | INDICAÇÃO TERAPÊUTICA        | DROGA 2 POR FONÉTICA/ESCRITA SEMELHANTE | DESCRIÇÃO CD3  | NOME COMERCIAL OU PRINCÍPIO ATIVO (DROGA 2) | INDICAÇÃO TERAPÊUTICA        |
|-----------------------------------------|---------------|---------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|----------------|---------------------------------------------|------------------------------|
| Norfloxacino                            | NORfloxacino  | Floxacin                                    | Antimicrobiano Quinolona     | Moxifloxacino                           | MOXifloxa-cino | Avalox                                      | Antimicrobiano Quinolona     |
| Nortriptilina                           | NORTriptilina | Pamelor                                     | Antidepressivo               | Amitriptilina                           | AmiTRIPTilina  | Amytril                                     | Antidepressivos              |
| Nubain                                  | NuBAIN        | Nalbupina                                   | Analgésico Narcótico         | Nimbium                                 | NIMbium        | Cisatracúrio                                | Bloqueador neuromuscular     |
| Olanzapina                              | OLANZapina    | Zyprexa Zydys                               | Antipsicótico, Neurolépticos | Quetiapina                              | QUETiapina     | Seroquel                                    | Antipsicótico, Neurolépticos |
| Olanzapina                              | OLANZapina    | Zyprexa                                     | Antipsicótico, Neurolépticos | Clozapina                               | CLOZApina      | Leponex                                     | Antipsicótico, Neurolépticos |
| Omeprazol                               | OMEprazol     | Losec/ Losar                                | Antiulceroso                 | Esomeprazol                             | ESomeprazol    | Nexium                                      | Antiulceroso                 |
| omeprazol                               | OMEprazol     | Losec/ Losar                                | Antiulceroso                 | Pantoprazol                             | PANTOprazol    | Pantocal/ Pantozol                          | Antiulceroso                 |
| Oxaliplatina                            | OXALIplatina  | Eloxatin                                    | Antineoplásico Citotóxico    | Carboplatina                            | CARBOPlatina   | Fauldcarbo                                  | Antineoplásico Citotóxico    |
| Oxcarbazepina                           | OXcarbazepina | Trileptal                                   | Anticonvulsivante            | Carbamazepina                           | carBAMazepina  | Tegretol                                    | Anticonvulsivante            |
| Oxiconazol                              | OXIconazol    | Oceral                                      | Antifúngico                  | Voriconazol                             | VORIconazol    | Vfend                                       | Antifúngico Sistêmico        |



## MEDICAMENTOS SEMELHANTES POR FONÉTICA/ ESCRITA

| DROGA 1 POR FONÉTICA/ESCRITA SEMELHANTE | DESCRIÇÃO CD3 | NOME COMERCIAL OU PRINCÍPIO ATIVO (DROGA 1) | INDICAÇÃO TERAPEÚTICA     | DROGA 2 POR FONÉTICA/ESCRITA SEMELHANTE | DESCRIÇÃO CD3 | NOME COMERCIAL OU PRINCÍPIO ATIVO (DROGA 2) | INDICAÇÃO TERAPEÚTICA     |
|-----------------------------------------|---------------|---------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------|---------------|---------------------------------------------|---------------------------|
| Oxiconazol                              | OXIconazol    | Oceral                                      | Antifúngico               | Cetoconazol                             | CETOconazol   | Cetoconazol                                 | Antifúngico Sistêmico     |
| Oxiconazol                              | OXIconazol    | Oceral                                      | Antifúngico               | Tioconazol                              | TIOconazol    | Tralen                                      | Antifúngico               |
| Oxiconazol                              | OXIconazol    | Oceral                                      | Antifúngico               | Miconazol                               | MIconazol     | Vodol                                       | Antifúngico               |
| Oxiconazol                              | OXIconazol    | Oceral                                      | Antifúngico               | Itraconazol                             | ITRAconazol   | Sporanox                                    | Antifúngico               |
| Oxiconazol                              | OXIconazol    | Oceral                                      | Antifúngico               | Fluconazol                              | FLUconazol    | Zoltec                                      | Antifúngico               |
| Oxiconazol                              | OXIconazol    | Oceral                                      | Antifúngico               | Isoconazol                              | ISOconazol    | Icaden                                      | Antifúngico               |
| Paclitaxel                              | PACLitaxel    | Anzatax                                     | Antineoplásico Citotóxico | Docetaxel                               | DOCEtaxel     | Taxotere                                    | Antineoplásico Citotóxico |
| Pancuron                                | PANcuron      | Pancurônio                                  | Bloqueador Neuromuscular  | Rocuron                                 | ROCuron       | Rocurônio                                   | Bloqueador Neuromuscular  |
| Pancuron                                | PANcuron      | Pancurônio                                  | Bloqueador Neuromuscular  | Vecuron                                 | VEcuron       | Vecurônio                                   | Bloqueador Neuromuscular  |
| Pancurônio                              | PANcurônio    | Pancuron                                    | Bloqueador Neuromuscular  | Rocurônio                               | ROcuron       | Rocuron                                     | Bloqueador Neuromuscular  |

MEDICAMENTOS SEMELHANTES POR FONÉTICA/ ESCRITA

| DRUGA 1 POR FONÉTICA/ESCRITA SEMELHANTE | DESCRIÇÃO CD3 | NOME COMERCIAL OU PRINCÍPIO ATIVO (DRUGA 1) | INDICAÇÃO TERAPÉUTICA                  | DRUGA 2 POR FONÉTICA/ESCRITA SEMELHANTE | DESCRIÇÃO CD3   | NOME COMERCIAL OU PRINCÍPIO ATIVO (DRUGA 2) | INDICAÇÃO TERAPÉUTICA                  |
|-----------------------------------------|---------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|
| Pancurônio                              | PANcurônio    | Pancuron                                    | Bloqueador Neuromuscular               | Vecurônio                               | VEcuron         | Vecuron                                     | Bloqueador Neuromuscular               |
| Pantoprazol                             | PANToprazol   | Pantocal / Pantozol                         | Antiulceroso                           | Esomeprazol                             | ESomeprazol     | Nexium                                      | Antiulceroso                           |
| Pantoprazol                             | PANToprazol   | Pantocal / Pantozol                         | Antiulceroso                           | omeprazol                               | OMEprazol       | Losec/ Losar                                | Antiulceroso                           |
| Prandiná                                | PRANDin       | Repaglinida                                 | Hipoglicemiantes                       | Coumadin                                | COUMAdin        | Varfarina                                   | Anticoagulante                         |
| Pravastatina                            | PRAvastatina  | Pravastatina                                | Hipolipêmico                           | Sinvastatina                            | SINVastatina    | Zocor                                       | Hipolipêmico                           |
| Pravastatina                            | PRAvastatina  | Pravastatina                                | Hipolipêmico                           | Atorvastatina                           | ATORvasta-tina  | Lipitor                                     | Hipolipêmico                           |
| Pravastatina                            | PRAvastatina  | Pravastatina                                | Hipolipêmico                           | Rosuvastatina                           | ROSUvasta-tina  | Crestor                                     | Hipolipêmico                           |
| Prednisolona                            | PrednisoLona  | Predsim                                     | Antiinflamatório esteroideal sistêmico | Prednisona                              | PredniSona      | Meticorten                                  | Antiinflamatório esteroideal sistêmico |
| Prednisolona                            | PrednisoLona  | Predsim                                     | Antiinflamatório esteroideal sistêmico | Metilprednisona                         | METILprednisona | SOLU-Medrol                                 | Antiinflamatório esteroideal sistêmico |
| Prednisona                              | Prednisona    | Meticorten                                  | Antiinflamatório esteroideal sistêmico | Prednisolona                            | prednisoLona    | Meticorten                                  | Antiinflamatório esteroideal sistêmico |

## MEDICAMENTOS SEMELHANTES POR FONÉTICA/ ESCRITA

| DROGA 1 POR FONÉTICA/ESCRITA SEMELHANTE | DESCRIÇÃO CD3 | NOME COMERCIAL OU PRINCÍPIO ATIVO (DROGA 1) | INDICAÇÃO TERAPEÚTICA        | DROGA 2 POR FONÉTICA/ESCRITA SEMELHANTE | DESCRIÇÃO CD3 | NOME COMERCIAL OU PRINCÍPIO ATIVO (DROGA 2) | INDICAÇÃO TERAPEÚTICA                         |
|-----------------------------------------|---------------|---------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|---------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Quelicin                                | QUELICin      | Succinilcolina                              | Bloqueador Neuromuscular     | Keflin                                  | KEFLin        | Cefalotina                                  | Antimicrobiano<br>Cefalosporina<br>1ª geração |
| Quetiapina                              | QUETiapina    | Seroquel                                    | Antipsicótico, Neurolépticos | Olanzapina                              | OLANZapina    | Zyprexa Zydys                               | Antipsicótico, Neurolépticos                  |
| Quinidina                               | QuiniDINA     | Quinocardine                                | Antiarritmico                | Quinina (Associação)                    | QuiniNA       | Monotreat                                   | Antivertiginoso                               |
| Quinina (Associação)                    | QuiniNA       | Monotreat                                   | Antivertiginoso              | Quinidina                               | QuiniDINA     | Quinocardine                                | Antiarritmico                                 |
| Renitec                                 | ReNITEc       | Enalapril                                   | Agentes Anti-Hipertensivos   | Retemic                                 | ReTEMIc       | Oxibutina                                   | Antiespasmódicos urinários                    |
| Retemic                                 | ReTEMIc       | Oxibutinina                                 | Antiespasmódicos urinários   | Renitec                                 | ReNITEc       | Enalapril                                   | Agentes Anti-Hipertensivos                    |
| Rifamicina                              | RIFAmicina    | Rifocina                                    | Antimicrobiano Tópico        | Gentamicina                             | GENTAmicina   | Gentamicin                                  | Antimicrobiano<br>Aminoglicosídeo             |
| Rifamicina                              | RIFAmicina    | Rifocina                                    | Antimicrobiano Tópico        | Mitomicina                              | mitoMIcina    | Mitocin                                     | Antineoplásico<br>Citotóxico                  |
| Rifamicina                              | RIFAmicina    | Rifocina                                    | Antimicrobiano Tópico        | Bleomicina                              | BLEOmicina    | Bonar                                       | Antineoplásicos<br>Citotóxicos                |

MEDICAMENTOS SEMELHANTES POR FONÉTICA/ ESCRITA

| DROGA 1 POR FONÉTICA/ESCRITA SEMELHANTE | DESCRIÇÃO CD3 | NOME COMERCIAL OU PRINCÍPIO ATIVO (DROGA 1) | INDICAÇÃO TERAPÊUTICA | DROGA 2 POR FONÉTICA/ESCRITA SEMELHANTE | DESCRIÇÃO CD3   | NOME COMERCIAL OU PRINCÍPIO ATIVO (DROGA 2) | INDICAÇÃO TERAPÊUTICA          |
|-----------------------------------------|---------------|---------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------|--------------------------------|
| Rifamicina                              | RIFamicina    | Rifocina                                    | Antimicrobiano Tópico | Vancomicina                             | VANCOmi-cina    | Vancocina                                   | Antimicrobiano Glicopeptídeo   |
| Rifamicina                              | RIFamicina    | Rifocina                                    | Antimicrobiano Tópico | Tobramicina                             | TOBRAmicina     | Tobrex e Tobi                               | Antimicrobiano Aminoglicosídeo |
| Rifamicina                              | RIFamicina    | Rifocina                                    | Antimicrobiano Tópico | Garamicina                              | GARAMicina      | Garamicina                                  | Antimicrobiano Aminoglicosídeo |
| Rifamicina                              | RIFamicina    | Rifocina                                    | Antimicrobiano Tópico | Neomicina                               | NEOMICina       | Neomicina                                   | Antimicrobiano Aminoglicosídeo |
| Rifamicina                              | RIFamicina    | Rifocina                                    | Antimicrobiano Tópico | Eritromicina                            | ERITROmi-cina   | Eritrex                                     | Antimicrobiano Macrolídeo      |
| Rifamicina                              | RIFamicina    | Rifocina                                    | Antimicrobiano Tópico | Vibramicina                             | VIBRAMicina     | Vibramicina                                 | Antimicrobiano Tetraciclina    |
| Rifamicina                              | RIFamicina    | Rifocina                                    | Antimicrobiano Tópico | Daptomicina                             | DAPTOmicina     | Cubicin                                     | Antimicrobiano Lipopeptídeo    |
| Rifamicina                              | RIFamicina    | Rifocina                                    | Antimicrobiano Tópico | Clindamicina                            | CLINDAmi-cina   | Dalacin                                     | Antimicrobiano Lincosamida     |
| Rifamicina                              | RIFamicina    | Rifocina                                    | Antimicrobiano Tópico | Claritomicina                           | CLARITRO-micina | Klaricid                                    | Antimicrobiano Macrolídeo      |

## MEDICAMENTOS SEMELHANTES POR FONÉTICA/ ESCRITA

| DROGA 1 POR FONÉTICA/ESCRITA SEMELHANTE | DESCRIÇÃO CD3 | NOME COMERCIAL OU PRINCÍPIO ATIVO (DROGA 1) | INDICAÇÃO TERAPÊUTICA         | DROGA 2 POR FONÉTICA/ESCRITA SEMELHANTE | DESCRIÇÃO CD3     | NOME COMERCIAL OU PRINCÍPIO ATIVO (DROGA 2) | INDICAÇÃO TERAPÊUTICA     |
|-----------------------------------------|---------------|---------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------|---------------------------|
| Remifentanila                           | REMifentanila | Ultiva                                      | Analgésicos Narcóticos        | Fentanila                               | FentaNILA         | Fentanest/ Fentanil                         | Analgésicos Narcóticos    |
| Remifentanila                           | REMifentanila | Ultiva                                      | Analgésicos Narcóticos        | Sufentanila                             | SUFentanila       | Fastfen/ Sufenta                            | Analgésicos Narcóticos    |
| Reminyl                                 | REMInyl       | Galantamina                                 | Anticolinesterásicos          | Amaryl                                  | AMARyl            | Glimepirida                                 | Hipoglicemian-<br>te      |
| Rituximabe                              | riTUXimabe    | Mabthera                                    | Antineoplásico Citotóxico     | Bevacizumabe                            | BEVACizu-<br>mabe | Avastin                                     | Antineoplásico Citotóxico |
| Rituximabe                              | riTUXimabe    | Mabthera                                    | Antineoplásico Citotóxico     | Cetuximabe                              | CETUXimabe        | Erbitux                                     | Antineoplásico Citotóxico |
| Rituximabe                              | riTUXimabe    | Mabthera                                    | Anticorpo mono-<br>clonal     | Infiximabe                              | INFLIXimabe       | Remicade                                    | Anticorpo monoclonal      |
| Rituximabe                              | riTUXimabe    | Mabthera                                    | Antineoplásico Citotóxico     | Infiximabe                              | inFLIXimabe       | Influximabe                                 | Imunomodu-<br>lador       |
| Rituximabe                              | riTUXimabe    | Mabthera                                    | Antineoplásico Citotóxico     | Trastuzumabe                            | TRASTuzu-<br>mabe | Herceptin                                   | Antineoplásico Citotóxico |
| Rocuron                                 | ROCuron       | Rocurônio                                   | Bloqueador Neu-<br>romuscular | Pancuron                                | PANcuron          | Pancurônio                                  | Bloqueador Neuromuscular  |
| Rocuron                                 | ROCuron       | Rocurônio                                   | Bloqueador Neu-<br>romuscular | Vecuron                                 | VEcuron           | Vecurônio                                   | Bloqueador Neuromuscular  |

MEDICAMENTOS SEMELHANTES POR FONÉTICA/ ESCRITA

| DROGA 1 POR FONÉTICA/ESCRITA SEMELHANTE | DESCRIÇÃO CD3 | NOME COMERCIAL OU PRINCÍPIO ATIVO (DROGA 1) | INDICAÇÃO TERAPÊUTICA      | DROGA 2 POR FONÉTICA/ESCRITA SEMELHANTE | DESCRIÇÃO CD3 | NOME COMERCIAL OU PRINCÍPIO ATIVO (DROGA 2) | INDICAÇÃO TERAPÊUTICA      |
|-----------------------------------------|---------------|---------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|---------------|---------------------------------------------|----------------------------|
| Rocurônio                               | ROcuron       | Rocuron                                     | Bloqueador Neuromuscular   | Pancurônio                              | PANcurônio    | Pancuron                                    | Bloqueador Neuromuscular   |
| Rocurônio                               | ROcurônio     | Rocuron                                     | Bloqueador Neuromuscular   | Vecurônio                               | VEcurônio     | Vecuron                                     | Bloqueador Neuromuscular   |
| Ropivacaína                             | ROpivacaína   | Naropin                                     | Anestésico Local           | Bupivacaína                             | BUPivacaína   | Neocaína                                    | Anestésico Local           |
| Rosuvastatina                           | ROSUvastatina | Crestor                                     | Hipolipêmico               | Sinvastatina                            | SINVastatina  | Zocor                                       | Hipolipêmico               |
| Rosuvastatina                           | ROSUvastatina | Crestor                                     | Hipolipêmico               | Atorvastatina                           | ATORvastatina | Lipitor                                     | Hipolipêmico               |
| Rosuvastatina                           | ROSUvastatina | Crestor                                     | Hipolipêmico               | Pravastatina                            | PRAVastatina  | Pravastatina                                | Hipolipêmico               |
| Sandimmun                               | SandIMMUn     | Ciclosporina                                | Imunossupressor            | Sandostatin                             | SandOSTATIn   | octreotida                                  | Hemostático                |
| Sandostatin                             | SandOSTATIn   | Octreotida                                  | Hemostático                | Sandimmun                               | SandIMMUn     | ciclosporina                                | Imunossupressor            |
| Selozok                                 | SeloZOK       | Metoprolol                                  | Agentes Anti-Hipertensivos | Seloken                                 | SeloKEN       | Metoprolol                                  | Agentes Anti-Hipertensivos |
| Seloken                                 | SeloKEN       |                                             |                            | Selozok                                 | SeloZOK       | Metoprolol                                  | Agentes Anti-Hipertensivos |

## MEDICAMENTOS SEMELHANTES POR FONÉTICA/ ESCRITA

| DROGA 1 POR FONÉTICA/ESCRITA SEMELHANTE | DESCRIÇÃO CD3    | NOME COMERCIAL OU PRINCÍPIO ATIVO (DROGA 1) | INDICAÇÃO TERAPÊUTICA                  | DROGA 2 POR FONÉTICA/ESCRITA SEMELHANTE | DESCRIÇÃO CD3      | NOME COMERCIAL OU PRINCÍPIO ATIVO (DROGA 2) | INDICAÇÃO TERAPÊUTICA                  |
|-----------------------------------------|------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|
| Seroquel                                | SerOQUEL         | Quetiapina                                  | Antipsicótico                          | Serzone                                 | SerZONE            | Nefazodona                                  | Antidepressivo                         |
| Sinvastatina                            | SINvastatina     | Zocor                                       | Hipolipêmico                           | Atorvastatina                           | ATORvasta-<br>tina | Lipitor                                     | Hipolipêmico                           |
| Sinvastatina                            | SINvastatina     | Zocor                                       | Hipolipêmico                           | Rosuvastatina                           | ROSUvasta-<br>tina | Crestor                                     | Hipolipêmico                           |
| Sinvastatina                            | SINvastatina     | Zocor                                       | Hipolipêmico                           | Pravastatina                            | PRAvastatina       | Pravastatina                                | Hipolipêmico                           |
| Solu-Medrol                             | SOLU-Medrol      | Suc.sódico metilprednisolona                | Antiinflamatório esteroideal sistêmico | Depo- Medrol                            | DEPO-Medrol        | Acetato metilprednisolona                   | Antiinflamatório esteroideal sistêmico |
| Somatostatina                           | SOMATOS-<br>tina | Stilamin                                    | Hemostático                            | Nistatina                               | NIStatina          | Nistatina                                   | Antifúngico                            |
| Sufenta                                 | SUFenta          | Sufentanila Citrato                         | Analgésico Narcótico                   | Fentanila                               | fentaNIL           | Fentanila Citrato Fentanest                 | Analgésico Narcótico                   |
| Sufentanila                             | SUFentanila      | Sufenta                                     | Analgésicos Narcóticos                 | Alfentanila                             | ALfentanila        | Rapifen                                     | Analgésicos Narcóticos                 |
| Sufentanila                             | SUFentanila      | Sufenta                                     | Analgésico Narcótico                   | Fentanila                               | FENTanila          | Fentanil/ Fentanest Durogesic               | Analgésico Narcótico                   |

MEDICAMENTOS SEMELHANTES POR FONÉTICA/ ESCRITA

| DROGA 1 POR FONÉTICA/ESCRITA SEMELHANTE | DESCRIÇÃO CD3  | NOME COMERCIAL OU PRINCÍPIO ATIVO (DROGA 1) | INDICAÇÃO TERAPÊUTICA     | DROGA 2 POR FONÉTICA/ESCRITA SEMELHANTE | DESCRIÇÃO CD3   | NOME COMERCIAL OU PRINCÍPIO ATIVO (DROGA 2) | INDICAÇÃO TERAPÊUTICA    |
|-----------------------------------------|----------------|---------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------|--------------------------|
| Sufentanila                             | Sufentanila    | Fastfen/ Suf-fenta                          | Analgésicos Narcóticos    | Remifentanila                           | REMifentanila   | Ultiva                                      | Analgésicos Narcóticos   |
| Sulfadiazina                            | sulfADIAZINA   | Suladrim                                    | Antimicrobiano            | Sulfassalazina                          | sulfaSSALA-zina | Azulfin                                     | Antimicrobiano           |
| Sulfassalazina                          | sulfaSSALAZina | Azulfin                                     | Antimicrobiano            | Sulfadiazina                            | sulfADIAZINA    | Suladrim                                    | Antimicrobiano           |
| Superan                                 | SUPERan        | Alisaprida                                  | Antiemetico, Pro-cinético | Digesanã                                | DIGESan         | Bromoprida                                  | Antiemetico, Procinético |
| Tioconazol                              | TiOconazol     | Tralen                                      | Antifúngico               | Voriconazol                             | VORIconazol     | Vfend                                       | Antifúngico Sistêmico    |
| Tioconazol                              | TiOconazol     | Tralen                                      | Antifúngico               | Cetoconazol                             | CETOconazol     | Cetoconazol                                 | Antifúngico Sistêmico    |
| Tioconazol                              | TiOconazol     | Tralen                                      | Antifúngico               | Oxiconazol                              | OXIconazol      | Oceral                                      | Antifúngico              |
| Tioconazol                              | TiOconazol     | Tralen                                      | Antifúngico               | Miconazol                               | MIconazol       | Vodol                                       | Antifúngico              |
| Tioconazol                              | TiOconazol     | Tralen                                      | Antifúngico               | Itraconazol                             | ITRAconazol     | Sporanox                                    | Antifúngico              |
| Tioconazol                              | TiOconazol     | Tralen                                      | Antifúngico               | Fluconazol                              | FLUconazol      | Zoltec                                      | Antifúngico              |



## MEDICAMENTOS SEMELHANTES POR FONÉTICA/ ESCRITA

| DROGA 1 POR FONÉTICA/ESCRITA SEMELHANTE | DESCRIÇÃO CD3 | NOME COMERCIAL OU PRINCÍPIO ATIVO (DROGA 1)                 | INDICAÇÃO TERAPEÚTICA                 | DROGA 2 POR FONÉTICA/ESCRITA SEMELHANTE | DESCRIÇÃO CD3 | NOME COMERCIAL OU PRINCÍPIO ATIVO (DROGA 2) | INDICAÇÃO TERAPEÚTICA          |
|-----------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|---------------|---------------------------------------------|--------------------------------|
| Tioconazol                              | TIOconazol    | Tralen                                                      | Antifúngico                           | Isoconazol                              | ISOconazol    | Icaden                                      | Antifúngico                    |
| Tiotrópio                               | TIOtrópio     | Spiriva Respimat                                            | Broncodilatador                       | Ipratrópio                              | IPRAtrópio    | Atrovent                                    | Broncodilatador                |
| Tobradex                                | TobrADex      | Tobramicina 3mg/ml + Dexametasona 1mg/ml Colírio Frasco 5ml | Antimicrobiano Oftálmico e Corticoide | Tobrex                                  | ToBRex        | Tobramicina                                 | Antimicrobiano Oftálmico       |
| Tobramicina                             | TOBRAmicina   | Tobi e Tobrex                                               | Antimicrobiano Aminoglicosídeo        | Gentamicina                             | GENTAmicina   | Gentamicin                                  | Antimicrobiano Aminoglicosídeo |
| Tobramicina                             | TOBRAmicina   | Tobi e Tobrex                                               | Antimicrobiano Aminoglicosídeo        | Mitomicina                              | mitoMicina    | Mitocin                                     | Antineoplásico Citotóxico      |
| Tobramicina                             | TOBRAmicina   | Tobi e Tobrex                                               | Antimicrobiano Aminoglicosídeo        | Bleomicina                              | BLEOmicina    | Bonar                                       | Antineoplásicos Citotóxicos    |
| Tobramicina                             | TOBRAmicina   | Tobi e Tobrex                                               | Antimicrobiano Aminoglicosídeo        | Vancomicina                             | VANCOMicina   | Vancocina                                   | Antimicrobiano Glicopeptídeo   |
| Tobramicina                             | TOBRAmicina   | Tobi e Tobrex                                               | Antimicrobiano Aminoglicosídeo        | Rifamicina                              | RIFAmicina    | Rifocina                                    | Antimicrobiano Tópico          |
| Tobramicina                             | TOBRAmicina   | Tobi e Tobrex                                               | Antimicrobiano Aminoglicosídeo        | Garamicina                              | GARAMicina    | Garamicina                                  | Antimicrobiano Aminoglicosídeo |

MEDICAMENTOS SEMELHANTES POR FONÉTICA/ ESCRITA

| DROGA 1 POR FONÉTICA/ESCRITA SEMELHANTE | DESCRIÇÃO CD3 | NOME COMERCIAL OU PRINCÍPIO ATIVO (DROGA 1) | INDICAÇÃO TERAPÊUTICA                     | DROGA 2 POR FONÉTICA/ESCRITA SEMELHANTE | DESCRIÇÃO CD3   | NOME COMERCIAL OU PRINCÍPIO ATIVO (DROGA 2)                 | INDICAÇÃO TERAPÊUTICA                 |
|-----------------------------------------|---------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Tobramicina                             | TOBRAMicina   | Tobi e Tobrex                               | Antimicrobiano Aminoglicosídeo            | Neomicina                               | NEOMICina       | Neomicina                                                   | Antimicrobiano Aminoglicosídeo        |
| Tobramicina                             | TOBRAMicina   | Tobi e Tobrex                               | Antimicrobiano Aminoglicosídeo            | Eritromicina                            | ERITROMi-cina   | Eritrex                                                     | Antimicrobiano Macrolídeo             |
| Tobramicina                             | TOBRAMicina   | Tobi e Tobrex                               | Antimicrobiano Aminoglicosídeo            | Vibramicina                             | VIBRAMicina     | Vibramicina                                                 | Antimicrobiano Tetraciclina           |
| Tobramicina                             | TOBRAMicina   | Tobi e Tobrex                               | Antimicrobiano Aminoglicosídeo            | Daptomicina                             | DAPTOMICina     | Cubicin                                                     | Antimicrobiano Lipopeptídeo           |
| Tobramicina                             | TOBRAMicina   | Tobi e Tobrex                               | Antimicrobiano Aminoglicosídeo            | Clindamicina                            | CLINDAMi-cina   | Dalacin                                                     | Antimicrobiano Lincosamida            |
| Tobramicina                             | TOBRAMicina   | Tobi e Tobrex                               | Antimicrobiano Aminoglicosídeo            | Clarithomicina                          | CLARITRO-micina | Klaricid                                                    | Antimicrobiano Macrolídeo             |
| Tobrex                                  | TobRex        | Tobramicina                                 | Antimicrobiano Oftálmico                  | Tobradex                                | TobrADex        | Tobramicina 3mg/ml + Dexametasona 1mg/ml Colírio Frasco 5ml | Antimicrobiano Oftálmico e Corticoide |
| Toradol                                 | TORadol       | Trometamina, cetorolaco                     | Antiinflamatório não esteroidal sistêmico | Foradil                                 | ForaDIL         | Formoterol                                                  | Broncodilata-dor                      |

## MEDICAMENTOS SEMELHANTES POR FONÉTICA/ ESCRITA

| DROGA 1 POR FONÉTICA/ESCRITA SEMELHANTE | DESCRIÇÃO CD3 | NOME COMERCIAL OU PRINCÍPIO ATIVO (DROGA 1) | INDICAÇÃO TERAPÊUTICA                     | DROGA 2 POR FONÉTICA/ESCRITA SEMELHANTE | DESCRIÇÃO CD3 | NOME COMERCIAL OU PRINCÍPIO ATIVO (DROGA 2) | INDICAÇÃO TERAPÊUTICA                     |
|-----------------------------------------|---------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Toradol                                 | TORadol       | Trometamina, cetorolaco                     | Antiinflamatório não esteroidal sistêmico | Tramadol                                | TRAMadol      | Tramal                                      | Analgésicos Narcóticos                    |
| Tramadol                                | TRAMadol      | Tramal                                      | Analgésicos Narcóticos                    | Toradol                                 | TORadol       | Trometamina, cetorolaco                     | Antiinflamatório não esteroidal sistêmico |
| Trastuzumabe                            | TRAStuzumabe  | Herceptin                                   | Antineoplásico Citotóxico                 | Bevacizumabe                            | BEVACizu-mabe | Avastin                                     | Antineoplásico Citotóxico                 |
| Trastuzumabe                            | TRAStuzumabe  | Herceptin                                   | Antineoplásico Citotóxico                 | Rituximabe                              | riTUXimabe    | Mabthera                                    | Antineoplásico Citotóxico                 |
| Trazadona                               | TraZADONA     | Donaren                                     | Antidepressivo                            | Tramadol                                | TramADOL      | Sylador                                     | Analgésico opióide                        |
| Tretinoína                              | TREtinoína    | Vesanoid                                    | Antineoplásico                            | Isotretinoína                           | ISOTretinoína | Roacutan                                    | Antiacneico                               |
| Valcyte                                 | ValCYTE       | Valganciclovir                              | Antiviral                                 | Valtrex                                 | ValTREX       | Valaciclovir                                | Antiviral                                 |
| Valaciclovir                            | ValACiclovir  | Valtrex                                     | Antiviral                                 | Aciclovir                               | ACiclovir     | Aciclovir                                   | Antiviral                                 |
| Valaciclovir                            | ValACiclovir  | Valtrex                                     | Antiviral                                 | Fanciclovir (não padrão)                | Fanciclovir   | Penvir                                      | Antiviral                                 |

MEDICAMENTOS SEMELHANTES POR FONÉTICA/ ESCRITA

| DROGA 1 POR FONÉTICA/ESCRITA SEMELHANTE | DESCRIÇÃO CD3  | NOME COMERCIAL OU PRINCÍPIO ATIVO (DROGA 1) | INDICAÇÃO TERAPÊUTICA        | DROGA 2 POR FONÉTICA/ESCRITA SEMELHANTE | DESCRIÇÃO CD3   | NOME COMERCIAL OU PRINCÍPIO ATIVO (DROGA 2) | INDICAÇÃO TERAPÊUTICA          |
|-----------------------------------------|----------------|---------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------|--------------------------------|
| Valaciclovir                            | ValACiclovir   | Valtrex                                     | Antiviral                    | Ganciclovir                             | GANciclovir     | Cymevene                                    | Antivirais Cito-tóxicos        |
| Valaciclovir                            | ValACiclovir   | Valtrex                                     | Antiviral                    | Valganciclovir (não padrão)             | ValGANCi-clovir | Valcyte                                     | Antiviral                      |
| Valganciclovir (não padrão)             | ValGANciclovir | Valcyte                                     | Antiviral                    | Aciclovir                               | ACiclovir       | Aciclovir                                   | Antiviral                      |
| Valganciclovir (não padrão)             | ValGANciclovir | Valcyte                                     | Antiviral                    | Fanciclovir (não padrão)                | FANCiclovir     | Penvir                                      | Antiviral                      |
| Valganciclovir (não padrão)             | ValGANciclovir | Valcyte                                     | Antiviral                    | Ganciclovir                             | GANciclovir     | Cymevene                                    | Antivirais Cito-tóxicos        |
| Valganciclovir (não padrão)             | ValGANciclovir | Valcyte                                     | Antiviral                    | Valaciclovir                            | ValACiclovir    | Valtrex                                     | Antiviral                      |
| Vancomicina                             | VANCOMicina    | Vancocina                                   | Antimicrobiano Glicopeptídeo | Gentamicina                             | GENTAmicina     | Gentamicin                                  | Antimicrobiano Aminoglicosídeo |
| Vancomicina                             | VANCOMicina    | Vancocina                                   | Antimicrobiano Glicopeptídeo | Mitomicina                              | mitoMlcina      | Mitocin                                     | Antineoplásico Citotóxico      |
| Vancomicina                             | VANCOMicina    | Vancocina                                   | Antimicrobiano Glicopeptídeo | Bleomicina                              | BLEOMicina      | Bonar                                       | Antineoplási-cos Citotóxicos   |

## MEDICAMENTOS SEMELHANTES POR FONÉTICA/ ESCRITA

| DROGA 1 POR FONÉTICA/ESCRITA SEMELHANTE | DESCRIÇÃO CD3 | NOME COMERCIAL OU PRINCÍPIO ATIVO (DROGA 1) | INDICAÇÃO TERAPÊUTICA        | DROGA 2 POR FONÉTICA/ESCRITA SEMELHANTE | DESCRIÇÃO CD3  | NOME COMERCIAL OU PRINCÍPIO ATIVO (DROGA 2) | INDICAÇÃO TERAPÊUTICA          |
|-----------------------------------------|---------------|---------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|----------------|---------------------------------------------|--------------------------------|
| Vancomicina                             | VANCOMicina   | Vancocina                                   | Antimicrobiano Glicopeptídeo | Tobramicina                             | TOBRAmicina    | Tobrex e Tobi                               | Antimicrobiano Aminoglicosídeo |
| Vancomicina                             | VANCOMicina   | Vancocina                                   | Antimicrobiano Glicopeptídeo | Rifamicina                              | RIFAmicina     | Rifocina                                    | Antimicrobiano Tópico          |
| Vancomicina                             | VANCOMicina   | Vancocina                                   | Antimicrobiano Glicopeptídeo | Garamicina                              | GARAMicina     | Garamicina                                  | Antimicrobiano Aminoglicosídeo |
| Vancomicina                             | VANCOMicina   | Vancocina                                   | Antimicrobiano Glicopeptídeo | Neomicina                               | NEOMicina      | Neomicina                                   | Antimicrobiano Aminoglicosídeo |
| Vancomicina                             | VANCOMicina   | Vancocina                                   | Antimicrobiano Glicopeptídeo | Eritromicina                            | ERITROMicina   | Eritrex                                     | Antimicrobiano Macrolídeo      |
| Vancomicina                             | VANCOMicina   | Vancocina                                   | Antimicrobiano Glicopeptídeo | Vibramicina                             | VIBRAMicina    | Vibramicina                                 | Antimicrobiano Tetraciclina    |
| Vancomicina                             | VANCOMicina   | Vancocina                                   | Antimicrobiano Glicopeptídeo | Daptomicina                             | DAPTOmicina    | Cubicin                                     | Antimicrobiano Lipopeptídeo    |
| Vancomicina                             | VANCOMicina   | Vancocina                                   | Antimicrobiano Glicopeptídeo | Clindamicina                            | CLINDAmicina   | Dalacin                                     | Antimicrobiano Lincosamida     |
| Vancomicina                             | VANCOMicina   | Vancocina                                   | Antimicrobiano Glicopeptídeo | Claritomicina                           | CLARITROmicina | Klaricid                                    | Antimicrobiano Macrolídeo      |

MEDICAMENTOS SEMELHANTES POR FONÉTICA/ ESCRITA

| DROGA 1 POR FONÉTICA/ESCRITA SEMELHANTE | DESCRIÇÃO CD3 | NOME COMERCIAL OU PRINCÍPIO ATIVO (DROGA 1) | INDICAÇÃO TERAPÊUTICA       | DROGA 2 POR FONÉTICA/ESCRITA SEMELHANTE | DESCRIÇÃO CD3 | NOME COMERCIAL OU PRINCÍPIO ATIVO (DROGA 2) | INDICAÇÃO TERAPÊUTICA        |
|-----------------------------------------|---------------|---------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|---------------|---------------------------------------------|------------------------------|
| Valtrex                                 | ValTREX       | Valaciclovir                                | Antiviral                   | Valcyte                                 | ValCYTE       | Valganciclovir                              | Antiviral                    |
| Vasopressina                            | VASopressina  | Encrise                                     | Vasocostritor e Hipertensor | Desmopressina                           | DESMopressina | Ddavp                                       | Hormônio Antidiurético       |
| Vecuron                                 | VEcuron       | Vecurônio                                   | Bloqueador Neuromuscular    | Pancuron                                | PANCuron      | Pancurônio                                  | Bloqueador Neuromuscular     |
| Vecuron                                 | VEcuron       | Vecurônio                                   | Bloqueador Neuromuscular    | Rocuron                                 | ROcuron       | Rocurônio                                   | Bloqueador Neuromuscular     |
| Vecurônio                               | VEcuron       | Vecuron                                     | Bloqueador Neuromuscular    | Pancurônio                              | PANCurônio    | Pancuron                                    | Bloqueador Neuromuscular     |
| Vecurônio                               | VEcurônio     | Vecuron                                     | Bloqueador Neuromuscular    | Rocurônio                               | ROcurônio     | Rocuron                                     | Bloqueador Neuromuscular     |
| Viagra                                  | VIagra        | Sildenafil                                  | Disfunção erétil            | Allegra                                 | ALLEgra       | Fexofenadina                                | Anti-Histamínicos H1         |
| Vibramicina                             | VIBRAMicina   | Vibramicina                                 | Antimicrobiano Tetraciclina | Vancomicina                             | VANCOMicina   | Vancocina                                   | Antimicrobiano Glicopeptídeo |
| Vibramicina                             | VIBRAMicina   | Vibramicina                                 | Antimicrobiano Tetraciclina | Mitomicina                              | mitoMicina    | Mitocin                                     | Antineoplásico Citotóxico    |
| Vibramicina                             | VIBRAMicina   | Vibramicina                                 | Antimicrobiano Tetraciclina | Bleomicina                              | BLEOMicina    | Bonar                                       | Antineoplásicos Citotóxicos  |

## MEDICAMENTOS SEMELHANTES POR FONÉTICA/ ESCRITA

| DROGA 1 POR FONÉTICA/ESCRITA SEMELHANTE | DESCRIÇÃO CD3 | NOME COMERCIAL OU PRINCÍPIO ATIVO (DROGA 1) | INDICAÇÃO TERAPÊUTICA       | DROGA 2 POR FONÉTICA/ESCRITA SEMELHANTE | DESCRIÇÃO CD3  | NOME COMERCIAL OU PRINCÍPIO ATIVO (DROGA 2) | INDICAÇÃO TERAPÊUTICA          |
|-----------------------------------------|---------------|---------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|----------------|---------------------------------------------|--------------------------------|
| Vibramicina                             | VIBRAMicina   | Vibramicina                                 | Antimicrobiano Tetraciclina | Tobramicina                             | TOBRAMicina    | Tobrex e Tobi                               | Antimicrobiano Aminoglicosídeo |
| Vibramicina                             | VIBRAMicina   | Vibramicina                                 | Antimicrobiano Tetraciclina | Rifamicina                              | RIFAMicina     | Rifocina                                    | Antimicrobiano Tópico          |
| Vibramicina                             | VIBRAMicina   | Vibramicina                                 | Antimicrobiano Tetraciclina | Garamicina                              | GARAMicina     | Garamicina                                  | Antimicrobiano Aminoglicosídeo |
| Vibramicina                             | VIBRAMicina   | Vibramicina                                 | Antimicrobiano Tetraciclina | Neomicina                               | NEOMicina      | Neomicina                                   | Antimicrobiano Aminoglicosídeo |
| Vibramicina                             | VIBRAMicina   | Vibramicina                                 | Antimicrobiano Tetraciclina | Eritromicina                            | ERITROMicina   | Eritrex                                     | Antimicrobiano Macrolídeo      |
| Vibramicina                             | VIBRAMicina   | Vibramicina                                 | Antimicrobiano Tetraciclina | Vibramicina                             | VIBRAMicina    | Vibramicina                                 | Antimicrobiano Tetraciclina    |
| Vibramicina                             | VIBRAMicina   | Vibramicina                                 | Antimicrobiano Tetraciclina | Daptomicina                             | DAPTOmicina    | Cubicin                                     | Antimicrobiano Lipopeptídeo    |
| Vibramicina                             | VIBRAMicina   | Vibramicina                                 | Antimicrobiano Tetraciclina | Clindamicina                            | CLINDAMicina   | Dalacin                                     | Antimicrobiano Lincossamida    |
| Vibramicina                             | VIBRAMicina   | Vibramicina                                 | Antimicrobiano Tetraciclina | Claritomicina                           | CLARITROMicina | Klaricid                                    | Antimicrobiano Macrolídeo      |

MEDICAMENTOS SEMELHANTES POR FONÉTICA/ ESCRITA

| DROGA 1 POR FONÉTICA/ESCRITA SEMELHANTE | DESCRIÇÃO CD3 | NOME COMERCIAL OU PRINCÍPIO ATIVO (DROGA 1) | INDICAÇÃO TERAPÊUTICA     | DROGA 2 POR FONÉTICA/ESCRITA SEMELHANTE | DESCRIÇÃO CD3 | NOME COMERCIAL OU PRINCÍPIO ATIVO (DROGA 2) | INDICAÇÃO TERAPÊUTICA     |
|-----------------------------------------|---------------|---------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------|---------------|---------------------------------------------|---------------------------|
| Vimblastina                             | vimBLAStina   | Faulblastina                                | Antineoplásico Citotóxico | Vincristina                             | vinCRIStina   | Fauldvinci                                  | Antineoplásico Citotóxico |
| Vimblastina                             | vimBLAStina   | Faulblastina                                | Antineoplásico Citotóxico | Vinorelbina                             | vinORELBina   | Navelbine                                   | Antineoplásico Citotóxico |
| Vincristina                             | vinCRIStina   | Fauldvinci                                  | Antineoplásico Citotóxico | Vimblastina                             | vimBLAStina   | Faulblastina                                | Antineoplásico Citotóxico |
| Vinorelbina                             | vinORELBina   | Navelbine                                   | Antineoplásico Citotóxico | Vimblastina                             | vimBLAStina   | Faulblastina                                | Antineoplásico Citotóxico |
| Voriconazol                             | VORIconazol   | Vfend                                       | Antifúngico               | Tioconazol                              | TIOconazol    | Tralen                                      | Antifúngico Sistêmico     |
| Voriconazol                             | VORIconazol   | Vfend                                       | Antifúngico               | Cetoconazol                             | CETOconazol   | Cetoconazol                                 | Antifúngico Sistêmico     |
| Voriconazol                             | VORIconazol   | Vfend                                       | Antifúngico               | Oxiconazol                              | OXIconazol    | Oceral                                      | Antifúngico               |
| Voriconazol                             | VORIconazol   | Vfend                                       | Antifúngico               | Miconazol                               | MIconazol     | Vodol                                       | Antifúngico               |
| Voriconazol                             | VORIconazol   | Vfend                                       | Antifúngico               | Itraconazol                             | ITRAconazol   | Sporanox                                    | Antifúngico               |
| Voriconazol                             | VORIconazol   | Vfend                                       | Antifúngico               | Fluconazol                              | FLUconazol    | Zoltec                                      | Antifúngico               |



MEDICAMENTOS SEMELHANTES POR FONÉTICA/ ESCRITA

| DROGA 1 POR FONÉTICA/ESCRITA SEMELHANTE | DESCRIÇÃO CD3 | NOME COMERCIAL OU PRINCÍPIO ATIVO (DROGA 1) | INDICAÇÃO TERAPEÚTICA | DROGA 2 POR FONÉTICA/ESCRITA SEMELHANTE | DESCRIÇÃO CD3 | NOME COMERCIAL OU PRINCÍPIO ATIVO (DROGA 2) | INDICAÇÃO TERAPEÚTICA |
|-----------------------------------------|---------------|---------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|---------------|---------------------------------------------|-----------------------|
| Voriconazol                             | VORIconazol   | Vfend                                       | Antifúngico           | Isoconazol                              | ISOconazol    | Icaden                                      | Antifúngico           |
| Xeloda                                  | XeLODA        | Capecitabina                                | Antineoplásico        | Xenical                                 | XeNICAL       | Orlistate                                   | Obesidade             |
| Xenical                                 | XeNICAL       | Orlistate                                   | Obesidade             | Xeloda                                  | XeLODA        | Capecitabina                                | Antineoplásico        |
| Zocor                                   | ZOCor         | Sinvastatina                                | Hipolipêmico          | Cozaar                                  | CoZAAR        | Losartano                                   | Antihipertensivo      |
| Zovirax                                 | ZovIRAX       | Aciclovir                                   | Antiviral             | Zyvox                                   | ZyVOX         | Linezolida                                  | Antibiótico           |
| Zyban                                   | ZYBan         | Bupropiona                                  | Antidepressivo        | Diovan                                  | DIOvan        | Valsartana                                  | Antihipertensivo      |
| Zyvox                                   | ZyVOX         | Linezolida                                  | Antibiótico           | Zovirax                                 | ZovIRAX       | Aciclovir                                   | Antiviral             |

## REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. The American Geriatrics Society 2012 Beers Criteria Update Expert Panel. (2012). **American Geriatrics Society Ypdated Beers Criteria for Potentially Inappropriate Medication Use in Older Adults.** *Journal of the American Geriatrics Society*, 60, 616-631
2. ANVISA – RDC N° 26. Medicamentos Sujeito a Controle Especial de 15 de Fevereiro de 2005; Brasília; 2005.
3. ANVISA – RDC N° 111. Medicamentos Sujeito a Controle Especial de 29 de Abril de 2005; Brasília; 2005.
4. Baungartner, Thomas G. Clinical Guide to Parenteral Micronutrition. Fujisawa USA, Inc.-1997.
5. Compêndio Médico. Dicionário Médico de Medicamentos, 36ª ed. Organização Andrei. 2006
6. Dan L. Waitzberg. Nutrição Enteral e Parenteral na Prática Clínica, 2º ed. Atheneu Rio de Janeiro. 1995.
7. Dicionário de Especialidades Farmacêuticas – DEF. São Paulo: Publicações Científicas, 2008.
8. Donna M. Fick, PhD, RN; James W. Cooper, PhD; William E. Wade, PharmD, FASHP,FCCP; Jenifer L. Waller, PhD; J. Ross Maclean, MD; Mark H. Beers, MD. et.al; Updating the Beers Criteria for Potentially Inappropriate Medication Use in Older Adults; Arch Intern Med/ Vol. 163:2716-2724, Dec 8/22,2003.
9. Edward CHU MD, Vicent T. DEVITA Jr. MD. Manual de Drogas Antineoplásicas em uso nos Estados Unidos da América, ed. Organização Andrei LTDA, 2001.
10. Fabrício, Suzele Cristina Coelho; Rodrigues, Rosalina A Partezani; Junior, Moacy Lobo da Costa; Causas e conseqüências de quedas de idosos atendidos em Hospital público. Rev. Saúde Pública vol.38 no. 1, São Paulo Feb. 2004.
11. GILBERT, D. N. MOELLERING, R. B. JR. ELIOPOULOS, G. M, CHAMBERS, H. F. SAAG, M. S. Guia Stanford: Guia de Terapêutica Antimicrobiana 2011. Linha Anti-infectiva.
12. Habermann, Thomas M.; Mayo Clinic Internal Medicine Review; Seventh Edition 2006-2007.
13. HIRSCHBERG, R. Drug – Nutrient Interactions in Renal failure. IN: Koplle, J.D.; Massry, S. G.: Nutritional Management of Renal Disease. 1ªed. Baltimore, Willians & Wilkins, 1997. 799-815p.
14. Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Guia Farmacoterapêutico HC 2008/10. São Paulo. 2008.
15. Hospital Israelita Albert Einstein. Manual Farmacêutico 2014. São Paulo, 2014.
16. Hosp Pharma Manipulação e Suprimentos LTDA.
17. LACY, C.F., ARMSTRONG, L.L, GOLDMAN, M. P. **Medicamentos Lexi-Comp Manole.** 1ª edição Brasileira. Lexi-Comp

18. López, I. M. Guía de administración de medicamentos por sonda. Hospital Son Dureta. 143p - 163p. 2004.
19. Maria José Magalhães Gomes, Adriano Max Moreira Reis. Ciências Farmacêuticas 'Uma Abordagem em Farmácia Hospitalar', 1ª ed. Atheneu, 2000.
20. MARUCCI, N. F. M., GOMES, C.B.M.M. Interação Droga-Nutriente em Idosos. IN: Papaléo, N.M.: Gerontologia, Editora Atheneu, 1996.
21. Matarese, Laura E.; Gottschlich, Michele M. Contemporary Nutrition Support Practice: A chemical Guide, WB Sanders Company - 1998.
22. The Merck Index; 12 th ed.; USA: Merck Research Laboratories; 1996
23. Micromedex. Drug Evaculations. Art Press; 2001 8 v.
24. Micromex, Inc. Knowledge bases for healthcare. Safety & The Environment, 1999.
25. Micromedex Healthcare Series. Drug Evaluations. 96vol. 1974-1998p.
26. Nathalie van der Velde, Bruno H Ch Stricker, Huib A P Pols, and Tischa J M van der Cammen; Risk of falls after withdrawal of fall-risk-increasing drugs: a prospective cohort study; Received February 23, Accepted April 11, 2006.
27. NATIONAL PATIENT SAFETY GOAL-IDENTIFY. Anually review a list of loolalike/ sound-alike drugs used in the organization, and take action to prevent errors involving the interchange of these drugs. 2006-2007.
28. PERINI, E. NEIVA, H. M. NASCIMENTO, M. M. G, ROSA, M. B, ANACLETO, T. A. **Medicamentos Potencialmente Perigosos:** Saiba mais sobre a lista atualizada de medicamentos usados nos hospitais. *Boletim ISPM*. Jan. 2013 - Volume 2, nº 1.
29. P.R VADE - MÉCUM - Brasil de medicamentos,13ª ed. Soriak; 2007/08.
30. ROE, D.A. Diet, Nutrient and Drug Reactions. IN: Shils, M.E.; Olson, A.J.; Shike, M.: Modern Nutrition in Health and Disease., 8ªed. Malvem, Lea & Febiger, 1994. 1399-1416p.
31. Rombeau, John L. Clinical Nutrition: Parenteral Nutrition. WB Sauders Company, 1993.
32. Saint Vincents Hospital and Medical Center - A Guide to Food and Drug Interactions
33. Trissel LA. Handbook of injectable drugs, 15 th ed. Bethesda: ASP; 2008.
34. WHITE, R. BRADNAM V. **Handbook of Drug Administration via Enteral Feeding Tubes.** Second Edition, London: Pharmaceutical Press, 2011. pag. 614.

## ÍNDICE REMISSIVO

| Medicamento                                                                   | Página    |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Aas Infantil 100mg Cp                                                         | 117       |
| Abatacepte                                                                    | 112       |
| Abciximabe                                                                    | 112       |
| Ablok 25mg Cp                                                                 | 148       |
| Ablok 50mg Cp                                                                 | 148       |
| Acetato de Clostebol + Sulfato de Neomicina Bis 30g (Medley)                  | 228       |
| Acetato de Degarelix                                                          | 113       |
| Acetazolamida                                                                 | 113       |
| Acetilcisteína                                                                | 114       |
| Acetilcisteína 200mg Env (EMS)                                                | 114       |
| Acetilcisteína 200mg Env (Eurofarma)                                          | 114       |
| Acheflan Creme 5mg/g Bis 30g                                                  | 233       |
| Aciclovir                                                                     | 115 e 116 |
| Aciclovir 200mg Cp (Biosintética)                                             | 115       |
| Aciclovir 200mg Cp (Merck)                                                    | 115       |
| Aciclovir 200mg Cp (Neo Química)                                              | 115       |
| Aciclovir 200mg Cp (Prati Donaduzzi)                                          | 115       |
| Aciclovir 50mg/g Creme Bis 10g (EMS)                                          | 115       |
| Ácido Acético                                                                 | 117       |
| Ácido Acético 2% Fr 10ml                                                      | 117       |
| Ácido Acético 5% (50mg/mL) Fr 100mL                                           | 117       |
| Ácido Acetilsalicílico                                                        | 117       |
| Ácido Acetilsalicílico Tamponado                                              | 117       |
| Ácido Êpsilon Aminocapróico                                                   | 118 e 119 |
| Ácido Fólico                                                                  | 119       |
| Ácido Fólico + Ferrocárbonila + Cálcio Pantotênico + Vitaminas + Poliminerais | 120       |
| Ácido Fusídico                                                                | 120       |
| Ácido Gadotérico                                                              | 120       |
| Ácido Poliacrílico                                                            | 121       |
| Ácido Tranexâmico                                                             | 121 e 122 |
| Ácido Tranexâmico 250mg (50mg/ml) Amp 5mL (Blausiegel)                        | 122       |
| Ácido Tranexâmico 250mg (50mg/ml) Amp 5mL (Hipolabor)                         | 122       |
| Ácido Tranexâmico 250mg Cp (EMS)                                              | 121       |
| Ácido Ursodesoxicólico                                                        | 122       |
| Ácido Zoledrônico 4mg FA (Sandoz)                                             | 556       |
| Ácidos Graxos Essenciais (A.G.E)                                              | 121       |

| <b>Medicamento</b>                                           | <b>Página</b> |
|--------------------------------------------------------------|---------------|
| Aclasta 5mg Fr 100ml                                         | 557           |
| Actemra 200mg FA 10ml                                        | 523           |
| Actemra 80mg FA 4ml                                          | 523           |
| Actilyse 10mg FA                                             | 133           |
| Actilyse 50mg FA                                             | 133           |
| Actos 30mg Cp                                                | 458           |
| Adalat Oros 30mg Cp                                          | 423           |
| Adalimumabe                                                  | 123           |
| Adcetris 50mg FA (Takeda)                                    | 167           |
| Addera D3 3300UI/mL Fr 10ml                                  | 550           |
| Ad-element Amp 2mL                                           | 556           |
| Adenocard 6mg Amp                                            | 124           |
| Adenosina                                                    | 124           |
| Adifenina + Dipirona + Prometazina                           | 124 e 125     |
| Adiloz 600mg Cp Rev                                          | 375           |
| Adren 1mg Amp 1ml                                            | 125           |
| Adrenalina                                                   | 125           |
| Adriblastina Rd 10mg FA                                      | 264           |
| Adriblastina Rd 50mg FA                                      | 264           |
| Ad-TIL Gts Fr 20ml                                           | 545           |
| Advil 200mg Cp                                               | 340           |
| Aerolin 5mg/ml Sol Nebulização Fr 10mL                       | 490           |
| Aerolin 5mg/mL Solução Nebulização Fr 10mL Dose              | 490           |
| Aerolin Spray 100mcg/dose Fr                                 | 490           |
| Agomelatina                                                  | 126           |
| Agrastat 12,5mg FA 50ml                                      | 520           |
| Água Bidestilada                                             | 126           |
| Água Bidestilada Bolsa 1000mL (Halex Istar)                  | 126           |
| Água Bidestilada Fr 1000mL (Eurofarma)                       | 126           |
| Água Bidestilada Fr 1000mL (Fresenius Kabi)                  | 126           |
| Água Destilada (Deionizada) 1L                               | 126           |
| Água Destilada Fr 1000mL                                     | 126           |
| Água Oxigenada 10 Vol. Almotolia 100ml                       | 335           |
| Água Oxigenada Estéril 10 Vol. (3%) Frasco 50ml Manip        | 335           |
| Água Oxigenada Estéril 10 Vol. Frasco 100ml Manip            | 335           |
| Akineton 2mg Cp                                              | 164           |
| Akynzeo 300mg/0,5mg Cap                                      | 422           |
| Alantoína + Fomblin + Óleo de Silicone                       | 127           |
| Alantoína + Triclosan + Fenoxietanol + Óleo Vegetal de Milho | 127           |

| <b>Medicamento</b>                             | <b>Página</b> |
|------------------------------------------------|---------------|
| Albel 400mg Cp Mastigável                      | 127           |
| Albendazol                                     | 127           |
| Albendazol 400mg Cp Mastigável (Neo Química)   | 127           |
| Albiomin 20% Fr 50mL                           | 128           |
| Albumina Humana                                | 128           |
| Albumina Humana 20% Fr 50ml (Baxter)           | 128           |
| Albumina Humana 20% Fr 50ml (Grifols)          | 128           |
| Albumina Sérica Humana 20% Bolsa 50ml (Baxter) | 128           |
| Alburex 20 % Fr 50ml                           | 128           |
| Alcool Absoluto 99,6 °GL                       | 128           |
| Alcool Absoluto 99,6°GL Amp 10mL               | 128           |
| Álcool Etilico 70% Fr 100ml                    | 129           |
| Álcool Etilico Hidratado                       | 129           |
| Álcool Etilico Hidratado 70% Fr 60ml           | 129           |
| Álcool Gel Refil 1000ml                        | 129           |
| Álcool Polivinílico + Povidona                 | 129           |
| Aldactone 100mg Cp                             | 281           |
| Aldactone 25mg Cp                              | 281           |
| Aldomet 250mg Cp Rev                           | 396           |
| Alektos 20mg Cp                                | 164           |
| Alenia 12mcg + 400mcg Caps Inalatórias         | 171           |
| Alfapeginterferona 2B                          | 129           |
| Alfast 2,5mg Amp 5 mL                          | 130           |
| Alfentanila                                    | 130           |
| Alimta 100mg FA                                | 453           |
| Alimta 500mg FA                                | 453           |
| Alivium Gotas Fr 30ml                          | 340           |
| Alizaprida                                     | 130           |
| Alkeran 2mg Cp                                 | 388           |
| Alkeran 50mg FA                                | 388           |
| Allegra 120mg Cp Rev                           | 295           |
| Allegra 180mg Cp Rev                           | 295           |
| Allegra D 60/120mg Cp Rev                      | 295           |
| Alois 10mg Cp Rev                              | 388           |
| Alopurinol                                     | 131           |
| Alopurinol 100mg Cp (Medley)                   | 131           |
| Alopurinol 100mg Cp (Prati Donaduzzi)          | 131           |
| Alopurinol 300mg Cp (Medley)                   | 131           |
| Alopurinol 300mg Cp (Prati Donaduzzi)          | 131           |

| <b>Medicamento</b>                                                                                                       | <b>Página</b>  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Alopurinol 300mg Cp (Sandoz)                                                                                             | 131            |
| Alpinia Zerumbet                                                                                                         | 132            |
| Alprazolam                                                                                                               | 132            |
| Alprazolam 0,5mg Cp (Germed)                                                                                             | 132            |
| Alprazolam 0,5mg Cp (Medley)                                                                                             | 132            |
| Alprostadil                                                                                                              | 133            |
| Alteplase                                                                                                                | 133            |
| Amantadina                                                                                                               | 134            |
| Amaryl 1mg Cp                                                                                                            | 322            |
| Amato 25mg Cp Rev                                                                                                        | 524            |
| Ambisome 50mg FA                                                                                                         | 145            |
| Amicacina                                                                                                                | 135            |
| Amicacina 500mg Amp 2 mL (Novafarma)                                                                                     | 135            |
| Amicacina 500mg Amp 2 mL (Teuto)                                                                                         | 135            |
| Amilorida                                                                                                                | 135            |
| Aminoácidos + Glicose + Lipídeos + Na + K + Mg + Ca + PO <sub>4</sub> + Zn + SO <sub>4</sub> <sup>-</sup> + Cl + Acetato | 136            |
| Aminofilina                                                                                                              | 136 e 137      |
| Aminofilina 100mg Cp (Teuto)                                                                                             | 137            |
| Aminofilina 240mg Amp 10ml (Farmace)                                                                                     | 136            |
| Aminofilina 240mg Amp 10ml (Hipolabor)                                                                                   | 136            |
| Aminofilina 240mg Amp 10ml (Teuto)                                                                                       | 136            |
| Aminofilina 240mg FA 10ml Manip                                                                                          | 136            |
| Amiodarona                                                                                                               | 137 e 138      |
| Amiodarona 150mg Amp 3mL (Hipolabor)                                                                                     | 137            |
| Amiodarona 150mg Amp 3mL Manip                                                                                           | 137            |
| Amiodarona Cloridrato 100mg Cp                                                                                           | 138            |
| Amiodarona Cloridrato 200mg Cp (Biosintética)                                                                            | 138            |
| Amiodarona Gts 200mg/mL Fr 30mL Manip                                                                                    | 138            |
| Amitriptilina                                                                                                            | 139            |
| Amoxicilina                                                                                                              | 139            |
| Amoxicilina + Clavulanato de Potássio                                                                                    | 140, 141 e 142 |
| Amoxicilina 1000mg + Clavulanato de Potássio 200mg FA (Eurofarma)                                                        | 140            |
| Amoxicilina 500mg Cap (Biosintética)                                                                                     | 139            |
| Amoxicilina 500mg Cap (EMS)                                                                                              | 139            |
| Amoxicilina 500mg Cap (Germed)                                                                                           | 139            |
| Amoxicilina 500mg Cap (Medley)                                                                                           | 139            |
| Amoxicilina 500mg Cap (Prati Donaduzzi)                                                                                  | 139            |
| Amoxicilina 500mg Cap (Sandoz)                                                                                           | 139            |

| <b>Medicamento</b>                            | <b>Página</b> |
|-----------------------------------------------|---------------|
| Amoxil 500mg Cap                              | 139           |
| Ampicilina                                    | 142 e 143     |
| Ampicilina + Sulbactam                        | 143           |
| Ampicilina 1g + Sulbactam 0,5g FA (Eurofarma) | 143           |
| Ampicilina 1g + Sulbactam 0,5g FA (Mylan)     | 143           |
| Ampicilina 1g + Sulbactam 0,5g FA (Novafarma) | 143           |
| Ampicilina 1g FA (Teuto)                      | 142           |
| Ampicilina 500mg Cp (EMS)                     | 143           |
| Ampicilina 500mg Cp (Sandoz)                  | 143           |
| Ampicilina 500mg FA (Teuto)                   | 142           |
| Amplatil 1g FA                                | 142           |
| Amplatil 500mg FA                             | 142           |
| Amplictil 25mg Amp 5ml                        | 226           |
| Amplictil 25mg Cp Rev                         | 226           |
| Amplictil 4% Gts Fr 20ml                      | 226           |
| Amytril 25mg Cp                               | 139           |
| Anafranil 25mg Drg                            | 215           |
| Anastrozol                                    | 144           |
| Anastrozol 1mg Cp                             | 144           |
| Ancoron 100mg Cp Rev                          | 138           |
| Ancoron 200mg Cp                              | 138           |
| Ancoron Gts 200mg Fr 30mL                     | 138           |
| Androcur 50mg Cp                              | 209           |
| Anestalcon Sol Oft 25mg Fr 5ml                | 476           |
| Anfotericina B Lipossomal                     | 145           |
| Angipress 25mg Cp                             | 148           |
| Anidulafungina                                | 145           |
| Anidulafungina 100mg FA                       | 145           |
| Anlodipino                                    | 146           |
| Anlodipino 5mg Cp (Biosintética)              | 146           |
| Annita 500mg Cp Rev                           | 426           |
| Ansentrón 8mg Amp 4ml                         | 435           |
| Ansitec 10mg Cp                               | 174           |
| Antak 150mg Cp                                | 480           |
| Antak 50mg Amp 2ml                            | 479           |
| Antivirax 200mg Cp                            | 115           |
| Apidra 100ui/ml FA 10ml                       | 349           |
| Apixabana                                     | 146           |



| <b>Medicamento</b>                                                                  | <b>Página</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Apraz 0,5 Cp                                                                        | 132           |
| Apresolina 25mg Drg                                                                 | 332           |
| Aracytin Cs 1000mg FA                                                               | 211           |
| Aracytin Cs 100mg FA                                                                | 211           |
| Aradois 25mg Cp Rev                                                                 | 382           |
| Aradois 50mg Cp Rev                                                                 | 382           |
| Aramin 10mg Amp 1ml                                                                 | 394           |
| Arava 20mg Cp                                                                       | 366           |
| Arcoxia 60mg Cp Rev                                                                 | 283           |
| Arginina + Fosfoserina + Fosfotreonina + Glutamina + Triptofana + Hidroxocobalamina | 147           |
| Aricilina 5mUI FA (Blausiegel)                                                      | 158           |
| Arimidex 1mg Cp                                                                     | 144           |
| Ariscorten 100mg FA                                                                 | 334           |
| Aristopramida 10mg Amp 2mL                                                          | 399           |
| Arixtra 2,5mg Ser 0,5ml                                                             | 308           |
| Arixtra 7,5mg Ser 0,6ml                                                             | 308           |
| Aropax 20mg Cp Rev                                                                  | 451           |
| Artrinidad 100mg Amp 2ml                                                            | 202           |
| Artrinidad Iv 100mg FA                                                              | 201           |
| Artrolive Cap                                                                       | 233           |
| Asmapen 100mg Cp                                                                    | 137           |
| Aspirina Prevent 100mg Cp                                                           | 117           |
| Assert 50mg Cp                                                                      | 492           |
| Astro 500mg Cp Rev                                                                  | 151           |
| Astro 500mg FA                                                                      | 152           |
| Atacand 8mg Cp                                                                      | 178           |
| Atenol 25mg Cp                                                                      | 148           |
| Atenol 50mg Cp                                                                      | 148           |
| Atenolol                                                                            | 148           |
| Atenolol 25mg Cp (Biosintética)                                                     | 148           |
| Atenolol 25mg Cp (EMS)                                                              | 148           |
| Atenolol 25mg Cp (Germed)                                                           | 148           |
| Atenolol 25mg Cp (Medley)                                                           | 148           |
| Atenolol 25mg Cp (Prati Donaduzzi)                                                  | 148           |
| Atenolol 25mg Cp (Sandoz)                                                           | 148           |
| Atenolol 50mg Cp (Biosintética)                                                     | 148           |
| Atenolol 50mg Cp (EMS)                                                              | 148           |
| Atenolol 50mg Cp (Medley)                                                           | 148           |

| <b>Medicamento</b>                                             | <b>Página</b> |
|----------------------------------------------------------------|---------------|
| Atensina 100mcg Cp                                             | 217           |
| Atensina 150mcg Cp                                             | 217           |
| Atlansil 100mg Cp                                              | 138           |
| Atlansil 200mg Cp                                              | 138           |
| Atorvastatina                                                  | 148           |
| Atorvastatina 10mg Cp (Eurofarma)                              | 148           |
| Atorvastatina 10mg Cp (Medley)                                 | 148           |
| Atred 100mg FA                                                 | 453           |
| Atred 500mg FA                                                 | 453           |
| Atropina                                                       | 149           |
| Atropina 0,5% Colírio Fr 5ml                                   | 150           |
| Atropion 0,5mg Amp 1ml                                         | 149           |
| Atrovent 0,25mg/mL Fr 20mL                                     | 354           |
| Aturgyl Sol Nasal Fr 15ml                                      | 442           |
| Avalox 400mg Bolsa 250mL                                       | 413           |
| Avalox 400mg Cp Rev                                            | 414           |
| Avastin 100mg (25mg/mL) FA 4mL                                 | 162           |
| Avastin 400mg (25mg/mL) FA 16mL                                | 162           |
| Avide 100mg Cap                                                | 478           |
| Avodart 0,5mg Cap Gelatinosa Mole                              | 267           |
| Axetilcefuroxima 250mg Cp                                      | 196           |
| Axonium 2,5mg Cp                                               | 432           |
| Azacitidina                                                    | 150           |
| Azatioprina                                                    | 150           |
| Azilect 1mg Cp                                                 | 481           |
| Azitromicina                                                   | 151 e 152     |
| Azitromicina 500mg Cp Rev (EMS)                                | 151           |
| Azitromicina 500mg Cp Rev (Prati Donaduzzi)                    | 151           |
| Azukon Mr 30 mg Cp Lib Modificada                              | 321           |
| Azul de Metileno                                               | 152           |
| Azul de Metileno 2% Amp 5ml Manip                              | 152           |
| Azul Patente                                                   | 153           |
| Azul Patente 2,5% Amp 2ml Manip                                | 153           |
| Azulfin 500mg Cp Rev                                           | 507           |
| Bacillus de Calmette-Guérin Mycobacterium Bovis (BCG)          | 154           |
| Bacitracina + Neomicina                                        | 154           |
| Bacitracina 250ui/g + Neomicina Sulfato 5mg/g Bis 15g (Medley) | 154           |
| Baclofen 10mg Cp (Teuto)                                       | 154           |

| Medicamento                                           | Página |
|-------------------------------------------------------|--------|
| Baclofeno                                             | 154    |
| Baclofeno 10mg Cp (Teuto)                             | 154    |
| Baclofeno 10mg Cp (União Química)                     | 154    |
| Bac-sulfitrin 400mg + 80mg Amp 5ml                    | 505    |
| Bactomax 400mg FA                                     | 512    |
| Bactrim 400mg + 80mg Cp                               | 506    |
| Bactrim F 800mg + 160mg Cp                            | 506    |
| Bamifilina                                            | 155    |
| Bamifix 300mg Drg                                     | 155    |
| Bário Sulfato                                         | 155    |
| Bariogel 100% (1g/ml) Susp Or Copo 150ml              | 155    |
| Basiliximabe                                          | 155    |
| Becenun 100mg FA                                      | 182    |
| Beclometasona Dipropionato                            | 156    |
| Beclometasona Dipropionato + Fumarato de Formoterol   | 156    |
| Bedfordpoly B FA 500.000ui                            | 463    |
| Belimumabe                                            | 157    |
| Benalet Pastilha                                      | 252    |
| Benerva 300mg Cp                                      | 546    |
| Benfotiamina                                          | 157    |
| Benicar 20mg Cp Rev                                   | 434    |
| Benlysta 120mg FA                                     | 157    |
| Benlysta 400mg FA                                     | 157    |
| Benzalcônio + Sódio Cloreto                           | 157    |
| Benzetacil 1.200.000ui FA 4ml                         | 453    |
| Benzilpenicilina Benzatina                            | 158    |
| Benzilpenicilina Potássica                            | 158    |
| Benzilpenicilina Potássica 5mUI FA (Novafarma)        | 158    |
| Bepantol Derma Creme Bis 20g                          | 248    |
| Bepeben 1.200.000ui FA                                | 158    |
| Bepeben Benzilpenicilina Benzatina 600.000ui          | 158    |
| Berotec Gts 0,5% Fr 20ml                              | 291    |
| Beserol Cp                                            | 450    |
| Betacris Amp 5mL                                      | 401    |
| Betaistina                                            | 159    |
| Betametasona + Clioquinol + Gentamicina + Tolnaftato  | 160    |
| Betametasona + Gentamicina                            | 160    |
| Betametasona Acetato + Betametasona Fosfato Dissódico | 160    |

| Medicamento                                                | Página    |
|------------------------------------------------------------|-----------|
| Betametasona Dipropionato + Betametasona Fosfato Dissódico | 161       |
| Betametasona Valerato                                      | 161       |
| BETAmetasona Valerato Creme 0,1% Bis 30g (Germed)          | 161       |
| BETAmetasona Valerato Creme 0,1% Bis 30g (Medley)          | 161       |
| Betanecol                                                  | 161       |
| Betanecol 10mg Cap Manip                                   | 161       |
| Betnovate 0,1% Creme Bis 30g                               | 161       |
| Bevacizumabe                                               | 162       |
| Bextra 40mg FA                                             | 451       |
| Bezafibrato                                                | 162       |
| Bezafibrato 200mg Cp Rev (EMS)                             | 162       |
| Bezafibrato 200mg Cp Rev (Germed)                          | 162       |
| Biamotil 0,35% Colírio Fr 5ml                              | 208       |
| Bicalutamida                                               | 163       |
| Bicarbonato de Sódio                                       | 163 e 164 |
| Bicarbonato de Sódio 10% Amp 10ml (Hypofarma)              | 164       |
| Bicarbonato de Sódio 10% Amp 10ml Manip                    | 164       |
| Bicarbonato de Sódio 500mg Cap                             | 163       |
| Bicarbonato de Sódio 8,4% Amp 10ml Manip                   | 164       |
| Bicarbonato de Sódio 8,4% Fr 250mL                         | 164       |
| Bilastina                                                  | 164       |
| Binotal 500mg Cp                                           | 143       |
| Bioxtra Enxaguatório Bucal Fr 250mL                        | 272       |
| Bioxtra Gel Oral Bis 40mL                                  | 284       |
| Biozatin 1.200.000ui FA                                    | 453       |
| Biperideno                                                 | 164       |
| Bisacodil                                                  | 165       |
| Bisacodil + Docusato Sódico                                | 165       |
| Bisoprolol                                                 | 166       |
| Bleomicina                                                 | 166       |
| Bleomicina 15Ui FA (Baxter)                                | 166       |
| Bleu Patente V 2,5% Amp 2mL                                | 153       |
| Blopress 8mg Cp                                            | 178       |
| Bolsa Ultrabag 1,5% 2L                                     | 498       |
| Bonar 15 Ui FA                                             | 166       |
| Bortezomibe                                                | 167       |
| Botox 100u FA                                              | 524       |
| Brasart 80mg Cp Rev                                        | 536       |

| <b>Medicamento</b>                                         | <b>Página</b> |
|------------------------------------------------------------|---------------|
| Brentuximabe                                               | 167           |
| Brevibloc 100mg FA                                         | 279           |
| Brevibloc 2,5g Amp                                         | 279           |
| Bridion 200mg FA 2ml                                       | 504           |
| Brilinta 90mg Cp Rev                                       | 517           |
| Brintellix 5mg Cp Rev                                      | 555           |
| Bromazepam                                                 | 168           |
| Brometo de Ipratrópio 0,025% Fr 20mL (Biosintética)        | 354           |
| Brometo de Ipratrópio 0,025% Fr 20mL (EMS)                 | 354           |
| Brometo de Ipratrópio 0,025% Fr 20mL (Prati Donaduzzi)     | 354           |
| Brometo de Rocurônio 50mg FA 5mL (Eurofarma)               | 487           |
| Bromidrato de Fenoterol Gts 0,5% Fr 20ml (Prati Donaduzzi) | 291           |
| Bromogex 10mg (5mg/ml) Amp 2ml                             | 168           |
| Bromoprida                                                 | 168 e 169     |
| Bromoprida 10mg (5mg/ml) Amp 2ml (Novafarma)               | 168           |
| Bromoprida 10mg Amp 2ml (União Química)                    | 168           |
| Bromoprida Gts 4mg/mL Fr 20mL (Biosintética)               | 169           |
| BromoPRIDA Gts 4mg/ml Fr 20ml (EMS)                        | 169           |
| BromoPRIDA Gts 4mg/ml Fr 20ml (Medley)                     | 169           |
| Bss Solução Salina Balanceada Fr 500mL                     | 500           |
| Budecort Aqua 64mcg/dose Spray Nasal Fr                    | 171           |
| Budesonida                                                 | 170 e 171     |
| Budesonida + Formoterol                                    | 171           |
| Budesonida 2mg Fr Enema 100mL Manip                        | 170           |
| Budesonida 3mg Cap Gastorresistente Manip                  | 170           |
| Bup 150mg Cp Ação Prolongada                               | 174           |
| Bupivacaína                                                | 171 e 172     |
| Bupivacaína + Glicose                                      | 173           |
| Bupivacaína + Epinefrina                                   | 172           |
| Buprenorfina                                               | 173           |
| Bupropiona                                                 | 174           |
| Bupropiona 150mg Cp ação prolongada (Germed)               | 174           |
| Bupropiona 150mg Cp Liberação Lenta (Eurofarma)            | 174           |
| Bupropiona 150mg Cp Rev liberação lenta (EMS)              | 174           |
| Bupstestic 0,5% C/ Epinefrina FA 20mL                      | 172           |
| Bupstestic 0,5% S/ Adrenalina FA 20mL                      | 171           |
| Buscopan Composto Amp 5ml                                  | 278           |
| Buscopan Composto Cp Rev                                   | 279           |

| <b>Medicamento</b>                                        | <b>Página</b> |
|-----------------------------------------------------------|---------------|
| Buscopan Composto Gts Fr 20ml                             | 279           |
| Buscopan Simples 10mg Drg                                 | 278           |
| Buscopan Simples 20mg Amp 1ml                             | 277           |
| Buscopan Simples Gts 10mg/ml Fr 20ml                      | 277           |
| Busilvex 60mg FA                                          | 175           |
| Buspirona                                                 | 174           |
| Bussulfano                                                | 175           |
| Butilbrometo de Escopolamina 20mg Amp 1mL (União Química) | 277           |
| Caelyx 20mg FA                                            | 264           |
| Calcijex 1mcg Amp 1ml                                     | 177           |
| Cálcio Cloreto + Potássio + Sódio Cloreto                 | 176           |
| Cálcio Cloreto + Potássio + Sódio Cloreto + Sódio Lactato | 176           |
| Cálcio Poliestirenosulfonato                              | 177           |
| Calcitriol                                                | 177           |
| Calcort 30mg Cp                                           | 239           |
| Calnate 900mg/g Env 30g                                   | 177           |
| Camomila Extrato                                          | 178           |
| Camptosar 100mg (20mg/ml) FA                              | 354           |
| Camptosar 40mg (20mg/ml) FA                               | 354           |
| Cancidas 50mg FA                                          | 184           |
| Cancidas 70mg FA                                          | 184           |
| Candesartana                                              | 178           |
| Candicort Creme Bis 30g                                   | 200           |
| Canesten 1% Creme Dermatológico Bis 20g                   | 228           |
| Capecitabina                                              | 179           |
| Captopril                                                 | 179           |
| Captopril 12,5mg Cp (EMS)                                 | 179           |
| Captopril 12,5mg Cp (Medley)                              | 179           |
| Captopril 25mg Cp (EMS)                                   | 179           |
| Captopril 25mg Cp (Medley)                                | 179           |
| Captopril 25mg Cp (Prati Donaduzzi)                       | 179           |
| Carbamazepina                                             | 180           |
| Carbolitium 300mg Cp Rev                                  | 379           |
| Carbonato de Cálcio                                       | 176           |
| Carbonato de Cálcio + Vitamina D                          | 176           |
| Carboplatina                                              | 181           |
| Carboximaltose Férrica                                    | 181           |
| Carboximetilcelulose Sódico (Carmelose)                   | 182           |

| <b>Medicamento</b>                            | <b>Página</b> |
|-----------------------------------------------|---------------|
| Cardilol 12,5mg Cp                            | 183           |
| Cardilol 3,125mg Cp                           | 183           |
| Cardioxane 500mg FA                           | 248           |
| Cardizem 30mg Cp                              | 253           |
| Cardizem 60mg Cp                              | 253           |
| Carduran XL 4 mg Cp Lib Controlada            | 262           |
| Cariax Solução Bucal Com Clorexidina Fr 250ml | 225           |
| Carmelose Sódica + Associações                | 182           |
| Carmustina                                    | 182           |
| Carnabol Cp                                   | 545           |
| Carvão Ativado                                | 182           |
| Carvão Ativado 10g Env Manip                  | 182           |
| Carvedilol                                    | 183           |
| CarVEDilol 12,5mg Cp (Biosintética)           | 183           |
| CarVEDilol 12,5mg Cp (Libbs)                  | 183           |
| CarVEDilol 3,125mg Cp (Biosintética)          | 183           |
| CarVEDilol 3,125mg Cp (EMS)                   | 183           |
| CarVEDilol 6,25mg (EMS)                       | 183           |
| Carvedilol 6,25mg Cp (Biosintética)           | 183           |
| Carvedilol 6,25mg Cp (Germed)                 | 183           |
| Carvedilol 6,25mg Cp (Medley)                 | 183           |
| Casodex 50mg Cp Rev                           | 163           |
| Caspofungina                                  | 184           |
| Cataflam Emulgel 11,6mg/g Pomada Bis 60g      | 250           |
| Cebralat 50mg Cp                              | 205           |
| Ceclor Bd 500mg Drg                           | 184           |
| Cefaclor                                      | 184           |
| Cefaclor 500mg Cap (EMS)                      | 184           |
| Cefaclor 500mg Cap (Germed)                   | 184           |
| Cefadroxil                                    | 185           |
| Cefadroxila 500mg Cap (EMS)                   | 185           |
| Cefadroxila 500mg Cap (Eurofarma)             | 185           |
| Cefadroxila 500mg Cap (Medley)                | 185           |
| Cefalexina                                    | 186           |
| Cefalotina                                    | 186           |
| Cefalotina 1g FA (Blausiegel)                 | 186           |
| Cefalotina Sódica 1g FA (Abl)                 | 186           |
| Cefamox 500mg Cap                             | 185           |

| <b>Medicamento</b>                           | <b>Página</b> |
|----------------------------------------------|---------------|
| Cefariston 1g FA (Blausiegel)                | 186           |
| Cefazolina                                   | 187           |
| Cefazolina 1g FA (Abl)                       | 187           |
| Cefazolina 1g FA (Aurobindo)                 | 187           |
| Cefepima                                     | 189           |
| Cefepima Cloridrato 1g FA (Abl)              | 189           |
| Cefepima Cloridrato 1g FA (Novafarma)        | 189           |
| Cefotaxima                                   | 189           |
| Cefoxitina                                   | 190           |
| Ceftarolina Fosamila                         | 191           |
| Ceftazidima                                  | 192           |
| Ceftazidima + Avibactam                      | 193           |
| Ceftazidon 1g FA                             | 192           |
| Ceftozolona + Tazobctam                      | 193           |
| Ceftriaxona                                  | 194 e 195     |
| Ceftriaxona EV 1g FA (Abl)                   | 195           |
| Cefuroxima                                   | 196           |
| Celebra 100mg Cap                            | 197           |
| Celecoxibe                                   | 197           |
| Celestone Soluspan Amp 1ml                   | 160           |
| Cellcept 500mg Cp                            | 404           |
| Cellozina 1g FA                              | 187           |
| Cemax 1g FA                                  | 189           |
| Centrum Cp                                   | 553           |
| Cepacol Solução 0,5mg/ml Fr 250ml            | 199           |
| Cepacol Solução 0,5mg/mL Fr 250mL - Dose     | 199           |
| Cerne 12 Fr 5 mL                             | 552           |
| Certican 0,5mg Cp                            | 284           |
| Certican 0,75mg Cp                           | 284           |
| Cerumin Fr 8mL                               | 336           |
| Cetamina                                     | 198           |
| Cetazima 1g FA (Novafarma)                   | 189           |
| Cetilpiridínio                               | 199           |
| Cetirizina Dicloridrato                      | 199           |
| Cetirizina Dicloridrato 10mg Cp Rev (Medley) | 199           |
| Cetoconazol                                  | 200           |
| Cetoconazol + Betametasona                   | 200           |
| Cetoconazol + Betametasona Bis 30g (EMS)     | 200           |



| <b>Medicamento</b>                             | <b>Página</b>  |
|------------------------------------------------|----------------|
| Cetoconazol + Betametasona Bis 30g (Medley)    | 200            |
| Cetoprofeno                                    | 200, 201 e 202 |
| Cetoprofeno 100mg FA (Eurofarma)               | 200            |
| Cetoprofeno 100mg Iv FA (Cristália)            | 201            |
| Cetorolaco Trometamol 30mg Amp 1mL Manip       | 529            |
| Cetrolac 30mg Amp 1 mL                         | 529            |
| CETuximabe                                     | 202            |
| Cewin 1g Cp Efervescente S/Açúcar              | 549            |
| Cewin 500mg Cp de Desintegração Lenta          | 549            |
| Champix Kit Tratamento Cp Rev 0,5mg + 1mg      | 539            |
| Chlorohex Sabão 2% Fr 1L                       | 225            |
| Ciclobenzaprina                                | 203            |
| Ciclobenzaprina 5mg Cp Rev (Biosintética)      | 203            |
| Ciclobenzaprina 5mg Cp Rev (Eurofarma)         | 203            |
| Ciclofosfamida                                 | 203            |
| Ciclosporina                                   | 203 e 204      |
| Ciclosporina 100mg Cap (Germed)                | 203            |
| Ciclo-taurolidina + Citrato + Uroquinase       | 205            |
| Cilidon 1g FA                                  | 142            |
| Cilidon 500mg FA                               | 142            |
| Cilostazol                                     | 205            |
| Ciloxan 0,3% Colírio Fr 5ml                    | 208            |
| Cinetol 2mg Cp                                 | 164            |
| Cipramil 20mg Cp                               | 210            |
| Cipro 500mg Cp Rev                             | 207            |
| Cipro Iv 400mg Bolsa 200ml                     | 206            |
| Cipro Iv Flexibag 200mg Bolsa 100ml            | 206            |
| Ciprobacter 200mg Bolsa 100mL (Isofarma)       | 206            |
| Ciprobacter 400mg Bolsa 200mL (Isofarma)       | 206            |
| Ciprofibrato                                   | 206            |
| Ciprofloxacino                                 | 206, 207 e 208 |
| CIPROfloxacino 200mg Bolsa 100ml (Halex Istar) | 206            |
| Ciprofloxacino 200mg Bolsa 100mL (Isofarma)    | 206            |
| CIPROfloxacino 400mg Bolsa 200ml (Halex Istar) | 206            |
| Ciprofloxacino 500mg Cp Rev (EMS)              | 207            |
| Ciprofloxacino 500mg Cp Rev (Germed)           | 207            |
| Ciprofloxacino 500mg Cp Rev (Medley)           | 207            |

| <b>Medicamento</b>                                               | <b>Página</b> |
|------------------------------------------------------------------|---------------|
| Ciprofloxacino 500mg Cp Rev (Sandoz)                             | 207           |
| CIPROfloxacino Cld 500mg Cp Rev (Prati Donaduzzi)                | 207           |
| Ciproterona                                                      | 209           |
| Cis 10mg Amp 5mL                                                 | 209           |
| Cisatracúrio Besilato                                            | 209           |
| Cisplatina                                                       | 210           |
| Citalopram                                                       | 210           |
| Citalopram 20mg cp (Biosintética)                                | 210           |
| Citalopram 20mg cp (Sandoz)                                      | 210           |
| Citalor 10mg Cp Rev                                              | 148           |
| Citarabina                                                       | 211           |
| Citarabina 100mg FA 1mL                                          | 211           |
| Citarabina 1g FA 10mL                                            | 211           |
| Citarabina 500mg FA 5mL                                          | 211           |
| Citarax 500mg FA                                                 | 211           |
| Citidina + Uridina + Hidroxocobalamina                           | 211           |
| Citoneurin 5000 Amp                                              | 547           |
| Citoneurin 5000 Drg                                              | 547           |
| Citrato de Potássio                                              | 211           |
| Citrato de Tamoxifeno 20mg Cp (Sandoz)                           | 511           |
| Citrato Trissódico                                               | 212           |
| Citrato Trissódico 4% (40mg/ml) Bolsa 3000ml Manip (Life Pharma) | 212           |
| Citrato Trissódico 4% (40mg/ml) Bolsa 3000ml Manip (Phynton)     | 212           |
| Claritin 10mg Cp                                                 | 380           |
| Claritromicina                                                   | 212 e 213     |
| Claritromicina 500mg Cp (EMS)                                    | 212           |
| Claritromicina 500mg Cp (Medley)                                 | 212           |
| Claritromicina 500mg FA (Abl)                                    | 213           |
| Claritromicina 500mg FA (Aspen)                                  | 213           |
| Clavulin Injetável 1000mg/200mg FA                               | 140           |
| Clenil A 400mcg Flac 2ml                                         | 156           |
| Clexane 100mg Ser 1mL                                            | 271           |
| Clexane 20mg Ser 0,2mL                                           | 270           |
| Clexane 40mg Ser 0,4ml                                           | 270           |
| Clexane 60mg Ser 0,6ml                                           | 270           |
| Clexane 80mg Ser 0,8ml                                           | 270           |
| Clindamicina                                                     | 213           |
| Clindamicina 300mg Cap (União Química)                           | 213           |

| <b>Medicamento</b>                                          | <b>Página</b> |
|-------------------------------------------------------------|---------------|
| Clindamicina 300mg Cap Manip                                | 213           |
| Clindamicina Cloridrato 300mg Cap (Teuto)                   | 213           |
| Clindamicina Fosfato                                        | 214           |
| Clindamicina Fosfato 600mg Amp 4mL (Hipolabor)              | 214           |
| Clindamicina Fosfato 600mg Amp 4mL (Novafarma)              | 214           |
| Clindamicina Fosfato 600mg Amp 4mL (União Química)          | 214           |
| Clisterol / Soro Glicerinado 12% Fr 500mL                   | 320           |
| Clo 10mg Drg                                                | 215           |
| Clobazam                                                    | 214           |
| Clob-X Creme Bis 30g                                        | 127           |
| Clob-X Creme Bis 30g                                        | 127           |
| Clomipramina                                                | 215           |
| Clonazepam                                                  | 216           |
| Clonazepam Gts 2,5mg/ml Fr 20ml (EMS)                       | 216           |
| Clonidin 150mcg Amp 1ml                                     | 217           |
| Clonidina                                                   | 217           |
| Cloperastina                                                | 218           |
| Clopidogrel                                                 | 218           |
| Clorana 25mg Cp                                             | 333           |
| Cloranfenicol + Aminoácidos + Metionina + Viatamina A       | 219           |
| Cloranfenicol + Colagenase                                  | 219           |
| Cloranfenicol + Desoxirribonuclease + Fibrinolisisina       | 220           |
| Cloreto de Cálcio                                           | 220           |
| Cloreto de Cálcio 10% Amp 10ml Manip                        | 220           |
| Cloreto de Potássio                                         | 221 e 222     |
| Cloreto de Potássio 1,91g Env Manip                         | 221           |
| Cloreto de Potássio 19.1% Amp 10ml                          | 222           |
| Cloreto de Potássio 6% Sol Oral (sem açúcar) Fr 100mL Manip | 221           |
| Cloreto de Sódio                                            | 223           |
| Cloreto de Sódio 0,9% Ser 10ml                              | 223           |
| Cloreto de sódio 0,9% Ser 10mL (Equiplex)                   | 223           |
| Cloreto de Sódio 0,9% Ser 3mL                               | 223           |
| Cloreto de Sódio 20% Amp 10mL                               | 224           |
| Cloreto de Sódio 500mg Cap Manip                            | 223           |
| Clorexidina                                                 | 224 e 225     |
| Clorexidina + Fluoreto de Sódio                             | 225           |
| Cloridrato de Clomipramina 25mg Drg (EMS)                   | 215           |
| Cloridrato de Epirrubicina 10mg FA 5mL (Accord)             | 272           |

| <b>Medicamento</b>                                        | <b>Página</b> |
|-----------------------------------------------------------|---------------|
| Cloridrato de Epirrubicina 50mg FA 25mL (Accord)          | 272           |
| Cloridrato de Lidocaína 2% Sem Vasoconstritor (Novafarma) | 372           |
| Cloridrato de Pioglitazona 15mg Cp (Nova Química)         | 458           |
| Cloridrato de Propafenona 300mg Cp Rev (Eurofarma)        | 469           |
| Cloridrato de Sertralina 50mg Cp (Germed)                 | 491           |
| Clorpromazina                                             | 226           |
| Clortalidona                                              | 227           |
| Clortalidona 12,5mg Cp                                    | 227           |
| Clostebol + Neomicina                                     | 228           |
| Clotrimazol                                               | 228           |
| Clotrimazol 1% Creme Dermatológico Bis 20g (EMS)          | 228           |
| Clotrimazol 1% Creme Dermatológico Bis 20g (Medley)       | 228           |
| Cloxacilam                                                | 229           |
| Cobamamida + Coenzima B12 + Vitaminas + Associações       | 229           |
| Cobavital Cp                                              | 229           |
| Codein 3mg/ml Sol Oral Fr 120ml                           | 230           |
| Codeína                                                   | 230           |
| Codeína + Paracetamol                                     | 230           |
| Coglive 8mg Cap Liberação Prolongada                      | 315           |
| Colchicina                                                | 231           |
| Colchis 0,5mg Cp                                          | 231           |
| Colestiramina                                             | 232           |
| Colgate Periogard 0,12% Solução Fr 250ml                  | 225           |
| Coltrax 4mg Amp 2ml                                       | 519           |
| Coltrax 4mg Cp                                            | 519           |
| Combiron Fólico Cp Rev                                    | 120           |
| Combodart Cap                                             | 266           |
| Combodart Cap                                             | 512           |
| Compaz 10mg Amp 2ml                                       | 249           |
| Complexo Protrombínico                                    | 232           |
| Comtan 200mg Cp                                           | 271           |
| Concor 2,5mg Cp Rev                                       | 166           |
| Condroflex Cap                                            | 233           |
| Condroitina + Hialuronato                                 | 233           |
| Condroitina Sulfato + Glicosamina                         | 233           |
| Cordia Verbenacea                                         | 233           |
| Coreg 12,5 Cp                                             | 183           |
| Coronar 10mg Amp 1mL                                      | 358           |

| <b>Medicamento</b>                        | <b>Página</b> |
|-------------------------------------------|---------------|
| Corretal 500mg Cp Rev                     | 179           |
| Cortisonal 100mg FA (União Química)       | 334           |
| Cortisonal 500mg FA                       | 334           |
| Corus 50mg Cp Rev                         | 382           |
| Cosopt Solução Oftálmica Fr 5ml           | 262           |
| Cozaar 50mg Cp Rev                        | 382           |
| Cphd 22-90 Solução Ácida de Diálise 960ml | 496           |
| Cphd 24-90 Solução Ácida de Diálise 960ml | 496           |
| Cphd 32-90 Solução Ácida de Diálise 960ml | 496           |
| Creme Reparador Dérmico Loção Fr 200 mL   | 552           |
| Creon 10.000UI Cap                        | 377           |
| Creon 25.000UI Cap                        | 377           |
| Crestor 10mg Cp Rev                       | 488           |
| Cronobê 5000mcg Amp 2,5ml                 | 548           |
| Cubicin 500mg FA                          | 236           |
| Cumarina + Troxerrutina                   | 233           |
| Custodiol Bolsa 1000mL                    | 409           |
| Custodiol Bolsa 2000mL                    | 409           |
| Cymbalta 30mg Cap de Lib Retardada        | 266           |
| Cymbalta 60mg Cap de Lib Retardada        | 266           |
| Cymevene 500mg FA                         | 316           |
| Cyramza 100mg FA 10mL                     | 479           |
| Cyramza 500mg FA 50mL                     | 479           |
| Dabigatrana                               | 234           |
| Dacarb 200mg FA                           | 234           |
| Dacarbazina                               | 234           |
| Dacogen 50mg FA                           | 237           |
| Daflon 500mg Cp Rev                       | 255           |
| Daforin Gts 20mg/ml Fr 20ml               | 303           |
| Dalacin C 300mg Cap                       | 213           |
| Dalinvi 100mg (20mg/mL) FA                | 236           |
| Dalinvi 400mg (20mg/mL) FA                | 236           |
| Dalmadorm 30mg Cp Rev                     | 304           |
| Dantrolen 20mg FA                         | 235           |
| Dantroleno Sódico                         | 235           |
| Dapagliflozina                            | 235           |
| Daptomicina                               | 236           |
| Daraprim 25mg Cp                          | 460           |

| <b>Medicamento</b>                         | <b>Página</b> |
|--------------------------------------------|---------------|
| Daratumumab                                | 236           |
| Dastene 0,5mg Cap Gelatinosa Mole          | 267           |
| Daunorrubicina                             | 237           |
| Daunorrubicina 20mg FA                     | 237           |
| Ddavp 0,1mg Cp                             | 242           |
| Ddavp 4mcg Amp 1ml                         | 242           |
| Decadron 0,5mg Cp                          | 244           |
| Decadron 10mg FA 2,5ml                     | 243           |
| Decadron 2mg Amp 1ml                       | 243           |
| Decadron 4mg Cp                            | 244           |
| Decadron Colírio Fr 5ml                    | 245           |
| Deca-durabolin 25mg FA 1ml                 | 418           |
| Decitabina                                 | 237           |
| Deferasirox                                | 238           |
| Defibrotide                                | 238           |
| Defitêlio                                  | 238           |
| Deflazacort                                | 238           |
| Deller 50mg Cp Rev de Liberação Controlada | 502           |
| Denosumabe                                 | 239           |
| Depacon 500mg Amp 5ml                      | 535           |
| Depakene 250mg Cap                         | 536           |
| Depakene 50mg/ml Xarope Fr 100ml           | 536           |
| Depakote 250mg Cp Rev                      | 258           |
| Depakote 500mg Cp Rev                      | 258           |
| Depakote Er 250mg Cp Rev Lib Prolongada    | 258           |
| Depakote Er 500mg Cp Rev Lib Prolongada    | 258           |
| Depo-medrol 80mg FA 2ml                    | 397           |
| DermaBond Adv Líquido                      | 432           |
| Dermacerium Creme Tubo 50g                 | 505           |
| Dermodex Pomada Bis 60g                    | 426           |
| Dermomax Creme 200mg Bis 5g                | 373           |
| Desalex 5mg Cp Rev                         | 241           |
| Desferal 500mg FA                          | 240           |
| Desferroxamina Mesilato                    | 240           |
| Desflurano                                 | 241           |
| Desforane 1ml/ml Fr 240ml                  | 241           |
| Deslanol 0,4mg Amp 2ml                     | 241           |
| Deslanosídeo                               | 241           |

| <b>Medicamento</b>                                                    | <b>Página</b> |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------|
| Desloratadina                                                         | 241           |
| Desmopressina                                                         | 242           |
| Desonida                                                              | 243           |
| Desonol Creme Tubo 30g                                                | 243           |
| Dexametasona                                                          | 243 e 244     |
| Dexametasona + Moxifloxacino                                          | 245           |
| Dexametasona + Neomicina Sulfato                                      | 245           |
| Dexametasona + Neomicina Sulfato + Polimixina B Sulfato               | 246           |
| Dexametasona + Neomicina Sulfato + Polimixina B Sulfato + Hipromelose | 246           |
| DEXAmetasona 4mg Cp (EMS)                                             | 244           |
| Dexclorfeniramina                                                     | 247           |
| Dexilant 30mg Cápsula De Lib Prolongada                               | 247           |
| Dexlansoprazol                                                        | 247           |
| Dexmedetomidina                                                       | 247           |
| Dexmedetomidina 200mcg FA 2ml (União Química)                         | 247           |
| Dexpantenol                                                           | 248           |
| Dexrazoxano Cloridrato                                                | 248           |
| Dextrano+ Hipromelose + Poliquad                                      | 249           |
| Diamicron Mr 30 mg Cp Lib Modificada                                  | 321           |
| Diamox 250mg Cp                                                       | 113           |
| Diazepam                                                              | 249 e 250     |
| Diclofenaco Dietilamônio                                              | 250           |
| Diclofenaco Sódico                                                    | 251           |
| Diclofenaco Sódico 50mg Cp (EMS)                                      | 251           |
| Dicloridrato de Cetirizina 10mg Cp Rev (Sandoz)                       | 199           |
| Difenidramina                                                         | 252           |
| Difenidramina + Sódico Citrato + Amônio Cloreto                       | 252           |
| Difenidrin 50mg Amp 1mL                                               | 252           |
| Digesan 10mg Amp 2ml                                                  | 168           |
| Digesan 10mg Cap                                                      | 169           |
| Digesan Gts 4mg/mL Fr 20mL                                            | 169           |
| Digoxina                                                              | 253           |
| Digoxina 0,25mg Cp (Aspen Pharma)                                     | 253           |
| Digoxina 0,25mg Cp (Pharmalab)                                        | 253           |
| Digoxina 0,25mg Cp (Teuto)                                            | 253           |
| Dilacoron 80mg Cp Rev                                                 | 542           |
| Dilacoron Retard 120mg Cp Rev                                         | 542           |
| Diltiazem                                                             | 253           |

| <b>Medicamento</b>                              | <b>Página</b> |
|-------------------------------------------------|---------------|
| Diltiazem 30mg Cp (EMS)                         | 253           |
| Diltiazem 60mg Cp (EMS)                         | 253           |
| Diltiazem Cloridrato 30mg Cp (Germed)           | 253           |
| Dimefor 850mg Cp                                | 395           |
| Dimenidrinato + Vitamina B6                     | 254           |
| Dimenidrinato + Vitamina B6 + Frutose + Glicose | 254           |
| Dimorf 2mg Amp 2ml                              | 413           |
| Dimorf 0,1mg Amp 1mL                            | 413           |
| Dimorf 10mg Amp 1ml                             | 413           |
| Dimorf 10mg Cp                                  | 412           |
| Diosmina+ Hesperidina                           | 255           |
| Diovan 80mg Cp Rev                              | 536           |
| Dipiridamol                                     | 255           |
| Dipirona + Isometepteno + Cafeína               | 256           |
| Dipirona + Orfenadrina + Cafeína                | 256           |
| Dipirona Sódica                                 | 256           |
| Dipirona Sódica 1g Amp 2mL (Hipolabor)          | 257           |
| Dipirona Sódica 1g Amp 2ml (Teuto)              | 257           |
| Dipirona Sódica 500mg Cp (Medley)               | 257           |
| Dipirona Sódica Cp 500mg (EMS)                  | 257           |
| Dipirona Sódica Cp 500mg (Prati Donaduzzi)      | 257           |
| Diprivan 1% Amp 20ml                            | 471           |
| Diprivan 1% FA 100ml                            | 471           |
| Diprivan P F S 1% Ser 50ml                      | 471           |
| Diprivan P F S 2% Ser 50ml                      | 471           |
| Diprogenta Creme Bis 30g                        | 160           |
| Diprogenta Creme Bis 30g                        | 319           |
| Diprosan 5mg + 2mg Amp 1mL                      | 161           |
| Discovisc Ser 1ml                               | 233           |
| Divalproato de Sódio                            | 258           |
| Divelol 6,25mg Cp                               | 183           |
| Dividol 70mg Cap                                | 544           |
| DMSO                                            | 259           |
| DMSO 99% Gel Bis 10g Manip                      | 259           |
| Dobtan 250mg Amp 20mL                           | 259           |
| Dobutamina                                      | 259           |
| Dobutamina 250mg Amp 20mL (Novafarma)           | 259           |
| Dobutrex 250mg Amp 20mL                         | 259           |



| Medicamento                                       | Página |
|---------------------------------------------------|--------|
| Docelibbs 120mg FA                                | 259    |
| Docelibbs 20mg FA                                 | 259    |
| Docelibbs 80mg FA                                 | 259    |
| Docetaxel                                         | 259    |
| Doclaxin 1000mg/200mg FA                          | 140    |
| Dolantina 100mg Amp 2ml                           | 389    |
| Dolutegravir                                      | 260    |
| Domperidona                                       | 260    |
| Donaren 50mg Cp Rev                               | 527    |
| Donepezila                                        | 261    |
| Dopacris 50mg Amp 10ml                            | 261    |
| Dopamina                                          | 261    |
| DoPAmina Cloridrato 50mg Amp 10ml (Teuto)         | 261    |
| DoPAmina Cloridrato 50mg Amp 10ml (União Química) | 261    |
| Dorflex Cp                                        | 256    |
| Dorico 750mg Cp                                   | 448    |
| Dorilen Gts Fr 15mL                               | 124    |
| Dormire 15mg Amp 3ml                              | 406    |
| Dormire 15mg Cp                                   | 407    |
| Dormire 2mg/ml Sol Oral Fr 10ml                   | 405    |
| Dormire 50mg Amp 10ml                             | 406    |
| Dormire 5mg Amp 5ml                               | 406    |
| Dormonid 15mg Amp 3ml                             | 406    |
| Dormonid 15mg Cp Rev                              | 407    |
| Dormonid 50mg Amp 10ml                            | 406    |
| Dormonid 5mg Amp 5ml                              | 406    |
| Dorzolamida + Timolol                             | 262    |
| Dotarem 10mmol (0,5mmol/ml) FA 20ml               | 120    |
| Dotarem 5mmol (0,5mmol/ml) FA 10ml                | 120    |
| Dotarem 7,5mmol (0,5mmol/ml) FA 15ml              | 120    |
| Doxazosina                                        | 262    |
| Doxiciclina                                       | 263    |
| Doxiciclina 100mg Cp Rev (EMS)                    | 263    |
| Doxiciclina 100mg Cp Rev (Sigma Pharma)           | 263    |
| Doxopeg 20mg FA                                   | 264    |
| Doxorrubicina                                     | 264    |
| Doxorrubicina Cloridrato 50mg FA (Eurofarma)      | 264    |
| Doxorrubicina Lipossomal                          | 264    |

| <b>Medicamento</b>                                | <b>Página</b> |
|---------------------------------------------------|---------------|
| Dramin B6 10mg Cp Rev                             | 254           |
| Dramin B6 DL Amp 10ml                             | 254           |
| Droperdal 2,5mg Amp 1ml                           | 265           |
| Droperidol                                        | 265           |
| Droperidol +Fentanila                             | 265           |
| Dulcolax 5mg Drg                                  | 165           |
| Duloxetina                                        | 266           |
| Duotrat Creme Bis 30g                             | 160           |
| Duotrat Creme Bis 30g                             | 319           |
| Durogesic D-trans 2,1mg Adv Transdérmico 12 mcg/h | 292           |
| Durogesic D-trans 4,2mg Adv Transdérmico 25 mcg/h | 292           |
| Durogesic D-trans 8,4mg Adv Transdérmico 50 mcg/h | 292           |
| Durvalumabe                                       | 266           |
| Duspatalin 200mg Cap Lib Prolongada               | 386           |
| Dutasterida                                       | 267           |
| Dysport 500UI FA                                  | 524           |
| Ebix 10mg Cp Rev                                  | 388           |
| Ecalta 100mg FA                                   | 145           |
| Edoxabana                                         | 268           |
| Efedrin Sulfato 50mg Amp 1ml                      | 268           |
| Efedrina                                          | 268           |
| Efexor Xr 150mg Cap Lib. Controlada               | 541           |
| Efexor Xr 37,5mg Cap Lib. Controlada              | 541           |
| Efexor Xr 75mg Cap Lib. Controlada                | 541           |
| Effient 10mg Cp Rev                               | 464           |
| Efrinalin 1mg Amp 1ml                             | 125           |
| Égide 100mg Cp Rev                                | 524           |
| Eliquis 2,5mg Cp Rev                              | 146           |
| Eloxatin 50mg FA                                  | 440           |
| Eloxatin 100mg FA                                 | 440           |
| Eltrombopag Olamina                               | 269           |
| Emama 400mg Cap                                   | 550           |
| Emend 150mg FA                                    | 308           |
| Empagliflozina                                    | 269           |
| Emulsão de Lipídeos 10% Fr 500ml                  | 378           |
| Enalapril                                         | 270           |
| Encrise 20u Amp 1ml                               | 540           |
| Endofolin 5mg Cp Rev                              | 119           |

| <b>Medicamento</b>                                       | <b>Página</b> |
|----------------------------------------------------------|---------------|
| Enemaplex Fosfatado Fr 130ml                             | 310           |
| Enoxaparina Sódica                                       | 270           |
| Entacapon                                                | 271           |
| Entarkin 200mg Cp                                        | 271           |
| Entocort 3mg Cap Lib Prolongada                          | 170           |
| Entresto 24mg/26mg Cp Rev                                | 537           |
| Enxaguante Bucal Enzimático sem Álcool e sem Clorexidina | 272           |
| Ephynal 400mg Cap                                        | 550           |
| Epifrin 1mg Amp 1ml                                      | 125           |
| Epinelil 250mg Cap                                       | 536           |
| Epirubicina                                              | 272           |
| Epitezan Pomada Oft Bis 3,5g                             | 219           |
| Epivir 150mg Cp Rev                                      | 364           |
| Epósido 100mg FA 5mL                                     | 283           |
| Eprex 10000ui Ser 1mL                                    | 274           |
| Eprex 4.000ui Ser 0,4 mL                                 | 274           |
| Eprex 40.000ui Ser 1mL                                   | 274           |
| Equilid 50mg Cap                                         | 507           |
| Eranz 5mg Cp Rev                                         | 261           |
| Erbix 100mg (5mg/mL) FA 20mL                             | 202           |
| Eribulina Mesilato                                       | 272           |
| Eritromicina 500mg Cp (Prati Donaduzzi)                  | 273           |
| Eritromicina Estolato                                    | 273           |
| Eritromicina Lactobionato                                | 273           |
| Eritropoetina Humana Recombinante                        | 274           |
| Ertapeném                                                | 275           |
| Escitalopram                                             | 275 e 276     |
| Escopolamina                                             | 277 e 278     |
| Escopolamina Brometo + Dipirona                          | 278 e 279     |
| Escopolamina Gel Sachê 20mg Manip                        | 278           |
| Ésio Iv 40mg FA                                          | 281           |
| Esmeron 50mg FA 5ml                                      | 487           |
| Esmolol                                                  | 279           |
| Esomeprazol Magnésio                                     | 280           |
| Esomeprazol Sódico                                       | 281           |
| Espironolactona                                          | 281           |
| Espironolactona 100mg Cp (Germed)                        | 281           |
| Ethamolin 100mg Amp 2ml                                  | 411           |

| <b>Medicamento</b>                              | <b>Página</b> |
|-------------------------------------------------|---------------|
| Etna 10mg Pó Liófilo FA                         | 211           |
| Etna Cap                                        | 211           |
| Etomidato                                       | 282           |
| Etomidato 20mg Amp 10ml (Cristália)             | 282           |
| Etoposideo                                      | 283           |
| Etoricoxibe                                     | 283           |
| Eunades Cs 100mg FA                             | 283           |
| Euthyrox 100mcg Cp                              | 371           |
| Euthyrox 175mcg Cp                              | 371           |
| Euthyrox 25mcg Cp                               | 371           |
| Euthyrox 88mcg Cp                               | 371           |
| Euvax B Amp 1mL                                 | 534           |
| Everolimo                                       | 284           |
| Evicel Selante de Fibrina 1mL                   | 297           |
| Evicel Selante de Fibrina 2mL                   | 297           |
| Evicel Selante de Fibrina 5mL                   | 297           |
| Evoclass 20mg FA                                | 237           |
| Evomixan 20mg FA                                | 410           |
| Evoposdo 100mg Amp 5mL                          | 283           |
| Exelon 1,5mg Cap                                | 486           |
| Exelon Patch 10 Adv Transdérmico 9,5mg/24h      | 487           |
| Exelon Patch 15 Adv Transdérmico 13,3mg/        | 487           |
| Exelon Patch 5 Adv Transdérmico 9mg             | 487           |
| Exjade 250mg Cp Dispersível                     | 238           |
| Exodus 10mg Cp                                  | 275           |
| Exodus Gts 20mg/mL Fr 15 mL                     | 276           |
| Extodin 200mcg FA 2ml                           | 247           |
| Extrato de Componentes                          | 284           |
| Ezetimiba                                       | 284           |
| Ezetrol 10mg Cp                                 | 284           |
| Farlac 667mg/ml Xrp Fr 120ml                    | 363           |
| Farmorubicina Cs 10mg FA                        | 272           |
| Farmorubicina Cs 50mg FA                        | 272           |
| Faslodex 250mg Ser 5ml                          | 311           |
| Fastfen 50mcg (75mcg Citrato de Sufentanila/ml) | 503           |
| Fasturtec 1,5mg FA                              | 482           |
| Fator de de Von Willebrand + Fator VIII         | 286           |
| Fator Recombinante de Coagulação VII A          | 286           |

| <b>Medicamento</b>                | <b>Página</b> |
|-----------------------------------|---------------|
| Faulblastina 10mg FA              | 244           |
| Fauldacar 200mg FA                | 234           |
| Fauldcarbo 150mg Amp 15mL         | 181           |
| Fauldcarbo 450mg Amp 45mL         | 181           |
| Fauldcarbo 50mg Amp 5mL           | 181           |
| Fauldcispla 10mg FA               | 210           |
| Fauldcispla 50mg FA               | 210           |
| Fauldcita 1000mg FA               | 211           |
| Fauldcita 500mg Amp 5 mL          | 211           |
| Fauldfluor 2500 mg FA             | 303           |
| Fauldfluor 500mg FA               | 303           |
| FauldLEUCO 300mg FA 30mL          | 307           |
| FauldLEUCO 50mg FA 5 mL           | 307           |
| Fauldmetro 1g (100mg/mL) Amp 10mL | 401           |
| Fauldmetro 50mg (25mg/mL) FA 2mL  | 401           |
| Fauldoxo 10mg FA                  | 264           |
| Fauldoxo 50mg FA                  | 264           |
| Fauldvinci 1mg FA                 | 544           |
| Fazolon 1g FA                     | 187           |
| Fenazopiridina                    | 287           |
| Fenergan 25mg Cp Rev              | 469           |
| Fenergan 50mg Amp 2ml             | 468           |
| Fenilefrin 1% 10mg Amp 1ml        | 287           |
| Fenilefrina                       | 287 e 288     |
| Fenilefrina 10% Sol Oft Fr 5ml    | 288           |
| Fenital 250mg Amp 5ml             | 288           |
| Fenitoína                         | 288 e 289     |
| Fenobarbital                      | 289 e 290     |
| Fenocris Iv 200mg Amp 2ml         | 290           |
| Fenol                             | 291           |
| Fenol 5% Amp 5ml                  | 291           |
| Fenoterol                         | 291           |
| Fentanest 100mcg Amp 2ml          | 292           |
| Fentanest 250mcg Amp 5ml          | 292           |
| Fentanest 500mcg Amp 10ml         | 292           |
| Fentanil 100mcg Amp 2ml           | 292           |
| Fentanil 250mcg Ampola 5ml        | 292           |
| Fentanil 500mcg Amp 10ml          | 292           |

| <b>Medicamento</b>                                           | <b>Página</b> |
|--------------------------------------------------------------|---------------|
| Fentanila                                                    | 292           |
| Ferinject 500mg FA 10mL                                      | 181           |
| Ferro III Polimaltosado Hidróxido                            | 293 e 294     |
| Ferro Quelato Glicinado                                      | 294           |
| Festone 20mg Cp Rev                                          | 511           |
| Fexofenadina                                                 | 295           |
| Fexofenadina + Pseudoefedrina                                | 295           |
| Fibrase Pomada Bis 30g                                       | 220           |
| Fibrinase Com Cloranfenicol Pomada Bis 30g                   | 220           |
| Fibrinogênio + Trombina Humana                               | 297           |
| Fibrinogênio Humano                                          | 295           |
| Fibrinogênio Humano + Aprotinina Bovina + Trombina Humana    | 296           |
| Fibrinogênio Humano + Aprotinina Sintética + Trombina Humana | 296           |
| Filgrastim                                                   | 297           |
| Filgrastim 300mcg FA 1mL                                     | 297           |
| Filgrastine 300mcg FA 1mL                                    | 297           |
| Filgrastine 300mcg Ser 0,5ml                                 | 297           |
| Finasterida                                                  | 298           |
| Finasterida 5mg Cp (Biosintética)                            | 298           |
| Finasterida 5mg Cp (EMS)                                     | 298           |
| Finasterida 5mg Cp (Eurofarma)                               | 298           |
| Finasterida 5mg Cp (Merck)                                   | 298           |
| Finasterida 5mg Cp Rev (Medley)                              | 298           |
| Firazyr 30mg Ser 3ml                                         | 341           |
| Firmagon 120mg FA                                            | 113           |
| Firmagon 80mg FA                                             | 113           |
| Fitomenadiona Ev 10mg Amp 1ml                                | 551           |
| Fitomenadiona Miscelas Pediátrico 2mg Amp 0,2ml Manip        | 551           |
| Flagyl 250mg Cp Rev                                          | 402           |
| Flagyl 400mg Cp Rev                                          | 402           |
| Flagyl 500mg Bolsa 100 mL                                    | 403           |
| Flanax 275mg Cp                                              | 418           |
| Flebogamma Dif 5g (10%) Fr 50ml                              | 344           |
| Fleet Enema Fr 130ml                                         | 310           |
| Flixonase Aquoso Spray Nasal 50mcg/dose Fr 120 doses         | 305           |
| Floratil 100mg Cap                                           | 490           |
| Florinefe 0,1 mg Cp                                          | 300           |
| Floxacin 400mg Cp Rev                                        | 429           |

| <b>Medicamento</b>                                           | <b>Página</b> |
|--------------------------------------------------------------|---------------|
| Flucistein 10% (300mg) Amp 3ml                               | 114           |
| Fluconazol                                                   | 298 e 299     |
| Fluconazol 50mg Cap Manip                                    | 298           |
| Fludalibbs 50mg FA                                           | 300           |
| Fludara 50mg FA                                              | 300           |
| Fludarabina                                                  | 300           |
| Fludrocortisona                                              | 300           |
| Fludrocortisona 0,1mg Cp Manip                               | 300           |
| Fludrocortisona 0,1mg Cp Manip (Buenos Aires)                | 300           |
| Fluimucil 10% (300mg) Amp 3ml                                | 114           |
| Fluimucil 200mg Env                                          | 114           |
| Fluimucil 600mg Cp Eferv                                     | 114           |
| Flumazenil                                                   | 301           |
| Flumazenil 0,5mg Amp 5mL (União Química)                     | 301           |
| Flumazil 0,5mg Amp 5ml                                       | 301           |
| Flunarin 10mg Cap                                            | 302           |
| Flunarizina                                                  | 302           |
| Flunitrazepam                                                | 302           |
| Fluoresceína                                                 | 303           |
| Fluoresceína 1% (10mg/ml) Solução Oftálmica Frasco 5ml Manip | 303           |
| Fluoruracila                                                 | 303           |
| Fluoxetina                                                   | 303 e 304     |
| Fluoxetina 20mg Cap (Biosintética)                           | 303           |
| Fluoxetina 20mg Cap (EMS)                                    | 303           |
| Fluoxetina 20mg Cap (Eurofarma)                              | 303           |
| Fluoxetina 20mg Cap (Medley)                                 | 303           |
| Fluoxetina 20mg Cap (Teuto)                                  | 303           |
| Fluoxetina Gotas 20mg/ml Fr 20ml (Medley)                    | 304           |
| Flurazepam                                                   | 304           |
| Flurbiprofeno                                                | 305           |
| Fluticasona                                                  | 305           |
| Fluticasona + Salmeterol                                     | 306           |
| Fluxene 20mg Cap                                             | 303           |
| Fluxocor 20mg Cp Rev                                         | 434           |
| Folinato de Cálcio                                           | 307           |
| Folinato de Cálcio 15mg Cp Manip                             | 307           |
| Folinato de Cálcio 300mg FA 30mL (Eurofarma)                 | 307           |
| Fomblin 3% + Alantoina 1% + Óleo de Silicone Manip           | 127           |

| <b>Medicamento</b>                                 | <b>Página</b> |
|----------------------------------------------------|---------------|
| Fondaparinux Sódico                                | 308           |
| Foraseq 12mcg + 400mcg Caps Inalatórias            | 171           |
| Fortaz 1g FA                                       | 192           |
| Forten Fr 10ml                                     | 147           |
| Forxiga 10mg Cp Rev                                | 235           |
| Fosaprepitanto Dimeglumina                         | 308           |
| Foscarnet Sódico                                   | 309           |
| Foscavir 24mg/mL Fr 250mL                          | 309           |
| Fosfato de Potássio                                | 309           |
| Fosfato de Potássio 17,5% (2meq/ml) Amp 10ml       | 309           |
| Fosfato de Potássio 17,5% (2meq/ml) Amp 10ml Manip | 309           |
| Fosfato de Sódio Dibásico + Fosfato de Sódio       | 310           |
| Fosfomicina Trometamol                             | 310           |
| Fostair Spray 100mcg + 6mcg                        | 156           |
| Fresh Tears Colírio 0,5% Fr 10ml                   | 182           |
| Fresoflox 400mg Bolsa 200ml                        | 206           |
| Frisium 10mg Cp                                    | 214           |
| Frontal 0,5mg Cp                                   | 132           |
| Frutovitam Amp 10ml                                | 551           |
| Fulvestranto                                       | 311           |
| Furacin 0,2% Solução Fr 30ml                       | 427           |
| Furosemida                                         | 311 e 312     |
| Furosemida + Cloreto de Potássio                   | 312           |
| Furosemida 20mg Amp 2ml (Teuto)                    | 312           |
| Fzolcris 50mg Cp Rev                               | 484           |
| Gabapentina                                        | 314           |
| Gabapentina 300mg Cap (Biolab)                     | 314           |
| Gabapentina 300mg Cap (Biosintética)               | 314           |
| Gabapentina 300mg Cap (EMS)                        | 314           |
| Gabapentina 300mg Cap (Germed)                     | 314           |
| Gabapentina 400mg Cap (Biolab)                     | 314           |
| Gabapentina 400mg Cap (EMS)                        | 314           |
| Gabapentina 400mg Cap (Germed)                     | 314           |
| Gadobutrol                                         | 314           |
| Gadopentetato de Dimeglumina                       | 315           |
| Gadovist 604,72mg/ml FA 15ml                       | 314           |
| Gadoxetato                                         | 315           |
| Galantamina                                        | 315           |



| <b>Medicamento</b>                                             | <b>Página</b> |
|----------------------------------------------------------------|---------------|
| Galantamina 8mg Cap Liberação Prolongada (Nova Química)        | 315           |
| Galantamina 8mg Cap Liberação Prolongada (Prati Donaduzzi)     | 315           |
| Galvus 50mg Cp                                                 | 543           |
| Ganciclotrat 500mg FA                                          | 316           |
| Ganciclovir                                                    | 316           |
| Ganciclovir Sódico 500mg FA (Eurofarma)                        | 316           |
| Gardenal 100mg Cp                                              | 289           |
| Gel de Papaína 10% Tubo 30g Manip                              | 447           |
| Gel de Papaína 2% Tubo 30g Manip                               | 447           |
| Gel de Papaína 6% Tubo 30g Manip                               | 447           |
| Gelafundin 4% Fr 500ml                                         | 317           |
| Gelatina + Cloreto de Sódio + Hidróxido de Sódio               | 317           |
| Gelatina + Pectina + Carboximetilcelulose Sódica + Associações | 318           |
| Gelatina + Trombina                                            | 317           |
| Gemzar 1000mg FA                                               | 318           |
| Gemzar 100mg FA                                                | 318           |
| Gemzar 200mg FA                                                | 318           |
| Gencitabina                                                    | 318           |
| Genlibbs 1000mg FA                                             | 318           |
| Genlibbs 200mg FA                                              | 318           |
| Gentamicin 80mg Amp 2 mL                                       | 318           |
| Gentamicina                                                    | 318 e 319     |
| Genuxal 1000mg FA                                              | 203           |
| Genuxal 200mg FA                                               | 203           |
| Glicenax 12% Fr 500ml                                          | 320           |
| Glicerín Sup Adulto (EMS)                                      | 319           |
| Glicerina                                                      | 319 e 320     |
| Glicerina 12% (120mg/ml) Fr 500ml (Halex Istar)                | 320           |
| Glicerina 12% Fr 500mL (Sanobiol)                              | 320           |
| Glicerina Adulto Sup (Pfizer)                                  | 319           |
| Glicerina Adulto Sup (Pharmascience)                           | 319           |
| Glicerina Pura                                                 | 320           |
| Glicerina Pura FA 50ml Manip                                   | 320           |
| Glicerina Sup Adulto (Granado)                                 | 319           |
| Glicerofosfato de Sódio                                        | 320           |
| Glicerofosfato de Sódio 10% Amp 20mL Manip                     | 320           |
| Glicina                                                        | 321           |
| Glicina 1,5% Sol Bolsa 3000ml                                  | 321           |

| <b>Medicamento</b>                                                                                                 | <b>Página</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Gliclazida                                                                                                         | 321           |
| Glicose                                                                                                            | 321           |
| Glicose + Cloreto de Sódio                                                                                         | 322           |
| Glicose 10% Bolsa 1000ml                                                                                           | 322           |
| Glicose 25% Amp 10ml (Isofarma)                                                                                    | 321           |
| Glicose 5% Bolsa 50ml                                                                                              | 322           |
| Glicose 50% Amp 10ml                                                                                               | 321           |
| Glicose 50% Bolsa 500ml (Isofarma)                                                                                 | 322           |
| Glicose 75% Amp 10mL Manip                                                                                         | 322           |
| Glifage 500mg Cp Rev                                                                                               | 395           |
| Glifage 850mg Cp Rev                                                                                               | 395           |
| Glifage Xr 500mg Cp de Ação Prolongada                                                                             | 395           |
| Glifage Xr 750mg Cp                                                                                                | 395           |
| Glimeperida Cp 1mg (Medley)                                                                                        | 322           |
| Glimepirida                                                                                                        | 322           |
| Glimepirida 1mg Cp (Biosintética)                                                                                  | 322           |
| Gliocort 100mg FA                                                                                                  | 334           |
| Gliocort 500mg FA                                                                                                  | 334           |
| Glucagen 1mg FA                                                                                                    | 323           |
| Glucagon                                                                                                           | 323           |
| Gluconato de Cálcio                                                                                                | 323           |
| Gluconato de Cálcio 10% Amp 10mL                                                                                   | 323           |
| Glycophós Amp 20 mL                                                                                                | 320           |
| Glypressin 1mg FA                                                                                                  | 516           |
| Golimumab                                                                                                          | 324           |
| Gosserrelina                                                                                                       | 324 e 325     |
| Gramicidina + Neomicina + Nistatina + Triancinolona                                                                | 325           |
| Gramicidina 0,25mg/g + Neomicina 2,5mg/g + Nistatina 100.000u/g + Triancinolona 1,0mg/g Creme Tubo 30g (Eurofarma) | 325           |
| Gramicidina 0,25mg/g + Neomicina 2,5mg/g + Nistatina 100.000u/g + Triancinolona 1,0mg/g Creme Tubo 30g (Germed)    | 325           |
| Gramicidina 0,25mg/g + Neomicina 2,5mg/g + Nistatina 100.000u/g + Triancinolona 1,0mg/g Creme Tubo 30g (Medley)    | 325           |
| Granisetrona                                                                                                       | 326           |
| Granisetrona 1mg Amp 1mL                                                                                           | 326           |
| Granisetrona 3mg Amp 3mL                                                                                           | 326           |
| Granulokine 300mcg FA 1mL                                                                                          | 297           |
| Granulokine 300mcg Ser 0,5ml                                                                                       | 297           |
| Guttalax 7,5mg/mL Gts Fr 30mL                                                                                      | 457           |
| Haemocomplettan P 1g FA                                                                                            | 295           |

| <b>Medicamento</b>                                             | <b>Página</b> |
|----------------------------------------------------------------|---------------|
| Haldol 1mg Cp                                                  | 328           |
| Haldol 5mg Amp 1ml                                             | 328           |
| Haldol 5mg Cp                                                  | 328           |
| Haldol Gts 2mg/ml Fr 30ml                                      | 328           |
| Halexminophen 1000mg (10mg/ml) Bolsa 100ml                     | 450           |
| Halo 1mg Cp                                                    | 328           |
| Halo 5mg Amp 1ml                                               | 328           |
| Halo 5mg Cp                                                    | 328           |
| Haloperidol                                                    | 328           |
| Haloperidol Gts 2mg/ml Fr 20ml (União Química)                 | 328           |
| Hd 170 Bic Ac Potas Com Acetato Galão 5000 mL                  | 499           |
| Hd Bicarbonato de Sódio 8,4% Galão 5L                          | 498           |
| Hemofol 25.000ui FA 5ml                                        | 329           |
| Hemofol Sc 5000ui Amp 0,25ml                                   | 329           |
| Hemogin Gel 50% Fr 10g Manip                                   | 456           |
| Hepamax S 5000UI/mL FA 5mL                                     | 329           |
| Heparina                                                       | 329 e 330     |
| Heparina 300UI Ser 10mL                                        | 330           |
| Heparina 300UI Ser 3mL                                         | 330           |
| Heptar 25.000ui FA 5ml                                         | 329           |
| Heptar 5000UI/mL FA                                            | 329           |
| Herceptin 440mg FA                                             | 527           |
| Hexamidina + Tetracaina                                        | 330           |
| Hexomidine Colutório Spray Fr 50mL                             | 330 e 331     |
| Hialuronato de Sódio                                           | 330           |
| Hialuronato de Sódio + Sorbitol                                | 331           |
| Hialuronidase                                                  | 331           |
| Hialuronidase 200ui Amp 1mL                                    | 331           |
| Hiconazol 200mg Bolsa 100mL                                    | 299           |
| Hidantal 100mg Cp                                              | 289           |
| Hidantal 250mg Amp 5mL                                         | 288           |
| Hidralazina                                                    | 332           |
| Hidralazina 25mg Cap Manip                                     | 332           |
| Hidrion 40mg/100mg Cp                                          | 312           |
| Hidroclorotiazida                                              | 333           |
| Hidrocortisona + Alumínio Subacetato + Lidocaína + Zinco Óxido | 334           |

| <b>Medicamento</b>                                         | <b>Página</b> |
|------------------------------------------------------------|---------------|
| Hidrocortisona Succinato                                   | 334           |
| Hidrocortisona Succinato Sódico 100mg FA (Eurofarma)       | 334           |
| Hidrogênio Peróxido                                        | 335           |
| Hidroxicloroquina                                          | 335           |
| Hidróxido de Alumínio + Hidróxido de Magnésio + Simeticona | 337           |
| Hidroxietilamido                                           | 337           |
| Hidroxipropilmetilcelulose                                 | 337           |
| Hidroxiquinolina + Trietanolamina                          | 336           |
| Hidroxiureia                                               | 337           |
| Hidroxizina                                                | 338           |
| Higroton 12,5mg Cp                                         | 227           |
| Hilano G-f 20                                              | 338           |
| Hipossulfito de Sódio                                      | 339           |
| Hipossulfito de Sódio 25% Amp 10mL Manip                   | 339           |
| Hirudoid 3mg/g Gel Bis 40g                                 | 463           |
| Histoacryl Cola Amp                                        | 420           |
| Hixizine 25mg Cp                                           | 338           |
| Holoxane 1000mg FA                                         | 342           |
| Holoxane 500mg FA                                          | 342           |
| Humalog 100ui/ml FA 10ml                                   | 351           |
| Humectol D Cp Rev                                          | 165           |
| Humira Ser 40mg/0,8ml                                      | 123           |
| Humulin N 100ui/ml FA 10ml                                 | 350           |
| Humulin R 100ui/ml FA 10ml                                 | 350           |
| Hyabak 0,15% Fr10ml Colírio                                | 330           |
| Hydrea 500mg Cap                                           | 337           |
| Hyplex B Amp 2mL                                           | 553           |
| Hypnomidate 20mg Amp 10ml                                  | 282           |
| Hypocina Composto Amp 5ml                                  | 278           |
| Hypoverin 100mg/2ml Amp                                    | 448           |
| Hytropin 0,5mg Amp 1ml                                     | 149           |
| Ibuprofeno                                                 | 340           |
| Icaden Creme 20g                                           | 355           |
| Icatibanto                                                 | 341           |
| IDA 10mg FA                                                | 341           |
| IDA 5mg FA                                                 | 341           |
| Idarrubicina                                               | 341           |
| Ifosfamida                                                 | 342           |

| <b>Medicamento</b>                                       | <b>Página</b> |
|----------------------------------------------------------|---------------|
| Ilosone 500mg Drg                                        | 273           |
| Imfinzi 120mg/2,4mL FA 2,4mL                             | 266           |
| Imfinzi 500mg/10mL FA 10mL                               | 266           |
| Imipenem + Cilastatina                                   | 342           |
| Imipenem 500mg + Cilastatina Sódica 500mg FA (Abl)       | 342           |
| Imipenem 500mg + Cilastatina Sódica 500mg FA (Novafarma) | 342           |
| Imipra 25mg Drg                                          | 343           |
| Imipramina                                               | 343           |
| Imosec 2mg Cp                                            | 380           |
| Imovane 7,5mg Cp                                         | 558           |
| Imunem 50mg Cp                                           | 150           |
| Imuno BCG 40mg Amp                                       | 154           |
| Imunoglobulina Antitetânica                              | 345           |
| Imunoglobulina Antitimócito Humanos (COELHO)             | 345           |
| Imunoglobulina Humana                                    | 344           |
| Imuran 50mg Cp Rev                                       | 150           |
| Indapamida                                               | 346           |
| Indapen Sr Cp Lib Prolongada                             | 346           |
| Inderal 10mg Cp                                          | 473           |
| Inderal 40mg Cp                                          | 473           |
| Índigo Carmim                                            | 346           |
| Índigo Carmim 2% (20mg/ml) Corante Fr 30ml Manip         | 346           |
| Índigo Carmin 0,8% Corante Amp 5mL                       | 346           |
| Índigo Carmin 0,8% Corante Fr 30mL                       | 346           |
| Indocid 50mg Cap                                         | 346           |
| Indometacina                                             | 347           |
| Indometacina 100mg Sup Manip                             | 347           |
| Infliximabe                                              | 347           |
| Insulina Degludeca                                       | 348           |
| Insulina Glargina                                        | 349           |
| Insulina Glulisina                                       | 349           |
| Insulina Humana NPH                                      | 350           |
| Insulina Humana Regular                                  | 350           |
| Insulina Lantus 100ui/ml FA 10ml                         | 349           |
| Insulina Lispro DNA Recombinante                         | 351           |
| Insunorm N 100ui/ml FA 10ml                              | 350           |
| Insunorm R 100ui/ml FA 10ml                              | 350           |
| Invanz 1g FA                                             | 275           |

| <b>Medicamento</b>                             | <b>Página</b> |
|------------------------------------------------|---------------|
| Iodixanol                                      | 351           |
| Iodo + Iodeto de Potássio                      | 352           |
| Iodopovidona (Sol Aquosa)                      | 352           |
| Iodopovidona (Sol com Tensoativos)             | 352           |
| Iodopovidona (Sol Hidroalcoólica)              | 352           |
| Ionclor 6% Sol Oral Fr 150mL                   | 221           |
| Iopamidol                                      | 353           |
| Iopamiron 300 FA 50ml                          | 353           |
| Iopamiron 612mg/mL FA 100 mL                   | 353           |
| Iopromida                                      | 353           |
| Ioversol                                       | 353           |
| Ipratrópio 0,025% (250mcg/mL) Fr 20mL (Germed) | 354           |
| Ipratrópio Brometo                             | 354           |
| Ipsilon 1g FA 20ml                             | 118           |
| Ipsilon 500mg Cp                               | 119           |
| Irinotecano                                    | 354           |
| Irinotecano Cloridrato 100mg FA (Eurofarma)    | 354           |
| Irinotecano Cloridrato 100mg FA (Glenmarck)    | 354           |
| Irinotecano Cloridrato 40mg FA (Eurofarma)     | 354           |
| Irinotecano Cloridrato 40mg FA (Glenmarck)     | 354           |
| Irujol Pomada Bis 30g                          | 219           |
| Isoconazol                                     | 355           |
| Isoflurano                                     | 355           |
| Isoflurano 5mL - Dose                          | 355           |
| Isoforine 1ml/ml Fr 100ml                      | 355           |
| Isoniazida                                     | 355           |
| Isoniazida 100mg Cap Manip                     | 355           |
| Isoprenalina                                   | 356           |
| Isoproterenol 0,2mg Amp 1mL Manip              | 356           |
| Isordil 5mg Cp Sublingual                      | 357           |
| Isossorbida Dinitrato                          | 357           |
| Isossorbida Mononitrato                        | 357 e 358     |
| Itraconazol                                    | 358           |
| Itraspor 100 mg                                | 358           |
| Ivabradina                                     | 359           |
| Ivermec 6mg Cp                                 | 360           |
| Ivermectina                                    | 360           |
| Ivermectina 6mg Cp                             | 360           |

| <b>Medicamento</b>                          | <b>Página</b> |
|---------------------------------------------|---------------|
| Januvia 50mg Cp Rev                         | 496           |
| Jardiance 10mg Cp Rev                       | 269           |
| Jardiance 25mg Cp Rev                       | 269           |
| K Y Gel Lubrificante Tubo 50g               | 470           |
| Kanakion Mm Ev 10mg Amp 1ml                 | 551           |
| Kanakion Mm Pediátrico Ampola 2mg Amp 0,2ml | 551           |
| Kavit 10mg IM Amp 1ml                       | 550           |
| Kefadim 1g FA                               | 192           |
| Kefazol 1g FA                               | 187           |
| Keflex 500mg Drg                            | 186           |
| Keflin Neutro 1g FA                         | 186           |
| Keforal 500mg Cap                           | 186           |
| Kefox 1g FA                                 | 190           |
| Keftron EV 1g FA                            | 195           |
| Keppra 250mg Cp Rev                         | 367           |
| Keroxime 750mg FA                           | 196           |
| Ketamin S 50mg/ml Amp 2ml                   | 198           |
| Ketamin S 50mg/ml FA 10ml                   | 198           |
| Keytruda 100 Mg FA                          | 453           |
| Kin Hidrat Spray 40ml                       | 491           |
| Klaricid 500mg FA                           | 213           |
| Koplan 200mg FA                             | 512           |
| Koplan 400mg FA 3mL                         | 512           |
| Kytril 1mg Amp 1ml                          | 326           |
| Kytril 3mg Amp 3ml                          | 326           |
| Labirin 8mg Cp                              | 159           |
| Lacosamina                                  | 362           |
| Lacrima Plus Sol Oft Fr 15ml                | 249           |
| Lactitol                                    | 363           |
| Lactulona 667mg/ml Xrp Fr 120ml             | 363           |
| Lactulose                                   | 363           |
| Lamictal 100mg Cp                           | 365           |
| Lamictal 25mg Cp                            | 365           |
| Lamitor 25mg Cp                             | 365           |
| Lamivudina                                  | 364           |
| Lamivudina 150mg Cp                         | 364           |
| Lamotrigina                                 | 365           |
| Lamotrigina Cp 100mg (Eurofarma)            | 365           |

| <b>Medicamento</b>                  | <b>Página</b>  |
|-------------------------------------|----------------|
| Lamotrigina Cp 25mg (Eurofarma)     | 365            |
| Lamotrigina Cp 25mg (Medley)        | 365            |
| Lanexat 0,5mg Amp 5ml               | 301            |
| L-arginina Aspartato                | 365            |
| Lasix 20mg Amp 2ml                  | 312            |
| Lasix 40mg Cp                       | 311            |
| Latanoprost                         | 366            |
| Leflunomida                         | 366            |
| Leflunomida 20mg Cp Rev (Cristália) | 366            |
| Legifol Cs 10mg/mL FA 5mL           | 307            |
| Levaflox 750mg (5mg/ml) Bolsa 150ml | 369            |
| Levanlodipino Benzilato             | 366            |
| Levaquin 500mg Cp Rev               | 369            |
| Leverctin 6mg Cp                    | 360            |
| Levetiracetam                       | 367            |
| Levobupivacaína                     | 368            |
| Levobupivacaína + Epinefrina        | 368            |
| Levodopa + Benserazida              | 369            |
| Levofloxacino                       | 369            |
| LEVOFloxacino 500mg Cp Rev (EMS)    | 369            |
| Levofloxacino 500mg Cp Rev (Germed) | 369            |
| Levofloxacino 500mg Cp Rev (Medley) | 369            |
| Levomepromazina                     | 370            |
| Levornogestrel                      | 370            |
| Levosimendana                       | 371            |
| Levotac 500mg Bolsa 100mL           | 369            |
| Levotiroxina                        | 371 e 372      |
| Levotiroxina 100mcg FA              | 372            |
| Levotiroxina Cp 100mcg              | 371            |
| Levotiroxina Cp 112mcg              | 371            |
| Lexapro 10mg Cp                     | 275            |
| Lexotan 3mg Cp                      | 168            |
| Lidocaína                           | 372, 373 e 374 |
| Lidocaína + Epinefrina              | 374            |
| Lidocaína + Norepinefrina           | 375            |
| Lidocaína 40mg/g Creme Bis 5g Manip | 373            |
| Linagliptina                        | 375            |
| Linezolida                          | 375 e 376      |



| Medicamento                              | Página |
|------------------------------------------|--------|
| Linezolid 600mg Bolsa 300mL (Eurofarma)  | 376    |
| Lioram 10mg Cp                           | 557    |
| Lioresal 10mg Cp                         | 154    |
| Lipase + Protease + Amilase              | 377    |
| Lipegfilgrastim                          | 378    |
| Lipídeos                                 | 378    |
| Lipiodol Ultrafluido Amp 10ml            | 434    |
| Lípitor 10mg Cp Rev                      | 148    |
| Lípitor 40mg Cp Rev                      | 148    |
| Lipless 100mg Cp                         | 206    |
| Lípuro 1% Amp 20ml                       | 472    |
| Lípuro 1% FA 100ml                       | 472    |
| Liraglutida                              | 378    |
| Lisador Gts Fr 15ml                      | 124    |
| Lisinopril                               | 379    |
| Lisinopril 10mg Cp (EMS)                 | 379    |
| Lisinopril 10mg Cp (Medley)              | 379    |
| Listo 4mg Cp Desintegração Oral          | 436    |
| Litocit 10meq Cp                         | 211    |
| Longactil 25mg Amp 5ml                   | 226    |
| Longactil 25mg Cp                        | 226    |
| Longactil 4% Gts Fr 20ml (Cristália)     | 226    |
| Lonquex 6mg Ser 0,6mL                    | 378    |
| Loperamida                               | 380    |
| Loratadina                               | 380    |
| Lorax 1mg Cp                             | 381    |
| Lorazepam                                | 381    |
| Lorazepam 1mg Cap Manip (Fórmula & Ação) | 381    |
| Lorazepam 1mg Cap Manip (Formularium)    | 381    |
| Losartana                                | 382    |
| Losartana Potássica 50mg Cp Rev          | 382    |
| Losec Mups 20mg Cp Rev                   | 435    |
| Luftal 125mg Cap Gelationosa             | 494    |
| Luftal Gts 75mg/ml Fr 15ml               | 494    |
| Lugol 2% Fr 100mL Bico Dosador Manip     | 352    |
| Lugol 2% Fr 50mL Bico Dosador Manip      | 352    |
| Lyrica 75mg Cap                          | 467    |
| Maalox Plus Suspensão Oral Fr 240ml      | 337    |

| <b>Medicamento</b>                                                       | <b>Página</b> |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Mabthera 100mg (10mg/mL) FA 10mL                                         | 486           |
| Mabthera 500mg (10mg/mL) FA 50mL                                         | 486           |
| Mabthera Sc 1400mg FA 15mL                                               | 486           |
| Macroantina 100mg Cap                                                    | 427           |
| Macrogol + Bicarbonato de Sódio + Cloreto de Sódio + Cloreto de Potássio | 384           |
| Magnésio Sulfato                                                         | 384 e 385     |
| Magnevistan 469mg/ml FA 10mL                                             | 315           |
| Magnevistan 469mg/ml FA 15 mL                                            | 315           |
| Magnoston 10% (100mg/ml) Ampola 10ml                                     | 384           |
| Manitol                                                                  | 385           |
| Manitol 20% Fr 250ml (Baxter)                                            | 385           |
| Manitol 20% Fr 250ml (Bbraun)                                            | 385           |
| Manitol 20% Fr 250ml (Fresenius Kabi)                                    | 385           |
| Manitol 20% Fr 250ml (JP)                                                | 385           |
| Mantidan 100mg Cp                                                        | 134           |
| Marevan 2,5mg Cp                                                         | 539           |
| Marevan 5mg Cp                                                           | 539           |
| Matriz Gelatinosa Derivada Bovina + Derivado de Trombina Humana          | 386           |
| Maxcef 1g FA                                                             | 189           |
| Maxidex 1mg/ml Susp Oft Fr 5ml                                           | 243           |
| Maxinom Pomada Oft Bis 3,5g                                              | 246           |
| Maxitrol Pomada Oft Bis 3,5g                                             | 246           |
| Maxitrol Susp Oft Fr 5ml                                                 | 246           |
| Mebeverina                                                               | 386           |
| Meclin 25mg Cp                                                           | 387           |
| Meclizina                                                                | 387           |
| Meglumina (Meglumina Ioxitalamato) + Ioxitalamato de Sódio               | 387           |
| Meglumina (Meglumina Ioxitalamato) + Polividona                          | 387           |
| Meglumina Ioxitalamato                                                   | 388           |
| Melfalano                                                                | 388           |
| Memantina                                                                | 388           |
| Memantina 10mg Cp Rev (Eurofarma)                                        | 388           |
| Meperidina Cloridrato (Petidina)                                         | 389           |
| Mercaptopurina                                                           | 390           |
| Meronem 500mg FA (Astrazeneca)                                           | 390           |
| Meronem 1g FA (Astrazeneca)                                              | 390           |
| Meropeném                                                                | 390           |
| Meropenem 1000 mg FA (Eurofarma)                                         | 390           |

| <b>Medicamento</b>                                      | <b>Página</b> |
|---------------------------------------------------------|---------------|
| Meropenem 1000mg FA (Abl)                               | 390           |
| Meropenem 500mg FA (Abl)                                | 390           |
| Mesacol 250mg Sup                                       | 391           |
| Mesacol 400mg Cp Rev                                    | 391           |
| Mesalazina                                              | 391 e 392     |
| Mesalazina Envelope 3g + Frasco Enema 100ml             | 392           |
| Mesna                                                   | 393           |
| Mesna 400mg Amp 4ml (Blausiegel)                        | 393           |
| Mestinon 60mg Cp                                        | 459           |
| Metadona                                                | 393 e 394     |
| Metamucil 5,8g Env                                      | 460           |
| Metaraminol                                             | 394           |
| Metenamina + Metiltionínio                              | 395           |
| Metformina                                              | 395           |
| Metformina 500mg Cp Lib Prolongada (Prati Donaduzzi)    | 395           |
| Metformina 500mg Cp Rev (Prati Donaduzzi)               | 395           |
| Metformina 750mg Cp (Prati Donaduzzi)                   | 395           |
| Metformina 850mg Cp (Prati Donaduzzi)                   | 395           |
| Metformina 850mg Cp (Biosintética)                      | 395           |
| Metformina 850mg CP (Medley)                            | 395           |
| Metformina Cloridrato 500mg Cp Rev (Biosintética)       | 395           |
| Metformina Cloridrato 500mg Cp Rev (Medley)             | 395           |
| Metformina Cloridrato 850mg Cp (Merck)                  | 395           |
| Meticorten 20mg Cp                                      | 466           |
| Meticorten 5mg Cp                                       | 466           |
| Metildopa                                               | 396           |
| Metildopa 250mg Cp Rev (Biosintética)                   | 396           |
| Metilfenidato                                           | 397           |
| Metilprednisolona Acetato                               | 397           |
| Metilprednisolona Succinato                             | 398           |
| Metilprednisolona Succinato Sódico 125mg FA (Novafarma) | 398           |
| Metilprednisolona Succinato Sódico 500mg FA (Novafarma) | 398           |
| Metoclopramida                                          | 399           |
| Metoprolol                                              | 400           |
| Metotrexato                                             | 401           |
| Metronack 500mg Bolsa 100mL                             | 403           |
| Metronidazol                                            | 402 e 403     |
| Metronidazol 250 Cp Rev (Prati Donaduzzi)               | 402           |

| <b>Medicamento</b>                                               | <b>Página</b>  |
|------------------------------------------------------------------|----------------|
| Metronidazol 500mg Bolsa 100 mL (Isofarma)                       | 402            |
| Metroniflex 500mg Bolsa 100 mL                                   | 403            |
| Miantrex 1g (100mg/mL) FA 10mL                                   | 401            |
| Miantrex CS 50mg FA 2mL                                          | 401            |
| Micafungina Sódica                                               | 403            |
| Micardis 40mg Cp                                                 | 513            |
| Micofenolato de Mofetila                                         | 404            |
| Micofenolato de Sódio                                            | 405            |
| Miconazol                                                        | 405            |
| Micostatin 25.000ui/g Creme Vaginal Tubo 60g                     | 425            |
| Midazolam                                                        | 405, 406 e 407 |
| Milgamma 150mg Cp                                                | 157            |
| Milrinona                                                        | 408            |
| Minerais + Histidina + Triptofano + Manitol + Alfa-cetoglutarato | 409            |
| Minilax 6,5g Bis                                                 | 501            |
| Miodaron 200mg Cp                                                | 138            |
| Miosan 5mg Cp                                                    | 203            |
| Mirena 52mg Endoceptivo (DIU)                                    | 370            |
| Mirtax 5mg Cp Rev                                                | 203            |
| Mirtazapina                                                      | 409            |
| Mirtazapina 15mg Cp Orodispersível                               | 409            |
| Mirtazapina 30mg Cp Orodispersível (Sandoz)                      | 409            |
| Mitexan 400mg Amp 4ml                                            | 393            |
| Mitoxantrona                                                     | 410            |
| Mixistar Solução 0,4%                                            | 497            |
| Mixistar Solução 0,8%                                            | 497            |
| Modafilina                                                       | 410            |
| Moduretic 25/2,5mg Cp                                            | 135            |
| Moduretic 50/5mg Cp                                              | 135            |
| Mometasona                                                       | 410            |
| Monocordil 40mg Cp                                               | 357            |
| Monocordil 20mg Cp                                               | 357            |
| Monocordil 5mg Cp Subl                                           | 357            |
| Monoetanolamina Oleato                                           | 411            |
| Mononitrato de Isossorbida 20mg Cp (Biosintética)                | 357            |
| Monossialogangliosídeo                                           | 411            |
| Monozol 400mg Cp Mastigável                                      | 127            |
| Montelucaste Sódico                                              | 412            |

| <b>Medicamento</b>                       | <b>Página</b> |
|------------------------------------------|---------------|
| Monuril 8g Env                           | 310           |
| Morfina                                  | 412 e 413     |
| Motilium 10mg Cp                         | 260           |
| Moxifloxacino                            | 413 e 414     |
| Mozobil 20mg FA 1,2ml                    | 461           |
| Mud Cr Bis 10g                           | 325           |
| Mud Cr Tubo 30g                          | 325           |
| Mupirocina                               | 414           |
| Mupirocina 2% Pomada Bis 15g (Cristália) | 414           |
| Muvinalx 14g Sachê                       | 384           |
| Mycamine 100mg FA                        | 403           |
| Mydriacyl 1% Sol Oft Fr 5ml              | 530           |
| Myfortic 180 mg Cp Rev                   | 405           |
| Myfortic 360mg Cp Rev                    | 405           |
| Mylanta Plus Suspensão Oral Fr 240ml     | 494           |
| Mylanta Plus Suspensão Oral Fr 240mL     | 337           |
| Myleran 2mg Cp                           | 175           |
| Mytedom 10mg Amp 1ml                     | 394           |
| Mytedom 5mg Cp                           | 393           |
| Nabpaclitaxel                            | 416           |
| Nalbufina Cloridrato                     | 416           |
| Naloxona Cloridrato                      | 416           |
| Naltrexona                               | 417           |
| Nandrolona Decanoato                     | 418           |
| Nanquim                                  | 418           |
| Nanquim Estéril Amp 2ml Manip            | 418           |
| Naprix 5mg Cp                            | 478           |
| Naproxeno                                | 418           |
| Naramig 2,5mg Cp Rev                     | 419           |
| Naratriptana                             | 419           |
| Naratriptana 2,5mg Cp Rev (EMS)          | 419           |
| Narcan 0,4mg Amp 1ml                     | 416           |
| Naropin 0,75% Amp 20ml                   | 488           |
| Naropin 1% Amp 20ml                      | 488           |
| Natalizumab                              | 419           |
| Natrilix Sr Cp Lib Prolongada            | 346           |
| Naturetti Cap                            | 491           |
| Nausebron 4mg (2mg/ml) Amp 2ml           | 436           |

| <b>Medicamento</b>                               | <b>Página</b> |
|--------------------------------------------------|---------------|
| Nausedron 8mg (2mg/ml) Amp 4ml                   | 436           |
| Nausedron 8mg Cp Rev                             | 437           |
| Navelbine 10mg FA                                | 545           |
| Navelbine 50mg FA                                | 545           |
| N-butyl-2-cianoacrilato                          | 420           |
| Nebacetin Pomada Bis 15g                         | 154           |
| Nebido 1g Amp 4ml                                | 532           |
| Nebilet 5mg Cp                                   | 420           |
| Nebivolol                                        | 420           |
| Neo Digoxin 0,25mg Cp                            | 253           |
| Neo Doxicilin 100mg Cp Rev                       | 263           |
| Neo Mistatin Creme Vaginal 25.000ui/g Tubo 60g   | 425           |
| Neocaína 0,50% Com epinefrina FA 20mL            | 172           |
| Neocaína 0,50% Sem Adrenalina FA 20mL            | 171           |
| Neocaína Isobárica 0,5% Amp 4ml                  | 172           |
| Neocaína Pesada 0,5% Amp 4ml                     | 173           |
| Neocitec 10mg FA                                 | 545           |
| Neomicina                                        | 421           |
| Neomicina Sulfato 500mg Cap                      | 421           |
| Neo-mistatin Oral 100.000ui/ml Suspensão Oral Fr | 425           |
| Neosaldina Drg                                   | 256           |
| Neosetron 3mg Amp 3ml                            | 326           |
| Neostigmina                                      | 421           |
| Neozine 4% Gts Fr 20ml                           | 370           |
| Nepresol 20mg Amp 1mL                            | 332           |
| Netupitanto + Palonosentrona                     | 422           |
| Neulastim 6mg Ser 0,6ml                          | 452           |
| Neuleptil 4% (40mg/ml) Gts Fr 20ml               | 456           |
| Neupro Adv Transdérmico 2mg                      | 489           |
| Neurontin 300mg Cap                              | 314           |
| Neurontin 400mg Cap                              | 314           |
| Neutrofer 300mg Cp                               | 294           |
| Nexium 20mg Cp Rev Lib Retardada                 | 280           |
| NEXium Iv 40mg FA                                | 281           |
| Nicord 5mg Cp                                    | 146           |
| Nicorette 2mg Goma                               | 422           |
| Nicotina                                         | 422 e 423     |
| Nicotinell 14mg Adv Transdérmico                 | 423           |

| <b>Medicamento</b>                                                  | <b>Página</b> |
|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| Nifedipino                                                          | 423           |
| Niliperidol Amp 2ml                                                 | 265           |
| Nimbium 10mg Amp 5ml                                                | 209           |
| Nimesulida                                                          | 424           |
| Nimesulida 100mg Cp (Biosintética)                                  | 424           |
| Nimesulida 100mg Cp (EMS)                                           | 424           |
| Nimodipino                                                          | 424           |
| Nimodipino 30mg Cp (EMS)                                            | 424           |
| Nimodipino 30mg Cp (Germed)                                         | 424           |
| Nimovas 30mg Cp Rev                                                 | 424           |
| Niquitin 14mg Adv Transdérmico                                      | 423           |
| Niquitin 21mg Adv Transdérmico                                      | 423           |
| Niquitin 7mg Adv Transdérmico                                       | 423           |
| Nistatina                                                           | 425           |
| Nistatina + Óxido de Zinco                                          | 426           |
| Nistatina + Óxido de Zinco (100.000UI/g + 200mg/g) Bis 60g (EMS)    | 426           |
| Nistatina + Óxido de Zinco (100.000UI/g + 200mg/g) Bis 60g (Medley) | 426           |
| Nistatina 100.000ui/ml Suspensão Oral Fr                            | 425           |
| Nistatina Creme Vaginal 25.000ui/g Tubo 60g (EMS)                   | 425           |
| Nistatina Creme Vaginal 25.000ui/g Tubo 60g (Medley)                | 425           |
| Nistatina Creme Vaginal 25.000UI/g Tubo 60g (Neo Química)           | 425           |
| Nistatina Creme Vaginal 25.000ui/g Tubo 60g (Prati Donaduzzi)       | 425           |
| Nisulid 100mg Cp                                                    | 424           |
| Nitazoxanida                                                        | 426           |
| Nitrofurantoina                                                     | 427           |
| Nitrofurazona                                                       | 427           |
| Nitroglicerina                                                      | 427           |
| Nitroprus 50mg FA                                                   | 428           |
| Nitroprussiato de Sódio                                             | 428           |
| Nivolumab                                                           | 428           |
| Nizoral Creme Bis 30g                                               | 200           |
| Nolvadex D 20mg Cp                                                  | 511           |
| Noprosil 10mg Amp 2mL                                               | 399           |
| Norepinefrina                                                       | 429           |
| Norepinefrina 8mg Amp 4mL (Novafarma)                               | 429           |
| Norepinefrina 8mg Amp 4ml (Hipolabor)                               | 429           |
| Norfloxacino                                                        | 429           |
| Norfloxacino 400mg Cp (União Química)                               | 429           |

| <b>Medicamento</b>                                | <b>Página</b> |
|---------------------------------------------------|---------------|
| Norfloxacino 400mg Cp (Medley)                    | 429           |
| Norfloxacino 400mg Cp (União Química)             | 429           |
| Norfloxacino 400mg Cp Rev (Germed)                | 429           |
| Norfloxacino 400mg Cp Rev (Sandoz)                | 429           |
| Noripurum 100mg Amp 2ml                           | 294           |
| Noripurum 100mg Amp 5ml                           | 294           |
| Noripurum 100mg Cp Mastigável                     | 293           |
| Normastig 0,5mg Amp 1ml                           | 421           |
| Nortriptilina                                     | 430           |
| Nortriptilina Cloridrato 25mg Cap (Eurofarma)     | 430           |
| Nortriptilina Cloridrato 25mg Cap Manip           | 430           |
| Norvasc 5mg Cp                                    | 146           |
| Novabupi 0,5% Com Vasoconstritor FA 20mL          | 368           |
| Novabupi 0,5% Sem Vasoconstritor FA 20 mL         | 368           |
| Novaderm Pomada Bis 30g                           | 228           |
| Novalgina 1g Amp 2ml                              | 257           |
| Novalgina 500mg Cp                                | 257           |
| Novalgina Gts 500mg/ml Fr 10ml                    | 256           |
| Novanlo 2,5mg Cp                                  | 146           |
| Novolin N 100 Ui/ml FA 10ml                       | 350           |
| Novolin R 100 Ui/ml FA 10ml                       | 350           |
| Noxafil Susp Oral 4,2g Fr 105mL                   | 263           |
| Nubain 10mg Amp 1ml                               | 416           |
| Nujol Fr 120ml                                    | 434           |
| Octalbin Albumina Humana 20% Fr 50ml (Octapharma) | 128           |
| Octil Cianoacrilato                               | 432           |
| Octreotida                                        | 432           |
| Olanzapina                                        | 432           |
| Olanzapina 2,5mg Cp Rev (Medley)                  | 433           |
| Olanzapina 5mg Cp Rev (Aché)                      | 433           |
| Olanzapina 5mg Cp Rev (Eurofarma)                 | 433           |
| Olanzapina 5mg Cp Rev (Medley)                    | 433           |
| Olanzapina 2,5mg Cp (Aché)                        | 433           |
| Olanzapina 2,5mg Cp (Eurofarma)                   | 433           |
| Olcadil 1mg Cp                                    | 229           |
| Olcadil 2mg Cp                                    | 229           |
| Óleo de Amêndoas                                  | 433           |
| Óleo de Amêndoas Fr 100mL                         | 433           |



| <b>Medicamento</b>                   | <b>Página</b> |
|--------------------------------------|---------------|
| Óleo de Amêndoas Fr 60mL             | 433           |
| Óleo Iodado de Papoula + Iodo        | 434           |
| Óleo Mineral                         | 434           |
| Olig Trat Amp 2mL                    | 556           |
| Olmesartana Medoxomila               | 434           |
| Olmetec 20mc Cp Rev                  | 434           |
| Omcilon A Orabase 1mg/g Bis 10g      | 528           |
| Omcilon-a M Creme Tubo 30g           | 325           |
| Omeprazol Magnésico                  | 435           |
| Omeprazol Sódico                     | 435           |
| Omeprazol Sódico 40mg FA (Cristália) | 435           |
| Omeprazol Sódico 40mg FA (Eurofarma) | 435           |
| Omnice Ocas 0,4mg Cp Rev             | 511           |
| Oncileg Creme Tubo 30g               | 325           |
| Ondansetrone                         | 436 e 437     |
| Ondantrolil 4mg Cp Rev               | 437           |
| Onicit 0,25mg FA 5ml                 | 444           |
| Onicit Ponv 0,075mg FA 1,5ml         | 444           |
| Ontax 100mg FA 16,7ml                | 444           |
| Ontax 150mg FA 25ml                  | 444           |
| Ontax 30mg FA 5ml                    | 444           |
| Opdivo 100mg/10mL                    | 428           |
| Opdivo 40mg (10mg/mL) Amp 4mL        | 428           |
| Oprazon 40mg FA 10ml                 | 435           |
| Optiray 320 - 68% Ser 75ml           | 353           |
| Optiray 320 Ser 100ml                | 353           |
| Optiray 320 Ser 125ml                | 353           |
| Optiray 350 Ser 75ml                 | 353           |
| Optiray 350 Ser 100ml                | 353           |
| Optiray 350 Ser 125ml                | 353           |
| Optive Ud Flac 0,4ml                 | 182           |
| Orencia 250mg FA 15mL                | 112           |
| Ornitina                             | 438           |
| Oroxadin 100mg Cp                    | 206           |
| Oscal 500mg Cp                       | 176           |
| Oscal D 500mg + 400ui Cp Rev         | 176           |
| Oseltamivir                          | 439           |
| Osmolac 10g Sachê                    | 363           |

| <b>Medicamento</b>                                          | <b>Página</b>  |
|-------------------------------------------------------------|----------------|
| Oxacilil 500mg FA                                           | 439            |
| Oxacilina                                                   | 439            |
| Oxacilina 500mg A (Blausiegel)                              | 439            |
| Oxacilina Sódica 500mg FA (Eurofarma)                       | 439            |
| Oxalibbs 100mg FA 20mL                                      | 440            |
| Oxalibbs 50mg FA 10mL                                       | 440            |
| Oxaliplatina                                                | 440            |
| Oxanon 500mg FA                                             | 439            |
| Oxcarbazepina                                               | 441            |
| Oxibutinina Cloridrato                                      | 441            |
| Oxicodona                                                   | 442            |
| Oximetazolina                                               | 442            |
| Oxycontin 20mg CpLib Prolongada                             | 442            |
| Oxycontin10 mg Cp Lib Prolongada                            | 442            |
| Paclitaxel                                                  | 444            |
| Palonosetrona                                               | 444            |
| Pamelor 10mg Cap                                            | 430            |
| Pamelor 25mg Cap                                            | 430            |
| Pamidrom 90mg FA 10ml                                       | 445            |
| Pamidronato Dissódico                                       | 445            |
| Panitumumab                                                 | 445            |
| Pantocal Iv 40mg FA                                         | 446            |
| Pantopaz 40mg Cp                                            | 446            |
| Pantoprazol                                                 | 446            |
| Pantoprazol 40mg Cp (Biosintética)                          | 447            |
| Pantoprazol 40mg Cp (EMS)                                   | 447            |
| Pantoprazol 40mg Cp (Eurofarma)                             | 446            |
| Pantoprazol 40mg FA (Eurofarma)                             | 446            |
| Pantozol 40mg Cp                                            | 447            |
| Pantozol Ev 40mg FA                                         | 446            |
| Papaína                                                     | 447            |
| Papaína 1g Env Manip                                        | 447            |
| Papaverina                                                  | 448            |
| Papaverina Cloridrato 100mg Amp 2ml                         | 448            |
| Paracetamol                                                 | 448, 449 e 450 |
| Paracetamol + Diclofenaco de Sódio + Carisoprodol + Cafeína | 450            |
| Paracetamol + Cafeína                                       | 450            |
| Paracetamol 750mg Cp (Biosintética)                         | 448            |

| <b>Medicamento</b>                              | <b>Página</b> |
|-------------------------------------------------|---------------|
| Paracetamol 750mg Cp (Germed)                   | 448           |
| Paracetamol 750mg Cp (Neo Química)              | 448           |
| Paracetamol 750mg Cp (Prati Donaduzzi)          | 448           |
| Paracetamol Gts 200mg/20gts/mL Fr 15mL (EMS)    | 449           |
| Paracetamol Gts 200mg/20gts/mL Fr 15mL (Germed) | 449           |
| Paracetamol Gts 200mg/20gts/mL Fr 15mL (Medley) | 449           |
| Parasin 400mg Cp Mastigável                     | 127           |
| Parecoxibe                                      | 451           |
| Paroxetina                                      | 451           |
| Paroxetina 20mg Cp Rev (EMS)                    | 451           |
| Paroxetina 20mg Cp Rev (Eurofarma)              | 451           |
| Paroxetina 20mg Cp Rev (União Química)          | 451           |
| Patz 5mg Cp Sublingual                          | 557           |
| Pegfilgrastim                                   | 452           |
| Pegintron 80mcg FA                              | 129           |
| Pembrolizumab                                   | 453           |
| Pemetrexede                                     | 453           |
| Penicilina G Benzatina                          | 453           |
| Pentamidina                                     | 454           |
| Pentamidina 300mg FA                            | 454           |
| Pentasa 500mg Cp Lib Lenta                      | 392           |
| Pentoxifilina                                   | 454 e 455     |
| Pentoxifilina 400mg Cp Rev Lib Prolongada       | 455           |
| Percloroeto Férrico                             | 456           |
| Periciazina                                     | 456           |
| Peridal 10mg Cp                                 | 260           |
| Periokin Gel Oral Tubo 36g                      | 225           |
| Perjeta 420mg FA                                | 457           |
| Permanganato de Potássio                        | 456           |
| Permanganato de Potássio 100mg Cp               | 456           |
| Persantin 10mg Amp 2ml                          | 255           |
| Pertuzumabe                                     | 457           |
| Phosfoenema Fr 130ml                            | 310           |
| Picossulfato Sódico                             | 457           |
| Pilocarpina                                     | 457           |
| Pilocarpina 2% Sol Oft 2% Fr 10ml               | 457           |
| Pioglitazona                                    | 458           |
| Pioglitazona 15mg Cp (EMS)                      | 458           |

| <b>Medicamento</b>                                              | <b>Página</b> |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|
| Pioglitazona 15mg Cp (Torrent)                                  | 458           |
| Piotaz 15mg Cp                                                  | 458           |
| Piperacilina + Tazobactam                                       | 458           |
| Piperacilina 2g + Tazobactam 0,25g FA (Eurofarma)               | 458           |
| Piperacilina 2g + Tazobactam 0,25g FA (Mylan)                   | 458           |
| Piperacilina 4g + Tazobactam 0,5g FA (Aurobindo)                | 458           |
| Piperacilina 4g + Tazobactam 0,5g FA (Eurofarma)                | 458           |
| Piperacilina 4g + Tazobactam 0,5g FA (Mylan)                    | 458           |
| Piperacilina 4g + Tazobactam 0,5g FA (Novafarma)                | 458           |
| Piridostigmina                                                  | 459           |
| Pirimetamina                                                    | 460           |
| Plaketar 250mg Cp Rev                                           | 518           |
| Plamet 10mg Amp 2ml                                             | 168           |
| Plamet Gts 4mg/ml Fr 20ml                                       | 169           |
| Plantaben 5g Env                                                | 460           |
| Plantago                                                        | 460           |
| Plaquinol 400mg Cp                                              | 335           |
| Plasil 10m Amp 2ml                                              | 399           |
| Plasil 10mg Cp                                                  | 399           |
| Plasma-Lyte Bolsa 500ml                                         | 500           |
| Plasmin 6% Bolsa 500ml                                          | 337           |
| Platamine 150mg FA 15ml                                         | 181           |
| Platamine 450mg FA 45ml                                         | 181           |
| Platamine 50mg FA 5ml                                           | 181           |
| Platistine 10mg FA                                              | 210           |
| Platistine 50mg FA                                              | 210           |
| Plavix 75mg Cp Rev                                              | 218           |
| Plerixafor                                                      | 461           |
| Plurair Spray 50mcg/dose Fr 120 Doses                           | 305           |
| Pneumo 23 Fr 0,5ml                                              | 534           |
| Pneumovax Fr 0,5ml                                              | 534           |
| Poemmy 250mg Ser 5ml                                            | 311           |
| Polaramine 2mg Cp                                               | 247           |
| Policresuleno + Cinchocaína                                     | 461 e 462     |
| Policresuleno 500mg/g + Cinchocaína 10mg/g Pomada Bis 30g Manip | 462           |
| Polidocanol                                                     | 462           |
| Polidocanol 1% Amp 2ml Manip                                    | 462           |
| Polimixina B                                                    | 462           |

| <b>Medicamento</b>                     | <b>Página</b> |
|----------------------------------------|---------------|
| Polimixina B 500.000ui FA (Eurofarma)  | 462           |
| Polireumin 20mg (10mg/mL) FA 2mL       | 330           |
| Polissulfato de Mucopolissacarídeo     | 463           |
| Pondera 20mg Cp Rev                    | 451           |
| Posaconazol                            | 463           |
| Pradaxa 110mg Cap                      | 234           |
| Pradaxa 150mg Cap                      | 234           |
| Pramipexol                             | 464           |
| Pramipexol 0,25mg Cp (Biosintética)    | 464           |
| Prasugrel Cloridrato                   | 464           |
| Pravastatina                           | 465           |
| Pravastatina 10mg Cp (Medley)          | 465           |
| Prebictal 50mg Cap                     | 467           |
| Precedex 200mcg FA 2ml                 | 247           |
| Predi Medrol Im 80mg FA 2ml            | 397           |
| Prednisolona                           | 465           |
| Prednisona                             | 466           |
| Prednisona 20mg Cp (Medley)            | 466           |
| Prednisona 5mg Cp (EMS)                | 466           |
| Prednisona 5mg Cp (Medley)             | 466           |
| Predsim 5mg Cp                         | 465           |
| Pregabalina                            | 467           |
| Prelone 5mg Cp                         | 465           |
| Pressat 5mg Cp                         | 146           |
| Primacor 10mg Amp 10mL                 | 408           |
| Primid 100mg Cp                        | 467           |
| Primidona                              | 467           |
| Primovist 181,43mg/0,25mmL/mL Ser 10mL | 315           |
| Pristiq 50mg Cp Rev de Lib Prolongada  | 502           |
| Procimax 20mg Cp                       | 210           |
| Procoralan 5mg Cp Rev                  | 359           |
| Proctyl Pomada Bis 30g                 | 462           |
| Proctyl Sup                            | 461           |
| Proderm Emulsão Fr 120ml               | 127           |
| Profenid 50mg Cap                      | 201           |
| Profenid Entérico 100mg Cp Rev         | 201           |
| Profenid Im 100mg Amp 2ml              | 202           |
| Profenid Iv 100mg FA                   | 200           |

| <b>Medicamento</b>                                                         | <b>Página</b> |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Prograf 1mg Cap                                                            | 510           |
| Prograf 5mg Amp 1ml                                                        | 510           |
| Prograf 5mg Cap                                                            | 510           |
| Prolia 60mg Ser 1mL                                                        | 239           |
| Prolopa 100mg/25mg Cp Dispersível                                          | 369           |
| Prolopa 200mg/50mg Cp                                                      | 369           |
| Prolopa BD 100mg/25mg Cp                                                   | 369           |
| Prolopa Hbs 100/25mg Cap                                                   | 369           |
| Prometazina                                                                | 468 e 469     |
| Propafenona                                                                | 469           |
| Propantelina                                                               | 469           |
| Propantelina Brometo 15mg Gel Manip                                        | 469           |
| Propatilnitrato                                                            | 470           |
| Propil 100mg Cp                                                            | 471           |
| Propilenoglicol + Polietilenoglicol + Hidroxipropilcelulose + Ácido Lático | 470           |
| Propilracil 100mg Cp                                                       | 471           |
| Propiltiouracil                                                            | 471           |
| Propionato de Clobetasol + Alantoína                                       | 471           |
| Propofol                                                                   | 472           |
| Propofol 1% (10mg/mL) Amp 100mL (Fresenius)                                | 472           |
| Propofol 1% (10mg/mL) Amp 20mL (Fresenius)                                 | 472           |
| Propovan 1% Amp 20ml                                                       | 472           |
| Propranolol                                                                | 472           |
| Propranolol 10mg Cp (EMS)                                                  | 472           |
| Propranolol 10mg Cp (Germed)                                               | 472           |
| Propranolol 10mg Cp (Medley)                                               | 472           |
| Propranolol 40g Cp (Medley)                                                | 473           |
| Propranolol 40mg Cp (EMS)                                                  | 472           |
| Propranolol 40mg Cp (Germed)                                               | 472           |
| Proscar 5mg Cp                                                             | 297           |
| Prostavasin 20mcg Amp                                                      | 133           |
| Prostigmine 0,5mg Amp 1ml                                                  | 421           |
| Protamina                                                                  | 473           |
| Protamina 5000ui Amp 5ml                                                   | 473           |
| Provie 1% FA 100ml                                                         | 472           |
| Provie 1% FA 20ml                                                          | 472           |
| Proximetacaína                                                             | 474           |
| Prozac 20mg Cap                                                            | 303           |

| <b>Medicamento</b>                                 | <b>Página</b> |
|----------------------------------------------------|---------------|
| Prucaloprida                                       | 474           |
| Prurizin 25mg Cp                                   | 338           |
| Pulmicort 0,5mg/mL                                 | 170           |
| Puran T4 88mcg Cp                                  | 371           |
| Puran T4 100mcg Cp                                 | 371           |
| Puran T4 12,5mcg Cp                                | 371           |
| Puran T4 25mcg Cp                                  | 371           |
| Purinethol 50mg Cp                                 | 390           |
| Pyridium 100mg Drg                                 | 287           |
| Quadridem Creme Bis 20g                            | 160           |
| Questran Light Pó Env 4g                           | 232           |
| Quetiapina                                         | 476           |
| Quetiapina 100mg C Cp Rev (Biosintética)           | 476           |
| Quetiapina 100mg Cp Rev (EMS)                      | 476           |
| Quetiapina 25mg Cp Rev (EMS)                       | 476           |
| Quetiapina Fumarato 25mg Cp Rev (Sandoz)           | 476           |
| Quetros 25mg Cp Rev                                | 476           |
| Quinoflox 500mg Cp Rev                             | 207           |
| Racecadotril                                       | 478           |
| Ramipril                                           | 478           |
| Ramipril 5mg Cp                                    | 478           |
| Ramucirumab                                        | 479           |
| Ranitidina                                         | 479 e 480     |
| Ranitidina 150mg Cp (EMS)                          | 480           |
| Ranitidina Cloridrato 50mg Amp 2ml (Teuto)         | 479           |
| Ranitidina Cloridrato 50mg Amp 2ml (União Química) | 479           |
| Rapamune 1mg Drg                                   | 495           |
| Rapifen 2,5mg Amp 5ml                              | 130           |
| Rasaglina Mesilato                                 | 281           |
| Rasburicase                                        | 482           |
| Razapina Odt 15mg Cp                               | 409           |
| Reforgan 250mg Cp                                  | 365           |
| Refresh Gel 0,3% Gel Tubo                          | 121           |
| Refresh Sol Oft Flac 0,4 mL                        | 129           |
| Regencel Pomada Oft Tubo 3,5g                      | 218           |
| Remeron Soltab 15mg Cp Orodispersível              | 409           |
| Remeron Soltab 30mg Cp Orodispersível              | 409           |
| Remicade 100mg FA                                  | 347           |

| <b>Medicamento</b>                                  | <b>Página</b> |
|-----------------------------------------------------|---------------|
| Remifas 2mg FA                                      | 482           |
| Remifentanila                                       | 482           |
| Remifentanila Cloridrato 2mg FA                     | 482           |
| Reminyl ER 8mg Cap Liberação Prolongada             | 315           |
| Renagel 800mg Cp Rev                                | 492           |
| Renitec 10mg Cp                                     | 270           |
| Renitec 5mg Cp                                      | 270           |
| Reopro 10mg Fr 5ml                                  | 112           |
| Resolor 1mg Cp Rev                                  | 474           |
| Respidon 1mg Cp                                     | 485           |
| Restiva 10mg Adv Transdérmico                       | 173           |
| Restiva 5mg Adv Transdérmico                        | 173           |
| Retemic 5mg Cp                                      | 441           |
| Reuquinol 400mg Cp                                  | 335           |
| Revatio 20mg Cp Rev                                 | 493           |
| Revectina 6mg Cp                                    | 360           |
| Revia 50mg Cp                                       | 417           |
| Revolade 25mg Cp                                    | 269           |
| Ribavirin 250mg Cap                                 | 483           |
| Ribavirina                                          | 483           |
| Ribavirina 250mg Cap Secretaria da Saúde            | 483           |
| Rifaldin 300mg Cp                                   | 484           |
| Rifampicina                                         | 483 e 484     |
| Rifampicina 300mg Cap                               | 484           |
| Rifampicina 300mg Cap Manip                         | 484           |
| Riluzol                                             | 484           |
| Riluzol 50mg Cp Rev (Cristália)                     | 484           |
| Ringer Lactato Bolsa 500ml                          | 176           |
| Ringer Simples Bolsa 500ml                          | 176           |
| Rinosoro Gts Fr 30ml                                | 158           |
| Riodeine Degermante Almotolia 30ml                  | 352           |
| Riodeine Degermante Fr 1000ml                       | 352           |
| Riodeine Dermo Suave Degermante 10% Almotolia 100ml | 352           |
| Riodeine Dermo Suave Degermante Galão 100mL         | 352           |
| Riodeine Dermo Suave Tópico 10% Almotolia 100mL     | 352           |
| Riodeine Dermo Suave Tópico Almotolia 30ml          | 352           |
| Riodeine Tintura Almotolia 100ml                    | 352           |
| Riohex 2% Almotolia 100mL                           | 224           |



| <b>Medicamento</b>                                   | <b>Página</b> |
|------------------------------------------------------|---------------|
| Riohex Degermante Com Tensoativo 2% Almotolia 1000mL | 224           |
| Riohex Degermante Com Tensoativo 2% Almotolia 30mL   | 224           |
| Riohex Loção Aquosa 0,2% Almotolia 100mL             | 224           |
| Riohex Loção Aquosa 0,5% Almotolia 100mL             | 224           |
| Riohex Solução Alcoólica 0,5% Almotolia 100mL        | 225           |
| Riohex Solução Alcoólica 0,5% Almotolia 30mL         | 225           |
| Rispalum 1mg Cp                                      | 485           |
| Risperdal 1mg Cp                                     | 485           |
| Risperidon 1mg Cp                                    | 485           |
| Risperidona                                          | 485           |
| Risperidona 1mg Cp (Biosintética)                    | 485           |
| Risperidona 1mg Cp (Eurofarma)                       | 485           |
| Ritalina 10mg Cp                                     | 397           |
| Ritmonorm 300mg Cp Rev                               | 469           |
| Rituximabe                                           | 486           |
| Rivaroxabana                                         | 486           |
| Rivastigmina                                         | 486 e 487     |
| Rivotril 0,25mg Cp Sublingual                        | 216           |
| Rivotril 0,5mg Cp                                    | 216           |
| Rivotril 2mg Cp                                      | 216           |
| Rivotril Gts 2,5mg/ml Fr 20ml                        | 216           |
| Rocaltrol 0,25mcg Cap                                | 177           |
| Rocefin EV 1g FA                                     | 195           |
| Rocefin IM 1g FA                                     | 194           |
| Rocuron 50mg FA 5ml                                  | 487           |
| Rocurônio                                            | 487           |
| Rohypnol 1mg Cp                                      | 302           |
| Ropi 0,75% (7,5mg/mL) Amp 20mL                       | 488           |
| Ropi 1% (10mg/mL) amp 20mL                           | 488           |
| Ropivacaína                                          | 488           |
| Rosuvastatina                                        | 488           |
| Rosuvastatina 10mg Cp Rev (EMS)                      | 488           |
| Rotigotina                                           | 489           |
| Saccharomyces Boulardii                              | 490           |
| Salbutamol                                           | 490           |
| Saliform Saliva Artificial Spray Fr 40ml Manip       | 491           |
| Saliva Artificial                                    | 491           |
| Sandimmun 50mg Amp 1ml                               | 204           |

| <b>Medicamento</b>                         | <b>Página</b> |
|--------------------------------------------|---------------|
| Sandimmun Neoral 100mg Cap                 | 203           |
| Sandimmun Neoral 100mg/ml Sol Oral Fr 50ml | 203           |
| Sandimmun Neoral 25mg Cap                  | 203           |
| Sandostatin 0,1mg Amp                      | 432           |
| Sandostatin 0,5mg Amp                      | 432           |
| Scaflan 100mg Cp                           | 424           |
| Secotex 0,4mg Cp Rev de Lib Controlada     | 511           |
| Seki 3,54mg/ml Xrp Fr 120ml                | 218           |
| Seloken 100mg Cp                           | 400           |
| Seloken 5mg Amp 5ml                        | 401           |
| Selozok 25mg Cp Lib Controlada             | 401           |
| Sene + Associações                         | 491           |
| Sepurin 120mg + 20mg Drg                   | 395           |
| Seretide 50/250mcg Disco 60 Doses          | 306           |
| Seretide Spray 25/250mcg Fr 120 Doses      | 306           |
| Seroquel 100mg Cp Rev                      | 476           |
| Seroquel 25mg Cp Rev                       | 476           |
| Sertralina                                 | 492           |
| Sertralina 50mg Cp (EMS)                   | 492           |
| Sevelâmer                                  | 492           |
| Sevelamer Cloridrato 800mg Cp Rev          | 492           |
| Sevocris 1ml/ml Fr 250ml                   | 493           |
| Sevoflurano                                | 493           |
| Sevoflurano 10mL - Dose                    | 493           |
| Sevoflurano 1mL - Dose                     | 493           |
| Sevoflurano 5mL - Dose                     | 493           |
| Sevones Fr 250mL                           | 493           |
| Sevorane 1ml/ml Fr 100ml                   | 493           |
| Sevorane 1ml/ml Fr 250ml                   | 493           |
| Sibelium 10mg Cap                          | 302           |
| Sifrol 0,125mg Cp                          | 464           |
| Sifrol 0,25mg Cp                           | 464           |
| Sifrol 1mg Cp                              | 464           |
| Sigmatriol 0,25mcg Cap                     | 177           |
| Sildenafil                                 | 493           |
| Silicato de Magnésio                       | 494           |
| Simbilex 200mcg FA 2ml                     | 247           |
| Simdax 12,5mg (2,5mg/ml) FA 5ml            | 371           |

| <b>Medicamento</b>                                                                                                               | <b>Página</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Simeticona                                                                                                                       | 494           |
| Simeticona Gts 75mg/mL Fr 15mL (EMS)                                                                                             | 494           |
| Simeticona Gts 75mg/ml Fr 15ml (Eurofarma)                                                                                       | 494           |
| Simeticona Gts 75mg/ml Fr 15ml (Medley)                                                                                          | 494           |
| Simponi 25mg Caneta 0,5mL                                                                                                        | 324           |
| Simulect 20mg FA 5ml                                                                                                             | 155           |
| Singulair 10mg Cp Mastig                                                                                                         | 412           |
| Sinvascor 10mg Cp                                                                                                                | 495           |
| Sinvastacor 10mg Cp                                                                                                              | 495           |
| Sinvastatina                                                                                                                     | 495           |
| Sinvastatina 10mg Cp Rev (Medley)                                                                                                | 495           |
| Sirdalud 2mg Cp                                                                                                                  | 521           |
| Sirolimo                                                                                                                         | 495           |
| Sitagliptina                                                                                                                     | 496           |
| Slow K 600mg Drg                                                                                                                 | 222           |
| Smofkabiven Fr 1477mL                                                                                                            | 136           |
| Smoflipid 20% Fr 100ml                                                                                                           | 378           |
| Smoflipid 20% Fr 500ml                                                                                                           | 378           |
| Sódio Cloreto + Potássio Cloreto + Soro Glicosado 5%                                                                             | 497           |
| Solução Ácida 22g/34 Na138 K2,0                                                                                                  | 496           |
| Solução Ácida 24g/34 Na138 K2,0                                                                                                  | 496           |
| Solução Ácida Para Hemodiálise                                                                                                   | 496           |
| Solução Básica - Ds 138/35-90                                                                                                    | 497           |
| Solução Básica de Diálise: Bicarbonato de Sódio + Cloreto de Sódio + Glicose Anidra                                              | 497           |
| Solução Cardioplégica                                                                                                            | 497           |
| Solução Cardioplégica 10 mL Amp Manip                                                                                            | 497           |
| Solução de Conservação de Órgãos                                                                                                 | 498           |
| Solução de Diálise (Na + K + Mg + PO4 + HCO3 + Cl) Bolsa 5000mL (Life Pharma)                                                    | 499           |
| Solução de Diálise 0,61%                                                                                                         | 499           |
| Solução de Diálise Hemolenta                                                                                                     | 499           |
| Solução de Diálise Peritoneal                                                                                                    | 499           |
| Solução de Diálise Peritoneal Pd2 1,5% Glicose 6l                                                                                | 499           |
| Solução de Diálise Peritoneal Pd2 2,5% Glicose 6l                                                                                | 499           |
| Solução de Diálise Peritoneal Pd2 4,25% Glicose 6l                                                                               | 499           |
| Solução de Diálise: Bicarbonato de Sódio                                                                                         | 498           |
| Solução de Diálise: Cloreto de Cálcio Diidratado + Cloreto de Sódio + Glicose + Cloreto de Magnésio Hexaidratado + Sódio Lactato | 498           |
| Solução de Diálise: Cloreto de Sódio + Cloreto de Potássio + Associações                                                         | 499           |

| <b>Medicamento</b>                                                                                                   | <b>Página</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Solução de Diálise: Cloreto de Sódio + Sulfato de Magnésio + Heptaidratado sem Glicose + Bicarbonato de Sódio        | 499           |
| Solução de Diálise: Cloreto de Sódio + Sulfato de Magnésio Heptaidratado sem Glicose                                 | 499           |
| Solução de Eletrólitos                                                                                               | 500           |
| Solução Fosfato Para Preparo Intestinal Fr 45 mL Manip                                                               | 310           |
| Solução Para Conservação de Órgãos Igl-1                                                                             | 498           |
| Solução Salina: Cálcio Cloreto + Magnésio Cloreto + Potássio Cloreto + Sódio Acetato + Sódio Citrato + Sódio Cloreto | 500           |
| Solu-medrol 125mg FA                                                                                                 | 398           |
| Solu-medrol 500mg FA                                                                                                 | 398           |
| Somalgin Cardio 100mg Cp                                                                                             | 117           |
| Somalium 3mg Cp                                                                                                      | 168           |
| Somatostatina                                                                                                        | 500           |
| Sorbitol + Lauril Sulfato de Sódio                                                                                   | 501           |
| Sorcal 900mg/g Env 30g                                                                                               | 177           |
| Sorine Infantil Gts Fr 30ml                                                                                          | 158           |
| Soro Fisiológico 0,9% Amp 10ml                                                                                       | 223           |
| Soro Fisiológico 0,9% Bolsa 1000ml                                                                                   | 223           |
| Soro Fisiológico 0,9% Bolsa 100ml                                                                                    | 223           |
| Soro Fisiológico 0,9% Bolsa 100ml (Eurofarma)                                                                        | 223           |
| Soro Fisiológico 0,9% Bolsa 2000ml                                                                                   | 223           |
| Soro Fisiológico 0,9% Bolsa 250ml                                                                                    | 223           |
| Soro Fisiológico 0,9% Bolsa 500ml                                                                                    | 223           |
| Soro Fisiológico 0,9% Bolsa 50ml                                                                                     | 223           |
| Soro Fisiológico 0,9% Trilaminado Bolsa 100ml (Eurofarma)                                                            | 223           |
| Soro Fisiológico 0,9% Trilaminado Bolsa 250ml (Eurofarma)                                                            | 223           |
| Soro Fisiológico 0,9% Trilaminado Bolsa 250ml (Halex Istar)                                                          | 223           |
| Soro Fisiológico 0,9% Trilaminado Bolsa 500ml (Eurofarma)                                                            | 223           |
| Soro Fisiológico 0,9% Trilaminado Bolsa 500ml (Halex Istar)                                                          | 223           |
| Soro Glico-fisiológico Bolsa 500ml                                                                                   | 322           |
| Soro Glicosado 10% Bolsa 500mL                                                                                       | 322           |
| Soro Glicosado 5% Bolsa 250ml                                                                                        | 322           |
| Soro Glicosado 5% Bolsa 1000ml                                                                                       | 322           |
| Soro Glicosado 5% Bolsa 100ml                                                                                        | 322           |
| Soro Glicosado 5% Bolsa 500ml (Baxter)                                                                               | 322           |
| Soro Glicosado 5% Trilaminado Bolsa 250ml                                                                            | 322           |
| Soro Glicosado 5% Trilaminado Bolsa 500mL                                                                            | 322           |
| Sotalol                                                                                                              | 501           |

| <b>Medicamento</b>                                                           | <b>Página</b> |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Sotalol Cloridrato 120mg Cp (Biosintética)                                   | 501           |
| Sotalol Cloridrato 120mg Cp (Brainfarma)                                     | 501           |
| Sotalol Cloridrato 160mg Cp (Biosintética)                                   | 501           |
| Sotalol Cloridrato 160mg Cp (Brainfarma)                                     | 501           |
| Sotalol Cloridrato 160mg Cp (Merck)                                          | 501           |
| Spiriva Respimat 2,5mcg/dose Fr 4mL                                          | 520           |
| Sporanox 100mg Cap                                                           | 358           |
| Sps-1 - Solução de Preservação de Órgãos 1000ml (Organ Recovery - Importado) | 498           |
| Stanglit 15mg Cp                                                             | 458           |
| Stanglit 30mg Cp                                                             | 458           |
| Stavigile 200mg Cp                                                           | 410           |
| Stilamin 3mg Amp                                                             | 500           |
| Stilnox 10mg Cp                                                              | 557           |
| Stomahesive Pasta Protetora de Pele Tubo 56,7g                               | 318           |
| Strepsils 8,75mg Pastilha                                                    | 305           |
| Subgalato de Bismuto                                                         | 502           |
| Subgalato de Bismuto Pote 10g Manip                                          | 502           |
| Succinato de Desvenlafaxina Monoidratado                                     | 502           |
| Succinato de Solifenacina                                                    | 502           |
| Succinil Colin 100mg FA                                                      | 508           |
| Succitrat 100mg FA                                                           | 508           |
| Sucrafalto 200mg/mL Flac 10mL Manip                                          | 503           |
| Sucrafilm 200mg/mL Flac 10ml                                                 | 503           |
| Sucrafato                                                                    | 503           |
| Sufenta 50mcg/ml Amp 1ml                                                     | 503           |
| Sufentanila                                                                  | 503           |
| Sugamadex Sódico                                                             | 504           |
| Suladrin 500mg Cp                                                            | 504           |
| Sulfadiazina                                                                 | 504           |
| Sulfadiazina 500mg Cap                                                       | 504           |
| Sulfadiazina Prata + Nitrato de Cério                                        | 505           |
| Sulfametoxazol + Trimetoprima                                                | 505 e 506     |
| Sulfametoxazol 400mg + Trimetoprima 80mg Cp (Prati Donaduzzi)                | 506           |
| Sulfametoxazol 400mg + Trimetoprima 80mg Cp (Sandoz)                         | 506           |
| Sulfametoxazol 800mg + Trimetoprima 160mg Cp (Prati Donaduzzi)               | 506           |
| Sulfassalazina                                                               | 507           |
| Sulfato de Gentamicina 0.1% Creme Bis 30g Manip                              | 319           |
| Sulfato de Magnésio 10% Amp 10ml (Samtec)                                    | 384           |

| <b>Medicamento</b>                                               | <b>Página</b> |
|------------------------------------------------------------------|---------------|
| Sulfato de Magnésio 10% Amp 10ml Manip                           | 384           |
| Sulfato de Magnésio 10% Amp Polietileno 10mL                     | 384           |
| Sulfato de Magnésio 500mg Cap Manip                              | 385           |
| Sulfato de Magnésio 650mg Flac Manip                             | 385           |
| Sulfato de Terbutalina 0,5mg/mL Amp 1mL (Hipolabor)              | 516           |
| Sulfato de Terbutalina/Terbutil 0,5mg/ml Amp 1mL (União Química) | 516           |
| Sulpirida                                                        | 507           |
| Sumatriptana                                                     | 508           |
| Sumax 25mg Cp                                                    | 508           |
| Superan 50mg Amp 2ml                                             | 130           |
| Supriderme Óleo Com Calêndula/curativo Age Almotolia 100 mL      | 120           |
| Sustrate 10mg Cp Subl                                            | 470           |
| Suxametônio                                                      | 508           |
| Sygen 100mg Amp 5ml                                              | 411           |
| Synolis Va 40mg + Sorbitol 40mg/mL Ser 2mL                       | 331           |
| Synolis Va 80mg/160mg Ser 4ml (Aptissen)                         | 331           |
| Synovium 75mg (25mg/mL) Ser 3mL                                  | 330           |
| Synthroid 88mcg Cp                                               | 371           |
| Synthroid 100mcg Cp                                              | 371           |
| Synthroid 112mcg Cp                                              | 371           |
| Synthroid 25mcg Cp                                               | 371           |
| Synvisc Classic 16mg Ser 2mL                                     | 338           |
| Synvisc One 48mg Ser 6ml                                         | 338           |
| Tachosil Esponja Medicamentosa                                   | 297           |
| Tacrolimo                                                        | 510           |
| Tacrolimo 0,5mg Cap Manip                                        | 510           |
| Tacrolimo 1mg Cap Secretaria da Saúde                            | 510           |
| Talco Neutro Estéril 50g                                         | 494           |
| Tamarine Cap                                                     | 491           |
| Tamarine Geléia Pote 150g                                        | 491           |
| Tamiflu 30mg Cap Secretaria da Saúde                             | 439           |
| Tamiflu 75mg Cap Secretaria da Saúde                             | 439           |
| Tamoxifeno                                                       | 511           |
| Tandrilax Cp                                                     | 450           |
| Tansulosina                                                      | 511           |
| Tansulosina 0,4mg Cap Lib Controlada Manip                       | 511           |
| Tapazol 5mg Cp                                                   | 517           |
| Tarfic 1mg Cap                                                   | 510           |

| <b>Medicamento</b>                  | <b>Página</b> |
|-------------------------------------|---------------|
| Tarfic 5mg Cap                      | 510           |
| Targocid 200mg FA                   | 512           |
| Targocid 400mg FA                   | 512           |
| Targus Adv Transdérmico 40mg        | 305           |
| Tarvexol 30mg FA 5ml                | 444           |
| Taurolock U 25000 UI FA 5mL         | 205           |
| Taxol 100mg FA 16,7ml               | 444           |
| Taxol 30mg FA 5ml                   | 444           |
| Taxotere 20mg FA                    | 259           |
| Taxotere 80mg FA                    | 259           |
| Tazocin 2,25g FA                    | 458           |
| Tazocin 4,5g FA                     | 458           |
| Tecnotecan 100mg (20mg/ml) FA       | 354           |
| Tecnotecan 40mg (20mg/ml) FA        | 354           |
| Teflan 20mg Cp                      | 515           |
| Teflan 20mg FA                      | 514           |
| Tegretol 200mg Cp                   | 180           |
| Tegretol 400mg Cp                   | 180           |
| Tegretol CR 200mg Cp Lib Controlada | 180           |
| Teicoplanina                        | 512           |
| Teiplan 200mg FA                    | 512           |
| Telebrix 30% FA 50mL                | 388           |
| Telebrix Coronar FA 100mL           | 387           |
| Telebrix Hystero FA 20ml            | 387           |
| Telmisartana                        | 513           |
| Tenofovir                           | 513           |
| Tenotec 20mg Cp                     | 515           |
| Tenoxicam                           | 514 e 515     |
| Tenoxicam 20mg Cp (Neo Química)     | 515           |
| Tenoxicam 20mg FA (Cristália)       | 514           |
| Tenoxicam 20mg FA (Eurofarma)       | 514           |
| Tenoxican 20mg Cp (EMS)             | 515           |
| Teofilina                           | 515           |
| Teolong 200mg Cap Lib Prolongada    | 515           |
| Terbutalina                         | 516           |
| Terlipressina + Manitol             | 516           |
| Tetanogamma 250ui Amp 1ml           | 345           |
| Tevaetopo 100mg FA                  | 283           |

| <b>Medicamento</b>                               | <b>Página</b> |
|--------------------------------------------------|---------------|
| Tevafofin 300mg FA 30 mL                         | 307           |
| Tevafofin 50mg FA 5ml                            | 307           |
| Thiopentax 1g FA                                 | 519           |
| Thymoglobuline 25mg FA                           | 345           |
| Thyrogen 1,08mg (0,9mg/ml) FA 1,2ml              | 521           |
| Tiamazol                                         | 517           |
| Tiamina 100mg/mL Amp 1mL Manip (Centro Paulista) | 546           |
| Tiamina 100mg/mL Amp 1mL Manip (Health Tech)     | 546           |
| Tiamina 100mg/ml Amp 1ml Manip (Verbenna)        | 546           |
| Ticagrelor                                       | 517           |
| Ticlopidina                                      | 518           |
| Ticlopidina Cloridrato 250mg Cp Rev (Medley)     | 518           |
| Tienam 500mg/500mg FA                            | 342           |
| Tigeciclina                                      | 518           |
| Tilatil 20mg Cp                                  | 515           |
| Tiocolchicosídeo                                 | 519           |
| Tiopental                                        | 519           |
| Tiorfan 100mg Cap                                | 478           |
| Tiotrópio Brometo                                | 520           |
| Tirofibana                                       | 520           |
| Tirotrofina Alfa                                 | 521           |
| Tissel Duo - Kit 10mL                            | 296           |
| Tissel Duo - Kit 2mL                             | 296           |
| Tissel Duo - Kit 4mL                             | 296           |
| Tissucol Tisseel Duo - Kit 2mL                   | 296           |
| Tivicay 50mg Cp Rev                              | 260           |
| Tizanidina                                       | 521           |
| Tobracin - D Colírio Fr 5ml                      | 523           |
| Tobradex Colírio Fr 5ml                          | 523           |
| Tobramicina                                      | 522           |
| Tobramicina + Dexametasona                       | 523           |
| Tobramicina 0.3% Sol Oft Fr 5ml (Cristália)      | 522           |
| Tobramicina 0.3% Sol Oft Fr 5ml (Biosintética)   | 522           |
| Tobramicina Colírio Fr 5mL (Biosintética)        | 523           |
| Tobramina 75mg Amp 1,5mL                         | 522           |
| Tobrex 0,3% Sol Oft Fr 5ml                       | 522           |
| Tocilizumabe                                     | 523           |
| Tofranil 25mg Cp                                 | 343           |



| <b>Medicamento</b>                                | <b>Página</b> |
|---------------------------------------------------|---------------|
| Topamax 100mg Cp Rev                              | 524           |
| Topamax 25mg Cp                                   | 524           |
| Toperma 5% (50mg/g) Patch Dose 5 adesivos         | 374           |
| Topiramato                                        | 524           |
| Topiramato 100mg Cp Rev (Biosintética)            | 524           |
| Topiramato 25mg Cp (Biosintética)                 | 524           |
| Topison 1mg/g Creme Bis 20g                       | 410           |
| Toradol 30mg Amp 1ml                              | 529           |
| Toragesic 10mg Cp Sublingual                      | 530           |
| Toragesic 30mg Amp 1ml                            | 529           |
| Torgena 2,5g FA                                   | 193           |
| Toxina Botulínica Tipo A                          | 524           |
| Tramadol                                          | 525           |
| Tramadol + Paracetamol                            | 526           |
| Tramadol 50mg Cap (Germed)                        | 525           |
| Tramadol Cloridrato 100mg Amp 2ml (União Química) | 525           |
| Tramadol Cloridrato 50mg Cap (Medley)             | 525           |
| Tramadon 100mg Amp 2ml                            | 525           |
| Tramadon 50mg Cap                                 | 525           |
| Tramal 100mg Amp 2ml                              | 525           |
| Tramal 50mg Cap                                   | 525           |
| Transamin 250mg Amp 5ml                           | 122           |
| Transamin 250mg Cp                                | 121           |
| Transtec 20mg Adv Transdérmico                    | 173           |
| Transtec 30mg Adv Transdérmico                    | 173           |
| Transtec 40mg Adv Transdérmico                    | 173           |
| Trastuzumabe                                      | 527           |
| Trayenta 5mg Cp Rev                               | 375           |
| Trazodona                                         | 527           |
| Trebyxan 100mg FA 5mL                             | 354           |
| Trebyxan 40mg FA 2mL                              | 354           |
| Trental 400mg Cp Rev                              | 455           |
| Tresiba Flextouch 100u/1ml Ser 3mL                | 348           |
| Tretinoína                                        | 528           |
| Triancil 100mg FA 5ml                             | 528           |
| Triancinolona                                     | 528           |
| Triancinolona Acetonida                           | 528           |
| Triancinolona Orabase 1mg/g Bis 10g (Eurofarma)   | 528           |

| <b>Medicamento</b>                               | <b>Página</b> |
|--------------------------------------------------|---------------|
| Triancinolona Orabase 1mg/g Bis 10g (Medley)     | 528           |
| Triancinolona Orabase 1mg/g Bisnaga 10g (Germed) | 528           |
| Triatec 5mg Cp                                   | 478           |
| Tridil 50mg Amp 10ml                             | 427           |
| Trileptal 300mg Cp Rev Divisível                 | 441           |
| Trimetazidina                                    | 529           |
| Trofodermin Creme Bis 30g                        | 228           |
| Trofodermin Creme Vaginal Bis 45g                | 228           |
| Trok G Crème Bis 30g                             | 160           |
| Trok-G Creme Bis 30g                             | 319           |
| Tromaxil 1000mg FA                               | 273           |
| Trometamol Cetorolaco                            | 529 e 530     |
| Tropicamida                                      | 530           |
| Tygacil 50mg FA                                  | 518           |
| Tylenol 750mg Cp Rev                             | 448           |
| Tylenol Dc 500mg + 65mg Cp Rev                   | 450           |
| Tylenol Gts 200mg/ml Fr 15ml                     | 449           |
| Tylex 500mg/30mg Cp                              | 230           |
| Tylex 7.5mg/500mg Cp                             | 230           |
| Tysabri 300mg FA 15mL                            | 419           |
| Ultiva 2mg FA                                    | 482           |
| Ultracet 37,5/325mg Cp                           | 526           |
| Ultravist 370 FA 50ml                            | 353           |
| Unasyn Injetável 1g + 0,5g FA                    | 143           |
| Undecilato de Testosterona                       | 532           |
| Uni Haloper 5mg Amp 1mL (União Química)          | 328           |
| Uni-diazepax 10mg Amp 2ml                        | 249           |
| Unifedrine 50mg/mL Amp 1mL                       | 268           |
| Unifental 100mcg Amp 2 ml                        | 292           |
| Unifental 250mcg Amp 5 ml                        | 292           |
| Unimedrol 125mg FA                               | 398           |
| Unimedrol 500mg FA                               | 398           |
| Uni-vir 200mg Cp                                 | 115           |
| Uni-vir Aciclovir 250mg FA                       | 116           |
| Unoprost 2mg Cp                                  | 262           |
| Urbanil 10mg Cp                                  | 214           |
| Urovit 100mg Drg                                 | 287           |
| Ursacol 150mg Cp                                 | 122           |

| <b>Medicamento</b>                                              | <b>Página</b> |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|
| Vacina Antipneumococo                                           | 534           |
| Vacina Antitetânica                                             | 534           |
| Vacina Contra Hepatite B                                        | 534           |
| Vacina Dupla Adulto (Antitetânica + Difteria) 10 Doses Fr 0,5mL | 534           |
| Vacina Engerix B Amp 1ml                                        | 534           |
| Vacina Pneumocócica 23 (VALENTE)                                | 534           |
| Valaciclovir                                                    | 535           |
| Valdoxan 25mg Cp Rev                                            | 126           |
| Valium 5mg Cp                                                   | 250           |
| Valproato de Sódio                                              | 535 e 536     |
| Valproato de Sódio Xarope Fr 10mL (Hipolabor)                   | 536           |
| Valsartana                                                      | 536           |
| Valsartana + Sacubitril                                         | 537           |
| Valsartana 80mg Cp Rev (Germed)                                 | 536           |
| Valtrex 500mg Cp                                                | 535           |
| Vancocina 500mg FA                                              | 538           |
| Vancomicina                                                     | 538           |
| Vancomicina 125mg Cap Manip                                     | 538           |
| Vancomicina 500mg FA (Abl)                                      | 538           |
| Vancomicina Cloridrato 500mg FA (Abl)                           | 538           |
| Vancomicina Cloridrato 500mg FA (Eurofarma)                     | 538           |
| Vareniclina Tartarato                                           | 539           |
| Varfarina                                                       | 539           |
| Vascer 100mg Amp 5mL                                            | 454           |
| Vaselina                                                        | 540           |
| Vaselina Amp 20mL Manip                                         | 540           |
| Vaselina Líquida Amp 10ml Manip                                 | 540           |
| Vaselina Líquida Fr 100ml                                       | 540           |
| Vaslip 10mg Cp Rev                                              | 495           |
| Vasodipina 30mg Cp Rev                                          | 424           |
| Vasogard 50mg Cp                                                | 205           |
| Vasopressina                                                    | 540           |
| Vastarel Mr 35mg Cp Rev lib Prolongada                          | 529           |
| Veac 200mg Cp Rev                                               | 555           |
| Veac 200mg FA                                                   | 554           |
| Vectibix 100mg FA 5mL                                           | 445           |
| Velban 10mg FA                                                  | 544           |
| Velcade 3,5mg FA                                                | 167           |

| <b>Medicamento</b>                                            | <b>Página</b> |
|---------------------------------------------------------------|---------------|
| Velija 30mg Cap de Lib Retardada                              | 266           |
| Venalot Drg                                                   | 233           |
| Venlafaxina                                                   | 541           |
| Venlafaxina 75mg Cp Lib. Prolong (Eurofarma)                  | 541           |
| Venlafaxina 75mg Cp Lib. Prolongada (EMS)                     | 541           |
| Venlafaxina Cloridrato 37,5mg Cp Lib. Controlada (Medley)     | 541           |
| Venlafaxina Cloridrato 75mg Cp Lib. Controlada (Biosintética) | 541           |
| Venlafaxina Cloridrato 75mg Cp Lib. Controlada (Medley)       | 541           |
| Venlaxin 75mg Cap Lib. Prolong                                | 541           |
| Venlift Od 150mg Cap Lib. Controlada                          | 541           |
| Venlift Od 75mg Cap Lib. Controlada                           | 541           |
| Venofundin 6% Ecoflac Bolsa 500ml                             | 337           |
| Verapamil                                                     | 542           |
| Verapamil 80mg Cp Rev (EMS)                                   | 542           |
| Verapamil Cloridrato 120mg Cp Lib Prolongada                  | 542           |
| Verapamil Cloridrato Cp Ação Prolongada (Sandoz)              | 542           |
| Verde Brilhante                                               | 543           |
| Verde Brilhante 2% Amp 10ml Manip                             | 543           |
| Versa 20mg Ser 0,2mL                                          | 270           |
| Versa 40mg Ser 0,4mL                                          | 270           |
| Vertex 10mg Cap                                               | 302           |
| Verutex Creme Bis 15g (Leo Pharma)                            | 120           |
| Vesanoid 10mg Cap Gelatinosa                                  | 528           |
| Vesicare 5mg Cp Rev                                           | 502           |
| Vfend 200mg Cp Rev                                            | 555           |
| Vfend 200mg FA                                                | 554           |
| Vibramicina 100mg Cp Rev                                      | 263           |
| Vibramicina 100mg Cp Solúvel                                  | 263           |
| Victoza 6mg/mL Caneta injetora com cartucho 3mL               | 378           |
| Vidaza 100mg FA                                               | 150           |
| Vidisic Gel 0,2% Gel Tubo 10g                                 | 121           |
| Vidmax 25mg Cp Rev                                            | 524           |
| Vigadexa Sol Oft Fr 5ml                                       | 245           |
| Vildagliptina                                                 | 543           |
| Vimblastina                                                   | 544           |
| Viminol                                                       | 544           |
| Vimpat 200mg FA 20mL                                          | 362           |
| Vimpat 50mg Cp Rev                                            | 362           |

| <b>Medicamento</b>                                     | <b>Página</b> |
|--------------------------------------------------------|---------------|
| Vimpat Sol Oral 10mg/ml Fr 200ml                       | 362           |
| Vincristina                                            | 544           |
| Vinorelbina                                            | 545           |
| Viread 300mg Cp                                        | 513           |
| Viscoat Large Ser 0,75ml                               | 233           |
| Visipaque 320 FA 100ml                                 | 351           |
| Visipaque 320 FA 50ml                                  | 351           |
| Vistagel Ser 2,5ml                                     | 337           |
| Vitamina + Poliminerais                                | 553           |
| Vitamina A + Vitamina B12 + L Carnitina + L Lisina     | 545           |
| Vitamina A + Vitamina D                                | 545           |
| Vitamina B1                                            | 546           |
| Vitamina B1 + Vitamina B6 + Vitamina B12               | 547           |
| Vitamina B1 + Vitamina B6 + Vitamina B12 Amp 1mL Manip | 547           |
| Vitamina B12                                           | 548           |
| Vitamina B6                                            | 548           |
| Vitamina B6 100mg Cap Manip                            | 548           |
| Vitamina C                                             | 549           |
| Vitamina C (ácido Ascórbico) 1g (200mg/ml) Amp         | 549           |
| Vitamina D3                                            | 550           |
| Vitamina E                                             | 550           |
| Vitamina K                                             | 550 e 551     |
| Vitaminas                                              | 551           |
| Vitaminas + Ácido Fólico                               | 552           |
| Vitaminas + Lectina + Óleo Vegetal                     | 552           |
| Vitaminas Complexo B sem Vit B1                        | 553           |
| Vitaminas do Complexo B                                | 552 e 553     |
| Vodol 20mg/g Pó Fr 30g                                 | 405           |
| Voltaren 50mg Cp Rev                                   | 251           |
| Voltaren 75mg Amp 3ml                                  | 251           |
| Voluven Solução 6% Bolsa 500ml                         | 337           |
| Vonau-flash 4mg Cp Desintegração Oral                  | 436           |
| Vori 200 mg Cp Rev                                     | 555           |
| Voriconazol                                            | 554 e 555     |
| Voriconazol 200mg Cp Rev (Cristália)                   | 555           |
| Vortioxetina                                           | 555           |
| Vudirax 150mg Cp Rev                                   | 364           |
| Wellbutrin Sr 150mg Cp Rev Ação Prolongada             | 174           |

| <b>Medicamento</b>                             | <b>Página</b> |
|------------------------------------------------|---------------|
| Xalatan Sol Oft Fr 2,5 mL                      | 366           |
| Xarelto 10mg Cp Rev                            | 486           |
| Xarelto 15mg Cp Rev                            | 486           |
| Xeloda 500mg Cp Rev                            | 179           |
| Xgeva 120mg FA 1,7mL                           | 239           |
| Xylestesin 10% Spray Fr 50ml                   | 374           |
| Xylestesin 2% Geléia Ser 10g                   | 373           |
| Xylestesin 1% Sem Vasoconstritor FA 20mL       | 372           |
| Xylestesin 2% Com epinefrina FA 20ml           | 374           |
| Xylestesin 2% Com Norepinefrina Carpule 1,8mL  | 375           |
| Xylestesin 2% Geléia Bis 30g                   | 373           |
| Xylestesin 2% Isobárica Amp 5mL                | 372           |
| Xylestesin 2% Sem Vasoconstritor Carpule 1,8ml | 372           |
| Xylestesin 2% Sem Vasoconstritor FA 20mL       | 372           |
| Xylocaina 2% Geléia Bis 30g                    | 373           |
| Xyloproct Pomada Bis 25g                       | 373           |
| Zargus 1mg Cp (Biosintética)                   | 485           |
| Zavedos 10mg FA                                | 341           |
| Zavedos 5mg FA                                 | 341           |
| Zentel 400mg Cp                                | 127           |
| Zerbaxa 1,5g FA                                | 193           |
| Zestril 10mg Cp                                | 379           |
| Zetia 10mg Cp                                  | 284           |
| Zetron 150mg Cp Rev Ação Prolongada            | 174           |
| Ziclague 2,4mL Fr 30mL                         | 132           |
| Zinacef 750mg FA                               | 196           |
| Zinco + Cobre + Manganês + Cromo               | 556           |
| Zinforo 600mg FA                               | 191           |
| Zinnat 250mg Cp Rev                            | 196           |
| Zitromax 500mg Cp Rev                          | 151           |
| Zitromax Iv 500mg FA                           | 152           |
| Zocor 10mg Cp                                  | 495           |
| Zofran 4mg Amp 2ml                             | 436           |
| Zofran 4mg Cp Rev                              | 437           |
| Zofran 8mg Amp 4ml                             | 436           |
| Zofran 8mg Cp Rev                              | 437           |
| Zoladex 3,6mg Ser                              | 324           |
| Zoladex La 10,8mg Ser                          | 325           |

| <b>Medicamento</b>             | <b>Página</b> |
|--------------------------------|---------------|
| Zoledrônico Ácido              | 556 e 557     |
| Zolibbs 4mg FA                 | 556           |
| Zoloft 50mg Cp                 | 492           |
| Zolpidem                       | 557           |
| Zolpidem 10 mg (EMS)           | 557           |
| Zolpidem 10 mg (Germed)        | 557           |
| Zolpidem 10 mg (Novartis)      | 557           |
| Zolpidem 10 mg (Sandoz)        | 557           |
| Zoltec 100mg Cap               | 298           |
| Zoltec 200mg Bolsa 100ml       | 299           |
| Zoltec 50mg Cap                | 298           |
| Zometa 4mg FA                  | 556           |
| Zopiclona                      | 558           |
| Zovirax (50mg/g) Creme Bis 10g | 115           |
| Zovirax 200mg Cp               | 115           |
| Zovirax 250mg FA               | 116           |
| Zyban 150mg Cp Ação Prolongada | 174           |
| Zyloric 100mg Cp               | 131           |
| Zyloric 300mg Cp               | 131           |
| Zylpen 500mg FA                | 390           |
| Zynvir Aciclovir 250mg FA      | 116           |
| Zyprexa 2,5mg Cp Rev           | 433           |
| Zyprexa 5mg Cp Rev             | 433           |
| Zyrtec 10mg Cp                 | 199           |
| Zyvox 600mg Bolsa 300ml        | 376           |
| Zyvox Cp Rev 600mg             | 375           |